

開放系の有効場理論 第 2 講

経路積分と Schwinger–Keldysh 形式

Enrico Pajer 氏の講義に基づく日本語講義ノート

講義：2026 年 7 月 6 日 ノート作成：2026 年 10 月 6 日

概要

Lindblad 方程式の具体例を通して減衰、位相緩和、エントロピーを整理し、期待値の演算子表示から二重化された経路積分を構成する。閉時間経路上の相関関数、Keldysh 基底、環境の積分消去による影響関数を、動画の順序に沿ってまとめる。これは逐語訳ではなく、数式を整えた日本語の要約ノートである。動画にない導出や留保は「文献補足」と表示し、参照箇所を併記する。

目次

1	対象動画・出典・読み方	2
1.1	確認した範囲と補足の扱い	2
1.2	記法と節ごとの出力	2
2	減衰する調和振動子と Heisenberg 描像	4
2.1	ジャンプ演算子が表す過程	4
2.2	占有確率の閉じた方程式	4
2.3	期待値から見る同じ減衰	4
3	純粋位相緩和：占有確率を変えずに干渉を失う	6
4	定常状態・unital 性・エントロピー	7
4.1	定常状態の条件	7
4.2	Unital は unitary とは異なる	7

1 対象動画・出典・読み方

対象は Enrico Pajer, “EFT of Open Systems: Path Integrals and the Schwinger–Keldysh Formalism (2/4)” である。公開元は Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES)、動画の長さは 1 時間 25 分 59 秒。公式配信ページの収録日は 2026 年 7 月 6 日、YouTube の公開日は 7 月 7 日である。

1.1 確認した範囲と補足の扱い

タイムスタンプ付き日本語自動生成字幕を全体にわたって確認した。数式の符号、指数、境界条件などは、字幕をそのまま転記せず、講師の公開ノート [?] と照合して再構成した。自動字幕は原語の校訂済み逐語録ではない。動画のタイムスタンプは各節冒頭に付け、口頭で省略された計算、必要な適用条件、表現の精密化を追加する場合は、その段落を文献補足として明示する。

参照する公開ノートは *Lectures on Open Systems and Cosmology*, arXiv:2607.14351v1 である。動画より後に公表された複数の学校向けのノートなので、文献の章立て・式番号を動画の板書番号と混同しない。本稿中の文献の節番号はこの v1 版を指す。

本稿	内容	動画のおおよその範囲
2	減衰振動子と Heisenberg 描像	0:56–15:03
3	純粋位相緩和	15:12–19:04
4	定常状態、unital 性、エントロピー	19:07–26:52
5	経路積分を使う目的	27:14–37:17
6	期待値から閉時間経路へ	37:17–55:40
7	ソースと生成汎関数	55:47–58:34
8	経路順序と各種相関関数	59:05–1:09:42
9	Keldysh 基底と因果的応答	1:09:48–1:16:15
10	環境の消去と影響汎関数	1:16:33–1:25:44

1.2 記法と節ごとの出力

$\hbar = 1$ とし、 ρ は密度演算子、 H は Hamiltonian、 $\mathcal{L}$ はその時間発展の生成子とする。演算子の期待値を $\langle O \rangle = \text{Tr}(\rho O)$ 、経路積分内の平均を $\langle\langle f \rangle\rangle$ と書く。初期時刻は t_0 、観測時刻は t 、経路の折返し時刻は $t_f \geq t$ である。演算子と積分変数は文脈で区別し、必要な箇所では演算子にハットを付ける。

各 section は改ページして始まる。ソース先頭の `\OnlySection` を 0 から 1–10 のいずれかに変更すると、同じ `template.tex` から該当節だけを出力できる。通常は 0 にして全文をコンパイルする。

参考文献は `ref.bib` から `utphys.bst` を用いて組版する。

2 減衰する調和振動子と Heisenberg 描像

動画対応：0:56–15:03。一量子損失、占有確率、定常状態、随伴生成子。

2.1 ジャンプ演算子が表す過程

前講の Lindblad 方程式を出発点とする。

$$\dot{\rho} = \mathcal{L}(\rho) = -i[H, \rho] + \sum_{\mu} \mathcal{D}[L_{\mu}]\rho, \quad (2.1)$$

$$\mathcal{D}[L]\rho = L\rho L^{\dagger} - \frac{1}{2}\{L^{\dagger}L, \rho\}. \quad (2.2)$$

$[a, a^{\dagger}] = 1$ 、 $N = a^{\dagger}a$ 、 $H = \omega(N + 1/2)$ と置く。講師は $L \propto a$ を損失、 $L \propto a^{\dagger}$ を利得、 $L \propto N$ を位相緩和として挙げる。実際に計算する最初の例は $L = \sqrt{\kappa}a$ ($\kappa > 0$) だけを持つ純粋減衰である。平方根を付けることで、散逸項の係数が κ になる。

2.2 占有確率の閉じた方程式

数状態 $|n\rangle$ での対角成分 $p_n = \langle n|\rho|n\rangle$ を占有確率 (population) と呼ぶ。このモデルでは対角成分だけで方程式が閉じ、

$$\dot{p}_n = \kappa[(n+1)p_{n+1} - np_n], \quad n = 0, 1, \dots \quad (2.3)$$

となる。最初の項は $n+1$ から n への流入、次の項は n から $n-1$ への流出である。Hamiltonian はこの基底で対角なので、対角成分の式に ω は現れない。正常に規格化できる定常分布は $p_0 = 1$ 、 $p_{n>0} = 0$ 、すなわち真空状態である。講義ではこれを古典的な振り子の減衰の量子版として説明する。

文献補足：占有確率の式の成分計算：文献 [?] 第 3.5 節「Pure damping」。以下は講義で省略された行間の計算である。

$$\langle n|a\rho a^{\dagger}|n\rangle = (n+1)p_{n+1}, \quad (2.4)$$

$$\frac{1}{2}\langle n|\{N, \rho\}|n\rangle = np_n. \quad (2.5)$$

定常条件の $n=0$ 成分から $p_1 = 0$ 、続いて $p_2 = 0, \dots$ が得られ、規格化が $p_0 = 1$ を決める。対角成分の閉性はこの H, L の選択の性質であり、任意のジャンプ演算子に対して仮定しない。

2.3 期待値から見る同じ減衰

動画対応：9:06–15:03。

Schrödinger 描像で状態を発展させる代わりに、双対写像を観測量に作用させられる。

$$\text{Tr}[\Phi_t(\rho_0)O] = \text{Tr}[\rho_0\Phi_t^\dagger(O)], \quad (2.6)$$

$$\mathcal{L}^\dagger(O) = i[H, O] + \sum_\mu \left(L_\mu^\dagger O L_\mu - \frac{1}{2} \{L_\mu^\dagger L_\mu, O\} \right). \quad (2.7)$$

Hamiltonian 部分の符号が $-i$ から $+i$ になる。散逸部分も双対に移す際には $L\rho L^\dagger$ が $L^\dagger OL$ になることに注意する。 $O = N$ なら

$$\mathcal{L}^\dagger(N) = -\kappa N, \quad \langle N(t) \rangle = e^{-\kappa(t-t_0)} \langle N(t_0) \rangle. \quad (2.8)$$

占有数がゼロへ向かうことと、基底状態に緩和することは整合している。ゼロ点エネルギー $\omega/2$ があっても、基底状態の $\langle N \rangle$ はゼロである。

文献補足：双対性の意味と計算：文献 [?] 第 2.5 節「The Heisenberg-picture master equation」、第 3.5 節。

式 (2.7) はトレースの巡回性から定義される随伴であり、 $\mathcal{L}$ 自体が自己随伴という主張ではない。 $a^\dagger N a = N(N-1)$ を使うと $\mathcal{L}^\dagger(N) = \kappa[N(N-1) - N^2]$ となる。一般の非ユニタリー写像では $\Phi_t^\dagger(AB) = \Phi_t^\dagger(A)\Phi_t^\dagger(B)$ とは限らないため、演算子の積を発展させる際はその積全体に写像を作用させる。

3 純粋位相緩和：占有確率を変えずに干渉を失う

動画対応：15:12–19:04。

次は $L = \sqrt{\gamma} N$ ($\gamma \geq 0$) を選ぶ。 $L = L^\dagger$ なので散逸項は二重交換子として書ける。

$$\dot{\rho} = -i\omega[N, \rho] - \frac{\gamma}{2}[N, [N, \rho]]. \quad (3.1)$$

数基底で $\rho_{mn} = \langle m | \rho | n \rangle$ とすると、各成分が独立に発展する。

$$\dot{\rho}_{mn} = \left[-i\omega(m-n) - \frac{\gamma}{2}(m-n)^2 \right] \rho_{mn}, \quad (3.2)$$

$$\rho_{mn}(t) = e^{-i\omega(m-n)\Delta t} e^{-\gamma(m-n)^2 \Delta t/2} \rho_{mn}(t_0), \quad \Delta t = t - t_0. \quad (3.3)$$

対角成分では $m = n$ なので $p_n(t) = p_n(t_0)$ 。非対角成分 (coherence) はエネルギー差 $\omega(m-n)$ で振動し、 $\gamma > 0$ なら減衰する。このようにエネルギー占有を変えずに位相の情報が失われる過程を純粋位相緩和と呼ぶ。

	純粋減衰	純粋位相緩和
ジャンプ演算子	$\sqrt{\kappa} a$	$\sqrt{\gamma} N$
占有確率	低い n へ移動	一定
長時間の状態	基底状態へ緩和	初期占有を残した対角状態
主な効果	励起の損失	数基底の非対角成分の減衰

文献補足：式の復元と留保：文献 [?] 第 3.5 節「Pure dephasing」。

自動字幕では式 (3.3) の位相の符号と $(m-n)^2$ の二乗が不明瞭である。ここでは $\dot{\rho} = -i[H, \rho] + \dots$ という規約から復元した。非対角成分の消失は指定した基底についての記述であり、これだけで古典力学の全性質が導かれるわけではない。また、定常状態は一意ではなく、数基底で対角な規格化密度行列はすべて定常である。

4 定常状態・unital 性・エントロピー

動画対応：19:07–26:52。減衰例のエントロピーの議論は 8:01–9:06。

4.1 定常状態の条件

定常状態 ρ_* は $\mathcal{L}(\rho_*) = 0$ を満たす。閉じた系なら $[H, \rho_*] = 0$ である。エネルギー固有状態の混合はその例である。開放系では Hamiltonian 項と散逸項を合わせてゼロにする必要がある。講義の減衰例は、初めに混合状態であっても純粋な基底状態に到達しうることを示す。したがって部分系の von Neumann エントロピー

$$S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho) \quad (4.1)$$

が常に増加するとは限らない。

4.2 Unital は unitary とは異なる

写像 Φ が恒等演算子を保つことを unital 性と呼ぶ。

$$\Phi(\mathbf{1}) = \mathbf{1}. \quad (4.2)$$

有限次元 d では、これは最大混合状態 $\mathbf{1}/d$ を保つことと同じである。時間一様な Lindblad 半群 $\Phi_t = e^{t\mathcal{L}}$ では

$$\mathcal{L}(\mathbf{1}) = \sum_{\mu} [L_{\mu}, L_{\mu}^{\dagger}] = 0 \quad (4.3)$$

が条件になる。各 L_{μ} がその随伴と可換なら十分だが、必要なのは和がゼロになることである。講師はこの点を口頭で言い直している。特に Hermite なジャンプ演算子による位相緩和はこの条件を満たす。

有限次元の unital な CPTP 写像には

$$S(\Phi(\rho)) \geq S(\rho) \quad (4.4)$$

が成り立つ。講義では定理として紹介され、証明は行われない。

文献補足：定理の使い方：文献 [?] 第 3.2 節「Unital maps and the non-decrease of entropy」。

半群の任意の時間差に式 (4.4) を適用すれば、時刻に関する単調非減少性が従う。単に初期時刻からの各 Φ_t が unital だというだけでは、任意の二時刻を結ぶ写像が unital かつ CPTP であるとは限らない。このノートでは講義と同じ半群の設定を用いる。調和振動子は無限次元であり、 $\mathbf{1}$ は規格化可能な状態ではない。 $\mathbf{1}/d$ を用いる有限次元の議論をそのまま無限次元へ移さない。

文献補足：「基底状態へ行く」と「単調にエントロピーが減る」の区別：文献 [?] 第 3.5 節「Entropy and stationary states」。以下は式 (2.3) から追加した検算例である。

純粋な $|1\rangle$ からの減衰では、 $q = e^{-\kappa\Delta t}$ として

$$\rho(t) = q |1\rangle \langle 1| + (1 - q) |0\rangle \langle 0|, \quad S(t) = -q \log q - (1 - q) \log(1 - q). \quad (4.5)$$

初期・終状態では $S = 0$ だが、中間では $S > 0$ である。したがって講義の「ゼロへ減る」は長時間の極限を述べるものと読み、任意の初期状態からの単調減少とは解釈しない。閉じた全体系がユニタリーに発展する場合、その全体系の von Neumann エントロピーは一定である。

5 演算子から経路積分へ：何を計算したいのか

動画対応：27:14–37:17。

5.1 同じ形式、異なる物理的設定

講師は、繰り込みやゲージ理論、場の理論への拡張を見据えて、演算子形式と等価な経路積分の記述を用意する。さらに、同時刻の期待値だけでなく、異なる時刻の相関を一つの枠組みで扱うことを重視する。演算子形式で異時刻相関が計算できないという意味ではなく、その構造を整理する方法として経路積分が便利なのである。

Schwinger–Keldysh (SK) 形式が使われる状況は、講義では次のように区別される。

1. 純粋状態を Hamiltonian でユニタリーに発展させる場合。
2. 混合状態を Hamiltonian でユニタリーに発展させる場合。
3. 環境を捨象した部分系の非 Hamiltonian 的な発展を扱う場合。

SK 形式は最初の二つにも使える。混合状態を使うこと、場を二重化すること、散逸が存在することは、それぞれ異なる事項である。講師がここで「閉じた系／開いた系」と言うときは Hamiltonian 的な発展かどうか注目しており、電荷保存の有無だけで区別しているわけではない。

5.2 期待値の二通りの表示

まず閉じた系を考え、 $\rho_0 = \rho(t_0)$ とする。

$$\langle O(t) \rangle = \text{Tr} [U(t, t_0) \rho_0 U^\dagger(t, t_0) O] \quad (5.1)$$

$$= \text{Tr} [\rho_0 U^\dagger(t, t_0) O U(t, t_0)]. \quad (5.2)$$

一行目は状態の時間発展、二行目は $O_H(t) = U^\dagger O U$ という観測量の時間発展に対応する。この等式はトレースの巡回性による。時間依存 Hamiltonian も含めると

$$U(t, t_0) = \mathcal{T} \exp \left[-i \int_{t_0}^t ds H(s) \right]. \quad (5.3)$$

時間に沿って順に微小発展を掛けるため、時間順序 $\mathcal{T}$ が自然に現れる。これを経路積分へ置き換えるのが次節の課題である。

文献補足：記法の照合：文献 [?] 第 4.1 節、式 (4.1)–(4.4)。

式 (??) のトレース内の O は Schrödinger 描像の固定演算子であり、外側の $\langle O(t) \rangle$ は時刻 t における期待値を意味する。後で用いる経路 $x_+(s), x_-(s)$ は演算子ではなく積分変数である。この区別を保つと、二本の経路から一つの量子系の相関が得られる理由を追いやすい。

6 二本の経路と閉時間経路の構成

動画対応：37:17–55:40。位置基底の挿入、境界条件、場の二重化。

6.1 三つの通常の積分

簡単のため観測量を $\hat{x}^n$ に限る。 $\mathbf{1} = \int dx |x\rangle \langle x|$ をトレースの三か所へ挿入すると

$$\begin{aligned} \langle \hat{x}_H(t)^n \rangle &= \int dx_{+,0} dx_{-,0} dx_f \rho_0(x_{+,0}, x_{-,0}) x_f^n \\ &\quad \times \langle x_f | U(t, t_0) | x_{+,0} \rangle \langle x_{-,0} | U^\dagger(t, t_0) | x_f \rangle, \\ \rho_0(x_{+,0}, x_{-,0}) &= \langle x_{+,0} | \rho_0 | x_{-,0} \rangle. \end{aligned} \quad (6.1)$$

$x_{+,0}$ と $x_{-,0}$ は初期密度行列の二つの添字を区別する名前である。 x_f は観測時刻にトレースをとるための共通の位置である。 $\hat{x}^n$ が位置基底で対角だから、終点での挿入は単なる数 x_f^n になる。

6.2 二つの発展核を経路積分にする

次に、それぞれの行列要素を履歴の積分へ置き換える。

$$\langle x_f | U | x_{+,0} \rangle = \int_{x_+(t_0)=x_{+,0}}^{x_+(t)=x_f} \mathcal{D}x_+ e^{iS[x_+]}, \quad (6.3)$$

$$\langle x_{-,0} | U^\dagger | x_f \rangle = \int_{x_-(t_0)=x_{-,0}}^{x_-(t)=x_f} \mathcal{D}x_- e^{-iS[x_-]}, \quad (6.4)$$

$$S[x] = \int_{t_0}^t ds L(x(s), \dot{x}(s)). \quad (6.5)$$

二本目の重みの符号が逆なのは、時間発展演算子の随伴を用いているからである。二つの独立な積分変数を x_+ と x_- と呼ぶことが「場の二重化」であり、実在する量子自由度を二倍に増やしたわけではない。

$$\begin{aligned} \langle \hat{x}_H(t)^n \rangle &= \int dx_{+,0} dx_{-,0} dx_f \rho_0(x_{+,0}, x_{-,0}) \\ &\quad \times \int_{x_{+,0}}^{x_f} \mathcal{D}x_+ \int_{x_{-,0}}^{x_f} \mathcal{D}x_- e^{iS[x_+] - iS[x_-]} x_f^n. \end{aligned} \quad (6.6)$$


境界の数を積分する dx と、時間に依存する履歴を積分する $\mathcal{D}x$ を区別する。講師はこの点を繰り返し強調する。

6.3 終点では貼り合わせ、初期点では密度行列で重み付けする

式 (??) には次の二つの条件が組み込まれている。

$$x_+(t) = x_-(t) = x_f, \quad (x_{+,0}, x_{-,0}) \text{の重み} = \rho_0(x_{+,0}, x_{-,0}). \quad (6.7)$$

終点の共通の値 x_f も積分する。一方、初期点の二つの値は一般には一致しない。初期点まで $x_{+,0} = x_{-,0}$ と置くと、初期密度行列の非対角成分を捨ててしまう。



図は動画の前進枝・後退枝の説明を描き直したものである。紙面上の上下は経路を区別するための表示である。

境界積分・初期密度行列・終点の貼り合わせをまとめて I.C. (initial conditions) と略記すると

$$\langle \hat{x}_H(t)^n \rangle = \int_{\text{I.C.}} \mathcal{D}x_+ \mathcal{D}x_- e^{iS[x_+] - iS[x_-]} x_{\pm}(t)^n. \quad (6.8)$$

この式の挿入時刻は折返し点なので、 $x_+(t) = x_-(t)$ である。途中の異なる時刻へ演算子を挿入するときは、どちらの枝に置くかが重要になる。

文献補足：数式と境界条件の照合：文献 [?] 第 4.1 節、式 (4.6)–(4.12)。

I.C. という略記は、初期状態が真空であるとか、初期点が $-\infty$ であることを意味しない。有限の t_0 における一般の密度行列を重みとして選べる。運動量を含む観測量の導出には位置・運動量基底や演算子順序の扱いが必要であり、上の簡潔な導出は動画に合わせて位置の関数に限定している。

7 外部ソースと生成汎関数

動画対応：55:47–58:34。

7.1 汎関数微分で演算子を挿入する

観測量のたびに新しい積分を書く代わりに、各枝へ外部ソース $J_{\pm}(t)$ を導入する。

$$Z[J_+, J_-] = \int_{\text{I.C.}} \mathcal{D}x_+ \mathcal{D}x_- \exp \left\{ iS[x_+] - iS[x_-] + i \int_{t_0}^{t_f} ds [J_+ x_+ - J_- x_-] \right\}. \quad (7.1)$$

J_+ も J_- も自由に指定する外部関数であり、積分する動変数ではない。指数をソースで微分し、最後に $J_{\pm} = 0$ と置くことで場の挿入が得られる。

$$x_+(s) \longleftrightarrow \frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta J_+(s)}, \quad x_-(s) \longleftrightarrow -\frac{1}{i} \frac{\delta}{\delta J_-(s)}. \quad (7.2)$$

後退枝のソース項の符号を忘れない。多点関数にはこれらの微分を繰り返す。

7.2 両枝に同じソースを加えると 1 になる

動画で強調される規格化は

$$Z[J, J] = 1 \quad (7.3)$$

である。これは $J = 0$ に限った規格化よりも強い条件である。前進・後退で同一の外部作用を加えれば、二つの時間発展は打ち消し合う。

文献補足：演算子表示による確認：文献 [?] 第 4.1 節、式 (4.13)–(4.14)、(4.18)、(4.22)。

$H_J = H - J\hat{x}$ と定義すると、

$$Z[J_+, J_-] = \text{Tr}[U_{J_+} \rho_0 U_{J_-}^\dagger], \quad (7.4)$$

$$Z[J, J] = \text{Tr}[\rho_0 U_J^\dagger U_J] = \text{Tr} \rho_0 = 1. \quad (7.5)$$

最後の等式は規格化された初期状態と、実ソースに対するユニタリー発展を使う。この恒等式から、後で a 場だけの相関関数が消えることも導ける。

8 経路順序から時間順序・Wightman 関数へ

動画対応：59:05–1:09:42。

8.1 経路上で後の演算子を左に置く

経路積分中の $x_{\pm}$ は可換な数値の履歴だが、対応する量子演算子は一般には可換でない。その対応を指定するのが経路順序である。閉時間経路を $t_0 \rightarrow t_f \rightarrow t_0$ とたどったとき、後に現れる挿入を演算子積の左へ置く。したがって、+ 枝上では時間順序、- 枝上では反時間順序になる。また - 枝は経路上で必ず + 枝より後なので、異なる枝の積では - 枝の演算子を左へ置く。

二点関数を $C_{ab}(t, t') = \langle\langle x_a(t)x_b(t') \rangle\rangle$ (ここだけ $a, b \in \{+, -\}$) と書くと

$$C_{++}(t, t') = \langle\mathcal{T}\hat{x}(t)\hat{x}(t')\rangle, \quad (8.1)$$

$$C_{--}(t, t') = \langle\overline{\mathcal{T}}\hat{x}(t)\hat{x}(t')\rangle, \quad (8.2)$$

$$C_{+-}(t, t') = \langle\hat{x}(t')\hat{x}(t)\rangle, \quad (8.3)$$

$$C_{-+}(t, t') = \langle\hat{x}(t)\hat{x}(t')\rangle. \quad (8.4)$$

右辺の演算子は Heisenberg 描像である。最後の二つは時間順序を付けない Wightman 関数である。 C_{+-} の右辺の順序が逆転するのは t と t' の大小ではなく、枝の配置による。動画でも講師がこの順序をその場で確認している。

8.2 多点関数と二本の枝で扱える範囲

同じ規則は多点関数にも適用できる。

$$\langle\langle \prod_i x_+(t_i) \prod_j x_-(s_j) \rangle\rangle = \langle\overline{\mathcal{T}} \left[\prod_j \hat{x}(s_j) \right] \mathcal{T} \left[\prod_i \hat{x}(t_i) \right] \rangle. \quad (8.5)$$

二本の枝は、反時間順序のブロックと時間順序のブロックを作る。より複雑な順序を持つ OTOC (out-of-time-order correlator) には、さらに折返しを増やした経路が必要になる場合がある。講義はこの点を紹介するにとどめ、一般の多重経路の計算は行わない。

文献補足：対応式の照合と折返し点：文献 [?] 第 4.2 節、式 (4.23)、(4.26)–(4.30)。

折返し時刻 t_f は最後の演算子挿入より後に選ぶことができる。挿入のない余分な区間は $U^\dagger(t_f, t)U(t_f, t) = \mathbf{1}$ として相殺される。これは、観測時刻と経路の終端を同一視しなくてもよい理由である。

講義の休憩後には、真空・ユニタリー発展での通常の in-out 経路積分との関係についても言及がある。ただし、その場では証明は示されない。本稿ではこの発言を、すべての SK 相関関数が通常の時間順序積と同じだという主張には拡張しない。複素時間経路と $i\epsilon$ 処方についても短い助言があるが、具体的な計算はこの動画の範囲外である。

9 Keldysh 基底：ゆらぎと応答を分ける

動画対応：1:09:48–1:16:15。

9.1 平均と差への基底変換

二本の枝を次の線形結合へ組み替える。

$$x_r = \frac{x_+ + x_-}{2}, \quad x_a = x_+ - x_-, \quad x_{\pm} = x_r \pm \frac{x_a}{2}. \quad (9.1)$$

講師は r, a を retarded/advanced の名称で呼ぶ。この段階では変数の名前であり、以下の相関関数の因果構造を見るとその意味が明らかになる。

9.2 四つの二点関数

このノートでは講師の公開ノートと同じく、 G_R, G_A の定義に $-i$ を含めない。

$$G_K(t, t') := \langle\langle x_r(t) x_r(t') \rangle\rangle = \frac{1}{2} \langle\{\hat{x}(t), \hat{x}(t')\}\rangle, \quad (9.2)$$

$$G_R(t, t') := \langle\langle x_r(t) x_a(t') \rangle\rangle = \theta(t - t') \langle[\hat{x}(t), \hat{x}(t')]\rangle, \quad (9.3)$$

$$G_A(t, t') := \langle\langle x_a(t) x_r(t') \rangle\rangle = \theta(t' - t) \langle[\hat{x}(t'), \hat{x}(t)]\rangle, \quad (9.4)$$

$$\langle\langle x_a(t) x_a(t') \rangle\rangle = 0. \quad (9.5)$$

G_K は対称化されたゆらぎ、 G_R は後の時刻に現れる因果的応答の構造を表す。また $G_A(t, t') = G_R(t', t)$ である。 rr の反交換子には $1/2$ があるが、 ra, ar には付けない。

文献補足：規約と係数の照合：文献 [?] 第 4.2 節、式 (4.31)–(4.41)。

上の G_R そのものを、 $-i$ または i を含む別の慣用的な Green 関数と同一視しない。ソースへの線形応答の係数を使うときも、ソースを Hamiltonian へ入れる符号と揃える必要がある。特に G_A の交換子は G_R と引数の順序が逆である。以下に示す一例の展開は、動画で省略された代数計算を補ったものである。 $t > t'$ として $A = \langle\hat{x}(t)\hat{x}(t')\rangle$ 、 $B = \langle\hat{x}(t')\hat{x}(t)\rangle$ とすると

$$\langle\langle x_r(t) x_a(t') \rangle\rangle = \frac{1}{2}(C_{++} - C_{+-} + C_{-+} - C_{--}) = \frac{1}{2}(A - B + A - B) = A - B. \quad (9.6)$$

$t < t'$ では同じ線形結合がゼロになり、式 (??) の θ 関数が得られる。

9.3 何がゼロになるのか

式 (??) の一般化は、すべての挿入が a 場である相関の消失である。

$$\langle\langle x_a(t_1) \cdots x_a(t_n) \rangle\rangle = 0 \quad (n \geq 1). \quad (9.7)$$

自動字幕の「 a 場を一つでも含めばゼロ」という読み方は採用しない。実際、 ra と ar は一般に非ゼロである。二重化された場は、新たな独立の物理的振動子を二つ導入するものではなく、相関と応答を整理する構造を持っている。

文献補足：全 a 相関が消える理由：文献 [?] 第 4.2 節、式 (4.42)–(4.46)。

ソースにも $J_r = (J_+ + J_-)/2$ 、 $J_a = J_+ - J_-$ を定義すれば

$$J_+x_+ - J_-x_- = J_ax_r + J_rx_a. \quad (9.8)$$

両枝のソースが等しい条件は $J_a = 0$ であり、 $Z[J_r, J_a = 0] = 1$ となる。この恒等式を J_r で何度微分してもゼロなので、式 (??) が導かれる。これは二点関数に限らない、規格化からの制約である。

10 環境の積分消去と Feynman–Vernon 影響汎関数

動画対応：1:16:33–1:25:44。

10.1 系と環境を分ける

ここまで経路積分として構成したのは閉じた Hamiltonian 系である。SK 形式を導入しただけでは散逸は生じない。そこで全体系の変数を、追跡したい系 x と、追跡しない環境 q に分ける。

$$S_{\text{tot}}[x, q] = S_S[x] + S_E[q] + S_{\text{int}}[x, q]. \quad (10.1)$$

両枝に $x_{\pm}, q_{\pm}$ を用意した上で、 q_+, q_- の積分を実行し、 x_+, x_- の記述だけを残す。

10.2 影響汎関数の定義

環境に依存する重みをまとめて

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[x_+, x_-] &:= e^{iS_{\text{IF}}[x_+, x_-]} \\ &= \int_{\rho_{E,0}} \mathcal{D}q_+ \mathcal{D}q_- \exp \left\{ iS_E[q_+] - iS_E[q_-] \right. \\ &\quad \left. + iS_{\text{int}}[x_+, q_+] - iS_{\text{int}}[x_-, q_-] \right\} \end{aligned} \quad (10.2)$$

と定義する。この $\mathcal{F}$ が Feynman–Vernon 影響汎関数であり、 S_{IF} を影響作用と呼ぶ。講義では S_{IF} 自体を影響汎関数と呼ぶこともあるので、本稿では二つを記号で区別する。計算できるかどうかとは独立に、環境の全効果をこの一つの量へまとめられる。

文献補足：初期条件と用語：文献 [?] 第 4.3 節、式 (4.54)–(4.55) および同節の脚注。原論文は [?]

式 (??) のように環境だけの初期重みを切り出す際は

$$\rho_{SE}(t_0) = \rho_S(t_0) \otimes \rho_E(t_0) \quad (10.3)$$

という因子化初期状態を仮定している。これは字幕で明示されない仮定を文献から補ったものである。積分記号の添字 $\rho_{E,0}$ には、初期の $q_{+,0}, q_{-,0}$ の密度行列による重みと、終点 $q_+(t_f) = q_-(t_f) = q_f$ の貼り合わせおよび q_f の積分を含める。初期相関がある場合には初期の共同密度行列を保持し、この単純な分離をそのまま使わない。

10.3 系だけの有効作用

環境を積分した後、系の生成汎関数は

$$Z[J_+, J_-] = \int_{\rho_{S,0}} \mathcal{D}x_+ \mathcal{D}x_- \exp \left\{ iS_{\text{eff}}[x_+, x_-] + i \int ds (J_+ x_+ - J_- x_-) \right\}, \quad (10.4)$$

$$S_{\text{eff}}[x_+, x_-] = S_S[x_+] - S_S[x_-] + S_{\text{IF}}[x_+, x_-]. \quad (10.5)$$

閉じた系では作用は + 枝だけの関数と - 枝だけの関数の差だった。環境の相関を介して q を消去すると、 x_+ と x_- を同時に含む枝間相互作用が生じる。これが部分系の非ユニタリーな発展を表す経路積分上の新しい構造である。演算子形式の散逸項に対応する役割を、ここでは影響作用が担う。

講義の結びでは、影響作用に散逸、雑音、非 Markov 的な記憶効果が含まれることを述べる。これらを具体的な模型で計算するのは次の段階であり、この動画では影響汎関数の導入で終わる。

文献補足：模式的な「 $S_{\text{IF}} \neq 0$ なら開放系」の精密化：文献 [?] 第 4.3 節、式 (4.55)–(4.57) とその後の物理解釈に基づく整理。

影響作用にはパラメータの補正も含まれる。例えば実の局所汎関数について $S_{\text{IF}} = \delta S[x_+] - \delta S[x_-]$ と分離できる部分だけなら、系の作用を $S_S + \delta S$ へ変更して吸収できる。したがって非零の影響作用のすべてが、それだけで散逸を意味するわけではない。枝間の**相関関数**は閉じた系にも存在するが、ここで注目しているのは有効**作用**の枝間結合である。また、環境の積分消去は一般に時刻間の非局所性を生む。それを局所的な Lindblad 方程式へ置き換えるには追加の近似・条件が必要であり、影響汎関数を定義しただけで Markov 性が成立したとはみなさない。

10.4 この動画で到達した点

密度行列の両側の時間発展が二本の経路になり、枝の選択が演算子の順序を指定する。平均と差の基底に移ると、ゆらぎと因果的応答が明確になる。さらに環境を積分すると、同じ経路積分の中に部分系の開放的な力学を組み込める。以上が本動画の到達点である。動画説明欄に挙げられている有効作用の制約や摂動論の全項目が、この 85 分間ですべて導出されたわけではない。

補足出典の対応表

以下の節・式番号はすべて文献 [?] の arXiv v1 版を指す。

本稿	文献で補った内容	引用箇所
2	占有確率と随伴生成子の計算	第 3.5 節、式 (3.114)–(3.127) ; 第 2.5 節、式 (2.98)–(2.103)
3	位相緩和の符号・平方・定常状態	第 3.5 節、式 (3.139)–(3.143)
4	半群・有限次元の条件、非単調なエントロピー	第 3.2 節、式 (3.34)–(3.50) ; 第 3.5 節末尾「Entropy and stationary states」
5–6	描像・積分変数・境界条件の区別	第 4.1 節、式 (4.1)–(4.12)
7	$Z[J, J] = 1$ の演算子による確認	第 4.1 節、式 (4.13)–(4.22)
8	折返し点と相関の対応	第 4.2 節、式 (4.23)、(4.26)–(4.30)
9	r/a 係数・符号と全 a 相関の消失	第 4.2 節、式 (4.31)–(4.46)
10	因子化初期状態、影響作用の定義と解釈	第 4.3 節、式 (4.52)–(4.57) とその前後

`ref.bib` には、元のファイルを残した上で、INSPIRE の BibTeX 出力をそのまま追記した。各エントリ直前のコメントに取得 URL を記載している。元から存在した Caldeira–Leggett のエントリは保管しているが、本動画の補足の直接の出典には用いていないため、参考文献一覧には出力しない。

参考文献

- [1] E. Pajer, ``Lectures on Open Systems and Cosmology: Master Equation, Schwinger–Keldysh and Open Effective Field Theories," [arXiv:2607.14351](#) [[hep-th](#)].