

РІВНЯННЯ ПАРАБОЛІЧНОГО ТИПУ

Узагальнення рівняння дифузії-теплопровідності

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(A_{ij}(t, x) \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) - B(t, x)u + f \quad (1)$$

A_{ij} – симетрична додатно визначена матриця; $B \geq 0$.

$u \equiv u(t, x), \quad f \equiv f(t, x) \in C^2(\mathbb{R}_+ \otimes \mathbb{R}^n), \quad t \in \mathbb{R}_+, \quad x \equiv (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n,$

$\mathbb{R}_+ = \{t : t \in \mathbb{R}, t \geq 0\};$

Розв'язки (1) розглядаємо в класі функцій $u \equiv u(t, x) \in C^2(\mathbb{R}_+ \otimes \mathbb{R}^n)$, які

досить швидко спадають з першими похідними до нуля на нескінченності

$|u(t, x)| \leq C(|x|) \rightarrow 0, \quad \left| \frac{\partial u(t, x)}{\partial x_i} \right| \leq D(|x|) \rightarrow 0 \quad \text{при } |x| \rightarrow \infty, \quad \text{причому } \forall t \in [0, T], \quad T > 0,$

$$\int_{\mathbb{R}^n} d^n \mathbf{r} u^2(t, \mathbf{r}) < \infty.$$

Зауважимо, що ці умови пов'язані між собою і їх можна послабити.

Далі припускаємо, що для кожного $T > 0 \quad \exists M(T) < \infty: |f(t, \mathbf{r})| < M(T)$, тобто

$f(t, \mathbf{r})$ обмежена в кожній полосі $0 \leq t \leq T$, причому $\int_{\mathbb{R}^n} d^n x f^2(t, \mathbf{r}) < \infty$. Далі

позначаємо $\mathbf{r}^2 \equiv x_1^2 + \dots + x_n^2$ – скалярний квадрат вектора \mathbf{r} .

Початкова умова для (1) така:

$$u(0, \mathbf{r}) = v_0(\mathbf{r}) \in C^2(\mathbb{R}^n), \quad |v_0(\mathbf{r})| \leq M_1 < \infty. \quad (2)$$

Частковим випадком (1) є однорідне рівняння

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u$$

з умовою (2).

$$\frac{1}{2} \frac{\partial u^2}{\partial t} = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(A_{ij}(t, x) u \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n A_{ij}(t, x) \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial u}{\partial x_j} - B(t, x) u^2 + u f(t, x) \quad (3)$$

Проінтегруємо по усьому простору:

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int d^n x u^2 = \sum_{i,j=1}^n \int d^n x \frac{\partial}{\partial x_i} \left(A_{ij}(t, x) u \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) - \frac{1}{2} \int d^n x \sum_{i,j=1}^n A_{ij}(t, x) \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial u}{\partial x_j} - \int d^n x B(t, x) u^2 + \int d^n x u f(t, x).$$

Завдяки умовам на нескінченності $\int d^n x \frac{\partial}{\partial x_i} \left(A_{ij}(t, x) u \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) = 0$, а завдяки додатній визначеності A_{ij} та невід'ємності A_{ij} другий та третій доданки у правій частині менше нуля. Тому

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int d^n x u^2(x, t) \leq \int d^n x u f(t, x). \quad (4)$$

При $f(t, x) \equiv 0$ маємо

$$\int d^n x u^2(t, x) \leq \int d^n x u^2(0, x) \quad (5)$$

– оцінка через початкові умови.

Застосуємо це для доведення єдиності розв'язків задачі (1,2).

Нехай функції u_1, u_2 належать зазначеному класу функцій та задовольняють (1) з умовами (2). Тоді для різниці $w = u_1 - u_2$ маємо рівняння

$$\frac{\partial w}{\partial t} = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(A_{ij}(t, x) \frac{\partial w}{\partial x_j} \right) - B(t, x) w,$$

для якого отримуємо оцінку, аналогічну (5). Оскільки $w(0, x) = 0$, звідси

$$\int d^n x w^2(t, x) \leq 0, \text{ що можливо лише коли } w(t, x) \equiv 0, \text{ щ.т.д.}$$

РІВНЯННЯ ЕЛІПТИЧНОГО ТИПУ

Розглядаємо

$$\sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(A_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) - B(x) u + f = 0, \quad (6)$$

A_{ij} – симетрична додатно визначена матриця; $B \geq 0$.

Розв'язки (1) розглядаємо в класі функцій $u \equiv u(x) \in C^2(\mathbb{R}^n)$, які досить швидко спадають з першими похідними до нуля на нескінченності:

$$|u(x)| \leq C(|x|) \rightarrow 0, \quad \left| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right| \leq D(|x|) \rightarrow 0 \quad \text{при } |x| \rightarrow \infty, \quad \text{причому } \int_{\mathbb{R}^n} d^n \mathbf{r} u^2(t, \mathbf{r}) < \infty.$$

Аналогічно (3)

$$\sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(A_{ij}(x) u \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n A_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial u}{\partial x_j} - B(x) u^2 + u f(x) = 0.$$

Після інтегрування маємо

$$\frac{1}{2} \int d^n x \left\{ \sum_{i,j=1}^n A_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial u}{\partial x_j} + B(x) u^2 \right\} = \int d^n x u f(x). \quad (7)$$

Припустимо, що у нас є розв'язки u_1, u_2 з однаковими правими частинами з названого класу функцій. Тоді для різниці $w = u_1 - u_2$ маємо рівняння (6), в якому $f \equiv 0$. З рівняння (7), підставляючи $w = u_1 - u_2$ маємо

$$\int d^n x \left\{ \sum_{i,j=1}^n A_{ij}(x) \frac{\partial w}{\partial x_i} \frac{\partial w}{\partial x_j} + B(x) w^2 \right\} = 0, \quad \text{що дає } \sum_{i,j=1}^n A_{ij}(x) \frac{\partial w}{\partial x_i} \frac{\partial w}{\partial x_j} + B(x) w^2 \equiv 0 \quad \text{та}$$

$$\sum_{i,j=1}^n A_{ij}(x) \frac{\partial w}{\partial x_i} \frac{\partial w}{\partial x_j} \equiv 0, \quad \text{а значить } \frac{\partial w}{\partial x_j} \equiv 0, \quad w \equiv \text{const}. \quad \text{З умов на нескінченності } w \equiv 0.$$

РІВНЯННЯ ГІПЕРБОЛІЧНОГО ТИПУ

(нова нумерація)

Розглядаємо рівняння

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(A_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) - B(x) u + f \quad (1)$$

де $t \in \mathbb{R}_+$, $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3$ ($\mathbb{R}_+ = \{t : t \in \mathbb{R}, t \geq 0\}$), $u \in C^2(\mathbb{R}_+ \otimes \mathbb{R}^3)$, $f \in C^2(\mathbb{R}_+ \otimes \mathbb{R}^3)$.

Як і раніше, A_{ij} – симетрична додатно визначена матриця; $B > 0$, але A_{ij}, B не залежать від t .

Рівняння (1) розглядаємо разом із початковими умовами (задача Коші):

$$u(0, x) = \varphi(x), \quad \varphi \in C^3(\mathbb{R}^3), \quad (2)$$

$$\left. \frac{\partial}{\partial t} u(t, x) \right|_{t=0} = \psi(x), \quad \psi \in C^2(\mathbb{R}^3), \quad (3)$$

Домножимо (1) на $\frac{\partial u}{\partial t}$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 &\equiv \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(A_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) - B(x) u \frac{\partial u}{\partial t} + f \frac{\partial u}{\partial t} = \\ &= \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(A_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) - \sum_{i,j=1}^n \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left(A_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) - \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} (B(x) u^2) + f \frac{\partial u}{\partial t} \end{aligned}$$

або

$$\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + A_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial u}{\partial x_j} + B(x) u^2 \right] = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(A_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) + f \frac{\partial u}{\partial t}.$$

Інтегруємо по всьому простору

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int d^n x \left[\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + A_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial u}{\partial x_j} + B(x) u^2 \right] = \int d^n x f \frac{\partial u}{\partial t}. \quad (4)$$

Нехай функції u_1, u_2 належать зазначеному класу функцій та задовольняють

(1) з умовами (2). Тоді для різниці $w = u_1 - u_2$ маємо рівняння (1,2,3) з

нульовим джерелом $f \equiv 0$ та нульовими початковими умовами. З рівняння (4)

при $f(t, x) \equiv 0$ маємо

$$\frac{d}{dt} \int d^n x \left[\left(\frac{\partial w}{\partial t} \right)^2 + A_{ij}(x) \frac{\partial w}{\partial x_i} \frac{\partial w}{\partial x_j} + B(x) w^2 \right] = 0$$

Звідси, з урахуванням нульових початкових умов

$$\left[\left(\frac{\partial w}{\partial t} \right)^2 + A_{ij}(x) \frac{\partial w}{\partial x_i} \frac{\partial w}{\partial x_j} + B(x) w^2 \right]_t \equiv 0 \quad \text{і} \quad w \equiv 0.$$