



CHECK-LIST DE REPRISE

Pour le coureur en reprise après blessure
À glisser dans votre carnet d'entraînement.

SUIVI HEBDOMADAIRE

Sem.	Date	Volume (km)	Nb séances	Douleur max 0-10	Douleur J+1 0-10	Raideur matin O/N	Sensation globale
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

RÈGLES D'AJUSTEMENT

DOULEUR $\leq 3/10$ = OK

Une gêne légère est acceptable. Au-delà de 3/10 pendant la séance, ou si la douleur explose le lendemain, on ajuste — sans paniquer.

RÈGLE DES 20 %

Si la douleur augmente : réduire le volume hebdo de ~20 % pendant 7 à 14 jours, garder une intensité modérée, supprimer les séances agressives.

UNE SEULE VARIABLE

Ne changez qu'un paramètre à la fois (volume, intensité, terrain, chaussures). Sinon impossible de savoir ce qui fonctionne.

+ 10 % MAXI / SEMAINE

Quand vous progressez : maximum +10 % de volume hebdomadaire. Pas plus, même si vous vous sentez bien.

PAS DE DOUBLE PROGRESSION

Pas d'augmentation simultanée du volume de course ET de la difficulté du renforcement. Choisir l'un ou l'autre.

CONSTANCE > INTENSITÉ

3 séances régulières par semaine battent une séance hebdomadaire intense. Le corps s'adapte à ce qui est répété.

⚠️ CONSULTEZ SANS ATTENDRE SI :

Douleur > 7/10 • Douleur très localisée sur un point précis • Douleur nocturne ou au repos • Gonflement / rougeur / chaleur
• Sensation de blocage ou de dérobage • Douleur reproductible par sautilllements sur un pied • Aucune amélioration après 3 semaines de plan

Maxence Lecointe — Ostéopathe D.O. — Expert Running

Cabinet : 40 rue Royale, 59800 Lille

Prendre rendez-vous :

doctolib.fr/osteopathe/lille/maxence-lecointe