

外科

考古題本

考古製作群

考古寫手		考古組長	共筆長
黃祺升	洪曄博	潘祐君	陳文賢
陳君泓	朱奕帆	鍾承翰	顏嘉萱
趙柏儒	蔡睿文	賴冠愷	

共筆長的話

外科共同筆記

外科筆試題目 目錄

01 ABC 組考題	1
§ 選擇題：(每題 3 分) 90%.....	1
§ 簡答題	6
01 DEF 組考題	7
§ 選擇題.....	7
§ 問答	13
02 考題	14
§ 是非題	14
§ 選擇題.....	14
§ 簡答題	19
03 A 組考題	20
§ 是非題 (3 分)	20
§ 選擇題 (每題 3 分).....	20
§ 問答題 (4 分)	25
03 F 組考題	26
§ 是非題 (每題 4 分)	26
§ 選擇題 (每題 4 分)	26
§ 簡答題 (4 分)	29
04 A 組考題	30
§ 是非題	30
§ 選擇題.....	30
04 B 組考題	35
§ 是非題	35
§ 選擇題.....	35
B05 期中考 分類題目	40
§ 消化道潰瘍 陳炯年	40
§ 胰臟癌 田郁文	40
§ 林明燦哥老師/外科營養學	40
§ 楊博仁老師/病態性肥胖.....	41
§ 何承懋老師/肝衰竭的治療	42
§ 郭庭均老師/外傷病患的評估與處置	42
§ 周聖哲(郭庭均代班)老師/腹部外傷與超音波.....	42
§ 官振祥老師/淋巴水腫	44
§ 鄭乃禎老師/縫線引流管、慢性傷口	45
§ 戴浩志老師/軟組織感染、顯微手術	47
06 A 組題目	49
§ 是非題 (每題 4 分)	49
§ 選擇題 (每題 4 分)	49
06 B 組題目	53

§ 是非題（每題 4 分）	53
§ 選擇題（每題 4 分）	53
§ 簡答題（4 分）	56
06 C 組題目	57
§ 是非題	57
§ 選擇題	57
§ 簡答題：(每題 4 分).....	61
06 D 組題目	62
§ 選擇題	62
07 A 組題目	66
§ 是非題	66
§ 選擇題	66
§ 簡答題:(每題 4 分)	70
07 B 組題目	71
§ 選擇題	71
§ 簡答題:(每題 4 分)	75
07 C 組題目	76
§ 是非題	76
§ 選擇題	76
§ 簡答題:(每題 4 分)	80
07 D 組題目	81
§ 是非題	81
§ 選擇題	81
07 E 組題目	85
§ 是非題	85
§ 選擇題	85
§ 簡答題	88
07 F 組題目	89
§ 是非題	89
§ 選擇題	89
08 A 組題目	94
§ 是非題	94
§ 選擇題	94
08 B 組題目	99
§ 選擇題	99
08 C 組題目	101
08 D 組題目	101
§ 選擇題	101
§ 問答題	105
08 E 組題目	106
§ 是非題	106
§ 選擇題	106
§ 問答題	110
08 F 組題目	111
§ 是非題	111

§ 選擇題	111
09 A 組題目	117
§ 是非題	117
§ 選擇題	117
09 B 組題目	123
§ 問答題	123
§ 選擇題	123
09 C 組題目	129
§ 問答題	129
§ 是非題	129
§ 選擇題	129

01 ABC 組考題

§ 選擇題：(每題 3 分) 90%

1. 已確定之惡性肺腫瘤，欲施以外科手術前，須考慮是否有遠端肺外惡性腫瘤轉移 (distal metastasis)，下列敘述何者為錯？
 - (A) 肝臟與腎上腺為較常轉移之處。
 - (B) 全身骨骼同位素掃描可幫助判讀是否有骨頭轉移。
 - (C) 若有頸部淋巴腫大，可考慮先做細胞學穿刺檢查(Aspiration cytology)，以判讀是否已有轉移現象。
 - (D) 若懷疑有腦部之轉移，正子攝影(PET)之診斷正確率遠高於腦部的核磁共振攝影(MRI)檢查。
2. 下列何者為最常見的良性食道腫瘤？
 - (A) Hemangioma
 - (B) Polyps
 - (C) Hamatoma
 - (D) Leiomyoma
3. 下列何者非 AHA guideline class I 二尖瓣手術的適應症？
 - (A) 中度二尖瓣逆流，併肺部壓力升高
 - (B) 重度二尖瓣逆流，併運動功能下降
 - (C) 重度二尖瓣逆流，併肺積水
 - (D) 重度二尖瓣逆流，併肺高壓
 - (E) 重度二尖瓣逆流，併心律不整
4. 七個月大女嬰，體重 6 公斤，發現有一心室中膈缺損，為第一型，無主動脈瓣脫垂，下列建議何者較適當？
 - (A) 可以再等數個月，看其生長曲線是否符合年齡
 - (B) 建議先行心導檢查，看 Qp/Qs
 - (C) 應直接建議手術治療
 - (D) 可給 digoxin 及利尿劑，等瓣膜脫垂再建議手術
5. 下列哪一項是做胰頭十二指腸切除術前必須完成的檢查？
 - (A) 內視鏡膽道攝影併置放膽道支架以使黃疸消退而減少手術風險。
 - (B) 血管攝影以確定上腸動、靜脈是否被腫瘤侵犯。
 - (C) 內視鏡切片檢查以確定腫瘤為惡性的。
 - (D) 腹部電腦斷層或核磁共振以確定無肝臟轉移。
 - (E) 經皮穿肝膽道攝影併置放膽道引流管以使黃疸消退而減少手術風險。
6. 以下何者為真？
 - (A) Shunting procedure 是唯一肝移植以外能預防食道出血併發症的外科方法

- (B) 接受 total shunts 的病人，預防食道出血的功能並不好
- (C) TIPS 的使用主要是直接連通門靜脈跟下腔靜脈
- (D) selective shunts 比較不會出現肝腦病變
7. 根據世界糖尿病聯盟在 2011 年的建議，下面哪位台灣人建議用手術來做治療糖尿病？
- (A) 38 歲男性，罹患第二型糖尿病 3 年，目前吃兩種降血糖藥，BMI: 37
- (B) 18 歲女性，罹患第一型糖尿病 6 年，目前以胰島素控制，BMI: 24
- (C) 42 歲男性，罹患第二型糖尿病 8 年，目前吃三種降血糖藥，BMI: 26
- (D) 26 歲男性，罹患第一型糖尿病 10 年，目前以胰島素控制，BMI: 32
- (E) 56 歲男性，罹患第二型糖尿病 20 年，目前以胰島素控制，BMI: 25
8. 下列何種胃部疾病中，何者不是以手術切除作為首要的治療選擇？
- (A) 第 2 期胃腺癌(gastric adenocarcinoma)。
- (B) 胃部異位胰(ectopic pancreas)合併消化道出血。
- (C) 初期胃部淋巴瘤(gastric lymphoma)
- (D) 4 公分的胃部基質瘤(gastrointestinal stromal tumor of the stomach)
9. 關於 neurogenic claudication 的敘述何者有誤？
- (A) lumbar spinal stenosis 可引起此種跛行情況
- (B) 患者站立過久會有雙腳麻痛症狀
- (C) 患者走一段路後會有症狀
- (D) 患者騎腳踏車一段時間後會有症狀
10. 先天性橫膈疝氣(congenital diaphragmatic hernia, CDH)中，哪一型最常見？
- (A) Bochdalek type
- (B) Hiatal hernia
- (C) Morgagni hernia
- (D) Spigelian hernia
11. 何處受傷可引起大量失血？
- (A) 胸腔
- (B) 腹腔
- (C) 大腿骨
- (D) 以上皆是
12. 肝癌手術前的檢查當中，哪一項與手術的安全性最沒有關聯？
- (A) 血中總膽紅素濃度(total bilirubin)
- (B) ICG test
- (C) 血小板濃度(platelet count)
- (D) 影像檢查中是否有腹水

(E) 血液中天門冬胺酸轉胺酶 AST(GOT)濃度

13. 以下何者不屬於甲狀腺癌？

- (A) 未分化癌 anaplastic type
- (B) 乳突癌 papillary carcinoma
- (C) 濾泡癌 follicular carcinoma
- (D) 類癌 carcinoid tumor
- (E) 髓質癌 medullary carcinoma

14. What is the most common carbohydrate used for TPN?

- (A) Dextrose
- (B) Fructose
- (C) Invert sugar
- (D) Lactose

15. Which of the following is NOT an advantage of monofilament sutures?

- (A) Less tissue drag
- (B) Doesn't wick
- (C) Good knot security
- (D) Less tissue reaction

16. 下列何者不是治療胃腸道基質瘤 GIST 的標靶藥物？

- (A) 基利克 imatinib (glivec)
- (B) 舒癌特 sunitinib (sutent)
- (C) 癌瑞格 Regorafenib (Stivarga)
- (D) 截瘤達 Xeloda (Capecitabine)

17. 從捐贈者取下的腎臟，必須使用哪一種器官保存液灌洗並低溫保存？

- (A) Saline solution
- (B) HTK solution
- (C) HAES solution
- (D) Ringer's solution

18. Glioblastoma 目前的標準治療包括手術後的同步化學和放射治療(CCRT)，使用的化學治療為何？

- (A) BCNU
- (B) Temozolomide
- (C) Bevacizumab
- (D) Methotrexate

19. 陳先生是一位 50 歲的男性，因口腔癌接受了由耳鼻喉科團隊所進行的廣泛性切除與頸部淋巴結廓清手術，所造成的組織缺損立即由整形外科團隊以大小約 5*5

公分的橈動脈前臂游離皮瓣進行顯微重建手術，前後耗時約 8 小時。身為照顧醫師，有關手術後照顧應注意的事項，何者最不適當？

- (A) 每小時觀察皮瓣血流狀態如顏色、溫度、微血管再充填(capillary refilling)
- (B) 每小時進行 Doppler 血流計檢查
- (C) 頸部傷口放置砂袋壓迫血管吻合處以避免出血
- (D) 監測尿輸出量

20. 一位 42 歲男性，因下腹痛接受闌尾切除，病理顯示 1.5cm carcinoid tumor，沒有血管或 mesoappendix 的侵犯，接下來作何處置？

- (A) Right hemicolectomy
- (B) 以 Octreotide 來治療 carcinoid syndrome 沒有效
- (C) 不須再作任何治療
- (D) 放射治療
- (E) 以 Streptozotocin 治療

21. 肺結核之手術適應症，下列何者除外？

- (A) 開放陰性空腔 (open negative cavity)
- (B) 非典型性結核 (atypical tuberculosis)
- (C) 儘管抗結核藥物治療，但仍為陽性痰液 (persistently positive sputum)
- (D) 肺組織破壞合併感染 (destroyed lung with persistent infection)
- (E) 大量咳血 (massive hemoptysis)

22. 何者非脫離呼吸器前的準備？

- (a) 呼吸器強度 maximal inspiration pressure>25cmH₂O
- (b) 潮氣量 total volume>5cc/kg
- (c) 靜態順應性 static compliance>30cc/cmH₂O
- (d) 每分鐘通氣量<180cc/kg/min
- (e) 氧合能力 PaO₂/FiO₂<100

- (A) abcd
- (B) abce
- (C) acde
- (D) abde
- (E) abcde

23. 對於腹部外傷病患，可以考慮做哪些檢查？

- (A) 作 DPL
- (B) 作 FAST
- (C) 作 physical examination
- (D) 以上皆可

24. 那些人容易罹患乳癌，下列何者為非？
- (A) 家屬有乳癌者，尤其是母親或姊妹
 - (B) 偏好高脂肪食物者
 - (C) 三十歲以後生第一胎或未曾生育者
 - (D) 以上皆是
25. On a T2 weighted MRI a degenerative disc may have which appearance?
- (A) Black
 - (B) Light grey
 - (C) White
 - (D) Red
 - (E) Green
26. 左腿 S1 radiculopathy，MRI 見 L4~5 disc 在 T2W2 signal intensity 下降，L5~S1 左邊 ruptured disc，請問下列哪些敘述是正確的？
- (A) 若發生 incontineence，須馬上手術
 - (B) 目前最好的治療是 cage fixation on L5~S1 不須 transpedicular fixation and fusion
 - (C) 這病例導致背痛，應同時接受 L4~5 手術
 - (D) 須 cage fixation on L4~5 須 transpedicular fixation and fusion
 - (E) microsurgical discectomy 10 year recurrence rate about 12%
27. 有關神經母細胞瘤(neuroblastoma)下列敘述何者錯誤？
- (A) 發生率約 7000 名活產有 1 例
 - (B) 一般而言 stage 4S 病患的預後比 stage 4 更差
 - (C) 不是所有的病人都需要手術治療
 - (D) 有 MYCN amplification 的腫瘤預後較差
28. 下列為傷口覆蓋豬皮或屍皮的優點，何者除外？
- (A) 減少傷口疼痛
 - (B) 減少換藥次數
 - (C) 減少發炎反應
 - (D) 提供傷口良好的癒合環境
 - (E) 可掌控傷口癒合速度
29. 腹部外傷評估時，何種方式最適合在現場重複使用？
- (A) CT SCAN
 - (B) FAST
 - (C) DPL
 - (D) KUB

(E) ANGIOGRAPHY

30. 移植前評估，哪一項檢查是為了避免 hyperacute rejection?

- (A) Cross matching
- (B) HLA tissue typing
- (C) VDRL screening
- (D) CMV screening

§ 簡答題

1. 影響 GBM 存活之因素?(曾漢民 5%)
2. 手指末端受傷組織缺損是很常見的，常用的重建方式有哪些？(謝榮賢 5%)

01 DEF 組考題

§ 選擇題

1. 關於頭頸部重建，下列敘述何者錯誤？
 - (A) 胸大肌肌皮瓣(pectoralis major myocutaneous flap)由胸肩峰動脈(thoracoacromial artery)供應血流，可以用來重建鼻咽處的組織缺損
 - (B) 肩胸皮瓣(deltpectoral flap)由內乳動脈(internal mammary artery)的肋間穿透支(intercostal perforating branches)供應血流。目前仍被廣泛應用於頭頸部重建
 - (C) 橈側前臂皮瓣(radial forearm flaps)為目前重建頭頸部軟組織的重要來源
 - (D) 1998 年，在顯微手術的輔助下，成功完成第一例的人類異體喉移植
2. 以下何者較不常用來做頭頸口腔癌切除後的重建？
 - (A) 大腿前外側皮瓣 Anterolateral thigh (ALT) fasciocutaneous flap
 - (B) 小腿腓骨皮瓣 Fibula osteocutaneous flap
 - (C) 前臂橈骨動脈 Radial forearm flap
 - (D) 腹部深下動脈穿透枝皮瓣 Deep inferior epigastric perforator flap (DIEP)
 - (E) 空腸(jejunum)腸道皮瓣
3. 電燒傷的病人通常何種血液檢驗值會升高，代表其肌肉受傷程度？
 - (A) CPK
 - (B) BUN
 - (C) WBC
 - (D) Creatinine
 - (E) Hemoglobin
4. 壓瘡產生的順序
 - (1) 水泡
 - (2) 發紅
 - (3) 壞死
 - (4) 潰瘍
 - (5) 表皮剝落
 - (A) abcde
 - (B) baecd
 - (C) dceab
 - (D) badec
 - (E) baced
5. 有關尿道下裂(Hypospadias)，下列敘述何者正確？
 - (A) 病人出生後應儘速手術矯正尿道下裂
 - (B) 病人應先接受包皮環切手術，等 1 歲再矯正尿道下裂

- (C) 尿道開口愈低位(靠近會陰)者，發生率愈高
- (D) 手術的原則是把陰莖拉直並且把尿道開口做到龜頭前端
6. Typical sciatica symptom，下列何者不正確？
- (A) Symptom aggravated by forward flexion
- (B) Symptom aggravated by driving
- (C) Symptom aggravated by knee bending
- (D) Symptom aggravated by cough
- (E) Straight leg rising test usually positive
7. A right-sided disc herniation at the L5-S1 level typically may cause: (多選)
- (A) Low back pain and right sciatica
- (B) Weakness of dorsiflexion of the right foot
- (C) A diminished or absent right knee jerk
- (D) Diminution of sensation over the medial aspect of the right foot, including the great toe
- (E) Weakness of dorsiflexion of the left foot
8. 放射治療作為乳癌根除手術後之輔助療法，在下列情況下可考慮加作放射治療？
- (A) 癌細胞轉移之腋下淋巴結超過 4 個
- (B) 侵襲性腫瘤大於 5 公分
- (C) 手術邊緣靠近或有癌細胞感染
- (D) 乳房保留手術
- (E) 以上皆是
9. 關於外傷病患，輸液治療的原則何者不正確？
- (A) Damage control resuscitation 的觀念是說，輸血時採用 FFP : pRBC : platelet = 1:1:1
- (B) In blunt or penetrating head injuries, SBP should be kept above 100 mmHg
- (C) 對於戰場上的士兵受傷大量流血，7.5% saline 是較適合的選擇
- (D) FFP 和 Fresh whole blood 的凝固因子差別在於 factor V and VII
- (E) In penetrating torso injuries with uncontrolled hemorrhagic shock, fluid resuscitation should be initiated only for Class III hemorrhagic shock
10. 腦死判定準則，何者為是？
- (1) 病人陷入昏迷，其氣管抽痰不能引起咳嗽反射
- (2) 必須依賴人工呼吸器
- (3) 其確定為新陳代謝、藥物中毒所導致之昏迷
- (4) 低體溫昏迷必須先排除可逆性之昏迷
- (5) 兩次腦死判定間隔四小時

- (A) a+b+c+d
- (B) a+b+c+e
- (C) b+c+d+e
- (D) a+b+d+e
- (E) a+b+c+d+e

11. 經由 transalaryngeal intubation 後，最容易受傷的部位為何？

- (A) Nose
- (B) Tongue
- (C) Esophagus
- (D) Subglottis
- (E) Trachea

12. 下列何者不是橡皮圈結紮術(rubber band ligation)的適應症？

- (A) 第一度內痔
- (B) 第二度內痔
- (C) 第三度內痔
- (D) 肛門乳突肥大(hypertrophic anal papilla)

13. 下列何者為非？

- (A) 所有的胃腸道基質瘤都應被視為惡性腫瘤
- (B) 胃腸道基質瘤和胃癌一樣，其腫瘤指標為 CEA
- (C) 基利克對復發、轉移之胃腸道基質瘤，約有 80%的臨床有效性
- (D) 微創手術可應用於腸胃道基質瘤的治療
- (E) 標靶藥物治療後，仍可整合外科及其他介入性療法，共同治療癌症

14. 一個 50 歲男子在上臂後方有很深的撕裂傷，自述是遭人咬傷，你建議應遵循何種 wound healing 模式？

- (A) Primary healing
- (B) Delayed primary healing
- (C) Secondary healing
- (D) Healing of partial-thickness wounds

15. 人終其一生，可能得到痔瘡的可能性是？

- (A) 15%
- (B) 30%
- (C) 50%
- (D) 80%

16. 以下關於副甲狀腺之敘述，何者為是？

- (A) 血鈣過高，最常見的原因是，含鈣藥物攝取過多

- (B) 甲狀腺機能亢進不會引起高血鈣
- (C) 原發性的副甲狀腺機能亢進的原因有：Parathyroid adenoma 及 Parathyroid hyperplasia
- (D) 不論原因是 Parathyroid adenoma 或是 Parathyroid hyperplasia，施行的術式皆相同
17. 要減少肝癌手術後腫瘤的復發，以下哪一種方法最可能有效？
- (A) 手術前針對腫瘤做肝動脈栓塞
- (B) 手術中採取血流控制(vascular control)的方法減少出血
- (C) 合併 B 型肝炎肝硬化的病人，在手術後給予抗病毒藥物治療
- (D) 手術後給予化學治療藥物
- (E) 採用微創手術進行肝癌切除
18. 下列何 X 光檢查對顏面骨折的初步診斷較不適宜？
- (A) Facial bone CT
- (B) Water's view
- (C) Zygomatic arch
- (D) 3D CT
19. 治療先天性橫膈疝氣(congenital diaphragmatic hernia, CDH)的首要在於？
- (A) 緊急手術修補橫膈破洞以恢復肺換氣功能
- (B) 控制肺動脈高壓並維持血氧濃度
- (C) 應盡快裝上 ECMO
- (D) 開放性動脈導管結紮(PDA ligation)
20. 哪一種脊椎腫瘤屬於 intramedullary tumor?
- (A) Ependymoma
- (B) Meningioma
- (C) Schwannoma
- (D) osteosarcoma
21. 六十歲男性，因胃竇部(antrum of stomach)2.5 公分大的胃腺癌(gastric adenocarcinoma)接受手術治療。術前檢查的腫瘤分期(clinical staging)是 cT2N1M0。依照標準的建議，這位病患應接受下列何種治療？
- (A) Subtotal gastrectomy + D2 lymph nodes dissection
- (B) Total gastrectomy + D2 lymph nodes dissection
- (C) Endoscopic submucosal resection
- (D) Local tumor excision + D1 lymph nodes dissection
22. 下列何者不是接受 Y 型胃繞道手術後常見的副作用？
- (A) 貧血
- (B) 胃食道逆流

- (C) 骨質疏鬆
- (D) 吻合處潰瘍
- (E) 掉頭髮

23. 最常因門脈高壓導致出現靜脈區張破裂的靜脈叢位於：

- (A) 直腸壁
- (B) 肚臍周邊
- (C) 肝門區
- (D) 食道壁

24. 在做胰頭十二指腸切除術時不一定會切除下列哪一結構？

- (A) 十二指腸
- (B) 胃幽門
- (C) 膽囊
- (D) 胰臟頭部
- (E) 胃十二指腸動脈

25. 一位 13 個月大的女嬰，因 tachypnea, body weight 6 kg，其 cath data 如下：

	Pressure	SaO ₂
SVC	6	60
RV inlet	90/8	80
RV outlet	90/12	88
PA	90/35	88
Ao	90/60	92
LA	12	96

其 Qp/Qs 為？

- (A) 1.5
 - (B) 2.0
 - (C) 2.5
 - (D) 3.0
 - (E) > 4
26. 下列何者非 AHA guideline class I 主動脈瓣膜手術的適應症？
- (A) 嚴重主動脈瓣逆流，併左心擴大
 - (B) 重度主動脈瓣膜狹窄，併有胸痛表現
 - (C) 重度主動脈瓣膜狹窄，併有運動功能下降
 - (D) 重度主動脈瓣膜狹窄，併昏倒病史
 - (E) 中度主動脈瓣膜逆流，併有胸痛表現
27. 下列哪一個基因或蛋白質與食道癌之發生或 Disease progression 最無關係？
- (A) p16
 - (B) p53
 - (C) Ras
 - (D) Cyclin D
 - (E) nm23 H1
28. FVC 與 FEV1 是用以評估呼吸功能之哪一部分？
- (A) 通氣功能(ventilation)
 - (B) 氣體交換功能(gas exchange)
 - (C) 以上皆是
 - (D) 以上皆非
29. 原發性腦瘤中良性腫瘤最常見的是：
- (A) pituitary tumor
 - (B) meningioma

(C) schwannoma

(D) hemangioma

30. 下列哪一個免疫抑制藥物最有可能有致畸胎性，準備要懷孕的移植病友不宜使用？

(A) Cyclosporine

(B) Tacrolimus

(C) Mycophenolate mofetil

(D) Prednisolone

§ 問答

1. 尺神經斷裂會使大部份的手掌內在肌(*intrinsic muscle*)失去功能，即使修補後也必須經過很長時間，至少 2-3 年，功能才會慢慢恢復。但大都只能恢復一部分功能，功能恢復不好會造成 *claw finger deformity*。請問 *claw finger deformity* 是什麼樣的姿勢？(謝榮賢)

02 考題

§ 是非題

1. 急性肝衰竭產生的合併症是影響全身的不光只是肝臟單一器官
2. 凝血功能異常是急性肝衰竭重要 biomarker

§ 選擇題

1. 以下敘述何者錯誤？
 - (A) 胃癌發生率在台灣還排在十大癌症中，但有逐漸下降的趨勢
 - (B) 胃癌減少可能與幽門桿菌去除有關
 - (C) 目前台灣早期胃癌比率較中晚末期胃癌低
 - (D) 胃癌確診需靠電腦斷層
2. 以下敘述何者正確？
 - (A) 晚期胃癌的治療希望是開刀
 - (B) 病人身體狀況良好，其早期胃癌的手術切除可不作淋巴腺清除
 - (C) 依照指引若已有腹廣泛轉移，且無阻塞或腫瘤流血的情況應也可做胃癌切除手術
 - (D) 早期胃癌手術不宜使用腹腔鏡進行
3. 下列哪種情況不需使用 TPN(total parenteral nutrition)?
 - (A) 術前營養不良的胃癌病患
 - (B) 全胃切除手術後的胃癌病患
 - (C) High output 的小腸造口病患
 - (D) 預計接受 Whipple 手術的膽管癌病患
4. 使用 TPN(total parenteral nutrition)會有那些併發症，何者為非？
 - (A) 高血糖
 - (B) 低血糖
 - (C) 肝指數異常
 - (D) 菌血症
5. 食道之 secondary peristalsis 常出現於？
 - (A) 吞嚥硬食時
 - (B) 吞嚥流質時
 - (C) 受物理或化學刺激時
 - (D) 睡眠時

6. 胃繞道手術對下列哪種代謝性疾病的治療效果最好?
- (A) 高血壓
 - (B) 第一型糖尿病
 - (C) 高膽固醇血症
 - (D) 高尿酸血症
 - (E) 第二型糖尿病
 - (F) 裝弱考前哀哀叫病
7. 下列哪種術式是 2016 年台灣施行最多的減重手術
- (A) 胃繞道
 - (B) 胃間隔
 - (C) 胃束帶
 - (D) 胃袖狀切除
 - (E) 膽胰繞道術
8. 下列敘述何者錯誤?
- (A) Trachea 的起點是 cricoid cartilage(C6) to carina(T5)
 - (B) 在胚胎學 trachea 的形成，是在第三周末期，由 foregut 的 ventral side 形成 respiratory diverticulum，在第四周末期，esophagotracheal septum 癒合，將 esophagus 和 trachea 分隔成兩獨立器官
 - (C) Trachea atresia 最常見的是 type II:整個 trachea 沒有成行，雙側的 main bronchi 在 midline 合在一起，有時會合併 bronchio-esophageal fistul
 - (D) Esophageal atresia 最常見的是 type A: esophagus 的 distal 及 proximal 端沒有相連，且沒有形成任何的 tracheo-esophageal fistula
9. 一個 40 歲男子在上臂後方有很深的撕裂傷，自訴是遭人咬傷，你建議應遵循何種 wound healing 模式?
- (A) Primary healing
 - (B) Delayed primary healing
 - (C) Secondary healing
 - (D) Healing of Partial-Thickness Wounds
10. 理想的傷口敷料有何特性，下列何者為非?
- (A) 在傷口持續保持濕潤
 - (B) 有利於傷口癒合
 - (C) 進傷口自行擴創 (autodebridement)
 - (D) 使得傷口周圍的組織如同泡在水中
11. Which of the following is a non-absorbable suture material?
- (A) Vicryl
 - (B) Dexon

(C) Plain Catgut

(D) Nylon

12. Which of the following is NOT an advantage of monofilament sutures?

(A) Less tissue drag

(B) Doesn't wick

(C) Good knot security

(D) Less tissue reaction

13. 關於 Primary spontaneous pneumothorax 之敘述，何者為非？

(A) 抽菸會增加復發機會

(B) 好發於 15~30 歲

(C) 病患通常身材較為瘦高

(D) 好發於女性病患

14. 二十四歲病患，右側自發性氣胸，第一次發作，CXR 顯示最大塌陷距離 4 公分，請問以下何種處置較為適當？

(A) 保守氧氣治療，12 小時沒有惡化即可出院。

(B) 利用 IV 留置針或是 pigtail 導管抽除空氣，治療成功後病人即可出院，門診追蹤。

(C) 插上 Fr.28 胸管，接上 chest bottle 收住院，看漏氣是否自動停止。

(D) 收住院接受胸腔鏡手術，治療氣胸又預防日後復發。

15. 對於分化良好之甲狀腺癌，相對於甲狀腺單頁切除，施行根治性甲狀腺全切除手術的優點，以下何者為非？

(A) 術後可施行 I-131（放射性碘）的治療及掃描。

(B) 術後可以血中之甲狀腺球蛋白（thyroglobulin）值來追蹤。

(C) 癌症復發機率較低。

(D) 手術的風險較低。

16. 以下關於副甲狀腺之敘述，何者為是？

(A) 血鈣過高，最常見的原因是，含鈣藥物攝取過多

(B) 甲狀腺機能亢進不會引起高血鈣。

(C) 原發性的副甲狀腺機能亢進的原因有：Parathyroid adenoma 及 Parathyroid hyperplasia

(D) 不論原因是 parathyroid adenoma 或是 parathyroid hyperplasia，施行的術式皆相同。

17. 下列哪一項是做胰頭十二指腸切除術前必須完成的檢查？

(A) 內視鏡膽道攝影併置放膽道支架以使黃疸消退而減少手術風險

(B) 血管攝影以確定上腸繫膜動、靜脈是否被腫瘤侵犯

(C) 內視鏡切片檢查以確定腫瘤是惡性的

- (D) 腹部電腦斷層或核磁共振以確定無肝臟轉移
- (E) 經皮穿肝膽道攝影併置放膽道引流管以使黃疸消退而減少手術風險
18. 在做胰頭十二指腸切除術時不一定會切除下列哪一結構？
- (A) 十二指腸
- (B) 胃幽門
- (C) 膽囊
- (D) 胰臟頭部
- (E) 胃十二指腸動脈
19. 唇顎裂之治療方針何者為非？
- (A) 需階段性治療
- (B) 需要醫療團隊
- (C) 語言治療非常重要
- (D) 以外型整復為第一優先
20. 下列何者為小兒整形外科治療範圍？
- (A) Head and neck congenital anomaly
- (B) Face neurofibromatosis
- (C) Polydactyl
- (D) 以上皆是
21. 如何評估有無呼吸道吸入性燒傷(inhalation injury)？
- (1) 鼻毛是否燒焦
- (2) 口周圍或痰中是否有炭粒
- (3) 有無呼吸困難
- (4) 聲音改變、嘶啞
- (A) 2
- (B) 123
- (C) 34
- (D) 1
- (E) 1234
22. 當顯微自由皮瓣出現初期靜脈栓塞(venous congestion)時，會出現以下何者狀況？
- (A) 血管都卜勒(Doppler)訊號變強
- (B) 毛細血管再充盈時間(capillary refill)延長
- (C) 呈現灰紫色
- (D) 針扎(pinprick)血流速度變慢
- (E) 針扎(pinprick)血流顏色呈現鮮紅色
23. 以下合適拆線時機，何者錯誤？

- (A) 眼瞼皮膚：10~14 天
(B) 臉部皮膚：5~7 天
(C) 手部前臂皮膚：7~10 天
(D) 腿部膝蓋皮膚：10~14 天
(E) 頸部皮膚：5~7 天
24. 有關慢性潰瘍傷口癒合方式，有所謂的重建階梯(reconstructive ladder)，其先後順序為何？ 1.植皮手術(skin graft) 2.局部皮瓣手術(skin flap) 3.傷口縫合(wound closure) 4.游離皮瓣手術(free flap)
- (A) 3421
(B) 4213
(C) 3124
(D) 2413
25. 關於頭頸部重建，下列敘述何者錯誤？
- (A) 胸大肌肌皮瓣 (pectoralis major myocutaneous flap) 由胸肩峰動脈 (thoracoacromial artery) 供應血流，可以用來重建鼻咽處的組織缺損
(B) 肩胸皮瓣 (deltopectoral flap) 由內乳動脈 (internal mammary artery) 的肋間穿通支 (intercostal perforating branches) 供應血流，目前仍被廣泛應用於頭頸部重建
(C) 橈側前臂皮瓣 (radial forearm flaps) 為目前重建頭頸部軟組織的重要來源
(D) 1998 年，在顯微手術的輔助下，成功完成第一例的人類異體喉移植
26. 下列有關各種肺癌之處理方式敘述，何者為非？
- (A) 支氣管鏡及痰液細胞學檢查，可以幫忙得到正確之腫瘤細胞診斷
(B) 早期的 Squamous cell carcinoma 與 Adenocarcinoma 以外科治療為主
(C) Small cell carcinoma 則以 radiotherapy 治療為主
(D) 非小細胞癌中以 bronchial alveolar carcinoma 的預後較佳
27. 已確定之惡性肺腫瘤，欲施以外科手術前，需考慮是否有遠端肺外惡性腫瘤轉移 (distal metastasis)，下列敘述何者為錯？
- (A) 肝臟與腎上腺為較常轉移之處。
(B) 全身骨骼同位素掃描可幫助判讀是否有骨骼轉移。
(C) 若有頸部淋巴腫大，可考慮先做細胞學穿刺檢查 (Aspiration cytology)，以判讀是否已有轉移現象。
(D) 若懷疑有腦部之轉移，正子攝影 (PET) 之診斷正確率遠高於腦部的核磁共振攝影 (MRI)檢查。
28. 若欲判定及定位「肺腫瘤」侵犯的範圍，下列哪一種檢查最適當？
- (A) 胸部 X 光檢查 (PA + Lateral views)
(B) 胸部電腦斷層胸部正子造影 (PET)

(C) 胸部超音波

§ 簡答題

1. 請舉出兩種常見的手部良性神經腫瘤：4%
2. 外傷病患最常發生的致死原因有以下幾項，請分別闡述相對應的機制與如何處置：
(林子忻 6%)

外傷致死原因	機制	外傷處置
例：腔室症候群 (compartment syndrome)	肌肉壞死造成高血鉀	緊急降低鉀離子
心包膜填塞 (cardiac tamponade)		
張力性氣胸 (tension pneumothorax)		
呼吸道阻塞 (airway obstruction)		
骨盆骨折 (massive hemothorax)		

03 A 組考題

§ 是非題 (3 分)

1. 為了預防氣切手術病人術後產生 trachea stricture，需採用有 cuffed 的氣切管，同時盡可能的使氣囊都處於飽滿的階段，以把氣管撐開，才不會形成氣管狹窄。

§ 選擇題 (每題 3 分)

1. 以下敘述何者錯誤？
 - (A) 胃癌發生率在台灣還排在十大癌症中，但有逐漸下降的趨勢
 - (B) 胃癌的減少可能與幽門桿菌的去除有關
 - (C) 目前在台灣早期胃癌比率較中晚末期胃癌低
 - (D) 胃癌的確診需靠電腦斷層
2. 關於胃腸基質瘤的描述何者錯誤？
 - (A) 手術切除時應加上淋巴腺擴清
 - (B) 腫瘤小於 3 公分，大部分沒症狀
 - (C) 化學治療效果差
 - (D) 腫瘤細胞來源與胃癌不同
3. 下列有關消化性潰瘍穿孔的描述何者錯誤？
 - (A) 有些病人在穿孔發生前不知道有潰瘍
 - (B) 電腦斷層診斷率最高
 - (C) 最常做的手術為胃切手術
 - (D) 病人術前有休克時，其預後差
4. 食道之 secondary peristalsis 常出現於
 - (A) 吞嚥硬食時
 - (B) 吞嚥流質時
 - (C) 受物理或化學刺激時
 - (D) 睡眠時
5. 全靜脈營養的主要適應症下列何者最為錯誤？
 - (A) 腸阻塞(ileus)超過 1 週以上
 - (B) 早期胃癌
 - (C) 急性胰臟炎超過 1 週以上
 - (D) 胃癌病人有胃出口阻塞(Gastric Outlet Obstruction)
6. 全靜脈營養有關的常見併發症，何者最不常見？
 - (A) Hyperglycemia
 - (B) Jaundice
 - (C) Sepsis
 - (D) Pneumothorax

(E) Fracture

7. 對於一位嚴重營養不良正考慮接受癌症手術治療的患者，何種營養介入計畫最重要？

- (A) 營養治療計劃
- (B) 篩選營養不良（知道他是營養不良患者）
- (C) 照會營養師
- (D) 給予靜脈營養

8. 下列關於氣管腫瘤的敘述，何者錯誤？

- (A) Squamous cell carcinoma 容易侵犯氣管下 1/3，易有局部淋巴結侵犯，是否切除乾淨與預後有關
- (B) Adenoid cystic carcinoma 容易侵犯氣管上 1/3，易有 submucosa infiltration，因此不易切除乾淨，但長得很硬，所以切除乾淨與預後無關
- (C) 最常見的良性 trachea tumor 是 chondroma
- (D) Trachea papilloma 容易轉變成 squamous cell carcinoma

9. 術前作新輔助治療(neoadjuvant therapy)可能的好處是？

- (A) Patient selection
- (B) Better patients' tolerance to chemotherapy
- (C) Sterilization: induce tumor regression and reduce the risk of R1 resection
- (D) The chance of an in vivo assessment of tumor chemosensitivity
- (E) 以上皆是

10. 在做胰頭十二指腸切除術時不一定會切除下列哪一結構？

- (A) 十二指腸
- (B) 胰臟鉤部(uncinate process)
- (C) 胃幽門
- (D) 胰臟頭部
- (E) 胃十二指腸動脈

11. 關於胰臟炎後所發生的假性囊腫(pseudocyst)下列哪些是正確的？

- (A) 一般發生於 severe acute pancreatitis 4 個禮拜之後
- (B) Well-defined wall, completely encapsulated
- (C) Location 可以是 intrapancreatic and/or extrapancreatic
- (D) Heterogeneous and non-liquid densities of varying degrees in different locations
- (E) 病人時常伴隨有器官衰竭現象

12. 下列何者不會造成創傷後立即死亡？(immediate death)

- (A) 主動脈破裂
- (B) 氣管撕裂傷

- (C) 第二級脾臟破裂
 - (D) 高位脊椎受損
13. 下列何種骨折可能會導致患者出血性休克？
- (A) 橈骨骨折
 - (B) 股骨骨折
 - (C) 肩胛骨骨折
 - (D) 骨盆骨折
14. 以流行病學來說，全世界最常見的淋巴水腫成因是什麼？
- (A) Milroy syndrome
 - (B) Filariasis-induced lymphedema
 - (C) Breast cancer related lymphedema
 - (D) Lymphedema disichiasis
15. 以下何者為乳房重建常用的自體皮瓣？
- (A) 闊背肌皮瓣(LD flap)
 - (B) 腹直肌根蒂皮瓣(pedicle TRAM flap)
 - (C) 深下腹動脈穿通枝皮瓣(DIEP flap)
 - (D) 以下皆是
16. 一個 30 歲男子在上臂外側有很深的撕裂傷，自訴是遭人咬傷，你建議應遵守何種 wound healing 模式？
- (A) Primary healing
 - (B) Delayed primary healing
 - (C) Secondary healing
 - (D) Healing of Partial-Thickness Wounds
17. 理想的傷口敷料有何特性，下列何者為非？
- (A) 在傷口持續保持濕潤
 - (B) 有利於傷口癒合
 - (C) 促進傷口自行擴創(autodebridement)
 - (D) 使得傷口周圍的組織如同泡在水中
18. 下列與預估大面積燒傷的死亡率有關，何者除外？
- (A) 年齡
 - (B) 燒傷面積
 - (C) 燒傷種類
 - (D) 吸入性灼傷
19. 下列為診斷吸入性燒傷的重要依據，何者除外？
- (A) 在密閉空間發生燒傷傷害

- (B) 顏面燒傷
 - (C) 聲音沙啞
 - (D) 有喘鳴(stridor)
20. 隨著年齡老化及工作的關係，上肢神經經常有被壓迫的現象而造成神經壓迫症候群，下列何者是最常見的上肢神經壓迫症候群？
- (A) Carpal tunnel syndrome
 - (B) Cubital tunnel syndrome
 - (C) Posterior interosseous nerve syndrome
 - (D) Radial tunnel syndrome
21. 先天手部多指症最常發生在哪一部位？
- (A) Thumb
 - (B) Index finger
 - (C) Middle finger
 - (D) Ring finger
 - (E) Little finger
22. 王先生 56 歲，右腳底遭尖銳物刺傷，二星期後發燒、畏寒、右腳腫脹疼痛，右腳底皮膚呈黑色壞死，有膿性滲出液，抽血檢查發現白血球數增加，血糖高於 400mg/dL。下列哪一項處置對王先生之病情控制最有幫助？
- (A) 清創手術與抗生素治療
 - (B) 血管攝影
 - (C) 胰島素注射
 - (D) 高壓氧治療
 - (E) 親水性敷料(Hydrocolloid dressing)
23. 關於全身性發炎反應症候群(systemic inflammatory response syndrome)的定義，下列何者正確？
- (A) 體溫攝氏 37 度，心跳每分鐘 100 次
 - (B) 呼吸每分鐘 25 次，白血球為 8000/mm³
 - (C) 體溫攝氏 34 度，白血球為 3000/mm³
 - (D) 心跳每分鐘 80 次，PaCO₂ 為 28mmHg
 - (E) 體溫攝氏 37 度，PaCO₂ 為 28mmHg
24. 在自由皮瓣(Free Flap)顯微手術後，臨床上之 Flap Monitoring 中，下列何者是表示血流可能不正常？
- (A) Color of flap skin: Pink
 - (B) Temperature of flap skin: 攝氏 32 度
 - (C) Capillary refilling time: 少於 1 秒
 - (D) Needle puncture: fresh red blood

- (E) Doppler sound: positive and pulsation
25. 下列何種顏面骨折的發生率最高？
- (A) 鼻骨
 - (B) 顴骨
 - (C) 下顎
 - (D) 上顎
26. 在上顎骨骨折當中，下列何者會造成所謂的 craniofacial dissociation
- (A) Le Fort I
 - (B) Le Fort II
 - (C) Le Fort III
 - (D) Le Fort IV
27. 唇顎裂病人之治療方針何者為非？
- (A) 需階段性治療
 - (B) 需要醫療團隊
 - (C) 語言治療非常重要
 - (D) 以外形整復為第一優先
28. 下列何者為小兒整形外科治療之範圍？
- (A) Head and neck congenital anomaly
 - (B) Face Neurofibromatosis
 - (C) Polydactyl
 - (D) 以上皆是
29. Which of the following sign is NOT related to ulnar nerve lesions proximal to the elbow?
- (A) Froment's sign
 - (B) Claw deformity
 - (C) Wartenberg's sign
 - (D) Wartenberg's syndrome
 - (E) Earle's sign
30. Which of the following muscle is innervated by median nerve?
- (A) Abductor digiti minimi
 - (B) Flexor digiti minimi
 - (C) Opponens digiti minimi
 - (D) Palmaris brevis
 - (E) None of above
31. Primary spontaneous pneumothorax 的手術適應症，何者為非？

- (A) 放置引流管後仍持續漏氣的病患
- (B) 自發性氣胸合併血胸病患
- (C) 病患為特殊職業（譬如：機師），希望手術減少復發機會
- (D) 第一次發作病患

§ 問答題（4 分）

1. Please describe the threshold concept(s) that mostly transform your understanding of acute liver failure and explain why.

03 F 組考題

§ 是非題（每題 4 分）

1. 胃癌的輔助化學治療(adjuvant chemotherapy)，適用於 lymph nodes dissection 不夠徹底的病患
2. 為了預防氣切手術病人術後產生 trachea stricture，需採用有 cuffed 的氣切管，同時盡可能的使氣囊都處於飽滿的階段，以把氣管撐開，才不會形成氣管狹窄。

§ 選擇題（每題 4 分）

1. 下列有關消化性潰瘍穿孔的描述何者錯誤？
 - (A) 有些病人在穿孔發生前都不知道有潰瘍
 - (B) 電腦斷層診斷率最高
 - (C) 最常做的手術為胃切手術
 - (D) 病人術前有休克時，其預後差
2. Patients receiving immune-enhanced diets after major cancer operations can be expected to
 - (A) Have fewer infectious complications
 - (B) Have decreased 30-day mortality rates compared with controls
 - (C) Show decreased synthesis of constituent visceral proteins
 - (D) Benefit from these nutritional products only if they have preoperative malnutrition
 - (E) Receive DNA oligonucleotides, omega-3 fatty acids, and prostaglandin E2 in the nutritional formulation
3. 下列關於氣管腫瘤的敘述，何者錯誤？
 - (A) Squamous cell carcinoma 容易侵犯氣管下 1/3，易有局部淋巴結侵犯，是否切除乾淨與預後有關
 - (B) Adenoid cystic carcinoma 容易侵犯氣管上 1/3，易有 submucosa infiltration，因此不易切除乾淨，但長得很硬，所以切除乾淨與預後無關
 - (C) 最常見的良性 trachea tumor 是 chondroma
 - (D) Trachea papilloma 容易轉變成 squamous cell carcinoma
4. Which of the following sign is NOT related to ulnar nerve lesions proximal to the elbow?
 - (A) Froment's sign
 - (B) Claw deformity
 - (C) Wartenberg's sign
 - (D) Wartenberg's syndrome
 - (E) Earle's sign
5. 二十五歲男性病患，左側自發性氣胸，第一次發作，並無接受撞擊等創傷病史，CXR 顯示最大塌陷距離 6 公分合併肋膜積液，放置豬尾巴引流管後引流出 600c.c.鮮血，患者目前生命徵象穩定，請問以下何種處置較為適當？

- (A) 保守氧氣治療，12 小時後氣胸範圍沒有惡化即可出院
 - (B) 持續利用 pigtail 導管抽除空氣並觀察，沒有漏氣後病人即可出院，門診追蹤
 - (C) 插上 Fr.28 胸管，接上 chest bottle 並觀察，沒有漏氣後病人即可出院，門診追蹤
 - (D) 安排緊急胸腔鏡手術
6. 乳癌病患經下列何種乳房切除手術後可以接受重建手術
- (A) modified radical mastectomy
 - (B) simple mastectomy and sentinel lymph node biopsy
 - (C) partial mastectomy and axillary lymph node biopsy
 - (D) all of above
7. 先天手部多指症最常發生在哪一部位？
- (A) Thumb
 - (B) Index finger
 - (C) Middle finger
 - (D) Ring finger
 - (E) Little finger
8. 下列哪一項是對的？
- (A) 手術是唯一有機會治癒胰臟癌的治療方式
 - (B) 手術切除乾淨胰臟癌後的病人不需輔助性(adjuvant chemotherapy)的化學治療
 - (C) 手術時做大範圍的淋巴腺清除可增加病人的存活率
 - (D) 臨床上是根據腫瘤的大小來判定是否可以切除乾淨
9. 一個 30 歲男子在上臂外側有很深的撕裂傷，自訴是遭人咬傷，你建議應遵守何種 wound healing 模式？
- (A) Primary healing
 - (B) Delayed primary healing
 - (C) Secondary healing
 - (D) Healing of Partial-Thickness Wounds
10. 唇顎裂病人之治療方針何者為非？
- (A) 需階段性治療
 - (B) 需要醫療團隊
 - (C) 語言治療非常重要
 - (D) 以外形整復為第一優先
11. 下列為診斷吸入性燒傷的重要依據，何者除外？
- (A) 在密閉空間發生燒傷傷害
 - (B) 顏面燒傷

- (C) 聲音沙啞
 - (D) 有喘鳴(stridor)
12. 以下敘述何者錯誤？
- (A) 胃癌發生率在台灣還排在十大癌症中，但有逐漸下降的趨勢
 - (B) 胃癌的減少可能與幽門桿菌的去除有關
 - (C) 目前在台灣早期胃癌比率較中晚末期胃癌低
 - (D) 胃癌的確診需靠電腦斷層
13. 目前認為影響 Lymphaticovenous anastomosis(LVA)的主要 prognostic factor 不包括
- (A) Early stage intervention
 - (B) Number of LVA bypasses
 - (C) Lymphedema grading
 - (D) Body mass index(BMI)
14. 以流行病學來說，全世界最常見的淋巴水腫成因是什麼？
- (A) Milroy syndrome
 - (B) Filariasis-induced lymphedema
 - (C) Breast cancer related lymphedema
 - (D) Lymphedema disichiasis
15. 在血管吻合(microvascular anastomosis)之顯微手術技巧中，有關 Continuous Suture Technique 之敘述，下列何者有誤？
- (A) May be used on the vessels which diameter is larger than 2.5mm
 - (B) May significantly widen the anastomosis-site
 - (C) May decreases anastomosis time by up to 50%
 - (D) May decreases anastomosis leakage
 - (E) Most commonly used for end-to-side anastomosis with large vessels
16. Which of the following is a non-absorbable suture material?
- (A) Vicryl
 - (B) Dexon
 - (C) Plain Catgut
 - (D) Nylon
17. 關於胰臟炎後所發生的假性囊腫(pseudocyst)下列哪些是正確的？
- (A) 一般發生於 severe acute pancreatitis 4 個禮拜之後
 - (B) Well-defined wall, completely encapsulated
 - (C) Location 可以是 intrapancreatic and/or extrapancreatic
 - (D) Heterogeneous and non-liquid densities of varying degrees in different locations

- (E) 病人時常伴隨有器官衰竭現象
18. 食道之 tertiary peristalsis 常出現於何種情形
- (A) Achalasia
 - (B) GE reflux
 - (C) Nutcracker esophagus
 - (D) Diffuse esophageal spasm
19. 10-0 縫線的粗細為？
- (A) 0.2mm
 - (B) 0.1mm
 - (C) 0.02mm
 - (D) 0.01mm
20. 自小客車駕駛與計程車對撞，胸前有明顯安全帶勒痕，病人主訴腹脹疼痛，有關腹部出血的急救措施何者為誤？
- (A) 盡快建立大口徑周邊血管靜脈輸液
 - (B) 立刻抽血檢查血紅素，若低於 10 則啟動大量輸血
 - (C) 若生命徵象穩定，則可安排腹部及骨盆腔電腦斷層
 - (D) 第一時間的輸液應該以 crystalloid 為主
21. 在做胰頭十二指腸切除術時不一定會切除下列哪一結構？
- (A) 十二指腸
 - (B) 胃幽門
 - (C) 膽囊
 - (D) 胰臟頭部
 - (E) 胃十二指腸動脈
22. 隨著年齡老化及工作的關係，上肢神經經常有被壓迫的現象而造成神經壓迫症候群，其中最常見的是腕隧道症候群，請問第二常見的是？
- (A) Carpal tunnel syndrome
 - (B) Cubital tunnel syndrome
 - (C) Posterior interosseous nerve syndrome
 - (D) Radial tunnel syndrome

§ 簡答題（4 分）

1. 請簡述“跟你原先認知的急性肝衰竭”所不同或不知道的觀念，並說明自己哪裡改變了
2. 煩請填寫在外科學習時，最優秀總醫師(必填)

04 A 組考題

§ 是非題

1. 為了預防氣切手術病人術後產生 trachea stricture，需採用有 cuffed 的氣切管，同時盡可能的使氣囊都處於飽滿的階段，以把氣管撐開，才不會形成氣管狹窄。

§ 選擇題

1. 10-0 縫線的粗細為？
(A) 0.2mm
(B) 0.1mm
(C) 0.02mm
(D) 0.01mm
2. 周邊動脈阻塞的典型症狀表現不包括？
(A) 皮膚、肌肉、組織萎縮
(B) 趾頭失去了彈性，趾甲變薄
(C) 毛髮掉落，組織溫度變低
(D) 足踝上臂血壓指數（ankle-brachial pressure index）下降
3. 以下哪一種體液所含的 HCO_3^- 濃度最高？
(A) Pancreatic juice
(B) Gastric juice
(C) Small bowel juice
(D) bile
4. 腸胃道手術後病患發生 Steatorrhea 情形，最需要補充哪一種藥物？
(A) Proton pump inhibitor
(B) Pancreatic enzymes
(C) Antibiotics
(D) Probiotics H2
5. 二十四歲男性病患，右側自發性氣胸，第二次發作，CXR 顯示最大塌陷距離四公分，請問以下何種處置較為適當？（林孟暉）
(A) 保守氧氣治療，12 小時後沒有惡化即可出院
(B) 利用 IV 留置針或是 pigtail 導管抽除空氣，治療成功後病人即可出院，門診追蹤。
(C) 插上 Fr.28 胸管，接上 chest bottle 收住院，看漏氣是否自動停止。
(D) 收住院接受胸腔鏡手術，治療氣胸又預防日後復發。
6. 56 歲王先生，右腳底遭尖銳物刺傷，一星期後發燒、畏寒，右腳腫脹疼痛，有膿性滲出液，抽血檢查發現白血球數增加，血糖高於 400 mg/dL。下列哪一項處置，對王先生之病情控制最有幫助？（鄭乃禎）

- (A) 血管攝影
 - (B) 清創手術、與抗生素治療
 - (C) 口服胰島素
 - (D) 高壓氧治療
 - (E) 親水性敷料 (Hydrocolloid dressing)
7. 在自由皮瓣 (Free Flap) 顯微手術後，臨床上之 Flap Monitoring 中，下列何者是表示血流可能不正常？ (戴浩志)
- (A) Color of flap skin: Pink
 - (B) Temperature of flap skin: 32°C
 - (C) Capillary refilling time: 少於 1 秒
 - (D) Needle puncture: fresh red blood
 - (E) Doppler sound: positive and pulsating
8. 一般而言，外科手術傷口感染時之細菌，下列何者是常見？
- (A) 格蘭氏陽性細菌
 - (B) 格蘭氏陰性細菌
 - (C) 厭氧菌
 - (D) 多種細菌結核桿菌
9. 關於 primary spontaneous pneumothorax 之敘述，何者為非？ (林孟暉)
- (A) 抽菸會增加復發機會
 - (B) 好發於 40~50 歲
 - (C) 病患通常身材較為瘦高
 - (D) 好發於男性病患
10. 下列與預估大面積燒傷的死亡率有關，何者除外？ (楊永健)
- (A) 年齡
 - (B) 燒傷面積
 - (C) 燒傷種類
 - (D) 吸入性灼傷
11. Which is benefit for recovery from surgery, eg. Faster for flatus and oral intake ? (林明燦)
- (A) Comprehensive nutrition
 - (B) Multidisciplinary care
 - (C) Minimal invasive surgery (MIS)
 - (D) All of the above
12. 以下哪項指標可以用來評估病患是否營養不良？
- (A) 病患近期體重變化

- (B) 食慾好壞
 - (C) 相關腸胃道症狀
 - (D) 以上皆可
13. 癌症末期病患以下何種狀況，可以考慮居家全靜脈營養(Home TPN)照護？
- (A) 王先生目前意識清楚且行動自如，但癌症復發造成腸胃道阻塞
 - (B) 吳先生大腸癌併肝轉移，體重明顯降低但目前進食正常
 - (C) 陳先生食道癌併肺轉移，無法經口進食
 - (D) 以上皆不適合
14. 下列關於 Bernstein test 何者為非？
- (A) 為了測試食道對酸的排空能力
 - (B) 為了測試食道對酸的敏感度
 - (C) 為食道 pH monitor 之輔助診斷工具
 - (D) 其假陽性約為 10%。
15. 關於胰臟炎後所發生的假性囊腫(pseudocyst)下列那些是正確的？
- (A) 一般發生在於 severe acute pancreatitis 4 個禮拜之後。
 - (B) Well-defined wall, completely encapsulated。
 - (C) Location 可以是 intrapancreatic and /or extrapancreatic。
 - (D) and non-liquid densities of varying degrees in different locations。
 - (E) 病人時常伴隨有器官衰竭現象。
16. 在血管顯微吻合(microvascular anastomosis)之顯微手術技巧中，有關 Vessel Size Mismatch 時之縫合選擇，下列何者有誤？
- (A) Size discrepancy < 2:1 => dilation, end-to-end
 - (B) Size discrepancy > 2:1, < 3:1 => beveling
 - (C) Size discrepancy > 2:1, < 3:1 => spatulation
 - (D) Size discrepancy > 3:1 => end-to-side
 - (E) Size discrepancy > 4:1 => continuous, end-to-end
17. 下列敘述何者錯誤？
- (1) ICG lymphography 可用來檢查淋巴管的走向，淋巴管阻塞，管狀線性的淋巴管呈現越清楚
 - (2) 實際淋巴管是越健康越透明越有彈性，白色的淋巴液看得越清楚，分布較多
 - (3) 因為 MRI 是淋巴水腫的 gold standard，將 MRV 影像疊合可以更看得清楚 lymphatic vascular anastomosis 的接口位置設計，對手術相當有幫助
 - (4) 病人接受自體淋巴結手術移植，供應區可以自行再生淋巴結，因此這是相當有效，病人傷害最小的治療方式
 - (5) Pumping, suction 和 lymphogenesis 是淋巴管與靜脈管接合有效舒緩淋巴水腫最重要的理論基礎

- (A) 134
- (B) 145
- (C) 1234
- (D) 1345
- (E) 12345

18. 下列敘述何者正確？

- (1) 淋巴水腫大致分為 primary,如 Milroy' s syndrome 跟 secondary 手術造成的
- (2) 乳癌做完全乳切除術後約 10%病人會有淋巴水腫發生
- (3) 依據 International society of lymphology 定義淋巴水腫有 I,II,III,IV 期，四期最為嚴重，組織越纖維化
- (4) 標準檢查淋巴水腫以核磁共振檢查為主，較無放射線傷害
- (5) 穿戴彈性壓力襪對於下肢淋巴水腫保守治療有一定程度的幫助，常見是一年後再評估是否有接受手術治療的必要性

- (A) 1
- (B) 1,2
- (C) 1,2,3
- (D) 1,2,3,4
- (E) 1,2,3,4,5

19. 下列何項敘述是錯誤的？

- (A) 肥胖跟癌症有關
- (B) 肥胖會增加醫療支出
- (C) 病態肥胖最有效的治療是藥物
- (D) 減重手術也可改善代謝性疾病

20. 下列何者不會造成創傷後立即死亡？(immediate death)

- (A) 主動脈破裂
- (B) 氣管撕裂傷
- (C) 第二級脾臟破裂
- (D) 高位脊椎受損

21. 在做胰頭十二指腸切除術時不一定會切除下列哪一構造？（田郁文）

- (A) 十二指腸
- (B) 胃幽門
- (C) 膽囊
- (D) 胰臟頭部
- (E) 胃十二指腸動脈

22. 關於全身性發炎反應症候群(systemic inflammatory response syndrome)的定義，下列何者正確？
- (A) 體溫 37°C ，心跳每分鐘 100 次
 - (B) 呼吸每分鐘 25 次，白血球為 $8,000/\text{mm}^3$
 - (C) 體溫 34°C ，白血球為 $3,000/\text{mm}^3$
 - (D) 心跳每分鐘 80 次， PaCO_2 為 28mmHg
 - (E) 體溫 37°C ， PaCO_2 為 28mmHg
23. 下列敘述何者是錯的？
- (A) 目前最普遍使用的減重手術術式是 laparoscopic sleeve gastrectomy
 - (B) Gastric bypass 是兼具 restrictive 和 malabsorption 的術式
 - (C) Gastric balloon 是 restrictive 的方法，其減重效果與 gastric bypass 差不多
 - (D) Sleeve gastrectomy 比較容易造成胃酸逆流

04 B 組考題

§ 是非題

1. 為了預防氣切手術病人術後產生 trachea stricture，需採用有 cuffed 的氣切管，同時盡可能的使氣囊都處於飽滿的階段，以把氣管撐開，才不會形成氣管狹窄。

§ 選擇題

1. Which of the following is the advantage of multifilament sutures?
(A) more tissue drag
(B) doesn't wick
(C) good knot security
(D) has "memory"
2. 引流管有何作用，下列何者為非？
(A) 可觀察傷口引流分泌物顏色、量、黏稠度
(B) 移除手術後傷口內的滲液、減少死腔
(C) 當深部傷口有膿瘍情形時，可外接無菌沖洗液予以沖洗
(D) 增進病患術後的舒適度
(E) 增加皮瓣與組織間的結合度，以促進傷口癒合
3. 以下哪一種體液所含的 HCO_3^- 濃度最高？
(A) Pancreatic juice
(B) Gastric juice
(C) Small bowel juice
(D) Bile
4. 腸胃道手術後病患發生 steatorrhea 情形，最需要補充哪一種藥物？
(A) Proton pump inhibitor
(B) Pancreatic enzymes
(C) Antibiotics
(D) Probiotics H2
5. 24 歲男性病患，右側自發性氣胸，第二次發作，CXR 顯示最大塌陷距離 4cm，請問以下何種處置較為恰當？
(A) 保守氧氣治療，12 小時後沒有惡化即可出院
(B) 利用 iv 留置針或是 pigtail 導管抽除空氣，治療成功後病人即可出院，門診追蹤
(C) 插上 Fr. 28 胸管，接上 chest bottle 收住院，看漏氣是否自動停止
(D) 收住院接受胸腔鏡手術，治療氣胸又預防日後復發
6. 一個 30 歲男子在上臂外側有很深的撕裂傷，自訴是遭人咬傷，你建議應遵循何種 wound healing 模式？（鄭乃禎）

- (A) Primary healing
 - (B) Delayed primary healing
 - (C) Secondary healing
 - (D) Healing of Partial-Thickness Wound
7. 下列有關吸入性灼傷的治療為誤？（楊永健）
- (A) 應給與預防性支氣管插管（prophylactic intubation）
 - (B) 觀察治療，不給予預防性支氣管插管（prophylactic intubation）
 - (C) 如伴隨大面積燒傷，應依 Parkland formula 給予體液
 - (D) 如伴隨大面積燒傷，應給予 tube feeding
8. 哪一項不是淋巴水腫在 Lymphoscintigraphy 上的表現？（黃柏誠）
- (A) Absent or delayed radiotracer transport
 - (B) Cutaneous flare
 - (C) Dermal diffusion or backflow
 - (D) Clearly visualized lymphatic collector
9. 關於 primary spontaneous pneumothorax 之敘述，何者為非？（林孟璋）
- (A) 抽菸會增加復發機會
 - (B) 好發於 40~50 歲
 - (C) 病患通常身材較為瘦高
 - (D) 好發於男性病患
10. 下列與預估大面積燒傷的死亡率有關，何者除外？（楊永健）
- (A) 年齡
 - (B) 燒傷面積
 - (C) 燒傷種類
 - (D) 吸入性灼傷
11. Which is benefit for recovery from surgery, eg. Faster for flatus and oral intake? (林明燦)
- (A) Comprehensive nutrition
 - (B) Multidisciplinary care
 - (C) Minimal invasive surgery (MIS)
 - (D) All of the above
12. Which is better in clinical nutrition for surgical patients?
- (A) Early nutrition
 - (B) Enteral nutrition
 - (C) Immunonutrition
 - (D) All the above

13. Which policy is utilized in surgical patients?
- (A) Early recovery after surgery (ERAS)
 - (B) European Society Parenteral Enteral Nutrition (ESPEN) Guideline
 - (C) Artificial intelligence (AI)
 - (D) All the above
14. 下列關於 Bernstein test 何者為非？
- (A) 為了測試食道對酸的排空能力
 - (B) 為了測試食道對酸的敏感度
 - (C) 為食道 pH monitor 之輔助診斷工具
 - (D) 其假陽性約為 10%。
15. 關於胰臟炎後所發生的假性囊腫(pseudocyst)下列那些是正確的？
- (A) 一般發生在於 severe acute pancreatitis 4 個禮拜之後。
 - (B) Well-defined wall, completely encapsulated。
 - (C) Location 可以是 intrapancreatic and /or extrapancreatic。
 - (D) Heterogeneous and non-liquid densities of varying degrees in different locations。
 - (E) 病人時常伴隨有器官衰竭現象。
16. 先天手部多指症最常發生在哪一部位？
- (A) Thumb Index finger
 - (B) Middle finger
 - (C) Ring finger
 - (D) Littler finger
17. 下列敘述何者錯誤？
- (1) ICG lymphography 可用來檢查淋巴管的走向，淋巴管阻塞，管狀線性的淋巴管呈現越清楚
 - (2) 實際淋巴管是越健康越透明越有彈性，白色的淋巴液看得越清楚，分布較多
 - (3) 因為 MRI 是淋巴水腫的 gold standard，將 MRV 影像疊合可以更看得清楚 lymphatic vascular anastomosis 的接口位置設計，對手術相當有幫助
 - (4) 病人接受自體淋巴結手術移植，供應區可以自行再生淋巴結，因此這是相當有效，病人傷害最小的治療方式
 - (5) Pumping, suction 和 lymphogenesis 是淋巴管與靜脈管接合有效舒緩淋巴水腫最重要的理論基礎
- (A) 134
 - (B) 145
 - (C) 1234
 - (D) 1345
 - (E) 12345

18. 下列敘述何者正確？

- (1) 淋巴水腫大致分為 primary,如 Milroy' s syndrome 跟 secondary 手術造成的
- (2) 乳癌做完全乳切除術後約 10%病人會有淋巴水腫發生
- (3) 依據 International society of lymphology 定義淋巴水腫有 I,II,III,IV 期，四期最為嚴重，組織越纖維化
- (4) 標準檢查淋巴水腫以核磁共振檢查為主，較無放射線傷害
- (5) 穿戴彈性壓力襪對於下肢淋巴水腫保守治療有一定程度的幫助，常見是一年後再評估是否有接受手術治療的必要性

- (A) 1
- (B) 1,2
- (C) 1,2,3
- (D) 1,2,3,4
- (E) 1,2,3,4,5

19. 下列何項敘述是錯誤的？（陳炯年）

- (A) 肥胖跟癌症有關
- (B) 肥胖會增加醫療支出
- (C) 病態肥胖最有效的治療是藥物治療
- (D) 藥物減重手術也可改善代謝性疾病

20. 下列何者不會造成創傷後立即死亡？(immediate death)

- (A) 主動脈破裂
- (B) 氣管撕裂傷
- (C) 第二級脾臟破裂
- (D) 高位脊椎受損

21. 在做胰頭十二指腸切除術時不一定會切除下列哪一構造？

- (A) 十二指腸
- (B) 胃幽門
- (C) 膽囊
- (D) 胰臟頭部
- (E) 胃十二指腸動脈

22. 關於全身性發炎反應症候群(systemic inflammatory response syndrome)的定義，下列何者正確？

- (A) 體溫 37°C ，心跳每分鐘 100 次
- (B) 呼吸每分鐘 25 次，白血球為 $8,000/\text{mm}^3$
- (C) 體溫 34°C ，白血球為 $3,000/\text{mm}^3$
- (D) 心跳每分鐘 80 次， PaCO_2 為 28mmHg

(E) 體溫 37°C , PaCO_2 為 28mmHg

23. 下列敘述何者是錯的？

(A) 目前最普遍使用的減重手術術式是 laparoscopic sleeve gastrectomy

(B) Gastric bypass 是兼具 restrictive 和 malabsorption 的術式

(C) Gastric balloon 是 restrictive 的方法，其減重效果與 gastric bypass 差不多

(D) Sleeve gastrectomy 比較容易造成胃酸逆流

B05 期中考 分類題目

§ 消化道潰瘍 陳炯年

1. 是非題：修補胃潰瘍 (gastric ulcer) 的穿孔時，不應該在潰瘍部分切片，以免增加出血風險。(A、B、C 組考題)

§ 胰臟癌 田郁文

2. 對於介於可切與不可切的胰臟管狀細胞癌 (borderline pancreatic ductal cell adenocarcinoma) 新輔助治療 (neoadjuvant therapy) 的可能好處是下列哪些選項? (A、B 組考題)
 - (A) 選擇病人 (patients selection)
 - (B) 可評估化療效果 (in vivo assessment of tumor chemosensitivity)
 - (C) 有機會讓腫瘤縮小而切得乾淨 (sterilization)
 - (D) 化療效果比較好 (better patients' tolerance and preserved anatomy)
 - (E) 以上皆是
3. 在做胰頭十二指腸切除術不一定會切除下列何者? (A、B 組考題)
 - (A) portal vein
 - (B) uncinate process
 - (C) 十二指腸 胰臟頭部
 - (D) 胃十二指腸動脈
4. 關於胰臟炎後所發生的 wall-off necrosis 下列哪一項是錯誤的? (A、B 組考題)
 - (A) 一般發生於 acute necrotizing pancreatitis 4 個星期之內
 - (B) well-defined wall, completely encapsulated
 - (C) location 可 intra- and/or extra-pancreatic
 - (D) Heterogeneous density

§ 林明燦哥老師/外科營養學

5. 全靜脈營養(TPN)最不常見的併發症為何? (A、C 組考題)
 - (A) 高血糖
 - (B) 肝功能異常
 - (C) 氣胸
 - (D) 心肌梗塞
 - (E) 電解質不平衡
6. 全靜脈營養(TPN)最不常見的併發症為何? (B 組考題)
 - (A) 高血糖
 - (B) 肝功能異常
 - (C) 氣胸
 - (D) 中風(CVA)

7. 以下哪項指標最少用來評估病患是否營養不良？（A 組考題）
- (A) 病患近期體重變化
 - (B) 食慾好壞
 - (C) 相關腸胃道症狀
 - (D) 心律不整
 - (E) 肌少症(Sarcopenia)
8. 哪項指標可以用來評估病患是否營養不良？（B 組考題）
- (A) 病患近期體重變化
 - (B) 食慾好壞
 - (C) 相關腸胃道症狀
 - (D) 以上皆可
9. Patients receiving immune-enhanced diets after major cancer operations can be expected to?（B 組考題）
- (A) have decreased 30-day mortality rates compared with controls
 - (B) have fewer infectious complications
 - (C) show decreased synthesis of constituent visceral proteins
 - (D) benefit from these nutritional products only if they have preoperative malnutrition receive DNA oligonucleotides, omega-3 fatty acids, and prostaglandin E2 in the
 - (E) nutritional formulation

§ 楊博仁老師/病態性肥胖

10. 下列哪些人不符合從 2020 年 5 月起健保給付減重手術的標準（複選）？（A、B 組考題）
- (A) 42 歲男性，BMI:38，合併高血脂
 - (B) 60 歲女性，BMI:42，合併高血壓、糖尿病
 - (C) 19 歲男性，BMI:48，合併睡眠呼吸中止
 - (D) 50 歲男性，BMI:35，合併第二型糖尿病，糖化血色素 7.0
 - (E) 23 歲女性，BMI:31，合併多囊性卵巢症候群病患近期體重變化
11. 腹腔鏡胃袖狀切除手術後第一年平均可以降低多少術前體重？（C 組考題）
- (A) 10%
 - (B) 25%
 - (C) 40%
 - (D) 50%
 - (E) 75%
12. 胃繞道手術對下列哪種疾病的改善效果最快？（C 組考題）
- (A) 高血壓

- (B) 高尿酸血症
- (C) 第二型糖尿病
- (D) 高膽固醇血症
- (E) 非酒精性脂肪肝炎

§ 何承懋老師/肝衰竭的治療

13. 簡答題：請簡述急性肝衰竭的臨床病程走勢，體液狀態(fluid status)，以及病生理機轉的相互關係。(A 組考題)
14. 關於全身性發炎反應症候群(systemic inflammatory response syndrome)的定義，下列何者正確？(B 組考題)
- (A) 體溫 37°C，心跳每分鐘 100 次
 - (B) 呼吸每分鐘 25 次，白血球為 8000/mm³
 - (C) 體溫 34°C，白血球為 3000/mm³
 - (D) 心跳每分鐘 80 次，PaCO₂ 為 28mmHg
 - (E) 體溫 37°C，PaCO₂ 為 28mmHg

§ 郭庭均老師/外傷病患的評估與處置

15. 關於全身性發炎反應症候群(systemic inflammatory response syndrome)的定義，下列何者正確？(C 組考題)
- (A) 選項遺失
16. 所謂的 Lethal triad，係指與外傷出血相關的惡性循環。請問不包括以下哪件事？
- (A) 凝血病變
 - (B) 低血鈣
 - (C) 酸中毒
 - (D) 低體溫
17. 以下何者非為「創傷急救復甦」的核心原則？(C 組考題)
- (A) damage control resuscitation
 - (B) massive fluid resuscitation
 - (C) hemostatic resuscitation
 - (D) hypotensive resuscitation

§ 周聖哲(郭庭均代班)老師/腹部外傷與超音波

18. 關於「腹內高壓」以下敘述何者正確？(C 組考題)
- (A) 經由導尿管路得到的膀胱壓力，無法代表腹內壓力值
 - (B) 腹內高壓的定義為:腹內壓力高於 15mmHg
 - (C) 腹內高壓也會影響遠端的顱內壓
 - (D) 單純血胸併出血性休克經急救復甦者，非高風險族群

19. 二十四歲男性病患，右側自發性氣胸，第二次發作，CXR 顯示最大塌陷距離 4 公分，請問以下何種處置較為適當？（A、B、C 組考題）
- (A) 保守氧氣治療，12 小時後沒有惡化及可出院。
 - (B) 利用 IV 留置針或是 pigtail 導管抽除空氣，治療成功後病人即可出院，門診追蹤。
 - (C) 插上 Fr.28 胸管，接上 chest bottle 收住院，看漏氣是否自己停止。
 - (D) 收住院接受胸腔鏡手術，治療氣胸又預防日後復發。
20. 食道遲緩不能給內科治療方式，不包含以下哪個？（A、B、C 組考題）
- (A) 鈣離子阻斷劑
 - (B) 氣球擴張術
 - (C) 肉毒桿菌注射術
 - (D) 一氧化氮（NO）
21. 以下哪些治療不是食道遲緩不能的外科治療方式？（B 組考題）
- (A) 開胸食道肌肉切開術
 - (B) 開腹食道肌肉切開術
 - (C) 胸腔鏡食道肌肉切開術
 - (D) 經口內視鏡食道肌肉切開術
 - (E) 以上皆是
22. 依據 Ishikawa 的分類系統，Ishikawa 的手指頭斷指傷害分成幾個小區（subzones）？（A、B、C 組考題）
- (A) 2 個
 - (B) 3 個
 - (C) 4 個
 - (D) 5 個
23. 關於手指的外傷性斷指，下列何者是最好的重建術式？（A、C 組考題）
- (A) 斷指接合回去
 - (B) 局部皮瓣修補傷口
 - (C) 修短骨頭，直接截指
 - (D) 腳趾轉至手指
24. 隨著年齡老化及工作的關係，上肢神經常有被壓迫的現象而出現神經壓迫症候群請問最常見的是？（C 組考題）
- (A) Radial tunnel syndrome
 - (B) Cubital tunnel syndrome
 - (C) Posterior interosseous nerve syndrome
 - (D) Carpal tunnel syndrome

25. 在 radial polydactyly (thumb duplication) , 最常使用的分類方法為 Wassel classification 就是根據 level of duplication 將 radial polydactyly (thumb duplication) 分為 type1-7 , 請問其中最常見的是 ? (C 組考題)

- (A) Type 2
- (B) Type 7
- (C) Type 4
- (D) Type 1

§ 官振祥老師/淋巴水腫

26. 以下均為 Indocyanine green (ICG , 循血綠) 之敘述 , 請選擇正確的對應 ? (A 、 B 、 C 組考題)

- (1) 若病人對硫化物過敏 , 不可使用此藥物
- (2) 此藥物本身是深暗藍色 , 加入生理食鹽水稀釋後會變綠色
- (3) 此藥物均靠腎臟代謝 , 因此腎功能不好者不能使用
- (4) 注射至體內會和血清蛋白結合
- (5) 注射於皮下色素殘留會呈現紫色的狀態
- (6) 目前對於此藥用於淋巴水腫手術是健保給付

- (A) OXXOXX
- (B) OXOOXX
- (C) XXXOXX
- (D) XXOOXO

27. 淋巴管的定位可以手術前在腫脹肢體的第二指間皮下注射循血綠(ICG), 下面四位病人請依 ICG 顯影型態從最嚴重到最輕微依序排出 ? (B 組考題)

圖片遺失

- (A) ACBD
- (B) ABCD
- (C) DCBA
- (D) DBCA

28. ICG 的注射位置和 LSG 相似 , 在肢體末端或要要做手術切口的遠端 , 深度也是皮下注射。ICG 的螢光需要有搭配近紅外線相機 , 才能顯像。請問 ICG excitation/emission 激發波長及發射波長為何 ? (B 組考題)

- (A) 512/1024nm
- (B) 256/750nm
- (C) 760/820nm
- (D) 1024/2203nm

29. 下列敘述何者不正確 ? (A 組考題)

- (1) 淋巴水腫大致分為 primary，如 Milroy' s syndrome 跟 secondary 手術造成的
- (2) 乳癌做完全乳切除後約 10%的病人會有淋巴水腫發生
- (3) 依據 international society of lymphology 定義，淋巴水腫有分 I, II, III, IV 期，第四期最為嚴重，組織越纖維化
- (4) 標準檢查淋巴水腫以核磁共振檢查為主，較無放射傷害
- (5) 穿戴彈性壓力襪對於下肢淋巴水腫保守治療有一定程度的幫助，常見是一年後再評估是否有接受手術治療的必要性
- (6) 課堂中參考文獻（楊家森醫師）認為，LVESA (lymphaticovenous end-to-side anastomosis) 通常在淋巴管跟靜脈管管徑相差大時使用的接合方法

- (A) 1235
- (B) 1345
- (C) 1346
- (D) 2356
- (E) 2345

30. 下列敘述何者不正確？（A 組考題）

- (1) ICG Lymphography 可用來檢查淋巴管的走向，淋巴管阻塞，管狀線性的淋巴管呈現越不清楚
- (2) 實際淋巴管是越健康越透明越有彈性，純白色的淋巴液看得越清楚，分佈較多
- (3) 因為 MRI 是淋巴水腫影像的 gold standard，將 MRV 影像疊合可以看得更清楚 lymphatic venous anastomosis 的接口位置設計，對手術相當有幫助
- (4) 病人接受自體淋巴結手術移植，供應區可以自行再生淋巴結，因此這是相當有效且對病人傷害最小的治療方式
- (5) Pumping、suction 和 lymphogenesis 是淋巴管與靜脈管接合有效舒緩淋巴水腫最重要的理論基礎

- (A) 134
- (B) 145
- (C) 1234
- (D) 2345
- (E) 12345

§ 鄭乃禎老師/縫線引流管、慢性傷口

31. Which of the following cell type plays an important role in the process of secondary wound healing? （B 組考題）

- (A) Neutrophil
- (B) Myoepithelial cell

- (C) Myofibroblast
 - (D) Mesenchymal stem cell
 - (E) Lymphocyte
32. 長期使用類固醇的病患，為了拮抗類固醇對傷口癒合的不良影響可使用：（A、B、C 組考題）
- (A) Vitamin A
 - (B) Vitamin B
 - (C) Vitamin C
 - (D) Vitamin D
33. Which of the following cell type plays a specific role in the process of secondary wound healing? （A、B、C 組考題）
- (A) Neutrophil
 - (B) Myoepithelial cell
 - (C) Mesenchymal stem cell
 - (D) Pericyte
34. 一個 30 歲男性在上臂外側有很深的撕裂傷，自訴是遭人咬傷，你建議應遵循何種 wound healing 模式？（B 組考題）
- (A) Primary healing
 - (B) Delayed primary healing
 - (C) Secondary healing
 - (D) Healing of partial-thickening wounds
35. 一個 50 歲男子在上臂後方有很深的撕裂傷，自訴是剛遭人咬傷，你建議應遵循何種 wound healing 模式？（A、C 組考題）
- (A) Primary healing
 - (B) Delayed primary healing
 - (C) Secondary healing
 - (D) Moist wound healing
 - (E) Healing of Partial-Thickness Wounds
36. 一般而言，外科手術傷口感染之細菌，下列何者最常見？（B 組考題）
- (A) 格蘭氏陽性細菌
 - (B) 格蘭氏陰性細菌
 - (C) 厭氧菌
 - (D) 多種細菌
 - (E) 結核桿菌
37. 在手術傷口感染時之細菌培養結果，下列何者是常見的體表細菌？（A、C 組考題）

- (A) 金黃色葡萄球菌
- (B) 大腸桿菌
- (C) 綠膿桿菌
- (D) 厭氧菌
- (E) 結核桿菌

38. Which of the following is an advantage of multifilament sutures? (A、C 組考題)

- (A) More tissue drag
- (B) Doesn't wick
- (C) Good knot security
- (D) Less tissue reaction
- (E) Has "memory"

§ 戴浩志老師/軟組織感染、顯微手術

39. 56 歲王先生有糖尿病，右腳底遭尖銳物刺傷，一星期後發燒、畏寒、右腳腫脹疼痛、有膿性滲出液，抽血檢查發現白血球數增加，血糖高於 400mg/dL。下列哪一項處置，對王先生病情控制最沒有幫助？(A、C 組考題)

- (A) 膿液之細菌培養
- (B) 胰島素治療
- (C) 清創手術
- (D) 抗生素治療
- (E) 親水性敷料 (hydrocolloid dressing) 換藥

40. 56 歲王先生，右腳底遭尖銳物刺傷，一星期後發燒、畏寒、右腳腫脹疼痛、有膿性滲出液，抽血檢查發現白血球數增加，血糖高於 400mg/dL。下列哪一項處置，對王先生病情控制最有幫助？(B 組考題)

- (A) 血管攝影
- (B) 清創手術與抗生素治療
- (C) 口服胰島素
- (D) 高壓氧治療
- (E) 親水性敷料

41. 糖尿病足潰瘍的誘發病因主要來自？(B 組考題)

- (A) 周邊血管病變
- (B) 營養失調
- (C) 免疫力低下
- (D) 紅血球變形
- (E) 周邊神經病變

42. 在血管顯微吻合 (microvascular anastomosis) 之顯微手術技巧中，有關於顯微物合技巧，下列何者「有誤」？(A、C 組考題)

- (A) 2 guide sutures (180 degrees apart)
 - (B) Perpendicular piercing
 - (C) Equal bites on either side
 - (D) Microforceps in lumen vs. retracting intima (endothelium)
 - (E) Avoid backwalling
43. 下列那一項「不屬於」表軟組織感染？（A、C 組考題）
- (A) Erysipela(丹毒)
 - (B) Folliculitis(毛素炎)
 - (C) Furuncles& carbunclesR
 - (D) Cellulitis(蜂窩組織炎)
 - (E) Necrotizing fasciitis(壞死性筋膜炎)
44. 在自由皮瓣（Free Flap）顯微重建手術後，臨床上之 Flap Monitoring 中，下列是表示血流可能「不正常」？（A 組考題）
- (A) Color of flap skin : Pink
 - (B) Temperature of flap skin : 32 度 C
 - (C) Capillary refilling time : 少於 1 秒
 - (D) Needle puncture : fresh red blood
 - (E) Doppler sound : positive and pulsating
45. 在血管顯微吻合（microvascular anastomosis）之顯微手術技巧中，有關 Vessel Size Mismatch 時之縫合選擇,下列何者有誤？（A 組考題）
- (A) Size discrepancy < 2:1 => dilation, end-to-end
 - (B) Size discrepancy > 2:1, < 3:1 => beveling
 - (C) Size discrepancy > 2:1, < 3:1 => spatulation
 - (D) Size discrepancy > 3:1 => end-to-side
 - (E) Size discrepancy > 4:1 => continuous, end-to-end

06 A 組題目

§ 是非題（每題 4 分）

1. Tracheobronchomalacia 是因為反覆的感染或發炎，造成氣管軟骨軟化，使呼吸或咳嗽時，呼吸道無法維持正常的結構而塌陷。

§ 選擇題（每題 4 分）

1. 哪一項不是淋巴水腫在 Lymphoscintigraphy 上的表現？
(A) Absent or delayed radiotracer transport
(B) Cutaneous flare
(C) Dermal diffusion or backflow
(D) Clearly visualized lymphatic collector
2. 下列哪條動脈不會供應胰臟頭部：
(A) GDA 胰十二指腸動脈
(B) PDA 胰十二指腸動脈
(C) Splenic artery
3. 術前作新輔助治療（neoadjuvant therapy）可能的好處是？
(A) Patient selection
(B) Better patients' tolerance to chemotherapy
(C) Sterilization: induce tumour regression and reduce the risk of R1 resection.
(D) The chance of an in vivo assessment of tumour chemosensitivity.
(E) 以上皆是。
4. 全靜脈營養（TPN）最不常見的併發症為何？
(A) 高血糖
(B) 肝功能異常
(C) 氣胸
(D) 心肌梗塞
(E) 電解質不平衡
5. 以下敘述何者錯誤？
(A) 胃癌發生率在台灣還排在十大癌症中，但有逐漸下降的趨勢
(B) 胃癌的減少可能與幽門桿菌的去除有關
(C) 目前在台灣早期胃癌比率較中晚末期胃癌低
(D) 胃癌的確診需靠電腦斷層

6. 下列哪種術式是 2020 年台灣施行最多的減重手術？
- (A) 胃繞道
 - (B) 胃間隔
 - (C) 胃束帶
 - (D) 胃袖狀切除
 - (E) 膽胰繞道術
7. 下列何者非腹腔鏡膽囊切除手術適應症？
- (A) gall stone colic pain.
 - (B) gall stone pancreatitis.
 - (C) 0.5cm gall bladder polyp.
 - (D) gall stone acute cholecystitis.
8. 依 Foucher 的分類，Foucher 手指斷指傷害分成幾個區？
- (A) 2
 - (B) 3
 - (C) 4
 - (D) 5
9. 手指外傷性斷指，下列何者是最好的重建術式？
- (A) 腳指轉至手指
 - (B) 局部皮瓣修補傷口
 - (C) 修短骨頭，直接截指
 - (D) 斷指接回去
10. 乳癌病患乳房切除手術後可以接受重建手術的時機為何？
- (A) 乳房切除術後立即重建
 - (B) 乳切除術後延遲重建
 - (C) 乳房切除術後延遲性立即重建
 - (D) 以上皆是
11. 下列有關氣管的解剖敘述何者有誤？
- (A) 氣管長約 10-12 公分，寬約 1.3-2.2 公分
 - (B) 氣管由 20 個橢圓型軟骨構成
 - (C) 氣管始於環狀軟骨（Cricoid cartilage）之下，末端是氣管分歧部（Carina）
 - (D) 氣管上半部在頸部，下半部在胸腔內
 - (E) 氣管分歧部（Carina）與胸骨角（Sternal angle），及第四胸椎的上緣在同一平面上
12. CXR 上顯示 deep sulcus sign，常見於哪一種疾病？
- (A) 氣胸。

- (B) 血胸。
 - (C) 膿胸。
 - (D) 漏斗胸。
13. 食道 pH monitor 以何點為陽性之臨界質？
- (A) pH2
 - (B) pH3
 - (C) pH4
 - (D) pH5
14. 關於唇顎裂，以下何者為非？
- (A) 唇顎裂和顎裂是不同成因
 - (B) 唇裂顎裂常同時手術
 - (C) 手術成功的要訣是相關肌肉的修補
 - (D) 語言恢復是主要目標之一
 - (E) 需治療團隊
15. 目前本院頭頸癌重建最常用到的皮瓣為？
- (A) ALT flap
 - (B) forearm flap
 - (C) Fibular flap
 - (D) PM flap
16. 56 歲王先生有糖尿病，右腳底遭尖銳物刺傷。一星期後發燒、畏寒，右腳底腫脹疼痛，有膿性滲出液，抽血檢查發現白血球數增加，血糖高於 400 mg/dL。下列那一項處置，對王先生之病情控制「最沒有」幫助？
- (A) 膿液之細菌培養
 - (B) 胰島素治療
 - (C) 清創手術
 - (D) 抗生素治療
 - (E) 親水性敷料（Hydrocolloid dressing）換藥
17. 下列何者不是以顯微手術來完成？
- (A) 斷臂重接
 - (B) 斷指重接
 - (C) 肌腱縫合手術
 - (D) 糖尿病足自由皮瓣重建手術
 - (E) 自由皮瓣移植-頭頸部腫瘤切除後重建、乳癌乳房切除後重建等
18. 3-0 縫線的粗細為？
- (A) 1mm

- (B) 0.5mm
 - (C) 0.2mm
 - (D) 0.1mm
19. 以下何種影像最適合觀測 zygoma complex 的骨折？
- (A) Water's view
 - (B) skull AP
 - (C) panorax view (全口攝影)
 - (D) nasal view
20. 先天手部多指症在白人及亞洲人最常發生在那一部位？
- (A) Thumb
 - (B) index finger
 - (C) middle finger
 - (D) ring finger
 - (E) little finger
21. 急診營有人受賓表要求醫師縫「美容針」，請問何謂「美容針」？
- (1) 用醫院最細的線把皮縫起來
 - (2) 針距盡量緊密製造完全密封不滲血的傷口
 - (3) 讓皮膚承受最大張力的整合
 - (4) 依傷口位置適度改變方向符合 Langer's Line
 - (5) 精準穩定的縫合技術
- (A) 全
 - (B) (1)(2)
 - (C) (4)(5)
 - (D) (1)(4)(5)
 - (E) (1)(3)(4)(5)
22. 下列哪一項不是目前臨床上治療淋巴水腫病人的處置？
- (A) Lymphaticovenous anastomosis (LVA)
 - (B) Vascularized LN transfer (VLNT)
 - (C) Complex decongestive therapy
 - (D) Compressive stocking
 - (E) Tacrolimus

06 B 組題目

§ 是非題（每題 4 分）

1. 修補 gastric ulcer 的穿孔時，不應在潰瘍部分切片。
2. 嚴重外傷病患的到院後需要先完整評估，鑑別診斷後再逕行處置。
3. 為了預防氣切手術病人術後產生 trachea stricture，需採用有 cuffed 的氣切管，同時盡可能的使氣囊都處於飽滿的階段，以把氣管撐開，才不會形成氣管狹窄。

§ 選擇題（每題 4 分）

1. 以下敘述何者正確？
 - (A) 晚期胃癌的治療希望是開刀
 - (B) 病人身體狀況良好，早期胃癌的手術切除可不作淋巴腺清除
 - (C) 依指引，若已有腹廣泛轉移，且無阻塞或腫瘤流血的情況應也可做胃癌手術
 - (D) 早期胃癌手術不宜使用腹腔鏡來進行了
2. 以下哪項指標可以用來評估病患是否營養不良？
 - (A) 病患近期體重變化
 - (B) 食慾好壞
 - (C) 相關腸胃道症狀
 - (D) 以上皆可
3. 以下何者不屬於甲狀腺癌？
 - (A) 未分化癌 anaplastic type
 - (B) 乳突癌 papillary carcinoma
 - (C) 濾泡癌 follicular carcinoma
 - (D) 類癌 carcinoid tumor
 - (E) 髓質癌 medullary Carcinoma
4. 關於胃腸基質瘤的描述何者錯誤？
 - (A) 手術切除時應加上淋巴腺擴清
 - (B) 腫瘤小於 3 公分，大部分沒症狀
 - (C) 化學治療效果差
 - (D) 腫瘤細胞來源與胃癌不同
5. 術前作新輔助治療（neoadjuvant therapy）可能的好處是？
 - (A) Patient selection.
 - (B) Better patients' tolerance to chemotherapy.
 - (C) Sterilization: induce tumour regression and reduce the risk of R1 resection.
 - (D) The chance of an in vivo assessment of tumour chemosensitivity.
 - (E) 以上皆是。
6. 關於胰臟炎後所發生的假性囊腫（pseudocyst）下列那些是正確的？

- (A) 一般發生在於 acute necrotising pancreatitis 4 個禮拜之後。
 - (B) Well-defined wall, completely encapsulated
 - (C) Location 可以是 intrapancreatic and/or extrapancreatic
 - (D) Heterogeneous and non-liquid densities of varying degrees in different locations
 - (E) 病人時常伴隨有器官衰竭現象。
7. 使用 TPN 需要哪些檢查？
- (A) BUN Cre
 - (B) 肝臟酵素
 - (C) 脂肪相關指數
 - (D) 以上皆是
8. 胃繞道手術對下列哪種代謝性疾病的治療效果最好？
- (A) 高血壓
 - (B) Type I DM
 - (C) 高膽固醇血症
 - (D) 高尿酸血症
 - (E) Type II DM
9. 那一項是錯的？
- (A) 手術是唯一有機會治癒胰臟癌的治療方式。
 - (B) 手術切除乾淨胰臟癌也需 adjuvant chemotherapy 的化學治療
 - (C) 手術時做大範圍的淋巴腺清除可增加病人的存活率
 - (D) 臨床上是根據腫瘤的大小來判定是否可以切除乾淨
10. 下列何種骨折可能會導致患者出血性休克？
- (A) 橈骨骨折
 - (B) 股骨骨折
 - (C) 肩胛骨骨折
 - (D) 骨盆骨折
11. 肺栓塞（pulmonary embolism）病人造成低氧血症的主要機轉是：
- (A) dead space 增加
 - (B) 肺動脈血流阻塞
 - (C) 呼吸道通氣障礙引起 VQ mismatch
 - (D) 增加微血管通透性（permeability）
12. 24 歲，自發性氣胸，第一次發作，CXR 顯示最大塌陷距離 4 公分，請問以下何種處置較為適當？
- (A) 保守氧氣治療，12 小時候沒有惡化即可出院。

(B) 利用留置針或是 pigtail 導管抽除空氣，治療成功後病人即可出院，門診追蹤。

(C) 插上 Fr.28 胸管，接上 chest bottle 收住院，看漏氣是否自動停止。

(D) 收住院接受胸腔鏡手術，治療氣胸又預防日後復發。

13. Which is not treatment for achalasia ?

(A) Botox injection

(B) balloon dilatation

(C) VATS

(D) POEM

(E) Above are correct

14. 下列哪一項不屬於表淺組織感染？

(A) Erysipela

(B) Folliculitis

(C) Furuncles & carbuncles

(D) Cellulitis

(E) Necrotizing fasciitis

15. 在自由皮瓣顯微重建手術後，臨床上 flap monitoring 中，何者代表血流可能不正常？

(A) Color of flap skin : Pink

(B) Temperature of flap skin : 32 度 C

(C) Capillary refilling time : 少於 1 秒

(D) Needle puncture : fresh red blood

(E) Doppler sound : positive and pulsating

16. 下肢周邊動脈阻塞疾病的典型臨床表現不包括？

(A) 皮膚、肉、組織萎縮

(B) 趾頭失去了彈性，指甲變薄

(C) 毛髮掉落，組織溫度變低

(D) 足踝上臂血壓指數（ankle-brachial pressure index）下降

17. 上顎骨骨折如果以 Le Fort 分類會有幾種型態的斷裂？

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 無限

18. Indocyanine green（ICG 循血綠）的注射位置和 LSG 相似，在肢體末端或要做手術切口的遠端，深度也是皮下注射。ICG 的螢光需要有搭配近紅外線照相機，才能顯像。請問 ICG Excitation/emission 激發波長及發射波長為何？

- (A) 512/1024 nm
 - (B) 256/750 nm
 - (C) 760/830 nm
 - (D) 1024/2203 nm
19. 隨著年齡老化及工作的關係，上肢神經常有被壓迫的現象而造成神經壓迫症候群，其中最常見的是腕隧道症候群，請問第二常見的是？
- (A) Carpal tunnel syndrome
 - (B) Cubital tunnel syndrome
 - (C) Posterior interosseous nerve syndrome
 - (D) Radial tunnel syndrome
20. 關於顱顏治療團隊，下列何者為非？
- (A) 是一個跨科部專家組成的團隊
 - (B) 協調師是其中之靈魂人物
 - (C) 牙科醫師在其中扮演重要之角色
 - (D) 團隊設定上只負責六歲之前病童之治療
 - (E) 台灣顱顏治療團隊很少
21. 2 公分口腔癌，侵犯到肌肉層，臨床期數（stage）？
- (A) I
 - (B) II
 - (C) III
 - (D) IV

§ 簡答題（4 分）

1. 請簡述急性肝衰竭的感染風險、發生時機、及處理原則。

06 C 組題目

§ 是非題

1. 為了預防氣切手術病人術後產生 trachea stricture，需採用有 cuffed 的氣切管，同時盡可能的使氣囊都處於飽滿的階段，以把氣管撐開，才不會形成氣管狹窄。

§ 選擇題

1. 以下敘述何者正確？
 - (A) 晚期胃癌的治療希望是開刀
 - (B) 病人身體狀況良好，其早期胃癌的手術切除可不作淋巴腺清除
 - (C) 依照指引，若已有腹廣泛轉移，且無阻塞或腫瘤流血的情況應也可做胃癌切除手術
 - (D) 早期胃癌手術不宜使用腹腔鏡來進行
2. 關於胃腸基質瘤的描述何者錯誤？
 - (A) 手術切除時應加上淋巴腺擴清
 - (B) 腫瘤小於 5 公分，大部分沒症狀
 - (C) 化學治療效果差
 - (D) 腫瘤細胞來源與胃癌不同
3. 腹腔鏡胃袖狀切除一年平均可以降低多少術前體重？
 - (A) 10%
 - (B) 25%
 - (C) 40%
 - (D) 50%
 - (E) 60%
4. 美容外科的發展起源？
 - (A) 義大利文藝復興喚醒對美的追求
 - (B) 法國太陽王路易十四下令發展
 - (C) 工業革命經濟起飛
 - (D) 世界大戰後個人主義興起
 - (E) 社群時代網紅正盛
5. 有關淋巴水腫 lymphatic duct 硬化的進展，其先後順序為何？
 - 1) Sclerosis type 2) Ectasis type 3) Normal type 4) Contraction type
 - (A) 3→2→4→1
 - (B) 4→2→1→3
 - (C) 3→1→2→4
 - (D) 2→4→1→3

6. 目前認為影響 Lymphaticovenous anastomosis (LVA)的主要 prognostic factor 不包括?
- (A) Early stage intervention
 - (B) Number of LVA bypasses
 - (C) Lymphedema grading
 - (D) Body mass index (BMI)
7. 關於快速恢復腸道手術病患術後照護(fast track recovery program)的原則，何者為非?
- (A) 避免使用止痛藥
 - (B) 盡早下床活動
 - (C) 術前充分衛教
 - (D) 避免過長時間禁食
8. 使用 TPN (total parenteral nutrition)會有那些併發症，何者為非?
- (A) 高血糖
 - (B) 低血糖
 - (C) 肝臟指數異常
 - (D) 菌血症
9. 在做胰十二指腸切除術時不一定會切除下列那一結構?
- (A) 十二指腸
 - (B) 胰臟鉤部。(uncinate process)
 - (C) 胃幽門
 - (D) 胰臟頭部
 - (E) 十二腸動脈
10. 下列何者非機器人手臂微創手術優點?
- (A) 醫材費用便宜
 - (B) 器械靈活度高
 - (C) 可完成較複雜的微創手術
 - (D) 手術視野穩定性佳
11. 對於創傷病患嚴重度的評估，下列哪個項目是錯的?
- (A) 外傷嚴重度分數(Injury Severity Score，ISS)計算是受傷最嚴重的三個區域分數平方相加
 - (B) ISS 最高 75 分最低 3 分
 - (C) ISS ≥ 16 分為嚴重外傷，可申請重大傷病卡
 - (D) 到院前死亡，ISS 為 75 分
12. 下列為懷疑吸入性灼傷的重要依據，何者除外?

- (A) 意外發生在密閉空間
 - (B) 衣服著火
 - (C) 聲音沙啞
 - (D) 鼻毛燒焦
13. 教導患有慢性阻塞性肺疾病的病人採用橫式呼吸(腹式呼吸)，可預期會有下列何項效果？
- (A) 減少潮氣容積
 - (B) 增加呼吸速率
 - (C) 增加運動的耐受力
 - (D) 減少肺泡換氣
14. 以下何者並非自發性氣胸的手術方式？
- (A) VATS bullectomy
 - (B) Mechanical pleurodesis
 - (C) Nuss procedure
 - (D) Pleurectomy
15. 食道之 tertiary peristalsis 常出現於何種情形？
- (A) Achalasia
 - (B) GE reflux
 - (C) Nutcracker esophagus
 - (D) Diffuse esophageal spasm
16. 在 radial polydactyly (thumb duplication)，最常使用的分類方法為 Wassel classification 就是依據 level of duplication 將 radial polydactyly (thumb duplication) 分為 type 1-7. 請問其中常見的是：
- (A) type 2
 - (B) type 7
 - (C) type 4
 - (D) type 1
17. 當頭頸癌自由皮瓣重建失敗時常用何種皮瓣取代？
- (A) Trapezium flap
 - (B) PM flap
 - (C) Rectus abdominis flap.
 - (D) scalp flap
18. Which of the following is a physiological characteristic of chronic wound?
- (A) High cellular proliferation
 - (B) High growth factor production

- (C) High cellular response
- (D) High proteinase concentration

19. 一般而言，外科手術傷口感染時之細菌培養結果，下列何者是常見的細菌？

- (A) 格蘭氏陽性細菌
- (B) 格蘭氏陰性細菌
- (C) 厭氧菌
- (D) 多種細菌
- (E) 結核桿菌

20. 在台灣最常發生顏面骨折的原因？

- (A) 車禍
- (B) 工作
- (C) 運動
- (D) 曬衣服

21. 下列哪種屬於 Syndromic Craniosynostosis？

- (A) Apert
- (B) Crouzon
- (C) Pfeiffer
- (D) Saethre-Chotzen
- (E) 以上皆是

22. 監測手指末梢的血液循環狀況，下列哪個指標最可靠？

- (A) 顏色
- (B) 溫度
- (C) 組織飽和度
- (D) 指尖滲血

§ 簡答題：(每題 4 分)

1. 請簡述急性肝衰竭的診斷依據?
2. 試申論可用於乳房重建的手術方式及其優缺點?

06 D 組題目

§ 選擇題

1. Patients receiving immune-enhanced diets after major cancer operations can be expected to?
 - (A) have decreased 30-day mortality rates compared with controls
 - (B) have fewer infectious complications
 - (C) show decreased synthesis of constituent visceral proteins
 - (D) Benefit from these nutritional products only if they have preoperative malnutrition
 - (E) Receive DNA oligonucleotides, omega-3 fatty acids, and prostaglandin E2 in the nutritional formulation
2. 以下何者為乳房重建常用的自體皮瓣？
 - (A) 闊背肌皮瓣（LD flap）
 - (B) 腹直肌根蒂皮瓣（pedicle TRAM Hap）
 - (C) 深下腹動脈穿通枝皮瓣（DIEP Hap）
 - (D) 以上皆是
3. 對於肘隧道症候群，在早期可使用保守療法，其中之一的方法是保持手肘在何種姿勢？
 - (A) 彎曲
 - (B) 伸直
4. 某晚你在急診值班，有一名行人被車撞的 60 歲男性病患由 EMT 送至急診，GCS 只有 8 分，你們在急診進行緊急插管，床邊超音波顯示胸腹骨盆無明顯出血，緊急電腦斷層顯示為右側硬腦膜上出血，照會神經外科欲行緊急手術，就在開刀房通知叫刀時病患血壓突然下降至 80/50mmHg，下列何者為最優先處置？
 - (A) 再做一次電腦斷層檢查
 - (B) 快速將病患送至開刀房接受手術
 - (C) 啟動大量輸血，請血庫備血
 - (D) 再次執行床邊超音波檢查
5. 下列哪條動脈不會供應胰臟頭部：
 - (A) GDA 胃十二指腸動脈
 - (B) IPDA 下胰十二指腸動脈
 - (C) Splenic artery 脾動脈
6. 下列哪些人可以考慮接受減重代謝手術？
 - (A) 12 歲男性，BMI: 31
 - (B) 52 歲女性，罹患第二型糖尿病，合併血糖控制不良，BMI:25
 - (C) 49 歲男性，嚴重憂鬱症，自殺多次，BMI:37
 - (D) 36 歲男性，罹患第一型糖尿病，合併血糖控制不良，BMI:45

(E) 63 歲女性，嚴重高血壓合併兩條冠狀動脈阻塞，BM: 26

7. 在拿取 groin vascularized LN Flap 時，要注意避免哪一區的淋巴以防止下肢醫源性水腫？
- (A) Central and medial
 - (B) Lower
 - (C) Superior
 - (D) Lateral
8. 當懷疑吸入性灼傷時，下列何者為非？
- (A) 給予預防性支氣管插管
 - (B) 給予預防性抗生素治療
 - (C) 高壓氧治療
 - (D) 胸部 X 光檢查
9. 二十三歲男性病患，左側自發性氣胸，第二次發作，並無接受撞擊等創傷病史，CXR 顯示最大塌陷距離 1.5 公分，患者目前生命徵象穩定，請問以下何種處置較為適當？
- (A) 保守氧氣治療，12 小時後氣胸範圍沒有惡化即可出院
 - (B) 持續利用 pigtail 導管抽除空氣並觀察，沒有漏氣後病人即可出院，門診追蹤
 - (C) 插上 Fr.28 胸管，接上 chest bottle 並觀察，沒有漏氣後病人即可出院，門診追蹤
 - (D) 安排胸腔鏡手術治療
10. 下列何者非腹腔鏡膽囊切除手術適應症？
- (A) gall stone colic pain.
 - (B) gall stone pancreatitis.
 - (C) 0.5cm gall bladder polyp.
 - (D) gall stone Acute cholecystitis.
11. 懷疑食道弛緩不能的病患，要做哪些檢查？
- (A) 食道內視鏡
 - (B) 鋇劑檢查
 - (C) 食道壓力檢測
 - (D) 以上皆是
12. 關於原發型自發性氣胸的描述，下列何者為非？
- (A) 男性常見，比率約為 3:1~6:1。
 - (B) 好發於身材瘦高男性。
 - (C) 少數人有家族病史。
 - (D) 第一次發作病患的復發機率為 30~50%。
 - (E) 第二次發作病患的復發機率為 20-30%。

13. 下列敘述何者錯誤？
- (A) Trachea 的起點是 cricoid cartilage (C6) to carina (T5)。
 - (B) 在胚胎學 trachea 的形成，是在第三週的末期，由 foregut 的 ventral side 形成 respiration diverticulum，在第四週的末期，esophagotracheal septum 癒合，將 trachea 和 esophagus 分隔成二個獨立的器官。
 - (C) Trachea atresia 最常見的是 type II: 整個 trachea 沒有成型，雙側的 main bronchi 在 midline 合在一起，有時會合併 bronchio-esophageal fistula。
 - (D) Esophageal atresia 最常見的是 type A: esophagus 的 distal 及 proximal 端沒有相連，且沒有形成任何的 tracheo-esophageal fistula.
14. 食道之 secondary peristalsis 常出現於？
- (A) 吞嚥硬食時
 - (B) 吞嚥流質時
 - (C) 受物理或化學物刺激時
 - (D) 睡眠時
15. Which of the following is a physiological characteristic of chronic wound ?
- (A) High cellular proliferation
 - (B) High growth factor production
 - (C) High cellular response
 - (D) High proteinase concentration
16. 關於早期胃癌 (early gastric cancer) 的診斷與治療，下列敘述何者正確？
- (A) 早期胃癌都是從 gastric adenoma 轉變成 adenocarcinoma。
 - (B) 侵犯深度沒有超出 submucosal layer 者，均視為早期胃癌。
 - (C) 99%的早期胃癌不會有淋巴轉移。
 - (D) 早期胃癌皆可以使用 endoscopic submucosal dissection 治療。
17. 關於唇顎裂，以下何者為非？
- (A) 唇顎裂和顎裂是不同成因
 - (B) 唇裂顎裂常同時手術
 - (C) 手術成功的要訣是相關肌肉的修補
 - (D) 語言恢復是主要目標之一
 - (E) 需治療團隊
18. 下列那一項「不屬於」表淺軟組織感染？
- (A) Erysipela (丹毒)
 - (B) Folliculitis (毛囊炎)
 - (C) Furuncles & carbuncles (癰&癤)
 - (D) Cellulitis (蜂窩組織炎)
 - (E) Necrotizing fascitis (壞死性筋膜炎)

19. 在血管顯微吻合（microvascular anastomosis）之顯微手術技巧中，有關 Vessel Size Mismatch 時之縫合選擇，下列何者「有誤」？
- (A) Size discrepancy < 2:1 → dilation, end-to-end
 - (B) Size discrepancy > 2:1, < 3:1 → beveling
 - (C) Size discrepancy > 2:1, < 3:1 → spatulation
 - (D) Size discrepancy > 3:1 → end-to-side
 - (E) Size discrepancy > 4:1 → Continuous, end-to-end
20. 最常見的繼發性淋巴水腫（secondary lymphedema）成因是什麼？
- (A) radiation injury
 - (B) post lymph node dissection
 - (C) obesity
 - (D) diet
21. 根據科學研究，下列何者對美的闡述為是？
- (A) 美的定義和物種無關
 - (B) 美是主觀的判斷，沒有客觀的標準
 - (C) 美很膚淺，和個人身心健康無關
 - (D) 我們通常無法一眼決定陌生人的美醜
 - (E) 麗質天生的人無論求偶求職都比較容易成功
22. 隨著年齡老化及工作的關係，上肢神經常有被壓迫的現象而造成神經壓迫症候群，請問最常見的是？
- (A) Radial tunnel syndrome
 - (B) Cubital tunnel syndrome
 - (C) Posterior interosseous nerve syndrome
 - (D) Carpal tunnel syndrome
23. Mandible reconstruction 最常用何種 flap？
- (A) fibular bone flap
 - (B) radial bone flap
 - (C) iliac bone flap
 - (D) tibial bone flap

07 A 組題目

§ 是非題

1. 腹部外傷病患於插管後不需要評估呼吸狀況以及呼吸音，應該要馬上進行影像學檢查(FAST、超音波、電腦斷層、血管攝影等)，以避免延遲性出血發生以及盡快止血。

§ 選擇題

1. 以下敘述何者正確？
 - (A) 胃癌發生率在台灣還排在十大癌症中,但有逐漸下降的趨勢
 - (B) 胃癌的減少可能與幽門桿菌的去除有關
 - (C))目前在台灣早期胃癌比率較中晚期胃癌低早期胃癌手術不宜使用腹腔鏡來進行
 - (D) 胃癌的確診需靠電腦斷層
2. 關於胃腸基質瘤(gastrointestinal stromal tumor, GIST)的診斷與治療,下列敘述何者正確？
 - (A) GIST 腫瘤的免疫組織染色,常呈現 CD-117 或 DOG-1 陽性。
 - (B) 相同大小,發生在胃部的 GIST 比發生在迴腸的 GIST,更容易發生轉移,惡性度更高。
 - (C) GIST 轉移型態主要是 lymphatic metastasis 和 direct invasion。
 - (D) 超過 4 公分的 GIST,應該先使用標靶藥物(Glivec)治療 6 個月,再進行手術切除。
3. 關於唇顎裂,以下何者為非:
 - (A) 唇顎裂和顎裂是不同成因
 - (B) 唇裂和顎裂常同時手術
 - (C) 手術成功的要訣是相關肌肉的修補
 - (D) 語言恢復是主要目標之一
 - (E) 需治療團隊
4. 以下何種狀態,需要考慮靜脈營養輸液治療？
 - (A) 短腸症
 - (B) 腸道吻合處滲漏,近期無法癒合
 - (C) 術前營養不良患者
 - (D) 以上皆是
5. 食道弛緩不能(achalasia),以下何者非其治療方式？
 - (A) 肉毒桿菌注射
 - (B) 氣球擴張術

- (C) 胸腔鏡手術
 - (D) 內視鏡經口肌肉切開術(POEM)
 - (E) 以上皆是
6. 關於食道,何者為非?
- (A) 食道為管狀物
 - (B) 食道為橫跨頸胸腹的器官
 - (C) 食道有兩層肌肉
 - (D) 以上皆是
7. 下列的胰臟腫瘤哪一個屬於內分泌腺腫瘤:
- (A) 胰腺泡細胞癌(Acinar cell carcinoma)
 - (B) 胰管內乳突狀黏液性腫瘤(IPMN)
 - (C) 胰臟腺癌 (PDAC)
 - (D) (PNET)
8. 一個 30 歲男性,自述在公園晨跑時胸口被捅了一刀,被送到你們醫院,不幸的是你們醫院並沒有外科醫師值班。在急診室,你評估病患有氣血胸,左胸被插了胸管,立馬從胸腔內流出 700cc 的鮮血。此病患也聯絡好準備要被轉診到大醫院了。不就在救護車到的時候,他的血壓 忽然下降到 80/68mmHg,心跳上升到每分鐘 136 下,下一步你該如何做?
- (A) 把胸管夾住
 - (B) 決定不轉診了
 - (C) 在急診室緊急開胸
 - (D) 重複檢查呼吸道等初級檢查,然後繼續轉診
 - (E) 延遲轉診,直到連絡上對方大醫院的胸腔外科醫師為止
9. 下列哪一個胰臟腺癌的致癌危險因子,證據不確定:
- (A) 飲食型態
 - (B) 家族史
 - (C) 糖尿病
 - (D) 慢性胰臟炎
 - (E) 抽菸
10. 腹腔鏡胃袖狀切除一年平均可以降低多少術前體重?
- (A) 10%
 - (B) 25%
 - (C) 40%
 - (D) 50%
 - (E) 60%
11. 有關淋巴水腫 lymphatic duct 硬化的進展,其先後順序為何?

- 1) Sclerosis type 2) Ectasis type 3) Normal type 4) Contraction type
- (A) 3→2→1→4
(B) 4→2→1→3
(C) 3→1→2→4
(D) 2→4→1→3
12. 15 歲男性病患，左側自發性氣胸，第一次發作，並無接受撞擊等創傷病史，CXR 顯示最大塌陷距離 6 公分合併肋膜積液，放置豬尾巴引流管後引流出 300c.c.鮮血，患者目前生命徵象穩定，請問以下何種處置較為適當？
- (A) 保守氧氣治療，12 小時後氣胸範圍沒有惡化即可出院
(B) 持續利用 pigtail 導管抽除空氣並觀察，沒有漏氣後病人即可出院，門診追蹤
(C) 插上 Fr.28 胸管，接上 chest bottle 並觀察，沒有漏氣後病人即可出院，門診追蹤
(D) 安排緊急胸腔鏡手術(VATS)治療
(E) 緊急於急診進行開胸手術(Thoracotomy)止血。
13. 下列那一項「不屬於」表軟組織感染？（A、C 組考題）
- (A) Erysipela(丹毒)
(B) Folliculitis (毛囊炎)
(C) Furuncles& carbuncles (癰&癤)
(D) Cellulitis(蜂窩組織炎)
(E) Necrotizing fasciitis(壞死性筋膜炎)
14. 56 歲王先生有糖尿病，右腳底遭尖銳物刺傷。一星期後發燒、畏寒，右腳底腫脹疼痛，有膿性滲出液，抽血檢查發現白血球數增加，血糖高於 400 mg/dL。下列那一項處置，對王先生之病情控制「最有」幫助？
- (A) 血管攝影
(B) 清創手術、與抗生素治療。
(C) 口服胰島素。
(D) 高壓氧治療。
(E) 親水性敷料(Hydrocolloid dressing)。
15. 隨著年齡老化及工作的關係，上肢神經常有被壓迫的現象而造成神經壓迫症候群，其中最常見的是腕隧道症候群，請問第二常見的是？
- (A) Carpal tunnel syndrome
(B) Cubital tunnel syndrome
(C) Posterior interosseous nerve syndrome
(D) Radial tunnel syndrome
16. 下列何者非腹腔鏡膽囊切除手術適應症？
- (A) gall stone colic pain.

- (B) gall stone pancreatitis.
(C) 0.5cm gall bladder polyp.
(D) gall stone Cacute cholecystitis.
17. 當疑似吸入性灼傷時,下列何者為最適當處置?
(A) 胸部 X 光檢查
(B)立即預防性內支氣管插管
(C)繼續觀察治療
(D) 禁食
18. Which of the following cell type plays an important role in the remodeling phase of wound healing?
(A) Neutrophil
(B) Macrophage
(C) Fibroblast
(D) Keratinocyte
19. 乳癌病患經乳房切除手術後可以接受重建手術的時機為何:
(A)乳房切除術後立即重建
(B)乳房切除術後延遲重建
(C)乳房切除術後延遲性立即重建
(D) 以上皆是
20. 兩公分口腔癌,侵犯到肌肉層,臨床期數(stage)屬?
(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV
21. 下列關於氣管惡性腫瘤的敘述,何者錯誤?
(A) 最常見的原發性氣管癌症為 Squamous cell carcinoma 。
(B) Adenoid cystic carcinoma 容易侵犯氣管上 1/3,易有 submucosa infiltration,因此不易切除乾淨,但長得很慢,所以切除乾淨與預後無關
(C) 最常見的氣管良性腫瘤是 chondroma 。
(D) Trachea papilloma 的形成與 human papillomavirus 有關,有可能會轉變成惡性的 squamous
22. 依據 Foucher 的分類系統,Foucher 的手指斷指傷害分成幾個區(zones)?
(A) 2 個
(B) 3 個
(C) 4 個

(D) 5 個

23. 教導患有慢性阻塞性肺疾病的病人採用橫式呼吸(腹式呼吸)，可預期會有下列何項效果？

(A) 減少潮氣容積

(B) 增加呼吸速率

(C) 增加運動的耐受力

(D) 減少肺泡換氣

§ 簡答題:(每題 4 分)

1. 請簡述肝衰竭時肝腎之間的交互影響及臨床應用？

07 B 組題目

§ 選擇題

1. 下列有關消化性潰瘍穿孔的描述何者錯誤？
 - (A) 有些病人在穿孔發生前不知道有潰瘍
 - (B) 電腦斷層診斷率最高
 - (C) 最常做的手術為胃切手術
 - (D) 病人術前有休克時，其預後差
2. 關於胃腸基質瘤(gastrointestinal stromal tumor, GIST)的診斷與治療,下列敘述何者正確？
 - (A) GIST 腫瘤的免疫組織染色,常呈現 CD-117 或 DOG-1 陽性。
 - (B) 相同大小,發生在胃部的 GIST 比發生在迴腸的 GIST,更容易發生轉移,惡性度更高。
 - (C) GIST 轉移型態主要是 lymphatic metastasis 和 direct invasion。
 - (D) 超過 4 公分的 GIST,應該先使用標靶藥物(Glivec)治療 6 個月,再進行手術切除。
3. 先天性顱顏畸形常見手術步驟包括:
 - (A) 頭骨切開
 - (B) 眼眶重建
 - (C) 中臉前移
 - (D) 骨板固定
 - (E) 以上皆是
4. 以下何種狀態,需要考慮靜脈營養輸液治療？
 - (A) 短腸症
 - (B) 腸道吻合處滲漏,近期無法癒合
 - (C) 術前營養不良患者
 - (D) 以上皆是
5. 食道弛緩不能(achalasia),以下何者非其治療方式？
 - (A) 肉毒桿菌注射
 - (B) 氣球擴張術
 - (C) 胸腔鏡手術
 - (D) 內視鏡經口肌肉切開術(POEM)
 - (E) 以上皆是
6. 下列何者不是台大醫院外傷病人啟動 Trauma team 適應症？
 - (A) 心跳大於 100 下/分鐘

- (B) 80 歲老人
 - (C) 頭、頸、軀幹、上臂或大腿之穿透傷或重物壓傷
 - (D) 高能量撞擊之證據
7. 下列的胰臟腫瘤哪一個屬於內分泌腺腫瘤:
- (A) 胰腺泡細胞癌(Acinar cell carcinoma)
 - (B) 胰管內乳突狀黏液性腫瘤(IPMN)
 - (C) 胰臟腺癌 (PDAC)
 - (D) 神經內分泌瘤 (PNET)
8. 下列哪一個胰臟腺癌的致癌危險因子,證據不確定:
- (A) 飲食型態
 - (B) 家族史
 - (C) 糖尿病
 - (D) 慢性胰臟炎
 - (E) 抽菸
9. 診斷外傷病患腹腔內是否有出血,可以使用的診斷方式那些?
- (A) DPL
 - (B) Sonography
 - (C) CT
 - (D) 以上皆是
10. 下面哪種手術對第二型糖尿病的治療效果最好:
- (A) 胃袖狀切除
 - (B) 可調式胃束帶
 - (C) Y 型胃繞道
 - (D) 胃隔間
 - (E) 內視鏡縮胃
11. 有關淋巴水腫 lymphatic duct 硬化的進展,其先後順序為何?
- 1) Sclerosis type 2) Ectasis type 3) Normal type 4) Contraction type
- (A) 3→2→1→4
 - (B) 4→2→1→3
 - (C) 3→1→2→4
 - (D) 2→4→1→3
12. 15 歲男性病患,左側自發性氣胸,第一次發作,並無接受撞擊等創傷病史,CXR 顯示最大塌陷距離 6 公分合併肋膜積液,放置豬尾巴引流管後引流出 300c.c.鮮血,患者目前生命徵象穩定,請問以下何種處置較為適當?
- (A) 保守氧氣治療,12 小時後氣胸範圍沒有惡化即可出院

- (B) 持續利用 pigtail 導管抽除空氣並觀察，沒有漏氣後病人即可出院，門診追蹤
- (C) 插上 Fr.28 胸管，接上 chest bottle 並觀察，沒有漏氣後病人即可出院，門診追蹤
- (D) 安排緊急胸腔鏡手術(VATS)治療
- (E) 緊急於急診進行開胸手術(Thoracotomy)止血。
13. 下列那一項「不屬於」表軟組織感染？（A、C 組考題）
- (A) Erysipela(丹毒)
- (B) Folliculitis (毛囊炎)
- (C) Furuncles& carbuncles (癰&癤)
- (D) Cellulitis(蜂窩組織炎)
- (E) Necrotizing fasciitis(壞死性筋膜炎)
14. 在血管顯微吻合(microvascular anastomosis)之顯微手術技巧中，有關 Vessel Size Mismatch 時之縫合選擇，下列何者有誤？
- (A) Size discrepancy < 2:1 => dilation, end-to-end
- (B) Size discrepancy > 2:1, < 3:1 => beveling
- (C) Size discrepancy > 2:1, < 3:1 => spatulation
- (D) Size discrepancy > 3:1 => end-to-side
- (E) Size discrepancy > 4:1 => continuous, end-to-end
15. 在 radial polydactyly (thumb duplication)，最常使用的分類方法為 Wassel classification 就是依據 level of duplication 將 radial polydactyly (thumb duplication) 分為 type 1-7. 請問其中常見的是：
- (A) type 2
- (B) type 7
- (C) type 4
- (D) type 1
16. 下列何者非腹腔鏡膽囊切除手術適應症？
- (A) gall stone colic pain.
- (B) gall stone pancreatitis.
- (C) 0.5cm gall bladder polyp.
- (D) gall stone Acute cholecystitis.
17. 當疑似吸入性灼傷時,下列何者為最適當處置？
- (A) 胸部 X 光檢查
- (B) 立即預防性內支氣管插管
- (C) 繼續觀察治療
- (D) 禁食

18. Which of the following cell type plays an important role in the remodeling phase of wound healing?
- (A) Neutrophil
 - (B) Macrophage
 - (C) Fibroblast
 - (D) Keratinocyte
19. 乳癌病患經乳房切除手術後可以接受重建手術的時機為何：
- (A)乳房切除術後立即重建
 - (B)乳房切除術後延遲重建
 - (C)乳房切除術後延遲性立即重建
 - (D)以上皆是
20. 兩公分口腔癌,侵犯到肌肉層,臨床期數(stage)屬?
- (A) I
 - (B) II
 - (C) III
 - (D) IV
21. 下列關於氣管外科治療的敘述,何者正確?
- (A) 結核菌感染呼吸道(Tracheobronchial tuberculosis)所造成氣管狹窄,可使用氣管支架維持氣管通暢,首選是 metallic stent
 - (B) 成人氣管長度約 10-13 公分,由於氣管上下段分別與頸部和縱隔腔有緊密相接,因此執行 segmental resection 所切除的範圍不能太長,僅能切除 3-4 公分的距離,以免無法將切除後的二端做縫合(end-to-end anastomosis)。
 - (C) 惡性腫瘤所造成的氣管阻塞,可選擇使用冷凍治療(cryotherapy),將阻塞的腫瘤組織一塊塊的移除,以維持呼吸道通暢
 - (D) 氣管移植手術(Trachea replacement)的植入物,若選擇同種異體移植(Allografts),由於存在有捐贈者抗原的關係,受贈者術後需服用抗排斥藥物。
22. 肺栓塞 (pulmonary embolism) 病人造成低氧血症的主要機轉是：
- (A) dead space 增加
 - (B) 肺動脈血流阻塞
 - (C) 呼吸道通氣障礙引起 VQ mismatch
 - (D) 增加微血管通透性 (permeability)
23. 以下何種影像最適合觀測 zygoma complex 的骨折？
- (A) Water's view
 - (B) skull AP
 - (C) panorax view (全口攝影)
 - (D) nasal view

24. 關於斷指接合手術,下列哪個構造的接合最重要?

- (A) 骨頭或關節的固定
- (B) 肌腱的接合
- (C) 靜脈的接合
- (D) 動脈的接合
- (E) 神經的接合

§ 簡答題:(每題 4 分)

1. 腦病變(留下的照片只看到這三個字)

07 C 組題目

§ 是非題

1. 腹部外傷病患為了避免腹部高壓影響生命徵象,如需大量輸血應該要以濃厚紅血球為主,並盡量低溫保鮮、加速、注意低血鈣。

§ 選擇題

1. 以下敘述何者正確?
 - (A) 胃癌發生率在台灣還排在十大癌症中,但有逐漸下降的趨勢
 - (B) 胃癌的減少可能與幽門桿菌的去除有關
 - (C))目前在台灣早期胃癌比率較中晚期胃癌低早期胃癌手術不宜使用腹腔鏡來進行
 - (D) 胃癌的確診需靠電腦斷層
2. 關於胃腸基質瘤(gastrointestinal stromal tumor, GIST)的診斷與治療,下列敘述何者正確?
 - (A) GIST 腫瘤的免疫組織染色,常呈現 CD-117 或 DOG-1 陽性。
 - (B) 相同大小,發生在胃部的 GIST 比發生在迴腸的 GIST,更容易發生轉移,惡性度更高。
 - (C) GIST 轉移型態主要是 lymphatic metastasis 和 direct invasion。
 - (D) 超過 4 公分的 GIST,應該先使用標靶藥物(Glivec)治療 6 個月,再進行手術切除。
3. 下列哪種屬於 Syndromic Craniosynostosis?
 - (A) Apert
 - (B) Crouzon
 - (C) Pfeiffer
 - (D) Saethre-Chotzen
 - (E) 以上皆是
4. Which of the following statement about body weight loss is not true for the patients with cancer?
 - (A) Can be one of the earliest clinical manifestations of malignant disease
 - (B) Involuntary weight loss is one of the most uncommon consequences of cancer
 - (C) frequently the symptoms that prompts individual to seek medical attention
 - (D) Weight loss among patients with cancer is multifactorial
 - (E) May result from the mechanical or tumor related effects, or from the side effects of cancer treatment
5. 關於食道,何者為非?
 - (A) 食道為管狀物
 - (B) 食道為橫跨頸胸腹的器官

- (C) 食道有兩層肌肉
 - (D) 以上皆是
6. 有關外傷病患出血,下列何處之出血不可能造成病患休克?
- (A) 頭皮出血
 - (B) 胸腔出血
 - (C) 腹腔出血
 - (D) 後腹腔出血
 - (E) 以上位置出血皆可能造成休克
7. 下列的胰臟腫瘤哪一個屬於內分泌腺腫瘤:
- (A) 胰腺泡細胞癌(Acinar cell carcinoma)
 - (B) 胰管內乳突狀黏液性腫瘤(IPMN)
 - (C) 胰臟腺癌(PDAC)
 - (D) 神經內分泌瘤(PNET)
8. 對於介於可切與不可切的胰臟管狀細胞癌(borderline pancreatic ductal cell adenocarcinoma), 新輔助治療(neoadjuvant therapy)的可能好處是下列那些項?
- (A) 選擇病人(patients selection)
 - (B) 可評估化療效果(in vivo assessment of tumor chemosensitivity)
 - (C) 有機會讓腫瘤縮小而切得乾淨(sterilization)
 - (D) 化療效果比較好(better patients' tolerance and preserved anatomy)
 - (E) 以上皆是
9. 腹腔鏡胃袖狀切除一年平均可以降低多少術前體重?
- (A) 10%
 - (B) 25%
 - (C) 40%
 - (D) 50%
 - (E) 60%

10. 哪一項不是目前臨床上治療淋巴水腫病人的處置？
- (A) Lymphaticovenous anastomosis (LVA)
 - (B) Charles procedure
 - (C) Compressive stocking
 - (D) Steroid
 - (E) Vascularized LN transfer (VLNT)
11. 15 歲男性病患，左側自發性氣胸，第一次發作，並無接受撞擊等創傷病史，CXR 顯示最大塌陷距離 6 公分合併肋膜積液，放置豬尾巴引流管後引流出 300c.c.鮮血，患者目前生命徵象穩定，請問以下何種處置較為適當？
- (A) 保守氧氣治療，12 小時後氣胸範圍沒有惡化即可出院
 - (B) 持續利用 pigtail 導管抽除空氣並觀察，沒有漏氣後病人即可出院，門診追蹤
 - (C) 插上 Fr.28 胸管，接上 chest bottle 並觀察，沒有漏氣後病人即可出院，門診追蹤
 - (D) 安排緊急胸腔鏡手術(VATS)治療
 - (E) 緊急於急診進行開胸手術(Thoracotomy)止血。
12. 下列那一項「不屬於」表軟組織感染？（A、C 組考題）
- (A) Erysipela(丹毒)
 - (B) Folliculitis (毛囊炎)
 - (C) Furuncles& carbuncles (癰&癤)
 - (D) Cellulitis(蜂窩組織炎)
 - (E) Necrotizing fasciitis(壞死性筋膜炎)
13. 56 歲王先生有糖尿病，右腳底遭尖銳物刺傷。一星期後發燒、畏寒，右腳底腫脹疼痛，有膿性滲出液，抽血檢查發現白血球數增加，血糖高於 400 mg/dL。下列那一項處置，對王先生之病情控制「最有」幫助？
- (A) 血管攝影
 - (B) 清創手術、與抗生素治療。
 - (C) 口服胰島素。
 - (D) 高壓氧治療。
 - (E) 親水性敷料(Hydrocolloid dressing)。
14. 隨著年齡老化及工作的關係，上肢神經常有被壓迫的現象而造成神經壓迫症候群，其中最常見的是腕隧道症候群，請問第二常見的是？
- (A) Carpal tunnel syndrome
 - (B) Cubital tunnel syndrome
 - (C) Posterior interosseous nerve syndrome
 - (D) Radial tunnel syndrome
15. 下列何者非腹腔鏡膽囊切除手術適應症？

- (A) gall stone colic pain.
 - (B) gall stone pancreatitis.
 - (C) 0.5cm gall bladder polyp.
 - (D) gall stone Cacute cholecystitis.
16. 當疑似吸入性灼傷時,下列何者為最適當處置?
- (A) 胸部 X 光檢查
 - (B)立即預防性內支氣管插管
 - (C)繼續觀察治療
 - (D) 禁食
17. Which of the following cell type plays an important role in the remodeling phase of wound healing?
- (A) Neutrophil
 - (B) Macrophage
 - (C) Fibroblast
 - (D) Keratinocyte
18. 乳癌病患經乳房切除手術後可以接受重建手術的時機為何:
- (A)乳房切除術後立即重建
 - (B)乳房切除術後延遲重建
 - (C)乳房切除術後延遲性立即重建
 - (D) 以上皆是
19. 兩公分口腔癌,侵犯到肌肉層,臨床期數(stage)屬?
- (A) I
 - (B) II
 - (C) III
 - (D) IV
20. 下列關於氣管惡性腫瘤的敘述,何者錯誤?
- (A) 最常見的原發性氣管癌症為 Squamous cell carcinoma。
 - (B) Adenoid cystic carcinoma 容易侵犯氣管上 1/3,易有 submucosa infiltration,因此不易切除
 - (C) 乾淨,但長得很慢,所以切除乾淨與預後無關
 - (D) 最常見的氣管良性腫瘤是 chondroma。
 - (E) Trachea papilloma 的形成與 human papillomavirus 有關,有可能會轉變成惡性的 squamous
21. 依據 Foucher 的分類系統,Foucher 的手指斷指傷害分成幾個區(zones)?
- (A) 2 個

(B) 3 個

(C) 4 個

(D) 5 個

22. 教導患有慢性阻塞性肺疾病的病人採用橫式呼吸(腹式呼吸)，可預期會有下列何項效果？

(A) 減少潮氣容積

(B) 增加呼吸速率

(C) 增加運動的耐受力

(D) 減少肺泡換氣

23. 眼眶底的 blow out fracture 最常讓眼眶內的組織陷入哪一個腔室？

(A) 口腔

(B) 上頤竇

(C) 顱內

(D) 以上皆非

§ 簡答題:(每題 4 分)

1. 請簡述急性肝衰竭的支持療法？

07 D 組題目

§ 是非題

1. 修補胃潰瘍（gastric ulcer）的穿孔時,不應該在潰瘍部分切片，以免增加出血風險。

§ 選擇題

1. 關於胃癌（gastric cancer）的敘述，下列何者正確？
 - (A) 離 EG junction 以下 2 公分處的胃癌，侵犯深度為 muscular layer，大小為 1.5 公分，出現 infra-pyloric lymph node 轉移的機會超過 50%
 - (B) Borrmann type IV 胃癌的預後通常比 Borrmann type I 好
 - (C) 對於第二期胃腺癌（IIA、IIB）、D2 淋巴廓清術有助於減少復發機會
 - (D) 胃癌手術後的重建術式以 Billroth II 為首選，因為較少引起膽汁逆流
2. 關於 Facial cleft 下列何者為是？
 - (A) 包含唇顎裂
 - (B) 常用編號系統分類
 - (C) 有些顏裂是沒有裂口的
 - (D) 眼距過寬是其中一類表徵
 - (E) 以上皆是
3. Which of the following statement about lack of enteral stimulation on the gut is not true?
 - (A) Decrease villous height
 - (B) Decrease absorption of endotoxin
 - (C) Increase translocation of bacteria
 - (D) Decrease brush border enzyme activities
 - (E) Increase sepsis and multi-System organ failure.
4. 下列何者不是台大醫院外傷病人啟動 Trauma team 適應症？
 - (A) 心跳大於 100 下/分鐘
 - (B) 80 歲老人
 - (C) 頭、頸、軀幹、上臂或大腿之穿透傷或重物壓傷
 - (D) 高能量撞擊之證據

5. 關於食道，何者為非？
- (A) 食道為管狀物
 - (B) 食道為橫跨頸胸腹的器官
 - (C) 食道有兩層肌肉
 - (D) 以上皆正確
6. 關於大量輸血（massive transfusion）的敘述，下列何者較不適當？
- (A) 大量輸血患者輸注 FFP（fresh frozen plasma）: platelets: PRBCs 最適合的比例是 2:1:1
 - (B) 24 小時內給予至少 10 單位 PRBCs（packed red blood cells）可稱為大量輸血
 - (C) 大量輸血時，若 fibrinogen level 小於 1g/L 或 100mg/dL 可給予 cryoprecipitate 或 fibrinogen concentrate
 - (D) 大量輸血時，若血小板小於 50000/mm³，建議輸血小板
 - (E) 大量輸血時，若監測 INR 大於 1.5，建議輸 FFP（fresh frozen plasma）
7. 惠普式手術切除的部位,至少包括下列那些?【複選題】
- (A) 胰臟頭部
 - (B) 十二指腸全部
 - (C) 約 15-20 公分的上段空腸
 - (D) 脾臟
 - (E) 膽道下端
8. (缺)
9. (缺)
10. 下列何者不是 Y 型胃繞道手術常見的副作用？
- (A) 貧血
 - (B) 骨質疏鬆
 - (C) 胃腸吻合處潰瘍
 - (D) 傾倒症候群
 - (E) 胃食道逆流
11. 以流行病學來說，全世界最常見的淋巴水腫成因是什麼？
- (A) Milroy syndrome
 - (B) Filariasis-induced lymphedema
 - (C) Breast cancer related lymphedema
 - (D) Radiation-induced lymphedema
12. 15 歲男性病患，右側自發性氣胸，第一次發作，並無接受撞擊等創傷病史，CXR 顯示最大塌陷距離 6 公分合併肋膜積液，放置豬尾巴引流管後引流出 600c.c.鮮血，患者目前生命徵象穩定，請問以下何種處置較為適當？
- (A) 保守氧氣治療，12 小時後，若氣胸範圍沒有惡化即可出院

- (B) 持續利用 pigtail 導管抽除空氣並觀察，沒有漏氣後病人即可出院，門診追蹤
- (C) 插上 Fr.28 胸管，接上 chest bottle 並觀察，沒有漏氣後病人即可出院，門診追蹤
- (D) 安排緊急胸腔鏡（VATS）手術治療
- (E) 緊急於急診進行開胸手術（thoracotomy）止血
13. 在手術傷口感染時之細菌培養結果，下列何者是常見的「體表細菌」？
- (A) 金黃色葡萄球菌
- (B) 大腸桿菌
- (C) 綠膿桿菌
- (D) 厭氧菌
- (E) 結核桿菌
14. 56 歲王先生，左腳底遭尖銳物刺傷，一星期後發燒、畏寒，左腳底腫脹疼痛，有膿性滲出液，抽血檢查發現白血球數增加，血糖高於 400mg/dL。下列哪一項處置，對王先生之病情控制最有幫助？
- (A) 血管攝影
- (B) 清創手術與抗生素治療
- (C) 口服胰島素
- (D) 高壓氧治療
- (E) 親水性敷料（Hydrocolloid dressing）
15. 對於肘隧道症候群，在早期可使用保守療法，其中之一的方法是保持手肘在何種姿勢？
- (A) 彎曲
- (B) 伸直
16. 下列何者非機器人手臂微創手術優點？
- (A) 醫材費用便宜
- (B) 器械靈活度高
- (C) 可完成較複雜的微創手術
- (D) 手術視野穩定性佳
17. 下列有關吸入性灼傷，何者有誤？
- (A) 多發生在密閉空間
- (B) 可引起化學性肺炎（chemical pneumonitis）
- (C) 常伴隨著大面積燒傷
- (D) 是導致燒傷死亡的重要因素
18. Which of the following cell type plays an important role in the remodelling phase of wound healing?
- (A) Neutrophil

- (B) Macrophage
 - (C) Fibroblast
 - (D) Keratinocyte
19. 頭頸部常用來當 recipient vessel 的血管為？
- (A) temporal artery
 - (B) occipital artery
 - (C) superior thyroid artery
 - (D) thoracoacromial artery
20. 下列關於氣管鏡（bronchoscopy）的敘述，何者錯誤？
- (A) 軟式支氣管鏡依據成像的原理，分成光學式及電子式二種。
 - (B) 窄頻影像（Narrow band imaging）的原理，是藉由濾光器窄化頻寬後所發出的藍光及綠光，穿透黏膜被血管的血紅素吸收，藉以凸顯黏膜層微血管的型態，得以鑑別早期的腫瘤病變。
 - (C) 硬式支氣管鏡，必須在全身麻醉的情況下，才能夠順利執行。
 - (D) 軟式支氣管鏡由於搭配的器械強度不如硬式支氣管鏡，因此所有的氣管支架置放必須得藉由硬式支氣管鏡來完成。
21. 關於斷指接合手術，下列哪個構造的接合最重要？
- (A) 骨頭或關節的固定
 - (B) 肌腱的接合
 - (C) 靜脈的接合
 - (D) 動脈的接合
 - (E) 神經的接合
22. 教導患有慢性阻塞性肺疾病的病人採用橫式呼吸（腹式呼吸），可預期會有下列何項效果？
- (A) 減少潮氣容積
 - (B) 增加呼吸速率
 - (C) 增加運動的耐受力
 - (D) 減少肺泡換氣
23. 在上顎骨骨折當中，下列何者會造成所謂的 craniofacial dissociation？
- (A) Le Fort I
 - (B) Le Fort II
 - (C) Le Fort III
 - (D) Le Fort IV

07 E 組題目

§ 是非題

1. 胃癌的輔助化學治療（adjuvant chemotherapy）適用於 lymph nodes dissection 不夠徹底的病患，
2. 腹部外傷病患於插管後不需要評估呼吸狀況以及呼吸音，應該要馬上進行影像學檢查（FAST 超音波、電腦斷層、血管攝影等），以避免延遲性出血發生以及盡快止血。

§ 選擇題

1. 關於胃腸基質瘤的描述何者錯誤？
(A) 手術切除時應加上淋巴腺廓清
(B) 腫瘤小於 3 公分，大部分沒症狀
(C) 化學治療效果差
(D) 腫瘤細胞來源與胃癌不同
2. 關於 Facial cleft 下列何者為是？
(A) 包含唇顎裂
(B) 常用編號系統分類
(C) 有些顏裂是沒有裂口的
(D) 眼距過寬是其中一類表徵
(E) 以上皆是
3. Which of the following statement about lack of enteral stimulation on the gut is not true?
(A) Decrease villous height
(B) Decrease absorption of endotoxin
(C) Increase translocation of bacteria
(D) Decrease brush border enzyme activities
(E) Increase sepsis and multi-System organ failure
4. 食道弛緩不能（achalasia），以下何者非其治療方式？
(A) 肉毒桿菌注射
(B) 氣球擴張術
(C) 胸腔鏡手術
(D) 內視鏡經口肌肉切開術（POEM）
(E) 以上皆是
5. 關於食道，何者為非？
(A) 食道為管狀物
(B) 食道為橫跨頸胸腹的器官
(C) 食道有兩層肌肉

- (D) 以上皆是
6. 下列有關外傷病患的 primary survey，何者錯誤？
- (A) Airway with cervical spine protection
 - (B) Breathing and ventilation
 - (C) Circulation with hemorrhage control
 - (D) Defibrillation
 - (E) Exposure and environmental control
7. 下列的胰臟腫瘤哪一個屬於內分泌腺腫瘤：
- (A) 胰腺泡細胞癌 (Acinar cell carcinoma)
 - (B) 胰管內乳突狀黏液性腫瘤 (IPMN)
 - (C) 胰臟腺癌 (PDAC)
 - (D) 神經內分泌瘤 (PNET)
8. About fatal and intractable pancreatic cancer, which is wrong?
- (A) From diagnosis to death mostly 6-12 months.
 - (B) Women are more at risk.
 - (C) Projected to become the 2nd cancer mortality in US by 2030.
 - (D) Only 10-20% qualify for curative resection with adjuvant chemotherapy
9. 腹腔鏡胃袖狀切除一年平均可以降低多少術前體重：
- (A) 10%
 - (B) 25%
 - (C) 40%
 - (D) 50%
 - (E) 60%
10. 目前認為影響 Lymphaticovenous anastomosis (LVA) 的主要 prognostic factor 包括：
- (A) Early stage intervention
 - (B) Body Weight
 - (C) Number of LVA bypasses
 - (D) Etiology
 - (E) Body mass index (BMI)
11. 請問 CXR 顯示 deep sulcus sign 代表什麼疾病？
- (A) Lung cancer with malignant pleural effusion
 - (B) Right middle lobe pneumonia
 - (C) Esophageal stricture
 - (D) Pneumothorax

(E) Flail chest

12. 一般而言，外科手術傷口感染時之細菌培養結果，下列何者是常見的細菌？
- (A) 格蘭氏陽性細菌
 - (B) 格蘭氏陰性細菌
 - (C) 厭氧菌
 - (D) 多種細菌
 - (E) 結核桿菌
13. 56 歲王先生，右腳底遭尖銳物刺傷，一星期後發燒、畏寒，右腳腫脹疼痛，有膿性滲出液，抽血檢查發現白血球數增加，血糖高於 400mg/dL。下列哪一項處置，對王先生之病情控制最有幫助？
- (A) 血管攝影
 - (B) 清創手術與抗生素治療
 - (C) 口服胰島素
 - (D) 高壓氧治療
 - (E) 親水性敷料 (Hydrocolloid dressing)
14. 對於肘隧道症候群，在早期可使用保守療法，其中之一的方法是保持手肘在何種姿勢？
- (A) 彎曲
 - (B) 伸直
15. 下列何者非腹腔鏡膽囊切除手術適應症？
- (A) gall stone with colic pain.
 - (B) gall stone pancreatitis.
 - (C) 0.5cm gall bladder polyp.
 - (D) gall stone with acute cholecystitis
16. 以下為吸入性灼傷的治療，何者除外？
- (A) 十二指腸灌食 (duodenal feeding)
 - (B) 通氣支持 (ventilatory support)
 - (C) 預防性抗生素 (prophylactic antibiotic)
 - (D) 給予鎮定劑
17. Which of the following is NOT a physiological characteristic of chronic wound?
- (A) Low cellular proliferation
 - (B) Low ratio of senescent cells
 - (C) Low cellular response
 - (D) High proteinase concentration
18. 以下何者為乳房重建常用的自體皮瓣？

- (A) 闊背肌皮瓣 (LD flap)
 - (B) 腹直肌根蒂皮瓣 (pedicle TRAM flap)
 - (C) 深下腹動脈穿通枝皮瓣 (DIEP flap)
 - (D) 以上皆是
19. 兩公分口腔癌，侵犯到肌肉層，臨床期數 (stage) 屬？
- (A) I
 - (B) II
 - (C) III
 - (D) IV
20. 下列關於氣管鏡 (bronchoscopy) 的敘述，何者錯誤？
- (A) 軟式支氣管鏡依據成像的原理，分成光學式及電子式二種。
 - (B) 窄頻影像 (Narrow band imaging) 的原理，是藉由濾光器化頻寬後所發出的藍光及綠光，穿透黏膜被血管的血紅素吸收，藉以凸顯黏膜層微血管的型態，得以鑑別早期的腫瘤病變。
 - (C) 硬式支氣管鏡必須在全身麻醉的情況下，才能夠順利執行。
 - (D) 軟式支氣管鏡由於搭配的器械強度不如硬式支氣管鏡，因此所有的氣管支架置放必須藉由硬式支氣管鏡來完成。
21. 教導患有慢性阻塞性肺疾病的病人採用橫式呼吸 (腹式呼吸)，可預期會有下列何項效果？
- (A) 減少潮氣容積
 - (B) 增加呼吸速率
 - (C) 增加運動的耐受力
 - (D) 減少肺泡換氣
22. 下列何種顏面骨骨折的發生率最高？
- (A) 鼻骨
 - (B) 顴骨
 - (C) 下顎
 - (D) 上顎

§ 簡答題

急性肝衰竭病人若發生腸胃道出血，可能對病情走勢的影響與機轉？

07 F 組題目

§ 是非題

1. 腹部外傷病患為了避免腹部高壓影響生命徵象，如需大量輸血應該要以濃厚紅血球為主，並盡量低溫保鮮、加速、注意低血鈣。

§ 選擇題

1. 關於胃腸基質瘤（gastrointestinal stromal tumor, GIST）的診斷與治療，下列敘述何者錯誤？
 - a. GIST 腫瘤的病因和 c-kit 基因的變異有關。
 - b. 若大小相同，有絲分裂數（mitotic counts）是影響 GIST 預後的重要因素
 - c. GIST 手術的安全範圍（safety margin）至少離腫瘤邊緣 4 公分以上。
 - d. Gastric GIST with liver metastasis，若肝臟轉移數目小於 4 個，應優先考慮手術切除。
 - (A) a, b
 - (B) b, c
 - (C) b, d
 - (D) c, d
 - (E) a, d
2. 關於胃癌（gastric cancer）的敘述，下列何者正確？
 - (A) 離 EG junction 以下 2 公分處的胃癌，侵犯深度為 muscular layer，大小為 1.5 公分，出現 infra-pyloric lymph node 轉移的機會超過 50%
 - (B) Borrmann type IV 胃癌的預後通常比 Borrmann type I 好
 - (C) 對於第二期胃腺癌（IIA、IIB），D2 淋巴廓清術有助於減少復發機會
 - (D) 胃癌手術後的重建術式以 Billroth II 為首選，因為較少引起膽汁逆流
3. 先天性顱顏畸形常見手術步驟包括：
 - (A) 頭骨切開
 - (B) 眼眶重建
 - (C) 中臉前移
 - (D) 骨板固定
 - (E) 以上皆是
4. 兩公分口腔癌，侵犯到肌肉層，臨床期數（stage）屬？
 - (A) I
 - (B) II
 - (C) III
 - (D) IV
5. Which of the following statement about lack of enteral stimulation on the gut is not true?

- (A) Decrease villous height
 - (B) Decrease absorption of endotoxin
 - (C) Increase translocation of bacteria
 - (D) Decrease brush border enzyme activities
 - (E) Increase sepsis and multi-System organ failure
6. 食道弛緩不能（achalasia），以下何者非其治療方式？
- (A) 肉毒桿菌注射
 - (B) 氣球擴張術
 - (C) 胸腔鏡手術
 - (D) 內視鏡經口肌肉切開術（POEM）
 - (E) 以上皆是
7. 下列有關外傷病患的 primary survey，何者錯誤？
- (A) Airway with cervical spine protection
 - (B) Breathing and ventilation
 - (C) Circulation with hemorrhage control
 - (D) Defibrillation
 - (E) Exposure and environmental control
8. 以下何者為乳房重建常用的自體皮瓣？
- (A) 闊背肌皮瓣（LD flap）
 - (B) 腹直肌根蒂皮瓣（pedicle TRAM flap）
 - (C) 深下腹動脈穿通枝皮瓣（DIEP flap）
 - (D) 以上皆是
9. Which of the following is not unmet needs of pancreatic cancer?
- (A) Novel biomarker for early detection
 - (B) Genomics & molecular biology for the mechanism of metastasis and desmoplasia
 - (C) Emerging strategy for radicality and further therapeutic target
 - (D) All of the above
10. 下列何者不符合從 2020 年 5 月起健保給付減重手術的標準？
- (A) 42 歲男性，BMI:38，合併高血脂及脂肪肝
 - (B) 60 歲女性，BMI:42，合併膝關節炎
 - (C) 19 歲男性，BMI:48，合併睡眠呼吸中止
 - (D) 50 歲男性，BMI:35，合併第二型糖尿病，糖化血色素 8.0
 - (E) 23 歲女性，BMI:33，合併高血壓、第二型糖尿病及多囊性卵巢症候群
11. 哪一項不是淋巴水腫在 Lymphoscintigraphy 上的表現？
- (A) Absent or delayed radiotracer transport

- (B) Cutaneus flare
 - (C) Dermal diffusion or backflow
 - (D) Clearly visualized lymphatic collector
12. 關於原發型自發性氣胸的描述，下列何者為非？
- (A) 男性常見，比率約為 3:1-6:1
 - (B) 好發於身材瘦高男性
 - (C) 少數人有家族病史
 - (D) 第一次發作病患的復發機率为 3-5%
 - (E) 抽菸會增加復發之機會
13. 關於全身性發炎反應症候群（systemic inflammatory response syndrome）的定義，下列何者正確？
- (A) 體溫 37°C，心跳每分鐘 100 次
 - (B) 呼吸每分鐘 25 次，白血球為 8000/mm³
 - (C) 體溫 34°C，白血球為 3000/mm³
 - (D) 心跳每分鐘 80 次，PaCO₂ 為 28 mmHg
 - (E) 體溫 37°C，PaCO₂ 為 28 mmHg
14. 在血管顯微吻合（microvascular anastomosis）之顯微手術技巧中，有關 Vessel Size Mismatch 時之縫合選擇，下列何者「有誤」？
- (A) Size discrepancy < 2:1 → dilation, end-to-end
 - (B) Size discrepancy > 2:1, < 3:1 → beveling
 - (C) Size discrepancy > 2:1, < 3:1 → spatulation
 - (D) Size discrepancy > 3:1 → end-to-side
 - (E) Size discrepancy > 4:1 → Continuous, end-to-end
15. 隨著年齡老化及工作的關係，上肢神經常有被壓迫的現象而造成神經壓迫症候群，其中最常見的是腕隧道症候群，請問第二常見的是？
- (A) Carpal tunnel syndrome
 - (B) Cubital tunnel syndrome
 - (C) Posterior interosseous nerve syndrome
 - (D) Radial tunnel syndrome
16. 下列何者非機器人手臂微創手術優點？
- (A) 醫材費用便宜
 - (B) 器械靈活度高
 - (C) 可完成較複雜的微創手術
 - (D) 手術視野穩定性佳。
17. 當疑似吸入性灼傷時，下列何者為最適當處置？

- (A) 胸部 X 光檢查
- (B) 立即預防性內支氣管插管
- (C) 繼續觀察治療
- (D) 禁食

18. Which of the following cell type plays an important role in the remodeling phase of wound healing?

- (A) Neutrophil
- (B) Macrophage
- (C) Fibroblast
- (D) Keratinocyte

19. 急診常有人受傷後要求醫師縫「美容針」，請問何謂「美容針」？

- a. 用醫院最細的線把皮膚縫起來
- b. 針距盡量緊密製造完全密封不滲血的傷口
- c. 讓皮膚承受最大張力的縫合
- d. 根據傷口位置適度改變方向符合 Langer's Line
- e. 精準穩定的縫合技術。

- (A) 以上皆是
- (B) a, b
- (C) d, e
- (D) a, d, e
- (E) a, c, d, e

20. 下列關於氣管外科治療的敘述，何者正確？

- (A) 結核菌感染呼吸道（Tracheobronchial tuberculosis）所造成氣管狹窄，可使用氣管支架維持氣管通暢，首選是 metallic stent。
- (B) 成人氣管長度約 10-13 公分，由於氣管上下段分別與頸部和縱膈腔有緊密相接，因此執行 Segmental resection 所切除的範圍不能太長，僅能切除 3-4 公分的距離，以免無法將切除後的二端做縫合（end-to-end anastomosis）。
- (C) 惡性腫瘤所造成的氣管阻塞，可選擇使用冷凍治療（cryotherapy），將阻塞的腫瘤組織一塊塊的移除，以維持呼吸道通暢。
- (D) 氣管移植手術（trachea replacement）的植入物，若選擇同種異體移植（Allografts），由於存在捐贈者抗原的關係，受贈者術後需服用抗排斥藥物。

21. 監測手指末梢的血液循環狀況，下列哪個指標最可靠？

- (A) 顏色
- (B) 溫度
- (C) 組織飽和度

- (D) 指尖滲血
22. 在上顎骨骨折當中，下列何者會造成所謂的 craniofacial dissociation？
- (A) Le Fort I
 - (B) Le Fort II
 - (C) Le Fort III
 - (D) Le Fort IV
23. 教導患有慢性阻塞性肺疾病的病人採用橫式呼吸（腹式呼吸），可預期會有下列何項效果？
- (A) 減少潮氣容積
 - (B) 增加呼吸速率
 - (C) 增加運動的耐受力
 - (D) 減少肺泡換氣

08 A 組題目

§ 是非題

- X 1. 腹部外傷病患為了避免腹部高壓影響生命徵象，如需大量輸血應該要以濃厚紅血球為主，並盡量低溫保鮮、加速、注意低血鈣

§ 選擇題

- D 1. 用全靜脈營養無法經口進食患者，哪一個成分對他/她是必須的？
(A) 綜合維生素
(B) 脂肪製劑
(C) 微量元素
(D) 以上皆是
- ABCE 2. 惠普式手術切除的部位，至少包括下列哪些：【複選題】
(A) 胰臟頭部
(B) 十二指腸全部
(C) 約 15-2 公分的上段空腸
(D) 脾臟
(E) 膽道下端
- A 3. 下列哪種術式是 2022 年台灣施行最多的減重手術：
(A) 胃袖狀切除
(B) Y 型胃繞道
(C) 單接口胃繞道
(D) 可調式胃束帶
(E) 膽胰繞道術
- B 4. 以下敘述何者正確？
(A) 晚期胃癌的治癒希望是開刀
(B) 病人身體狀況良好，其早期胃癌的手術切除可不作淋巴腺清除
(C) 依照指引，若已有腹廣泛轉移，且無阻塞或腫瘤流血的情況應也可做胃癌切除手術
(D) 早期胃癌手術不宜使用腹腔鏡來進行
- C 5. 下列何者非腹腔鏡膽囊切除手術適應症？

- (A) Gallstone with colic pain.
- (B) Gallstone pancreatitis.
- (C) 0.5cm gall bladder polyp
- (D) Gall stone with acute cholecystitis

6. 近年火紅的減重藥物 Liraglutide 主要成分是：

A

- (A) GLP-1 receptor agonist
- (B) GLP-1 receptor antagonist
- (C) GLP-2 receptor antagonist
- (D) GIP receptor agonist
- (E) GIP receptor antagonist

7. 以下哪項指標最少用來評估病患是否營養不良？

D

- (A) 病患近期體重變化
- (B) 食慾好壞
- (C) 相關腸胃道症狀
- (D) 頻尿
- (E) 肌少症 (Sarcopenia)

8. 關於 Facial cleft 下列何者為是？

E

- (A) 包含唇顎裂
- (B) 常用編號系統分類
- (C) 有些顏裂是沒有裂口的
- (D) 眼距過寬是其中一類表徵
- (E) 以上皆是

9. 目前認為影響 Lymphaticovenous anastomosis (LVA) 的主要 prognostic factor 包括？
(複選)

AC

- (A) Early stage intervention
- (B) Body Weight
- (C) Number of LVA bypasses
- (D) Etiology
- (E) Body mass index (BMI)

10. Which of the following is an advantage of multifilament sutures

C

- (A) Less tissue drag
- (B) Doesn't wick
- (C) Good knot security
- (D) Less tissue reaction
- (E) Shape memory

11. 下列關於吸入性灼傷病患需要早期插管 (early intubation) 的適應症，何者錯誤？

E

- (A) Extensive burns over face and neck
- (B) Overt signs and symptoms of airway obstruction by edema
- (C) Significant toxicity from carbon monoxide (H6CO) or cyanide
- (D) Hemodynamic instability
- (E) Full thickness burn 5-10% in adult patients

12. 美容外科的發展起源？

D

- (A) 義大利文藝復興喚醒對美的追求
- (B) 法國太陽王路易十四下令發展
- (C) 工業革命經濟起飛
- (D) 世界大戰後個人主義興起
- (E) 社群時代網紅正盛

13. 以下何者為乳房重建常用的自體皮瓣？

D

- (A) 闊背肌皮瓣 (LD flap)
- (B) 腹直肌根蒂皮瓣 (pedicle TRAM flap)
- (C) 深下腹動脈穿通枝皮瓣(DIEP flap)
- (D) 以上皆是

14. 併指畸形 (syndactyly) 是常見的先天性手部畸形，有關併指畸形，以下何者為非？

D

- (A) 有很強的家族史
- (B) 發生比率約 1 per 2,000 to 2,500 live births.
- (C) 最常發生於第三個 web space
- (D) 男女發生機率 男:女=1:2

15. 關於斷指接合的成功率，下列哪個因素最重要？

A

- (A) 受傷的嚴重程度
- (B) 病患的醫從性

(C) 手術設備的精密完善

(D) 外科醫師的技術

16. 淋巴水腫常見的症狀不包括？

D

(A) 反覆性感染

(B) 皮膚角質增生

(C) 肢端腫脹

(D) 血液循環變差

17. 上顎骨骨折如果以 LeFort 分類會有幾種型態的斷裂？

(A) 1

C

(B) 2

(C) 3

(D) 無限

18. 有關外傷病患出血，下列何處出血不可能造成病患休克？

(A) 頭皮出血

E

(B) 胸腔出血

(C) 腹腔出血

(D) 後腹腔出血

(E) 以上位置出血皆有可能造成休克

19. Which is NOT pitfall of management of multiple trauma?

(A) Routine nasogastric tube

D

(B) Routine foley catheter

(C) Log-rolling while moving

(D) Collar use after documentation of C-spine injury

20. 關於內視鏡經口肌肉切開術 (POEM)，何者為非？

(A) 體表沒有傷口

D

(B) 恢復快

(C) 偶有食道破裂之併發症

(D) 現今之治療主流

(E) 以上皆是

21. 下列哪一個不是自發性氣胸 (Primary spontaneous pneumothorax) 的手術適應症？

- (A) 氣胸復發患者
- D (B) 放置引流管後仍持續漏氣的病患
- (C) 病患住在澎湖七美，就醫不便，希望接受手術減少復發機會
- (D) 首次發作的 19 歲年輕男大學生
- (E) 自發性氣胸合併血胸病患
22. 下列敘述何者錯誤？
- (A) 為了避免氣切手術病人術後產生 trachea stricture，需採用有 cuffed 的氣切管，同時不可以使氣囊處於過度飽滿的階段，以避免氣管狹窄的形成。
- D (B) Tracheo-bronchial malacia 是因為反覆的感染或發炎，造成氣管的軟骨軟化，使得呼吸或咳嗽的時候，呼吸道無法維持正常的結構而塌陷。
- (C) 氣管移植手術，在台大體系的治療方式，是以主動脈組織工程進行氣管重建，術後不需要服用抗排斥藥物。
- (D) 氣管支架的材質，主要有 metallic stent 與 silicon stent 二種。其中良性的支氣管狹窄，首選是使用 metallic stent。
- (E) 以上皆為正確
23. 周邊型小肺癌 (<1 cm) 大多屬於低侵襲性癌，最有可能造成病患產生何種症狀？
- (A) 咳嗽
- D (B) 咳血
- (C) 呼吸喘
- (D) 沒有症狀

08 B 組題目

§ 選擇題

1. 關於唇顎裂，以下何者為非？

- (A) 唇裂和顎裂是不同成因
- (B) 唇裂和顎裂常同時手術
- (C) 手術成功的要訣是相關肌肉的修補
- (D) 語言恢復是主要目標之一
- (E) 需治療團隊

B

2. 下列何者非機器人手臂微創手術優點？

- (A) 醫材費用便宜
- (B) 器械靈活度高
- (C) 可完成較複雜的微創手術
- (D) 手術視野穩定性佳

A

3. 急診常有人受傷後要求醫師縫「美容針」，請問何謂「美容針」？

- a. 用醫院最細的線把皮膚縫起來
- b. 針距盡量緊密製造完全密封不滲血的傷口
- c. 讓皮膚承受最大張力的縫合
- d. 根據傷口位置適度改變方向符合 Langer's Line
- e. 精準穩定的縫合技術。

B

- (A) a,b
- (B) d,e
- (C) a,d,e
- (D) a,c,d,e
- (E) 以上皆是

4. 下列關於氣管腫瘤的敘述，何者錯誤？

- (A) 最常見的原發性氣管惡性腫瘤為 adenoid cystic carcinoma
- (B) Adenoid cystic carcinoma 容易侵犯氣管上 1/3，易有 submucosa infiltration，但長得很慢，因此術後可追加 radiotherapy，預後良好
- (C) Chondroma, hemangioma 為良性腫瘤，除非造成氣管堵塞或其他症狀，否則觀察即可
- (D) Trachea papilloma 的形成與 human papilloma virus 有關，有可能會轉變成惡性的 squamous cell carcinoma

D?

(E) Segmental resection 依據病人的狀況，最多可切至氣管一半的長度，在用 end-to-end anastomosis 縫合

5. 下列何者非淋巴水腫容易造成的症狀？

D

- (A) 反覆性感染
- (B) 皮膚角質增生
- (C) 肢端腫脹
- (D) 血液循環受阻

6. 全靜脈營養的主要適應症下列何者最為錯誤？

B

- (A) 腸阻塞一週以上
- (B) 腎炎
- (C) 急性胰臟炎一週以上
- (D) 胃癌病人有胃出口阻塞(gastric outlet obstruction)

7. 外傷病患的評估何者錯誤？

A

- (A) 需先評估胎兒的心音與狀況
- (B) 評估與處置同時進行
- (C) Primary survey 不需詢問完整病史
- (D) Second survey 需做完整 PE
- (E) 外傷病患最常見的休克種類為 hypovolemic shock

8. 請問 CXR 顯示 deep sulcus sign 代表什麼疾病？

D

- (A) Lung cancer with malignant pleural effusion
- (B) Right middle lobe pneumonia
- (C) Esophageal stricture
- (D) Pneumothorax
- (E) Flail chest

08 C 組題目

亡佚

08 D 組題目

§ 選擇題

1. 腹腔鏡胃袖狀切除平均一年可以降低多少術前體重？

B

- (A) 10%
- (B) 25%
- (C) 40%
- (D) 50%
- (E) 60%

2. 下面哪種手術對第二型糖尿病的治療效果最好？

A

C

- (A) 胃袖狀切除
- (B) 可調式胃束帶
- (C) Y 型胃繞道
- (D) 胃隔間
- (E) 內視鏡縮胃

3. 台大醫院成人住院第一天需要評估營養狀態，本院目前採用 “MUST” (Malnutrition Universal Screening Tool) 評估工具，請問評估哪些項目何者不是？

D

- (A) BMI
- (B) Unplanned weight loss in past 3-6 months
- (C) 已經或預期 NPO>7 天
- (D) 以上皆是

4. 根據研究指出，使用免疫營養 (immunonutrition) 對於腸胃道癌症病患的主要臨床好處是？

D

- (A) 降低傷口感染
- (B) 降低死亡率
- (C) 降低吻合處滲漏
- (D) 以上皆是

5. 下列何者非腹腔鏡膽囊切除手術適應症？

C

- (A) Gall stone with colic pain.

- (B) Gall stone pancreatitis.
- (C) 0.5cm gall bladder polyp.
- (D) Gall stone with acute cholecystitis.

6. 下列的胰臟腫瘤哪一個屬於內分泌腺腫瘤？

- D
- (A) 胰腺泡細胞癌 (Acinar cell carcinoma)
 - (B) 胰管內乳突狀黏液性腫瘤 (IPMN)
 - (C) 胰臟腺癌 (PDAC)
 - (D) 神經內分泌瘤 (PNET)

7. 關於胃腸基質瘤 (gastrointestinal stromal tumor, GIST) 的診斷與治療，下列敘述何者正確？

- D
- (A) GIST 腫瘤的免疫組織染色,常呈現 CD-117 或 DOG-1 陽性
 - (B) 相同大小，發生在胃部的 GIST 比發生在迴腸的 GIST，更容易發生轉移，惡性度更高。
 - A (C) GIST 轉移型態主要是 lymphatic metastasis 和 direct invasion
 - (D) 超過 4 公分的 GIST，應該先使用標靶藥物 (Glivec) 治療 6 個月，再進行手術切除。

8. 下列哪條動脈會供應胰臟頭部：【複選題】？

- AB
- (A) GDA 胰十二指腸動脈
 - (B) IPDA 下胰十二指腸動脈
 - (C) Splenic artery 脾動脈

9. 關於顱顏治療團隊，下列何者為非？

- D
- (A) 是一個由跨科部專家組成的團隊
 - (B) 協調師是其中之靈魂人物
 - (C) 牙科在其中扮演重要角色
 - (D) 此團隊設定上只負責六歲之前病童之治療
 - (E) 台灣顱顏治療團隊屈指可數

10. Secondary lymphedema 的診斷黃金標準是什麼？

- A
- C
- (A) Tc99m lymphoscintigraphy
 - (B) MR lymphangiography
 - (C) Limb circumference
 - (D) Volumetric measure

11. Which of the following is NOT an essential element for acute wound closure?

- E?
- (A) Secure hemostasis
 - (B) Remove foreign bodies

D

- (C) Excise dead tissue
- (D) Iodine solution irrigation
- (E) Obliterate all dead space

12. 有關肘隧道症候群，以下何者為非？

A

- (A) 手肘伸展時，症狀會變嚴重
- (B) 手肘彎曲時，症狀會變嚴重
- (C) 如果前臂也有症狀，要考慮是頸部或臂神經叢問題，而不是肘隧道症候群
- (D) 避免側睡可改善症狀

13. 下列那一項「不屬於」表淺軟組織感染？

E

- (A) Erysipelas (丹毒)
- (B) Folliculitis (毛囊炎)
- (C) Furuncles & carbuncles (癰&癤)
- (D) Cellulitis (蜂窩組織炎)
- (E) Necrotizing fasciitis (壞死性筋膜炎)

14. 以下何者為乳房重建常用的自體皮瓣??

D

- (A) 闊背肌皮瓣 (LD flap)
- (B) 腹直肌根蒂皮瓣 (pedicle TRAM flap)
- (C) 深下腹動脈穿通枝皮瓣 (DIEP flap)
- (D) 以上皆是

15. 美容外科的發展起源？

D

- (A) 義大利文藝復興喚醒對美的追求
- (B) 法國太陽王路易十四下令發展
- (C) 工業革命經濟起飛
- (D) 世界大戰後個人主義興起
- (E) 社群時代網紅正盛

16. Mandible reconstruction 最常用何種 flap ？

A

- (A) Fibular bone flap
- (B) Radial bone flap
- (C) Iliac bone flap
- (D) Tibial bone flap

17. 監測手指末梢的血液循環狀況，下列哪個指標最可靠？

C

- (A) 顏色

- (B) 溫度
- (C) 組織飽和度
- (D) 指尖滲血

18. 眼眶底的 **blow out fracture** 最常讓眼眶內的組織陷入哪一個腔室？

- B
- (A) 口腔
 - (B) 上頤竇
 - (C) 顱內
 - (D) 以上皆非

19. 一名從火場救出的男子，年約五十歲，背部一半左右的面積出現了二度以上的燒傷，用略帶沙啞反覆說著要回去救他心愛的狗，現場血壓 130/70 mmHg、心跳 110 下/每分鐘、呼吸速度約 24 下每分鐘，血氧 92%，下列敘述何者最正確？

- D
- (A) 根據九的法則 (Rule of Nines) 患者燒灼傷範圍超過 20%，應送至燒傷中心處置
 - (B) 患者心跳偏快，應在患者雙上臂各建立一條靜脈輸液管路，進行輸液
 - (C) 患者血氧 92%、呼吸偏快；建議給予鼻導管供給氧氣至血氧 94% 以上
 - (D) 如果患者臉上有碳粒、鼻毛有燒焦情形說話沙啞，可預防性先置入氣管內管

20. 食道弛緩不能 (achalasia) 的症狀，以下何者為非？

- C
- (A) 吞嚥困難
 - (B) 體重減輕
 - (C) 頭痛
 - (D) 胸痛

21. 關於原發型自發性氣胸的描述，下列何者為非？

- E
- (A) 男性常見，比率約為 3:1~6:1。
 - (B) 好發於身材瘦高男性。
 - (C) 少數人有家族病史。
 - (D) 女性患者需要考慮可能是月經型氣胸 (catamenial pneumothorax)。
 - (E) 第二次發作病患的復發機率為 10%。

22. 下列關於氣管鏡 (bronchoscopy) 的敘述，何者錯誤？

- E
- (A) 軟式支氣管鏡依據成像的原理，分成光學式及電子式二種。

- (B) 光學式的軟式支氣管鏡，因為材質較易損壞，加上成像品質較差，目前已經被淘汰，臨床上幾乎不會使用。
- (C) 窄頻影像 (Narrow band imaging) 的原理，是藉由濾光器等化頻寬後所發出的藍光及綠光，其穿透粘膜表層的血紅素吸收，藉以凸顯粘膜層微血管的型態，得以鑑別早期的腫瘤病變。
- (D) 硬式支氣管鏡，必須在全身麻醉的情況下，才能夠順利執行。
- (E) 軟式支氣管鏡由於搭配的器械強度不如硬式支氣管鏡，因此所有的氣管支架置放，必須得藉由硬式支氣管鏡來完成。

23. 小型肺腫瘤的偵測日益重要，以下何者是最敏感的檢查工具？

- C
- (A) 核磁共振 (MRI)
 - (B) 正子掃描 (PET)
 - (C) 電腦斷層 (CT)
 - (D) 平面 X 光攝影

§ 問答題

1. 請根據急性肝衰竭病生理機制，提出未來可能的治療策略。
2. 診斷外傷病患腹腔內是否有出血，可以使用的診斷方式那些？

08 E 組題目

§ 是非題

- X 1. 修補胃潰瘍 (gastric ulcer) 的穿孔時，不應該在潰瘍部分切片，以免增加出血風險

§ 選擇題

1. 關於胃腸基質瘤 (gastrointestinal stromal tumor, GIST) 的診斷與治療，下列敘述何者錯誤？
- D c. GIST 手術的安全範圍 (safety margin) 至少離腫瘤邊緣 4 公分以上。
- d. Gastric GIST with liver metastasis，若肝臟轉移數目小於 4 個，應優先考慮手術切除。
- (A) a, b
- (B) b, c
- (C) b, d
- (D) c, d
- (E) a, d
2. Which of the following statement about lack of enteral stimulation on the gut is not true?
- B (A) Decrease villous height
- (B) Decrease absorption of endotoxin
- (C) Increase translocation of bacteria
- (D) Decrease brush border enzyme activities
- (E) Increase sepsis and multi-System organ failure.
3. 關於 Facial cleft 下列何者為是？
- (A) 包含唇顎裂
- (B) 常用編號系統分類

- (C) 有些顏裂是沒有裂口的
- (D) 眼距過寬是其中一類表徵
- (E) 以上皆是

4. 哪一項不是淋巴水腫在 Lymphoscintigraphy 上的表現？

D

- (A) Absent or delayed radiotracer transport
- (B) Cutaneous flare
- (C) Dermal diffusion or backflow
- (D) Clearly visualized lymphatic collector

5. 在血管吻合 (microvascular anastomosis) 之顯微手術技巧中，有關 Continuous Suture Technique 之敘述，下列何者有誤？

B

- (A) May be used on the vessels which diameter is larger than 2.5mm
- (B) May significantly widen the anastomosis-site
- (C) May decreases anastomosis time by up to 50%
- (D) May decreases anastomosis leakage
- (E) Most commonly used for end-to-side anastomosis with large vessels

6. 關於胰臟炎後所發生的 wall-off necrosis 下列哪一項是錯誤的？

A

- (A) 一般發生於 acute necrotizing pancreatitis 4 個星期之內
- (B) well-defined wall, completely encapsulated
- (C) location 可 intra- and/or extra-pancreatic
- (D) Heterogeneous density

7. Whipple 必定會切除哪個血管？

C

- (A) Common hepatic artery
- (B) Splenic artery
- (C) Gastroduodenal artery
- (D) Left gastric artery

8. 請問 CXR 顯示 deep sulcus sign 代表什麼疾病？

C

- (A) Lung cancer with malignant pleural effusion Right middle lobe pneumonia
- (B) Esophageal stricture
- (C) Pneumothorax

(D) Flail chest

9. 在 radial polydactyly (thumb duplication) , 最常使用的分類方法為 Wassel classification 就是根據 level of duplication 將 radial polydactyly (thumb duplication) 分為 type1-7 , 請問其中最常見的是？

(A) Type 2

(B) Type 7

(C) Type 4

(D) Type 1

10. 下列何者不是 Y 型胃繞道手術常見的副作用？

(A) 貧血

(B) 骨質疏鬆

(C) 胃腸吻合處潰瘍

(D) 傾倒症候群

(E) 胃食道逆流

11. 腹腔鏡胃袖狀切除手術後第一年平均可以降低多少術前體重？

(A) 10%

(B) 25%

(C) 40%

(D) 50%

(E) 75%

12. 56 歲王先生，右腳底遭尖銳物刺傷，一星期後發燒、畏寒，右腳腫脹疼痛，有膿性滲出液，抽血檢查發現白血球數增加，血糖高於 400mg/dL 。下列哪一項處置，對王先生之病情控制最有幫助？

(A) 血管攝影

(B) 清創手術與抗生素治療

(C) 口服胰島素

(D) 高壓氧治療

(E) 親水性敷料 (Hydrocolloid dressing)

13. 急診常有人受傷後要求醫師縫「美容針」，請問何謂「美容針」？

a. 用醫院最細的線把皮膚縫起來

- b. 針距盡量緊密製造完全密封不滲血的傷口
- c. 讓皮膚承受最大張力的縫合
- d. 根據傷口位置適度改變方向符合 Langer's Line
- e. 精準穩定的縫合技術。

(A) 以上皆是

(B) a, b

(C) d, e

(D) a, d, e a, c, d, e

14. 下列何者需考慮吸入性灼傷？

(A) 鼻毛有炭粒

D (B) 鼻毛燒焦

(C) 全臉三度灼傷

(D) 以上皆是

15. 進香團翻車，你要檢傷，最先被救出的四個人你的救援順序？

甲、頭骨變形且少一塊，救出時皮膚呈紫灰色無任何反應

乙、非常喘、無法發出聲音

丙、腸子外露、橈動脈脈搏微弱

丁、一直在哭、腳沒辦法動要你救他

(A) 甲、乙、丙、丁

(B) 乙、丙、丁、甲

(C) 丙、丁、甲、乙

(D) 丁、甲、乙、丙

16. 懷疑食道弛緩不能的病患，要做哪些檢查？

(A) 食道內視鏡

(B) 鋇劑檢查

(C) 食道壓力檢測

(D) 以上皆是

17. 氣管相關敘述何者錯誤？

(A) 氣管始於 cricoid cartilage (C6)，終於 carina (T5)

(B) (忘了)

(C) 氣管由 tracheal artery 供應

(D) 氣切位置太低會造成 fistula，造成難以處理的大咳血。

(E) 在成人 vocal cord 是氣管最狹窄處，位於第 1 tracheal ring 的上方，若氣切位置太高會造成 upper trachea stenosis

18. 下列何者非機器人手臂微創手術優點？

A

- (A) 醫材費用便宜
- (B) 器械靈活度高
- (C) 可完成較複雜的微創手術
- (D) 手術視野穩定性佳

19. 下列何者非腹腔鏡膽囊切除手術適應症？

C

- (A) gall stone colic pain
- (B) gall stone pancreatitis
- (C) 0.5cm gall bladder polyp
- (D) gall stone acute cholecystitis

20. 依據 Foucher 的分類系統，Foucher 的手指斷指傷害分成幾個區 (zones)？

B

- (A) 2 個
- (B) 3 個
- (C) 4 個
- (D) 5 個

21. 頭頸部常用來當 recipient vessel 的血管為？

C

- (A) temporal artery
- (B) occipital artery
- (C) superior thyroid artery
- (D) thoracoacromial artery

§ 問答題

1. 寫出 TRAM flap 全名。
2. 外傷評估時，eFAST 有哪些基本部位？

08 F 組題目

§ 是非題

1. 胃癌的輔助化學治療 (adjuvant chemotherapy)，適用於 lymph node dissection 不夠徹底的病患。

§ 選擇題

1. 關於胃癌 (gastric cancer) 的敘述，下列何者正確？
 - (A) 離 EG junction 以下 2 公分處的胃癌，侵犯深度為 muscular layer，大小為 1.5 公分，出現 infra-pyloric lymph node 轉移的機會超過 50%
 - (B) Borrmann type IV 胃癌的預後通常比 Borrmann type I 好
 - (C) 對於第二期胃腺癌 (IIA、IIB)，D2 淋巴廓清術有助於減少復發機會
 - (D) 胃癌手術後的重建術式以 Billroth II 為首選，因為較少引起膽汁逆流
2. Which of the following statements about body weight loss is not true for the patients with cancer?
 - (A) Can be one of the earliest clinical manifestations of malignant disease
 - (B) Involuntary weight loss is one of the most uncommon consequences of cancer
 - (C) frequently the symptoms that prompts individual to seek medical attention
 - (D) Weight loss among patients with cancer is multifactorial
 - (E) May result from the mechanical or tumor related effects, or from the side effects of cancer treatment
3. The primary substrate for starvation-induced gluconeogenesis is?
 - (A) Liver glycogen
 - (B) Skeletal muscle protein
 - (C) Organ protein
 - (D) Free fatty acids
 - (E) Keto acids

4. Which IS unmet need of pancreatic cancer?
- (A) Early diagnosis
 - (B) Potent regimen
 - (C) Surgical radicality
 - (D) All of the above
5. Which of the following is NOT a surgical indication for mucinous pancreatic neoplasms?
- (A) Worrisome features
 - (B) High-risk stigmata
 - (C) Enhanced nodule
 - (D) Prolonged dyspepsia
6. 下列何者不是減重手術對人體的影響？
- (A) 關節負擔減少
 - (B) 饑餓感增加
 - (C) 對食物喜好改變
 - (D) 胃腸道賀爾蒙分泌改變
 - (E) 血壓下降
7. 下列何者非腹腔鏡膽囊切除手術適應症？
- (A) gall stone colic pain
 - (B) gall stone pancreatitis
 - (C) 0.5cm gall bladder polyp
 - (D) gall stone acute cholecystitis
8. 關於唇顎裂，以下何者為非？
- (A) 唇顎裂和顎裂是不同成因
 - (B) 唇裂和顎裂常同時手術
 - (C) 手術成功的要訣是相關肌肉的修補
 - (D) 語言恢復是主要目標之一
 - (E) 需治療團隊
9. 最常見的繼發性淋巴水腫（secondary lymphedema）成因是什麼？
- (A) Radiation injury
 - (B) Trauma

- (C) Obesity
- (D) Diet
10. 一般而言，外科手術傷口感染時之細菌培養結果，下列何者是常見的細菌？
- (A) 格蘭氏陽性細菌
- (B) 格蘭氏陰性細菌
- (C) 厭氧菌
- (D) 多種細菌
- (E) 結核桿菌
11. 下列何者不是顯微血管吻合手術 (microvascular anastomosis) 中常用的藥物或溶液？
- (A) Normal saline
- (B) Heparin
- (C) MgSO₄
- (D) Etoricoxib
- (E) Xylocaine
12. 在 radial polydactyly (thumb duplication)，最常使用的分類方法為 Wassel classification 就是根據 level of duplication 將 radial polydactyly (thumb duplication) 分為 type 1-7，請問其中最常見的是？
- (A) Type 2
- (B) Type 7
- (C) Type 4
- (D) Type 1
13. 乳癌病患乳房切除手術後可以接受重建手術的時機為何？
- (A) 乳房切除術後立即重建
- (B) 乳房切除術後延遲重建
- (C) 乳房切除術後延遲性立即重建
- (D) 以上皆是
14. 下肢周邊動脈阻塞疾病的典型臨床表現不包括？
- (A) 皮膚、肉、組織萎縮
- (B) 趾頭失去了彈性，指甲變薄

- (C) 毛髮掉落，組織溫度變低
- (D) 足踝上臂血壓指數（ankle-brachial pressure index）下降
15. 急診常有人受傷後要求醫師縫「美容針」，請問何謂「美容針」？
- a. 用醫院最細的線把皮膚縫起來
 - b. 針距盡量緊密製造完全密封不滲血的傷口
 - c. 讓皮膚承受最大張力的縫合
 - d. 根據傷口位置適度改變方向符合 Langer's Line
 - e. 精準穩定的縫合技術。
- (A) 以上皆是
- (B) a, b
- (C) d, e
- (D) a, d, e
- (E) a, c, d, e
16. 下列何種顏面骨骨折的發生率最高？
- (A) 鼻骨
- (B) 顴骨
- (C) 下顎
- (D) 上顎
17. 關於斷指接合手術，下列哪個構造的接合最重要？
- (A) 骨頭或關節的固定
- (B) 肌腱的接合
- (C) 靜脈的接合
- (D) 動脈的接合
- (E) 神經的接合
18. 一位中年女性過馬路被汽車撞送至急診，到院時呼吸困難，血氧 82%，血壓 80/50mmHg，左胸有大片瘀青，聽診發現呼吸音減弱，經細針減壓及左側胸管置入後引流出大量氣體，血壓上升回復到 90/70mmHg，血氧上升到 94%；呼吸狀況也改善，過五分鐘後，突然該患者又再度呼吸困難、血壓下降至 70/50mmHg，此時該如何處置最適當？
- (A) 確認胸管引流功能，若有必須在放置一條胸管
- (B) Call portable CXR 看胸管位置是否正確

- (C) 因生命徵象不穩定，應重新進行初級評估
- (D) 安排電腦斷層確定是否有其他部位大出血
19. Which IS mainstay of trauma care
- (A) Flexibility
- (B) Propriety
- (C) Team work
- (D) Timly
- (E) All of above
20. 吞嚥困難的症狀，以下何者不會產生？
- (A) 食道癌
- (B) 食道遲緩不能
- (C) 都會產生
- (D) 都不會產生
21. 17 歲女性病患，左側自發性氣胸，這已是第二次發作，第一次發作時僅接受 pigtail 導管置入引流空氣，這次急診 CXR 顯示最大塌陷距離 1.5 公分，請問以下何種處置是最適當的選擇？
- (A) 收住院接受胸腔鏡微創手術，治療氣胸又預防日後復發
- (B) 利用 iv 留置針或是 pigtail 導管抽除空氣，治療成功後病人即可出院，門診追蹤
- (C) 插上 Fr.28 胸管，街上 chest bottle 收住院，看漏氣是否自動停止
- (D) 保守氧氣治療，12 小時候沒有惡化即可出院
- (E) 插上 Fr.28 胸管收住院，並從胸管打肋膜沾粘劑
22. 下列關於氣管的敘述，何者錯誤？
- (A) Trachea 的起點 cricoid cartilage (C6)，終點是 carina (T5)
- (B) 氣管的穿刺傷，通常發生在頸部，涉及縱膈腔氣管的穿透傷通常有致命的危險，且有可能傷及食道或附近的大血管
- (C) Tracheal artery 是最主要負責氣管血流供應的血管
- (D) 氣管造口(tracheostomy)的造口位置如果過低，可能會增加氣管血管瘻管(tracheoinnominate fistula)的風險
- (E) 成人氣管最狹窄的位置是在聲帶(vocal cord)，因此氣切口若過高，如在第一個 trachea ring，會有為了避免傷及該處的危險

23. 肺葉切除是肺癌手術治療的標準治療，然而因肺葉大小不同，對肺活量的影響也有所差異，其中哪一個肺葉的切除對肺活量的影響最小？
- (A) 右上葉
 - (B) 右中葉
 - (C) 右下葉
 - (D) 左上葉
 - (E) 左下葉

09 A 組題目

§ 是非題

1. 胃癌的輔助化學治療(adjuvant chemotherapy)，適用於 lymph nodes dissection 不夠徹底的病患。

§ 選擇題

1. 下列哪一個胰臟腺癌的致癌危險因子，證據不確定：
(A) 飲食型態
(B) 家族史
(C) 糖尿病
(D) 慢性胰臟炎
2. 亡佚
3. 亡佚
4. 下列何者非機器人手臂微創手術優點？
(A) 醫材費用便宜
(B) 器械靈活度高
(C) 可完成較複雜的微創手術
(D) 手術視野穩定性佳
5. 亡佚
6. 在淋巴水腫的手術治療中，若患者的淋巴管硬化(Lymphosclerosis)嚴重，最適合採用哪一中手術來改善淋巴循環？
(A) 淋巴靜脈吻合術(LVA)
(B) 查爾氏手術(Charles procedure)
(C) 淋巴結皮瓣移植術(VLNT)
(D) 淋巴按摩

7. 一位 50 歲男性無糖尿病史及周邊血管疾病，因右踝瘀血潰瘍(Stasis ulcer) 來換藥，發現傷口腫脹並有清澈滲液發生，下列處置何者不宜？
- (A) 清除滲液，濕敷換藥繼續觀察
 - (B) 使用彈性繃帶加壓治療
 - (C) 使用 medical leeches 水蛭吸血
 - (D) 安排 lower limb venous doppler exam
8. 先天手部多指症，在白人及亞洲人，最常發生在哪一個部位？
- (A) Thumb
 - (B) index finger
 - (C) middle finger
 - (D) ring finger
 - (E) little finger
9. 56 歲王先生有糖尿病，右腳底遭尖銳物刺傷，一星期後發燒、畏寒，右腳底腫脹疼痛，有膿抽血檢查發現白血球數增加，血糖高於 400 mg/dL。下列那一項處置，對王先生之病情控制最沒有幫助？
- (A) 膿液之細菌培養
 - (B) 胰島素治療
 - (C) 清創手術
 - (D) 抗生素治療
 - (E) 親水性敷料 (Hydrocolloid dressing) 換藥
10. 以下何種 X 光影像最適合觀測 isolated zygomatic arch 的骨折？
- (A) Skull AP
 - (B) Water's view
 - (C) Submental vertex
 - (D) 以上皆非
11. 關於胸腔外科，何者為是？
- (A) 食道癌一定要開刀
 - (B) 食道癌一定不能開刀
 - (C) 食道手術有風險
 - (D) 以上皆非

12. 下列關於氣管惡性腫瘤的敘述，何者錯誤？
- (A) 最常見的原發性氣管癌症為 Squamous cell carcinoma
 - (B) Adenoid cystic carcinoma 容易侵犯氣管上 1/3，易有 submucosa infiltration，因此不易切除乾淨，但長得很慢，所以切除乾淨與預後無關。
 - (C) 最常見的氣管良性腫瘤是 chondroma。
 - (D) Trachea papilloma 的形成與 human papillomavirus 有關，有可能會轉變成惡性的 Squamous cell carcinoma。
13. 肺葉切除是肺癌手術的標準治療，然而因肺葉大小不同，對肺活量的影響也有所差異，其中哪一個肺葉的切除對肺活量的減損最小？
- (A) 右上肺
 - (B) 右中葉
 - (C) 右下葉
 - (D) 左上葉
 - (E) 左下葉
14. 有關外傷病患出血，下列何處之出血不可能造成病患休克？
- (A) 頭皮出血
 - (B) 胸腔出血
 - (C) 腹腔出血
 - (D) 後腹腔出血
 - (E) 以上位置出血皆可能造成休克
15. Which is NOT primary survey for multiple trauma?
- (A) Allergy
 - (B) Medication & past medical history
 - (C) Last meal
 - (D) Event
 - (E) All of the above

16. 乳癌病患經乳房切除手術後可以接受重建手術的時機為何？
- (A) 乳房切除術後立即重建
 - (B) 乳房切除術後延遲重建
 - (C) 乳房切除術後延遲性立即重建
 - (D) 以上皆是
17. 頸部穿刺傷（Neck Penetrating Injury）是一項會致命的傷害，下列對於 Zones of The Neck 敘述，何者錯誤？[109-2 國考]
- (A) The most accessible surgical zone 是 Zone II
 - (B) Zone II 範圍從 cricoid cartilage 往上至 the angle of mandible
 - (C) Zone I 範圍從 the angle of mandible 至 skull base
 - (D) Zone III 範圍包含大血管，不容易以手術方式進去處理
18. 有關傷口癒合過程的敘述，下列何者錯誤？[109-2 國考]
- (A) 組織受傷後首先進入發炎期（inflammatory phase），在此時期因血小板凝集後產生血管擴張物質，而導致血管管壁滲透力增加，增加血漿滲入細胞外組織，同時產生趨化因子（chemokine），使得發炎細胞如中性白血球移往受傷組織
 - (B) 於增生期（proliferative phase）時，大部分的纖維母細胞（fibroblast）會經由巨噬細胞產生的趨化作用，自受傷處以外的組織隨血液循環運送至受傷部位，並於受傷組織中合成膠原蛋白（collagen）
 - (C) 肌纖維母細胞（myofibroblast）於組織受傷後約 6 天形成，主要功能為分泌 α -平滑肌肌動蛋白（ α -smooth muscle actin）並形成應力纖維（stress fiber），於成熟期（maturation phase）負責傷口攣縮現象
 - (D) 於傷口癒合過程中發生的基質（matrix）合成，第三型膠原蛋白較第一型膠原蛋白較早形成

19. 關於開腹手術後，引流管中消化液流失的相關注意事項，下列何者錯誤？[109-2 國考]
- (A) 胃液每天分泌約達 1,000~2,000 毫升，大量流失可能引起鉀離子缺乏
 - (B) 腸液為每天分泌最多之消化液，大量流失可能造成酸血症
 - (C) 胰液呈透明狀，為鹼性消化液，每天分泌約達 600~800 毫升
選項選項
 - (D) 膽汁每天分泌約達 300~800 毫升，其中的碳酸氫離子 (HCO_3^-) 濃度比腸液、胰液還高
20. 有關乳房重建的各種方式中，下列敘述何者錯誤？[109-2 國考]
- (A) 根據統計，義乳重建 (implant-based reconstruction) 是多數人的選擇
 - (B) 放射治療容易導致重建乳房的纖維化或脂肪壞死 (fat necrosis)
 - (C) 闊背肌皮瓣 (LD flap) 對於小乳房是不錯的選擇
 - (D) 橫式腹直肌皮瓣 (TRAM flaps) 與深下腹穿通支皮瓣 (DIEP flaps) 都可以得到很好的乳房重建外觀，但是 DIEP 皮瓣有較高比例會腹部疝氣 (hernia)
21. 下列何種胸壁腫瘤，在血液檢驗中，通常不會有異常發現？[109-2 國考]
- (A) 漿細胞瘤 (plasmacytoma) 選項選項選項
 - (B) 骨纖維發育不良 (fibrous dysplasia) 選項選項選項
 - (C) 骨肉瘤 (osteosarcoma) 選項選項選項
 - (D) Ewing 氏肉瘤 (Ewing's sarcoma)
22. 李先生 35 歲，BMI (body mass index) : 43kg/m^2 ，過去一年努力藉由保守方法減重但效果不彰，本身亦有第二型糖尿病，且糖化血紅素 (HbA1C) 指數為 8.5%，胃鏡檢查發現胃食道逆流程度為 Los Angeles Grade C。李先生決定接受代謝減重手術治療，下列何種手術最為適合？[109-2 國考]
- (A) 胃底摺疊術 (Nissen fundoplication)
 - (B) 胃繞道手術 (Roux-en-Y gastric bypass)
 - (C) 垂直胃隔間術 (vertical banded gastroplasty)
 - (D) 迷走神經截斷術 (vagotomy)

23. 65 歲男性病患因胰頭癌接受胰十二指腸切除手術，於術後第 7 天正常進食，但腹內引流量突然從 50 ml/day 增加至 800ml/day，且引流液從透明血水變成乳白色混濁液，除此之外病人並無發燒及任何不適；請問下列何者之診斷較為可能？[109-2 國考]
- (A) 胰液滲漏 (pancreatic leak)
 - (B) 腹內膿瘍 (intra-abdominal abscess)
 - (C) 膽汁滲漏 (bile leak)
 - (D) 乳糜液滲漏 (chyle leak)

09 B 組題目

§ 問答題

1. 簡述急性肝衰竭中巨噬細胞的角色。

§ 選擇題

1. 關於胃腸基質瘤 (gastrointestinal stromal tumor, GIST) 的診斷與治療，下列敘述何者錯誤？
 - a. GIST 腫瘤的病因和 c-kit 基因的變異有關。
 - b. 若大小相同，有絲分裂數 (mitotic counts) 是影響 GIST 預後的重要因素
 - c. GIST 手術的安全範圍 (safety margin) 至少離腫瘤邊緣 4 公分以上。
 - d. Gastric GIST with liver metastasis，若肝臟轉移數目小於 4 個，應優先考慮手術切除。
 - (A) a, b
 - (B) b, c
 - (C) b, d
 - (D) c, d
 - (E) a, d
2. 全靜脈營養(TPN)最不常見的併發症為何？
 - (A) 高血糖
 - (B) 肝功能異常
 - (C) 氣胸
 - (D) 心肌梗塞
 - (E) 電解質不平衡
3. 關於胰臟炎後所發生的假性囊腫 (pseudocyst) 下列那些是錯誤的？
 - (A) 一般發生在於 acute necrotising pancreatitis 4 個禮拜之內。
 - (B) Well-defined wall, completely encapsulated
 - (C) Location 都是 extrapancreatic
 - (D) Homogeneous, fluid filled

4. 近年火紅的減重藥物 Liraglutide 主要成分是：
- (A) GLP-1 receptor agonist
 - (B) GLP-1 receptor antagonist
 - (C) GLP-2 receptor antagonist
 - (D) GIP receptor agonist
 - (E) GIP receptor antagonist
5. Which IS unmet need of pancreatic cancer?
- (A) Early diagnosis
 - (B) Potent regimen
 - (C) Surgical radicality
 - (D) All of the above
6. 關於顱顏治療團隊，下列何者為非？
- (A) 是一個由跨科部專家組成的團隊
 - (B) 協調師是其中之靈魂人物
 - (C) 牙科在其中扮演重要角色
 - (D) 此團隊設定上只負責六歲之前病童之治療
 - (E) 台灣顱顏治療團隊屈指可數
7. 淋巴靜脈吻合手術(LVA)中，健康的淋巴管是成功的關鍵之一。下列哪個因素可能導致吻合手術失敗？
- (A) 淋巴結腫大
 - (B) 淋巴管擴張
 - (C) 淋巴管硬化
 - (D) 靜脈栓塞
8. Which of the following is an advantage of multifilament sutures?
- (A) Less tissue drag
 - (B) Doesn't wick
 - (C) Good knot security
 - (D) Less tissue reaction
 - (E) Shape memory

9. 對於肘隧道症候群，在早期可使用保守療法，其中之一的方法是保持手肘在何種姿勢？
- (A) 彎曲
 - (B) 伸直
10. 56 歲王先生有糖尿病，右腳底遭尖銳物刺傷，一星期後發燒、畏寒，右腳底腫脹疼痛，有膿抽血檢查發現白血球數增加，血糖高於 400 mg/dL。下列那一項處置，對王先生之病情控制最沒有幫助？
- (A) 膿液之細菌培養
 - (B) 胰島素治療
 - (C) 清創手術
 - (D) 抗生素治療
 - (E) 親水性敷料（Hydrocolloid dressing）換藥
11. 治療 isolated zygomatic arch 骨折的治療是？
- (A) Gillies procedure
 - (B) Ash procedure
 - (C) Walsham procedure
 - (D) 以上皆非
12. 食道弛緩不能（achalasia），以下何者非其治療方式？
- (A) 肉毒桿菌注射
 - (B) 氣球擴張術
 - (C) 胸腔鏡手術
 - (D) 內視鏡經口肌肉切開術（POEM）
 - (E) 以上皆是

13. 下列關於氣管鏡 (bronchoscopy) 的敘述，何者錯誤？
- (A) 軟式支氣管鏡依據成像的原理，分成光學式及電子式二種。
 - (B) 光學式的軟式支氣管鏡，因為材質較易損壞，加上成像品質較差，目前已經被淘汰，臨床上幾乎不會使用。
 - (C) 窄頻影像 (Narrow band imaging) 的原理，是藉由濾光器等化頻寬後所發出的藍光及綠光，其穿透粘膜表層的血紅素吸收，藉以凸顯粘膜層微血管的型態，得以鑑別早期的腫瘤病變。
 - (D) 硬式支氣管鏡，必須在全身麻醉的情況下，才能夠順利執行。
 - (E) 軟式支氣管鏡由於搭配的器械強度不如硬式支氣管鏡，因此所有的氣管支架置放，必須得藉由硬式支氣管鏡來完成。
14. 亡佚
15. 下列有關外傷病患的 primary survey，何者錯誤？
- (A) Airway with cervical spine protection
 - (B) Breathing and ventilation
 - (C) Circulation with hemorrhage control
 - (D) Defibrillation
 - (E) Exposure and environmental control
16. 根據科學研究，下列何者對美的闡述為是？
- (A) 美的定義和物種無關
 - (B) 美是主觀的判斷，沒有客觀的標準
 - (C) 美很膚淺，和個人身心健康無關
 - (D) 我們通常無法一眼決定陌生人的美醜
 - (E) 麗質天生的人無論求偶求職都比較容易成功
17. 監測手指末梢的血液循環狀況，下列哪個指標最可靠？
- (A) 顏色
 - (B) 溫度
 - (C) 組織飽和度
 - (D) 指尖滲血
18. 下列關於 thyroid storm 治療的敘述，何者錯誤？ [108-1 國考]
- (A) Lugol's iodine 含有大量的碘，應避免使用
 - (B) β -blockers 可減少 peripheral T4 to T3 conversion
 - (C) propylthiouracil (PTU) 可減少 peripheral conversion of T4 to T3
 - (D) 應給予氧氣及靜脈輸液補充

19. 關於各種不同的生物工程皮膚替代物（bioengineered skin substitutes）的優點與缺點，下列敘述何者錯誤？[108-1 國考]
- (A) 培養的異體角質細胞（allogeneic keratinocyte graft）有傷口覆蓋與促進癒合的優點
 - (B) 培養的異體角質細胞（allogeneic keratinocyte graft）缺點是脆弱且無法避免傷口攣縮
 - (C) 生物工程真皮替代物（bioengineered dermal replacement）大部分只能當作暫時性的傷口覆蓋
 - (D) 生物工程真皮替代物（bioengineered dermal replacement）優點是具有優異的引導上皮化（re-epithelialization）的能力
20. 關於肋膜積液（pleural effusion）的敘述，下列何者正確？[108-1 國考]
- (A) 漏出液（transudate）常在肺炎或病毒感染時發生
 - (B) 滲出液（exudate）通常是清澈，蛋白質含量較低
 - (C) 滲出液（exudate）是肋膜液的 LDH 比上血清的 LDH 比值小於 0.6
 - (D) 若因肺炎產生之肋膜積液，此液體之葡萄糖濃度通常下降，且小於 60mg/dL 的液體
21. 外傷評分系統（Injury Severity Score, ISS）是對外傷病患嚴重度評估常用的評分方式；下列對於外傷評分系統的敘述何者錯誤？[108-1 國考]
- (A) Abbreviated Injury Scale（AIS），於 1971 年提出，將受傷部位嚴重程度，分為從第 1 級（minimal severity）至第 6 級（presumably fatal）
 - (B) Injury Severity Score（ISS）是一種生理性評分系統（physiological scoring system）
 - (C) ISS 分數區域為 1 分至 75 分，minor injury 是指 ISS < 9 分
 - (D) Glasgow Coma Scale（GCS）能評量外傷病患意識狀態，分數區域為 3 分至 15
22. 有關老年人外傷處置的敘述，下列何者錯誤？[108-1 國考]
- (A) 老年人發生硬腦膜下出血（subdural hemorrhage）的機率比硬腦膜上出血（epidural hemorrhage）機會高
 - (B) 必要時，應及早輸血
 - (C) 胸部挫傷時，發生院內感染的機率比年輕人高
 - (D) 生命徵象變化容易預測

23. 關於皮膚移植 (skin graft) 的敘述，下列何者正確？ [108-1 國考]
- (A) 血漿浸潤 (plasmatic circulation) 是指在術後的 72 小時後，移植的皮膚 (grafted skin) 將直接吸收養分
 - (B) 屍皮 (cadaveric skin) 覆蓋是屬於異種 (xenograft) 移植
 - (C) 常見的手術失敗原因包括血腫、感染，但移植皮膚因位移產生缺失 (loss) 情況並不多見
 - (D) 移植皮膚的真皮愈厚，愈不會產生傷口疤痕攣縮 (scar contracture)
24. 急診面對一位發燒病人，血壓 75/40 mmHg，心跳 105/min，心功能指標 (cardiac index) 下降，但中央靜脈壓力 (central venous pressure) 上升，最有可能診斷為何？ [108-1 國考]
- (A) 心因性休克
 - (B) 敗血性休克
 - (C) 低血容積休克
 - (D) 神經性休克

09 C 組題目

§ 問答題

1. 請簡述急性肝衰竭病人 fluid status 轉變的病生理機制？

§ 是非題

- X
1. 為了預防氣切手術病人術後產生 trachea stricture，需採用有 cuffed 的氣切管，同時盡可能地使氣囊都處於飽滿的階段，以把氣管撐開，才不會形成氣管狹窄。

§ 選擇題

- D
1. 關於胃腸基質瘤 (gastrointestinal stromal tumor, GIST) 的診斷與治療，下列敘述何者錯誤？
 - a. GIST 腫瘤的病因和 c-kit 基因的變異有關。
 - b. 若大小相同，有絲分裂數 (mitotic counts) 是影響 GIST 預後的重要因素
 - c. GIST 手術的安全範圍 (safety margin) 至少離腫瘤邊緣 4 公分以上。
 - d. Gastric GIST with liver metastasis，若肝臟轉移數目小於 4 個，應優先考慮手術切除。

(A) a, b
(B) b, c
(C) b, d
(D) c, d
(E) a, d
 2. 以下哪項指標較不能用來評估病患是否營養不良？

(A) 病患近期體重變化
(B) 食慾好壞
(C) 相關腸胃道症狀
(D) 抽菸
(E) 肌少症

3. About survival statistics of pancreatic cancer, which is wrong?
- (A) More than 73% of patients died in 1 year
- D (B) About 85% of patients died in 2 years
- (C) From SEER database, the 5-year relative survival is about 15%
- (D) The incidence in Taiwan doubled with in recent 20 years
4. 下列哪種術式是 2022 年台灣施行最多的減重手術：
- (A) Y 型胃繞道
- D (B) 胃間隔
- (C) 可調式胃束帶
- (D) 胃袖狀切除
- (E) 膽胰繞道術
5. 下列非腹腔鏡膽囊切除術手術適應症？
- (A) Gall stone with colic pain
- C (B) Gall stone pancreatitis
- (C) 0.5 cm gall bladder polyp
- (D) Gall stone with acute cholecystitis
6. 先天性顱顏畸形常見手術步驟包括？
- (A) 頭骨切開
- E (B) 眼眶重建
- (C) 中臉前移
- (D) 骨板固定
- (E) 以上皆是
7. 在淋巴水腫的早期手術治療中，淋巴靜脈吻合術(LVA)的成功率取決於哪一項因素？
- C (A) 患肢的淋巴液和脂肪組成比例
- (B) 患者的年齡與病史
- (C) 手術中找到健康的淋巴管和靜脈
- (D) 患肢是否已有慢性發炎

8. 糖尿病足潰瘍的誘發病因主要來自？

- (A) 周邊血管病變
- (B) 營養失調
- (C) 免疫力低下
- (D) 紅血球變形
- (E) 周邊神經病變

A

E

9. 在 radio polydactyly (thumb duplication)，最常使用的分類方法為 Wassel classification 就是根據 level of duplication 將 radial polydactyly (thumb duplication) 分為 type 1-7，請問其中最常見的是？

- (A) Type 2
- (B) Type 7
- (C) Type 4
- (D) Type 1

C

10. 在自由皮瓣(Free flap)顯微重建手術後，臨床上之 Flap monitoring 中，下列何者是表示血流可能「不正常」？

- (A) Color of flap skin: pink
- (B) Temperature of flap skin: 32 °C
- (C) Capillary refilling time: < 1 s
- (D) Needle puncture: fresh red blood
- (E) Doppler sound: positive and pulsating

B

11. 關於斷指接合手術，下列哪個構造的接合最重要？

- (A) 骨頭或關節的固定
- (B) 肌腱的接合
- (C) 靜脈的接合
- (D) 動脈的接合
- (E) 神經的接合

D

A

12. 關於食道，何者為非？

- (A) 食道為管狀物
- (B) 食道為橫跨頸胸腹的器官
- (C) 食道有兩層肌肉
- (D) 以上皆是

C

D

13. 周邊型小肺癌(< 1 cm)大多屬於低侵襲性癌，最有可能造成病患產生何種症狀？

- D (A) 咳嗽
(B) 咳血
(C) 呼吸喘
(D) 沒有症狀

14. 一位中年女性過馬路被汽車撞送至急診室，到院時呼吸困難，血氧 82%，血壓 80/50 mmHg，左胸有大片瘀青，聽診發現左側呼吸音減弱，經細針減壓以及左側胸管置入後引流出大量氣體，血壓上升回復到 90/70 mmHg，血氧上升到 94%；呼吸狀況也改善，過五分鐘後，突然該患者又再度呼吸困難、血壓下降至 70/50 mmHg，此時該如何處置最適當？

- C (A) 確認胸管引流功能，若有必須再放置一條胸管
(B) Call portable CXR 看胸管位置是否正確
(C) 因生命徵象不穩定，應重新進行初級評估
(D) 安排電腦斷層確定是否有其他部位大出血

15. 25 歲男性，在西門町衝突事件中受刀傷送進急診，檢查發現上腹部有一明穿刺傷口並有血流出，血壓 85/30 mmHg，心跳 140 下，呼吸每分鐘 25 下，病人頸靜脈有怒張現象，請問你會優先安排怎樣的影像檢查？

- B (A) 電腦斷層
(B) 床邊超音波
(C) 核磁共振
(D) 核醫心臟灌注

16. 急診常有人受傷後要求醫師縫「美容針」，請問何謂「美容針」？

- C 1) 用醫院最細的線把皮膚縫起來
2) 針距勁量緊密製造完全密封不滲血的傷口
3) 讓皮膚承受最大張力的縫合
4) 根據傷口位置適度改變方向符合 Langer's line
5) 精準穩定的縫合技術

- (A) 全
(B) 12
(C) 45
(D) 145
(E) 1345

17. 營養支持對於外科重症的病人極為重要，下列何者最接近正常體重病人一天的基礎能量消耗(basal energy expenditure)？

B?

(A) 10 ~ 15 Kcal x BW (Kg)

C

(B) 15 ~ 20 Kcal x BW (Kg)

(C) 25 ~ 30 Kcal x BW (Kg)

(D) 30 ~ 35 Kcal x BW (Kg)

18. 39 歲男性，有本態性高血壓、高脂血症、糖尿病及肝功能異常等病史並接受藥物控制，因病態性肥胖接受腹腔鏡袖狀胃切除手術(sleeve gastrectomy)。術前病人體重 130 公斤，身體質量指數(body mass index) 為 42.4 kg/m²，血壓 146/70 mmHg，心跳 72 次/分，呼吸 16 次/分。術後 4 小時病人主訴呼吸困難，意識呈焦慮狀態，當時血壓 120/95 mmHg、心跳 117 次/分、呼吸 26 次/分，給予氧氣 3 公升/分，使用後，動脈血氧飽和度可達 100%。此時病人最有可能的診斷為何？

D

C

(A) 急性肺栓塞 (acute pulmonart embolism)

(B) 急性心肌梗塞 (acute myocardial infarction)

(C) 急性失血 (acute blood loss)

(D) 急性疼痛 (acute pain)

19. 在大面積燒燙傷治療中，充分的體液復甦 (fluid resuscitation) 是避免休克的重要治療。對於 30 歲、70 公斤的男性燒燙傷病人，二度及三度傷口共占體表面積 (TBSA) 40%，下列處置何者最不適當？

D

(A) 建立靜脈管線 (IV line) 開始體液復甦 (fluid resuscitation)，並抽尿管監測尿量

(B) 如果按照 Parkland formula 靜脈輸液是給予 lactated Ringer solution，從 700 cc/hr 開始給予

(C) 尿量須維持在 35 cc/hr 以上

(D) 給予 lactated Ringer solution 2 小時後，尿量突然變少，可再給予 albumin，從 0.5 ml/Kg/% TBSA burn area 開始給予

20. 有關胃食道逆流之治療，下列何者較不適當？

(A) Lifestyle modification 加上 proton pump inhibitor (PPI) 為第一線治療

C

(B) 如內科治療已到極限而仍有症狀，則外科手術建議介入

D

(C) 很長期使用 proton pump inhibitor (PPI) 有引起 carcinoid tumor 之可能

(D) Nissen fundoplication 是 partial fundofication 的一種

B

21. 在急診室，一位 30 歲 70 公斤男性，主訴約 60 分鐘前左上腹部被刀刺傷，傷口疼痛，生命徵候：心跳 105/分、血壓 110/95 mmHg、呼吸 22/分，病人略顯焦慮，身體檢查發現左上腹部 2 公分傷口，四肢濕冷。預估該病人體內出血量可能為下列何者？

(A) 500 cc
(B) 1000 cc
(C) 1700 cc
(D) 2500 cc

22. 承上題，病人經過 20 分鐘的初步處理突然意識不清，生命徵象：心跳 145/分、血壓 60/45 mmHg、呼吸 32/分，下列何項處置不適當？

C

(A) 插上氣管內管以維持呼吸道暢通
(B) 準備緊急手術以控制出血
(C) 緊急輸血及使用升壓劑，以維持收縮壓在 120 mmHg
(D) 此時輸液除血液製品外，以 lactated Ringer's solution 或 生理食鹽水為主

23. 有關 gastric lymphoma 的敘述，下列何者正確？

(A) Primary lymphoma 在消化道中，最常出現在胃部，且多為 T-cell type

C

(B) Gastric lymphoma 的治療主流仍是以手術切除為優先考慮
(C) Gastric low-grade MALT lymphoma 的致病機轉與幽門桿菌 (H. pylori) 有關
(D) 此疾病對化學治療的反應不佳