

# Introducción al Análisis Real - Solutions Manual

mmanosalva  
eochoaq

15 de abril de 2023

# Índice general

<b>1. Espacios métricos</b>	<b>2</b>
1.1. Algunos ejercicios al lector: . . . . .	2
1.2. Quiz 4: . . . . .	5
1.3. Quiz 5: . . . . .	7
1.4. Ejercicios adicionales. . . . .	9
1.5. El conjunto de Cantor ☠☠☠☠☠ . . . . .	12
1.6. Sucesiones ☠☠☠☠☠ . . . . .	13
1.6.1. Algunos ejercicios al lector: . . . . .	13

# Capítulo 1

## Espacios métricos

El curso de Introducción al Análisis Real es uno de los más pesados en la carrera de matemáticas y los estudiantes carecen casi que de toda ayuda (no hay monitorias y los espacios en clase a veces son insuficientes), por este motivos decidimos hacer este solucionario de las notas de Introducción al Análisis Real de los profesores Leonardo Rendón y Serafín Bautista, esto más que un solucionario es una guía de lectura de las notas, aquí encontrarás muchos de los conceptos o ideas del curso desde un punto de vista más de estudiante que ha sufrido esa materia y que sabe lo compleja que puede llegar a ser.

Esperamos que las soluciones de los ejercicios que aportamos acá sirvan de guía para entender los conceptos y mecanismos que se deben usar para atacar este tipo de problemas.

Muchos éxitos - mmanosalva y eochoaq

### 1.1. Algunos ejercicios al lector:

✎ Probar que  $(\mathbb{R}^n, d_1)$  y  $(\mathbb{R}^n, d_\infty)$  son espacios métricos.

**Demostración.** • Sean  $p, q \in \mathbb{R}^n$ , tenemos que:

$$d_1(p, q) = \sum_{k=1}^n |p_k - q_k|$$

Luego como  $|p_k - q_k| \geq 0$ ,  $d_1(p, q) \geq 0$  (estamos sumando valores positivos). Ahora si  $d_1(p, q) = 0$ , como  $|p_k - q_k| \geq 0$  entonces  $|p_k - q_k| = 0$  para todo  $k$ , luego  $p_k = q_k$  para todo  $k$ , es decir  $p = q$ , además note que

$$d_1(p, q) = \sum_{k=1}^n |q_k - p_k| = d_1(q, p)$$

Esto ya que  $|p_k - q_k| = |q_k - p_k|$ , Ahora veamos la desigualdad triangular.

$$\begin{aligned}
d_1(p, q) &= \sum_{k=1}^n |p_k - q_k| \\
&= \sum_{k=1}^n |p_k - q_k + r_k - r_k| \\
&\leq \sum_{k=1}^n |p_k - r_k| + \sum_{k=1}^n |r_k - q_k| = d_1(p, r) + d_1(r, q)
\end{aligned}$$

• Nuevamente tomamos  $p, q \in \mathbb{R}^n$ , tenemos que:

$$d_\infty(p, q) = \max_{1 \leq k \leq n} |p_k - q_k|$$

como  $|p_k - q_k| \geq 0$  pues es claro que el máximo será mayor igual que 0 y por tanto  $d_\infty(p, q) \geq 0$ . Como  $|p_k - q_k| = |q_k - p_k|$ :

$$d_\infty(p, q) = \max_{1 \leq k \leq n} |q_k - p_k| = d_\infty(q, p)$$

Ahora si  $\max_{1 \leq k \leq n} |q_k - p_k| = 0$ ,  $|p_k - q_k| = 0$  para todo  $k$  (si el máximo es 0 los demás también por definición de máximo) y como  $|p_k - q_k| = 0$  para todo  $k$ , pues  $p_k = q_k$  para todo  $k$ , es decir  $p = q$ . Veamos la desigualdad triangular.

$$\begin{aligned}
d_\infty(p, q) &= \max_{1 \leq k \leq n} |p_k - q_k| \\
&= \max_{1 \leq k \leq n} |p_k - q_k + r_k - r_k| \\
&\leq \max_{1 \leq k \leq n} |p_k - r_k| + \max_{1 \leq k \leq n} |r_k - q_k| \\
&\leq d_\infty(p, r) + d_\infty(r, q)
\end{aligned}$$

□

☞ Sea  $X$  un conjunto no vacío y  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ . Diremos que  $f$  es una función acotada si existe  $k > 0$  tal que para todo  $x \in X$  se tiene  $|f(x)| \leq k$ . Consideremos el conjunto  $B(X) = \{f : X \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es acotada}\}$ . Definamos:

$$\begin{aligned}
d : B(X) \times B(X) &\rightarrow \mathbb{R} \\
(f, g) &\mapsto d(f, g)
\end{aligned}$$

donde  $d(f, g) = \sup\{|f(x) - g(x)| : x \in X\} = \sup_{x \in X} |f(x) - g(x)|$ . Entonces  $(B(X), d)$  es un espacio métrico.

**Demostración.** Es inmediato que  $d(f, g) \geq 0$  por definición de supremo y porque  $|f(x) - g(x)| \geq 0$ . Como  $|f(x) - g(x)| = |g(x) - f(x)|$ , entonces también se tiene que  $d(f, g) = d(g, f)$ .


Tenemos que  $|f(x) - g(x)| \geq 0$ , luego por definición de supremo si  $\sup_{x \in X} |f(x) - g(x)| = 0$ , entonces  $|f(x) - g(x)| = 0$  para todo  $x \in X$ , así  $f = g$ , o sea si  $d(f, g) = 0$ , entonces  $f = g$ . Veamos ahora la desigualdad triangular ☹☹☹☹☹☹:

$$\begin{aligned}
 d(f, g) &= \sup_{x \in X} |f(x) - g(x)| \\
 &= \sup_{x \in X} |f(x) - g(x) + h(x) - h(x)| \\
 &\leq \sup_{x \in X} |f(x) - h(x)| + |h(x) - g(x)| \\
 &= \sup_{x \in X} |f(x) - h(x)| + \sup_{x \in X} |h(x) - g(x)| \\
 &= d(f, h) + d(h, g)
 \end{aligned}$$

Esto ya que  $\sup(A + B) = \sup(A) + \sup(B)$

□

- ✎ Dado  $(E, d)$  un espacio métrico, toda bola abierta es un conjunto abierto. En efecto, dados  $B_E(p, r)$  (con  $r > 0$  y  $p \in E$ ) y  $q \in B_E(p, r)$ , tomamos  $r' = r - d(p, q)$  de donde se tiene que  $B_E(q, r') \subset B_E(p, r)$  (verifique esta contención como ejercicio).



**Demostración.** Sea  $x \in B_E(q, r')$ , entonces;

$$\begin{aligned}
 d(p, x) &\leq d(p, q) + d(q, x) \\
 &\leq r - d(q, x) + d(q, x) \\
 &\leq r
 \end{aligned}$$

Luego el punto  $x \in B_E(p, r)$  y se tiene la contención

□

Note que la prueba no debe depender del dibujo, sin embargo hacer dibujos puede ser de ayuda para tener una idea de la demostración, como ocurrió en este caso

**Teorema 1 (Teorema 9).** Dado  $(E, d)$  en espacio métrico, tenemos que:

- 1)  $E$  es cerrado
- 2)  $\emptyset$  es cerrado
- 3) Unión finita de cerrados es cerrada.
- 4) Intersección arbitraria de cerrados es cerrada.

**Demostración.** Note que  $E^C = \emptyset$  luego el complemento de  $E$  es abierto. □

**Demostración.** Por definición  $E$  es abierto, luego  $\emptyset$  es cerrado. □

**Demostración.** Consideremos  $C_i$  una familia de cerrados, luego

$$\left( \bigcup_{i=1}^n C_i \right)^C = \bigcap_{i=1}^n C_i^C$$

Y como intersección finita de abiertos es abierto, entonces acabamos. □

**Demostración.** Nuevamente consideremos  $C_i$  una familia de cerrados, entonces:

$$\left( \bigcap_{i \in I} C_i \right)^C = \bigcup_{i \in I} C_i^C$$

Y como unión arbitraria de abiertos es abierto, entonces acabamos. □

☞ Sea  $(E, d)$  un espacio métrico  $\{p\} = \bigcap_{r>0} B[p, r]$

**Demostración.** Suponga que  $\{p\} \neq \bigcap_{r>0} B[p, r]$ , luego existe  $x \in \bigcap_{r>0} B[p, r]$  tal que  $x \neq p$ , entonces  $x \in B[p, r]$  para todo  $r > 0$ , pero  $x \neq p$ , por tanto  $d(x, p) > 0$ , así existe  $0 < r < d(x, p)$  tal que  $x \notin B[p, r]$ , contradicción. □

## 1.2. Quiz 4:

☞ **Falso:** Observamos que vía la definición de abierto  $\mathbb{Q}$  no puede ser abierto ya que toda bola con centro en un racional va a tener irracionales dentro que no están en  $\mathbb{Q}$  y por tanto la bola no está contenida en  $\mathbb{Q}$ , luego no es abierto.

De hecho es la forma de argumentar esto, vía la densidad de  $\mathbb{Q}$  en  $\mathbb{R}$  que ya conocemos de los cursos anteriores.

De manera más formal para todo  $r > 0$ ,  $B(q, r) = (q - r, q + r) \not\subseteq \mathbb{Q}$ , ya que  $\mathbb{Q}$  es denso en  $\mathbb{R}$ .

Esto ocurre ya que estamos tomando bolas en  $\mathbb{R}$ . (Este argumento es para la métrica usual).

✎ Verdadero:

**Demostración.** Sea  $q \in \mathbb{Q}$ , consideremos  $B(q, \frac{1}{2})$  entonces como estamos en la métrica discreta  $B(q, \frac{1}{2}) = \{x \in \mathbb{R} : d_d(q, x) < \frac{1}{2}\} = \{q\}$  por definición de la métrica y como podemos hacer esto para todo  $q \in \mathbb{Q}$  y un conjunto es abierto si y solo si es unión de bolas abiertas, razonando inductivamente acabamos.  $\square$

✎ Verdadero:  $B(0, \frac{1}{2}) = \{x \in \mathbb{R} : d_d(0, x) < \frac{1}{2}\} = \{0\} = \{x \in \mathbb{R} : d_d(0, x) \leq \frac{1}{4}\} = B[0, \frac{1}{4}]$

✎ Verdadero:

**Demostración.** Para ver que los naturales son cerrados con  $d_1$ , veamos que su complemento es abierto. Observe que:

$$\mathbb{R} \setminus \mathbb{N} = (-\infty, 0) \bigcup_{i \in \mathbb{N}} B\left(i + \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

Note que esas bolas son abiertas y unión arbitraria de abiertos es abierto, efectivamente esas bolas cubren  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$  entonces acabamos.  $\square$

✎ Verdadero:

**Demostración.** Sea  $X \subseteq \mathbb{R}$  en  $(\mathbb{R}, d_d)$ ,  $X$  es abierto ya que:

$$X = \bigcup_{x \in X} B\left(x, \frac{1}{2}\right)$$

Y  $\mathbb{R} \setminus X$  también ya que:

$$\mathbb{R} \setminus X = \bigcup_{j \in \mathbb{R} \setminus X} B\left(j, \frac{1}{2}\right)$$

Luego  $X$  es cerrado ya que su complemento es abierto, estos conjuntos los llamaremos **clopen** para simplificar en algunos casos.  $\square$

Note que podemos escoger cualquier  $r \leq 1$  y la prueba se mantiene.

✎ Falso: Queremos ver que  $[0, \frac{1}{4})^C = [\frac{1}{4}, \frac{1}{2})$  no es abierto, note que  $B(\frac{1}{4}, r) = (\frac{1}{4} - r, \frac{1}{4} + r)$  para todo  $r > 0$  no está contenida en  $[\frac{1}{4}, \frac{1}{2})$ , entonces  $[0, \frac{1}{4})$  no es cerrado en  $([0, \frac{1}{2}), d|_{[0, \frac{1}{2}) \times [0, \frac{1}{2})})$

✎ Falso: El conjunto  $[0, \frac{1}{2})$  es abierto en  $([0, \frac{1}{2}), d_1|_{[0, \frac{1}{2}) \times [0, \frac{1}{2})})$ , pero no en  $(\mathbb{R}, d_1)$

✎ Verdadero:

**Demostración.** Sea  $A$  abierto en  $(E, d)$ , entonces:

$$A = \bigcup_{a \in A} B(a, r_a)$$

Luego:

$$A \cap E_1 = \bigcup_{a \in A} B(a, r_a) \cap E_1$$

Y sabemos que  $B(a, r_a) \cap E_1$  es abierto en  $E_1$  y como unión arbitraria de abiertos es abierto  $A \cap E_1$  es abierto, es decir  $A$  es abierto en  $E_1$ . □

Y acabamos esta sección.

## 1.3. Quiz 5:

☞ Verdadero:

**Demostración.** Sea  $x \in \mathbb{R}$  entonces  $(B(x, \frac{1}{3}) \setminus \{x\}) = \emptyset$ , luego  $(B(x, \frac{1}{3}) \setminus \{x\}) \cap \mathbb{Q} = \emptyset$ , por tanto  $\mathbb{Q}' = \emptyset$ . □

☞ Falso: Sabemos que  $S$  es cerrado si y solo si  $\bar{S} = S$ , antes probamos que  $\mathbb{N}$  en  $(\mathbb{R}, d_1)$  es cerrado luego

$$\bar{\mathbb{N}} = \mathbb{N}$$

☞ Falso: Sabemos que  $\partial\mathbb{Q} = \overline{\mathbb{Q} \cap \mathbb{R}} \setminus \mathbb{Q}$  y como  $\mathbb{Q}$  y  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \mathbb{I}$  son densos en  $\mathbb{R}$  entonces  $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$  y  $\bar{\mathbb{I}} = \mathbb{R}$ , así  $\partial\mathbb{Q} = \mathbb{R}$

☞ Verdadero:

**Demostración.** Tenemos que  $x \in [0, 1)'$  si y solo si  $x \in \overline{[0, 1) - \{x\}}$ , observe que:

$$\begin{aligned} \overline{[0, 1) - \{x\}} &= [0, 1) \setminus \text{int}([0, 1) \setminus ([0, 1) \setminus \{x\}]) \\ &= [0, 1) \setminus \text{int}(\{x\}) \\ &= [0, 1) \setminus \emptyset \end{aligned}$$

En efecto si  $x \in [0, 1)$ ,  $x \in [0, 1)'$  □

☞ Verdadero:  $\partial\mathbb{R} = \overline{\mathbb{R}} \cap \bar{\emptyset} = \mathbb{R} \cap \emptyset = \emptyset$

☞ Verdadero:



**Demostración.** Como en las pruebas anteriores note que si  $r \leq 1$  entonces para todo  $x \in \mathbb{R}$ ,  $B(x, r) \setminus \{x\} = \emptyset$  y por tanto  $B(x, r) \setminus \{x\} \cap \mathbb{R} = \emptyset$ , luego  $\mathbb{R}' = \emptyset$   $\square$

✎ **Falso:** Sea  $(\mathbb{R}, d_d)$  los reales con la métrica discreta, luego:

$$\overline{B(0, 1)} = \overline{\{0\}} = \{0\}$$

Mientras que:

$$B[0, 1] = \mathbb{R}$$

✎ **Verdadero:**

**Demostración.** Tenemos que:

$$d_1(p, q) = \sum_{k=1}^n |p_k - q_k|$$

y

$$d_\infty(p, q) = \max_{1 \leq k \leq n} |p_k - q_k|.$$

Pero como en este caso estamos en  $\mathbb{R}$ , entonces

$$d_1(p, q) = |p - q| = d_\infty(p, q)$$

Entonces como  $\mathbb{N}$  es cerrado en  $(\mathbb{R}, d_1)$ , también es cerrado en  $(\mathbb{R}, d_\infty)$

$\square$

✎ **Verdadero:**

**Demostración.** Tenemos que  $A$  es cerrado en  $(\mathbb{R}^n, d_\infty)$ , luego  $A^C$  es abierto en  $(\mathbb{R}^n, d_\infty)$ , así para todo  $x \in A^C$  existe un  $r_x$  tal que:

$$B_\infty(x, r_x) = \{y \in \mathbb{R}^n : d_\infty(x, y) < r_x\} \subseteq A^C$$

Ahora supongamos que  $A$  no es cerrado en  $(\mathbb{R}^n, d_1)$ , luego  $A^C$  no es abierto en  $(\mathbb{R}^n, d_1)$ , es decir, existe  $a \in A^C$  tal que para todo  $r > 0$ :

$$B_2(a, r) \not\subseteq A^C$$

En particular  $B_2(a, r_a) \not\subseteq A^C$ , pero como  $d_\infty(x, y) \leq d_2(x, y) < r_a$ , entonces  $B_2(a, r_a) \subseteq B_\infty(a, r_a) \subseteq A^C$ , contradicción.

$\square$

## 1.4. Ejercicios adicionales.

**Nota.** los siguientes ejercicios fueron propuestos en 2022-2 en un parcial de Análisis, el propósito de esta sección es que sirva para que el estudiante pueda hacerse una idea del modelo de preguntas que se suelen hacer y esté preparado

**En cada caso determine si el enunciado es verdadero o falso. Si es verdadero demuéstrela de lo contrario dé un contra ejemplo.**

- ☠ Si  $A \neq \emptyset$  es un subconjunto cerrado y acotado inferiormente en  $\mathbb{R}$  con la métrica usual  $|x - y|$  entonces  $A$  tiene elemento mínimo.

**Verdadero:**

**Demostración.** Supongamos que  $A$  es acotado inferiormente en  $\mathbb{R}$ , entonces existe  $i = \inf(A)$ , veamos que  $i \in A$ . Supongamos que  $i \notin A$ , entonces  $i \in \mathbb{R} \setminus A$ ,  $\mathbb{R} \setminus A$  es abierto porque  $A$  es cerrado, entonces existe  $\epsilon > 0$  tal que  $B(i, \epsilon) = (i - \epsilon, i + \epsilon) \subseteq \mathbb{R} \setminus A$ , por otro lado como  $i = \inf(A)$  existe  $b \in A$  tal que  $i \leq b < i + \epsilon$ , luego  $b \in (i - \epsilon, i + \epsilon) \subseteq \mathbb{R} \setminus A$ . Contradicción, luego  $i \in A$ , es decir  $i = \min(A)$ . □

- ☠ Sean  $(X, d)$  un espacio métrico y  $A, B$  subconjuntos de  $X$  tales que  $\text{int}(A) \subseteq B \subseteq \bar{A}$  entonces  $\bar{B} = \bar{A}$ .

**Falso:** Contraejemplo: Sean  $(\mathbb{R}, d_1)$ ,  $\mathbb{N} = A$  y  $\{0\} = B$ , entonces como  $\text{int}(\mathbb{N}) = \emptyset$ , es claro que  $\text{int}(\mathbb{N}) \subseteq \{0\}$ , por otro lado  $\bar{\mathbb{N}} = \mathbb{N}$  ya que  $\mathbb{N}$  es cerrado, y  $\overline{\{0\}} = \{0\}$ , en efecto  $\{0\} \neq \mathbb{N}$ .

- ☠ Si  $(X, d)$  es un espacio métrico entonces  $d'(x, y) = d^2(x, y)$  también define una métrica en  $X^2$ .

**Falso:** Contraejemplo: Tome  $(\mathbb{R}, d_1)$ , veamos que  $(\mathbb{R}, d_1^2)$  no es un espacio métrico. Note que  $d_1^2(3, 1) > d_1^2(3, 2) + d_1^2(2, 1)$  ( $4 > 1 + 1$ ), lo que contradice la desigualdad triangular

- ☠  $(X, d)$  un espacio métrico y  $(A_j)_{j \in J}$  una familia de subconjuntos de  $X$ . Si  $a \in \bar{A_j}$  para todo  $j \in J$  entonces  $a \in \overline{\bigcap_{j \in J} A_j}$ .

**Falso:** Contraejemplo: Sean  $\mathbb{Q}, \mathbb{I}$ , en  $(\mathbb{R}, d_1)$ , y sea  $x = \sqrt{2}$ , como  $\bar{\mathbb{Q}} = \bar{\mathbb{I}} = \mathbb{R}$ ,  $x \in \bar{\mathbb{Q}}$  y  $x \in \bar{\mathbb{I}}$ , sin embargo  $x \notin \overline{\mathbb{Q} \cap \mathbb{I}} = \bar{\emptyset} = \emptyset$

☠☠ Sean:

- $X$  el espacio de las funciones acotadas  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  definidas en el intervalo real  $I = [0, 1]$ ,
- $d$  la métrica definida en  $X^2$  por  $d(f, g) = \sup_{x \in I} |f(x) - g(x)|$ ,
- $f_0(x) = x^2, f_n(x) = \frac{x^2 \sin(2\pi nx)}{2\pi n}$  con  $n \in \mathbb{Z}^+, x \in I$  y
- $B(f_0, \frac{3}{2}) = \{f \in X : d(f, f_0) < \frac{3}{2}\}$  entonces  $f_n \in B(f_0, \frac{3}{2})$  para todo  $n \in \mathbb{Z}^+$ .

**Demostración.** Queremos ver que  $f_n \in B(f_0, \frac{3}{2})$  para todo  $n \in \mathbb{Z}^+$ , es decir que  $d(f_n, f_0) < \frac{3}{2}$  para todo  $n \in \mathbb{Z}^+$ , luego por la definición de la métrica:

$$\begin{aligned} d(f_n, f_0) &= \sup_{x \in I} \left| x^2 - \frac{x^2 \sin(2\pi n x)}{2\pi n} \right| \\ &= \sup_{x \in I} \left| x^2 \left( 1 - \frac{\sin(2\pi n x)}{2\pi n} \right) \right| \\ &\leq \sup_{x \in I} \left| 1 - \frac{\sin(2\pi n x)}{2\pi n} \right| && (x^2 \leq 1) \\ &\leq \left| 1 - \frac{1}{2\pi n} \right| && (-1 \leq \sin(\theta) \leq 1) \\ &\leq \frac{3}{2} \\ &= 1,5 \end{aligned}$$

Ya que  $0 < \frac{1}{2\pi n} < 1$  para todo  $n \in \mathbb{Z}^+$

□

**Nota.** cuando decimos métrica sobre  $X^2$  queremos decir que la métrica va del producto cartesiano  $X \times X$  en  $\mathbb{R}$ , no confundir con  $X^2 \times X^2$

**Nota.** Los siguientes ejercicios fueron propuestos en 2023-1 en el primer parcial de análisis:

Sean  $(X, d)$  es un espacio métrico y  $A$  es un subconjunto de  $X$ . En cada caso determine si la proposición es verdadera o falsa y demuéstrela o dé un contra-ejemplo según sea el caso.

☞  $X = \overline{A} \cup A^C$

**Demostración.** Sabemos que  $\overline{A} = X \setminus \text{int}(A^C)$ . En efecto  $X \setminus \text{int}(A^C) \cup A^C = X$  ya que  $\text{int}(A^C) \subseteq A^C$  □

☞  $\partial(\partial A) = \partial A$

**Falso:** Contraejemplo: Considere  $(\mathbb{R}, d_1)$ , sabemos que  $\partial\mathbb{Q} = \mathbb{R}$  y que  $\partial\mathbb{R} = \emptyset$ , luego  $\partial\mathbb{Q} = \mathbb{R} \neq \partial(\partial\mathbb{Q}) = \partial\mathbb{R} = \emptyset$

☞  $X = \text{int}(A) \cup \partial(A) \cup A^C$

**Demostración.** Tenemos que  $\partial A = \overline{A} \cap \overline{A^C}$ , luego

$$\begin{aligned}
\text{int}(A) \cup (\overline{A} \cap \overline{A^C}) \cup A^C &= \text{int}(A) \cup (\overline{A} \cup A^C \cap \overline{A^C} \cup A^C) \\
&= \text{int}(A) \cup (X \cap (X \setminus \text{int}(A) \cup A^C)) \\
&= \text{int}(A) \cup (X \setminus \text{int}(A)) \\
&= X
\end{aligned}$$

□

**Nota.** Aquí usamos varias de las propiedades de las notas en el capítulo del concepto de clausura, derivado y frontera, note que además usamos la propiedad anterior en la prueba cuando afirmamos que  $\overline{A} \cup A^C = X$ , note también que usamos que  $(A^C)^C = A$  pero pues ustedes ya vieron conjuntos allí.

☠  $\text{int}(\text{int}(A)) = \text{int}(A)$

**Demostración.** Tenemos que  $\text{int}(A)$  es abierto, luego como un conjunto es abierto si y solo si es igual a su interior entonces  $\text{int}(\text{int}(A)) = \text{int}(A)$  □

☠ Si  $\partial A$  es abierto entonces  $A = \emptyset$

**Falso:** Contraejemplo: Considere  $(\mathbb{R}, d_1)$ , luego  $\partial \mathbb{Q} = \mathbb{R}$  y  $\mathbb{R}$  es abierto pero  $\mathbb{Q} \neq \emptyset$ .

☠ Si  $X = \mathbb{R}^n$  y  $A$  es  $d_1$ -abierto entonces  $A$  es  $d_2$ -abierto.

**Demostración.** Suponga que  $A$  es  $d_1$ -abierto, entonces para todo  $x \in A$ , existe  $r$  tal que:

$$B_1(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n : d_1(x, y) < r\} \subseteq A$$

Y como  $d_2(x, y) \leq d_1(x, y)$ , entonces existe  $r'$   $B_2(x, r') \subseteq B_1(x, r) \subseteq A$ , luego  $A$  es  $d_2$ -abierto

□

**Nota.** Para este caso estamos usando la definición de métrica equivalente, note que si  $d_2(x, y) \leq d_1(x, y)$  entonces existe  $C \in \mathbb{R}$  tal que  $d_1(x, y) \leq C d_2(x, y)$ , luego eso es lo que nos garantiza la existencia de ese radio  $r'$  de tal manera que  $B_2(x, r') \subseteq B_1(x, r)$ .

**Nota.** Note que en las notas hace falta hacer énfasis en esta definición, sin embargo este tipo de detalles se suelen cubrir en clase, en cualquier caso el lector puede buscar en algún medio externo la definición de métrica equivalente y notar este detalle sutil.

☠ Si  $A \subseteq Y \subseteq X$  y  $A$  es  $Y$ -abierto entonces  $A$  es  $X$ -abierto.

**Falso:** Contraejemplo: Si  $E = \mathbb{R}$  con  $d(x, y) = |x - y|$  el conjunto  $[0, \frac{1}{3})$  no es abierto en  $\mathbb{R}$  pero es abierto en  $(E_1, d|_{E_1 \times E_1})$  con  $E_1 = [0, \frac{1}{2})$ . Simplemente observe que  $B_{E_1}(0, \frac{1}{3}) = [0, \frac{1}{3})$ .

☞ Si  $x \in X$  entonces para todo  $r > 0$  se tiene que  $\overline{B(x, r)} = B[x, r]$ .

**Falso:** Contraejemplo: Sea  $(\mathbb{R}, d_d)$ , entonces  $\overline{B(0, 1)} = \overline{\{0\}} = 0$  ya que  $\{0\}$  es cerrado con la métrica discreta, pero  $B[0, 1] = \mathbb{R}$ , luego no son iguales.

**Nota.** Sobre este parcial como se puede notar los ejercicios no son tan complejos si se nos permite usar las propiedades de las notas (que se ven también en clase), pero es probable que para ser usadas en el parcial el estudiante deba demostrarlas, en cuyo caso recomendamos entender muy bien las ideas de cada una de las pruebas, la idea nunca es memorizar las pruebas o las propiedades sino entender un poco la geometría del asunto y las ideas principales de cada prueba.

## 1.5. El conjunto de Cantor ☠☠☠☠☠

**Nota.** En esta sección solo trataremos el problema de probar que el conjunto de Cantor es perfecto, es decir que todo elemento del conjunto pertenece a su derivado. Quizás luego pongamos un diagrama de la prueba de que no es contable, un resultado más fuerte que quizás se podría sugerir es revisar la prueba de que todo conjunto perfecto no puede ser contable.

☞ El conjunto de Cantor es perfecto:

**Demostración.** Para demostrar que el conjunto de Cantor  $C$  es perfecto, para cada  $x \in C$  y para cada  $\epsilon > 0$  se debe encontrar un punto  $y \in C - \{x\}$  tal que  $|x - y| < \epsilon$ .

Para buscar  $y$ , recordemos que  $C$  se construye como la intersección de conjuntos  $C_0 \supset C_1 \supset C_2 \supset C_3 \supset \dots$  donde  $C_n$  es una unión de  $2^n$  intervalos disjuntos cada uno de longitud  $3^{-n}$ , y recordemos también que  $C$  tiene intersección no vacía con cada uno de esos  $2^n$  intervalos.

Elija  $n$  tal que  $3^{-n} < \epsilon$ . Sea  $[a, b]$  el intervalo de  $C_n$  que contiene a  $x$ . Cuando se quita el tercio medio de  $[a, b]$ , se obtienen dos intervalos  $[a, b']$ ,  $[b'', b]$  de  $C_{n+1}$ . El punto  $x$  está contenido en uno de esos dos intervalos, y hay un punto  $y \in C$  que está contenido en el otro de esos dos intervalos. Por lo tanto,  $y \neq x$  y  $|x - y| < \epsilon$ .  $\square$

**Nota.** Enlace para ver la prueba de que todo conjunto perfecto no es contable:

[Enlace.](#)

☞ El conjunto de Cantor es no contable

## 1.6. Sucesiones ☠☠☠☠☠

Este capítulo es cosa densa, mucho cuidado.

### 1.6.1. Algunos ejercicios al lector:

En esta sección también hay algunos ejercicios que el libro dice que son triviales, pero lo que es trivial hay que demostrarlo.

- ✎ Es fácil demostrar que  $n_k \geq k$  (Inducción)

**Demostración.** Supongamos que la secuencia comienza en  $k = 1$ . Entonces, lo más pequeño que puede ser  $n_1$  es 1. Por lo tanto,  $n_k \geq k$  es verdadero para  $k = 1$ . Ahora, asumimos por inducción que  $n_k \geq k$  para algún  $k$ . Dado que lo más pequeño que puede ser  $n_{k+1}$  es  $n_k + 1$ , obtenemos

$$n_{k+1} \geq n_k + 1 \geq k + 1.$$

□

(Para esta prueba es clave saber que tanto  $k$  como  $n_k$  son naturales.)

**Nota.** Note que una subsección podría verse como un subconjunto de una sucesión ya que los puntos  $\{x_{n_1}, x_{n_2}, \dots\} \subseteq \{x_1, x_2, \dots\}$ . Esto es lo que nos permite ver que toda subsucesión de una sucesión acotada es acotada.

**Nota.** En el teorema 10 lo que nos quieren decir es que  $S \subseteq E$  es cerrado si y solo si cualquier sucesión convergente en el espacio que es definida en  $S$  converge en  $S$ , o sea su límite pertenece a  $S$ , algo de esperar.

**Nota.** Note que en la proposición 21 lo que nos están diciendo es que  $a$  es un punto de acumulación (hay infinitos puntos ahí muy cerca de  $a$  para cualquier  $\epsilon$ )

- ✎ En la proposición 22 se hace la prueba para sucesiones crecientes pero no decrecientes, veamos ese caso:

**Demostración.** Sea  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión decreciente y acotada en  $(\mathbb{R}, d_1)$ , como  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es acotada entonces es acotada inferiormente y por lo tanto existe  $I = \inf\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ . Veamos que  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = I$ . Dado  $\epsilon > 0$  por la propiedad de aproximación existe  $N \in \mathbb{N}$ , tal que  $I + \epsilon > a_N$  y como  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es decreciente

$$I + \epsilon > a_N \geq a_n \quad \text{si } n \geq N$$

Por otro lado  $I + \epsilon > a_n > I - \epsilon$  (ya que  $I = \inf\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ ), Así  $|a_n - I| < \epsilon$  para todo  $n \geq N$ , luego  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = I$  □

- ✎ Ejercicio proposición 23

**Teorema 2.** Proposición 23:

Sean  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  y  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sucesiones en  $(\mathbb{R}, d_1)$ , si  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  y  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  son convergentes, entonces:

- $(a_n \pm b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es convergente y  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$

**Lema 1.** Si  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es una sucesión convergente (que converge a  $b$ ), entonces  $(-b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es convergente y converge a  $-b$ .

**Demostración.** Tenemos que  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es convergente y converge a  $b$ , es decir para todo  $\epsilon > 0$  existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que si  $n > N$   $|b_n - b| < \epsilon$ , luego:

$$|-b_n + b| = |-1(b_n - b)| = |-1||b_n - b| = |b_n - b| < \epsilon$$

Luego  $(-b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es convergente y converge a  $-b$  □

Con este lema podemos hacer la prueba del teorema solo para  $((a_n)_{n \in \mathbb{N}} + (b_n)_{n \in \mathbb{N}})_{n \in \mathbb{N}}$  ya que el caso de la resta es corolario de esto, note que basta considerar la sucesión  $(-b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  y usar el resultado para la suma.//

**Demostración.** Tenemos que  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  y  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  son convergentes, es decir para todo  $\epsilon > 0$  existen  $N_1 \in \mathbb{N}$  y  $N_2 \in \mathbb{N}$  tales que si  $n > N_1$   $|a_n - a| < \frac{\epsilon}{2}$  y si  $n > N_2$ ,  $|b_n - b| < \frac{\epsilon}{2}$ , luego si  $n > \max\{N_1, N_2\}$ , entonces.

$$|a_n + b_n - a - b| \leq |a_n - a| + |b_n - b| = \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

□

**Nota.** En estas pruebas siempre al escribirlas debemos saber las cotas que vamos a usar, pero esto no significa que siempre debamos ver a ojo que cota usar, usando la definición nos hubiéramos dado cuenta que la suma de las cotas nos iba a dar  $2\epsilon$ , por eso escogemos  $\frac{\epsilon}{2}$ , porque queremos que la suma sea menor que  $\epsilon$ , en análisis esto se hace para que las demostraciones tengan un mejor estilo, escritura y forma, se supone que con práctica el estudiante debería ser capaz de ver algunas de estas cotas sin mucho esfuerzo, pero si esto no se te da bien no te preocupes, a mí tampoco.

sympy Integrate(tan(x),x) sympy