

Table 1. Baseline Characteristics of Participants in Study

Characteristic	GFR≥60 (N=236)	GFR<60 (N=130)
GFR at Baseline—mL/min/1.73m²	81.1 ± 14.3	42.5 ± 14.5
suPAR—pg/mL	3138.5 ± 1265.8	4535.3 ± 1856.7
C-Reactive Protein (CRP)—mg/dL	5.0 ± 7.2	6.3 ± 11.5
Creatinine—mg/dL	1.0 ± 0.2	2.1 ± 2.4
Age—yrs	60.7 ± 12.3	67.6 ± 11.2
Sex—no. (%)		
Male	159 (67.4)	73 (56.2)
Female	77 (32.6)	57 (43.8)
Race—no. (%)		
Black	52 (22.0)	22 (16.9)
Non-Black	184 (78.0)	108 (83.1)
Body Mass Index (BMI)—kg/m²	29.7 ± 6.2	29.4 ± 7.2
History of Myocardial Infarction—no. (%)		
Yes	59 (25.0)	34 (26.2)
No	173 (73.3)	92 (70.8)
Missing Information (N/A)	4 (1.7)	4 (3.1)
Diagnosis of Diabetes—no. (%)		
Yes	86 (36.4)	47 (36.2)
No	146 (61.9)	81 (62.3)
Missing Information (N/A)	4(1.7)	2 (1.5)
Hypertension—no. (%)		
Yes	166 (70.3)	99 (76.2)
No	66 (28.0)	28 (21.5)
Missing Information (N/A)	4(1.7)	3 (2.3)
Dyslipidemia—no. (%)		
Yes	154 (65.3)	89 (68.5)
No	78 (33.1)	37 (28.5)
Missing Information (N/A)	4(1.7)	4 (3.1)
Proteinuria—no. (%)		
Yes	9 (3.8)	13 (10)
No	227 (96.2)	117 (90)
History of Smoking—no. (%)		
Yes	129 (54.7)	70 (53.8)
No	99 (41.9)	58 (44.6)
Missing Information (N/A)	8(3.4)	2 (1.5)

Coronary Artery Disease (CAD)—no. (%)		
Yes	151 (64.0)	75 (57.7)
No	76 (32.2)	48 (36.9)
Missing Information (N/A)	9(3.8)	7 (5.4)
Use of ACE Inhibitors/Angiotensin II Receptor Blockers—no. (%)		
Yes	159 (67.4)	94 (72.3)
No	75 (31.8)	35 (26.9)
Missing Information (N/A)	2 (0.8)	1 (0.8)