Kolonneforklaring

Kolonne	Hvad den viser	Hvordan den skal læses
Tema	Det teologiske tema, som prædikenen er kodet for (fx *Frygt*, *Kærlighed*, *Nationen*).	Hver række viser ét tema, så man kan se, hvordan det optræder i krise- og ikke-krisepædikener.
Krise nævnt	Antal prædikener, hvor temaet forekommer og hvor prædikenen eksplicit omtaler krisen.	Jo højere tallet er, desto mere fremtrædende er temaet i krisepædikener.
% af total	Andel af alle krisepækener, der indeholder temaet.	Giver et hurtigt overblik over udbredelsen i krisepædikener.
Krise udeladt	Antal prædikener, hvor temaet forekommer, men krisen ikke nævnes.	Bruges som kontrolgruppe til at se, om temaet især aktiveres i krisepædikener.
% af total	Andel af alle ikke-krisepækener, der indeholder temaet.	Sammenlignes med den foregående kolonne for at vurdere forskel.
Difference (RD)	*Risk difference*: forskellen mellem de to procenter.	Viser hvor mange procentpoint mere (eller mindre) temaet forekommer i krisepædikener. ±8–15 pp = moderat forskel, ≥15 pp = markant forskel.
Difference (RR)	*Risk ratio*: forholdet mellem de to procenter.	Et RR på 2,0 betyder, at temaet er dobbelt så hyppigt i krisepædikener.
P-værdi (Fisher/Chi^2)	Resultatet af en statistisk test (chi^2 eller Fishers eksakte test).	Lav p (< 0,05) = mindre end 5 % chance for at forskellen er et resultat af normal variation. Dvs. forandringen er statistisk signifikant.
Fortolkning	En samlet, letforståelig vurdering.	STÆRK EVIDENS = sikker forskel; EVIDENS = formentlig forskel; MULIGT MØNSTER = tendens; INGEN FORSKEL = ingen tydelig effekt.

Derudover findes en række skjulte hjælperkolonner, som bruges til mellemregninger og kan vises i Excel, hvis man vil følge de statistiske beregninger trin for trin.

Kort om den statistiske analyse

1. Hvad betyder en p-værdi?
En p-værdi svarer på spørgsmålet:

Hvis der slet ingen forskel var mellem krise- og ikke-kriseprædikener, hvor sandsynligt er det så at observere en forskel mindst så stor som den, vi ser her?

Lille p-værdi (< 0,05): Forskellen er usandsynlig som tilfældighed (under 5 % sandsynlighed for at forskellen er tilfældig) → vi kalder den statistisk signifikant.

Stor p-værdi (> 0,05): Forskellen kan skyldes tilfældigheder. Det betyder ikke, at der ingen forskel er, men at den ikke kan statistisk verificeres.

2. Hvorfor er mange p-værdier > 0,05?
Med ca. 80–100 prædikener pr. periode skal der meget store forskelle til (typisk ≥ 15–20 procentpoint), for reelt at kunne måle den statistisk styrke. Mindre forskelle på 5–10 pp kan være reelle tendenser, også selvom de ofte giver en 'for høj' p-værdi. Derfor bør store p-værdier ikke automatisk læses som bevis for at der ingen forskel er, men som usikre/mulige *resultater*. For at få et mere robust billede, må p-værdien tolkes i lyset af effektstørelsen/Riskdifferencen (Difference RD-kollonnen)

3. Kombination af p-værdi og effektstørrelse
I "Fortolkning"-kollonnen laves en sådan samlet vurdering af effektstørelsen og p-værdi tænkt sammen, for at få en mere nuanceret vurdering. Dette gøres efter nedenstående præmisser:

Kategori	**Risikoforskel (Difference RD)**	**p-værdi**	**Fortolkning**
STÆRK EVIDENS	Stor (≥ ±15 pp)	p < 0,05	Sikker forskel
EVIDENS	Stor (≥ ±15 pp)	0,05 ≤ p < 0,10	Sandsynlig forskel
MULIGT MØNSTER	Mellem (8–15 pp) eller stor (≥ ±15 pp)	p ≥ 0,10	Tendens, ikke sikker
INGEN FORSKEL	Lille (< 8 pp)	Alle p-værdier	Ingen tydelig forskel

Denne kombination hjælper os til både at vurdere, hvor stor forskellen er, og hvor sikker vi kan være på, at den er reel.

Beslutningen om at betragte ca. <8 pp som lille, er begrundet med størrelsen på vores datasæt. Med ca. 89-103 prædikener pr. periode, svarer hver prædiken til ca. 1-1,1 %. En forskel på fx 5 pp svarer altså kun til omkring 4–5 prædikener. Det er en meget lille absolut ændring, og det kan let ske ved tilfældigheder – især når grupperne med krise/ikke-krise er så små som de er. Ved at sætte grænsen ved ±8 procentpoint (≈ 7 prædikener i forskel) filtrerer vi mange af disse små "støjende" udsving fra og fokuserer på forskelle, der mindre sandsynligt skyldes tilfældigheder. Der er naturligvis ingen fast skillelinje her, men generelt ville man ofte først tale om en "meningsfuld effekt" hvis det ændrer ca. 10 % i et datasæt.

Når vi ser på vores data, kan vi også se at mange rækker med ±5–7 procentpoints forskel har meget høje p-værdier (0,5–0,9), hvilket betyder, at de statistisk set ikke kan skelnes fra tilfældig støj. Ved at bruge ±8 procentpoint fremhæver vi oftere forskelle, der også har p-værdier, der ligger lavere (stærkere bevis for, at de er reelle).

4. Valg af test

Selve den statistiske analyse er gjort med to forskellige formler; Chi^2-test og Fisher's eksakte test.

For hvert tema sammenlignes hyppigheden i krise- og ikke-krisepræken med en 2×2-kontingenstabel (de skjulte hjælper-kolonner). Hvis alle forventede celler ≥ 5, anvendes Chi^2-test. Hvis en eller flere celler < 5, anvendes Fisher's eksakte test, der beregner den præcise sandsynlighed for at observere lige så skæve data under nulhypotesen (i.e. at temaet forekommer lige ofte i krisepræken og ikke-krisepræken

Chi^2-test: bruges når de forventede tal er ≥ 5 i alle celler.

Formel: $\chi 2 = \sum \frac{(O-E)^2}{E}$

O = de observerede tal (se hjælper-kolonner)

E = det forventede tal under nulhypotesen (se hjælper-kolonner): $E = \frac{Rækkesum\ x\ Kolonnesum}{n}$

N = total

Man sammenligner Chi^2-værdien med en Chi^2-fordeling med 1 frihedsgrad for at få p-værdien (se skjulte kolonner).

Fisher's eksakte test: bruges når tal er meget små (< 5), fordi den giver et mere præcist resultat.

Fisher er ikke en formel i samme forstand, men en beregning af den præcise sandsynlighed for at få netop den 2×2-tabel (eller en endnu mere ekstrem), givet de samme rækkesummer og kolonnesummer.

Fisher-testen summerer derefter sandsynlighederne for alle tabeller, der er lige så ekstreme eller mere ekstreme end den observerede, for at give en p-værdi.