تمرین ۶ آدرس معماری - مهدی نیک‌نژاد - ۹۶۳۰۰۳۹

۱- * محدوده نمایش اعداد مکمل ۲ ← $-2^{n-1} \le N \le +(2^{n-1}-1)$ ← عدد n بیتی ← n=۴ ← $-8 \le N \le +7$

N عدد n بیتی است

الف) $6 = (0110)_2$

ب) $14 \notin N$ مجموعه ی ← ۱۴ در این محدوده نمایش داده نمی‌شود ← $-16 \le N \le +14$

برای نمایش آن باید حداقل n=۵ (۵ بیتی) باشد.

ج) $-10 \notin N$ مجموعه ی ← ۱۰- هم در این محدوده نمایش داده نمی‌شود برای نمایش آن باید حداقل n=۵ باشد.

د) $-4 = ?$

$+4 = 0100$ → مکمل ۲ → $1011 + 1 = 1100$ → $-4 = 1100$

۲- باید عدد ۱۱۰۰ را (که در نمایش مکمل ۲ است) با استفاده از Sign Extension (گسترش علامت) به این شکل کنیم: ۱۱۱۱۰۰

$$00110 + 111100 = 1001000$$

جواب: ۱۰۰۱۰۰۰

۳- الف) اعداد بی علامت:

$$2^{15} + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = (2^{15} + 2^5 - 1)$$

$2^5 - 1$

نکته: $2^0 + 2^1 + 2^2 + \cdots + 2^n = 2^{n+1} - 1$

اگر 1 به این اضافه کنیم OVF خواهیم داشت.

ب) اعداد علامت دار:

$$2^5 - 1 = 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0$$

۴- الف) Add & Shift:

$10 = (1010)_2 = B$

$14 = (1110)_2 = Q$

E	A	Q

1010×1110

E	A	Q
0	1010	1100

Scanned with CamScanner

		E	A	Q
		0	0000	1111
۱) $q_0=0 \rightarrow$ shr EAQ	→	0	0000	0111
۲) $q_0=1 \rightarrow$ EA ← A+B	→	0	1010	0111
۲) $q_0=1 \rightarrow$ shr EAQ	→	0	0101	0011
۳) $q_0=1 \rightarrow$ EA ← A+B	→	0	1111	0011
۳) $q_0=1 \rightarrow$ shr EAQ	→	0	0111	1001
۴) $q_0=1 \rightarrow$ EA ← A+B	→	1	0001	1001
۴) $q_0=1 \rightarrow$ shr EAQ	→	0	1000	1100

$$\begin{array}{r} 0101 \\ +\ 1010 \\ \hline 1111 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \overset{1}{0}\overset{1}{1}11 \\ +\ 1010 \\ \hline 10001 \end{array}$$

ب) روش booth : جلوی ضرب کننده یه صفر بی ارزش قرار می دهیم :

اگر الگوی مقابل را بینیم داریم :

00 ← کاری نمی کنیم
01 ← جمع
10 ← تفریق
11 ← کاری نمی کنیم

$B = 1110$
$Q = 1010$
$-B = \bar{B}+1 = 0001 + 0010$

$$\begin{array}{r} 1110 \\ \times\ 1010 \\ \hline 0000 \\ -1110 \\ +1110 \\ -1110 \\ \hline 10000100 \end{array}$$

		A	Q	q_{-1}
		0000	1010	✗
۱) $\overline{q_0 q_{-1}} = 00 \rightarrow$ ashr A Q q_{-1} (arethmatic shift right)	→	0000	0101	0
۲) $\overline{q_0 q_{-1}} = 10 \rightarrow$ A ← A+B̄+1	→	0010	0101	✗
۲) $\overline{q_0 q_{-1}} = 10 \rightarrow$ ashr A Q q_{-1}	→	0001	0010	1
۳) $\overline{q_0 q_{-1}} = 01 \rightarrow$ A ← A+B	→	1111	0010	✗
۳) $\overline{q_0 q_{-1}} = 01 \rightarrow$ ashr A Q q_{-1}	→	1111	1001	0
۴) $\overline{q_0 q_{-1}} = 10 \rightarrow$ A ← A+B̄+1	→	0001	1001	✗
۴) $\overline{q_0 q_{-1}} = 10 \rightarrow$ ashr A Q q_{-1}	→	0000	1100	1

$$\begin{array}{r} 0001 \\ +\ 1110 \\ \hline 1111 \end{array} \qquad \begin{array}{r} \overset{1}{1}\overset{1}{1}11 \\ +\ 0010 \\ \hline 10001 \end{array}$$

← E هم نیت دارین الوریم!

حاصل : 00001100

مثال مد انتظار داشتیم!

Scanned with CamScanner

$۲۷ = ۱۶ + ۸ + ۲ + ۱ \rightarrow$ $۲۷ =$ A: 0001 | Q: 1011

$۵ = ۴ + ۱ \longrightarrow$ $۵ =$ B: 0101 $\rightarrow -B = \bar{B}+1 = -1010 + 1 = 1011$

$A < B \rightarrow$ پس سرریز رخ نمی‌دهد

الف) restoring:

$$\begin{array}{r|l} ۲۷ & ۵ \\ -۲۵ & \\ \hline ۲ & \end{array}$$

A : Q | B → Q / A

		E	A	Q
۰)		~~۰~~	۰۰۰۱	۱۰۱۱
۱)	ShL EAQ →	۰	۰۰۱۱	۰۱۱۰
	E=۰ → →	۰	۱۱۱۰	۰۱۱۰
	EA ← A+B̄+1			
	E=۰ → →	*	۰۰۱۱	۰۱۱۰
	A ← A+B			
۲)	ShL EAQ →	۰	۰۱۱۰	۱۱۰۰
	E=۰ → →	۱	۰۰۰۱	۱۱۰۰
	EA ← A+B̄+1			
	E=۱ → →	*	۰۰۰۱	۱۱۰۱
	$q_0 \leftarrow 1$			
۳)	ShL EAQ →	۰	۰۰۱۱	۱۰۱۰
	E=۰ → →	۰	۱۱۱۰	۱۰۱۰
	EA ← A+B̄+1			
	E=۰ → →	*	۰۰۱۱	۱۰۱۰
	A ← A+B			
۴)	ShL EAQ →	۰	۰۱۱۱	۰۱۰۰
	E=۰ → →	۱	۰۰۱۰	۰۱۰۰
	EA ← A+B̄+1			
	E=۱ → →	۱	۰۰۱۰	۰۱۰۱
	$q_0 \leftarrow 1$			

A باقیمانده — Q خارج‌قسمت

Scanned with CamScanner

A, Q, M

$۲۷ = ۱۶ + ۸ + ۲ + ۱ \rightarrow$ A = 0001, Q = 1011

$۵ = ۴ + ۱ \rightarrow$ ۵ = 0101

M → $-M = \bar{M} + 1 = 1010 + 1 = 1011$

	E	A	Q	
	0	0001	1011	sc = ۴
۱) ShL AQ → 0		0011	011-	
EA ← A−M → 0		1110	011-	
$q_0 \leftarrow E$ → 0		1110	0110	
E = 0				
ShL AQ → 0		1100	1100	
EA ← A+M → 1		0001	1100	
۲) $q_0 \leftarrow E$ → 1		0001	1100	sc = ۳
E = 1				
ShL AQ → 1		0011	101-	
EA ← A−M → 0		1110	101-	
۳) $q_0 \leftarrow E$ → 0		1110	1010	sc = ۲
E = 0				
ShL AQ → 1		0010	010-	
EA ← A+M				
ادامه ۳ $q_0 \leftarrow E$ → 1		0010	0101	sc = ۱
E = 1		0010	0101	
		باقیمانده	خارج قسمت	

ب) الگوریتم non-restoring

sc ← n − 1

ShL AQ

EA ← A − M

$q_0 \leftarrow E$

E = 1 → A > M → ShL AQ

E = 0 → A < M → ShL AQ

EA ← A − M

EA ← A + M

sc ← sc − 1 (sc ≠ 0)

sc = 0

$q_0 \leftarrow E$

E = 1 → A ← A + M

Q: خارج قسمت

A: باقیمانده

۲۷ | ۵

۲۵

۲

Scanned with CamScanner