PANDUAN PERCUMA · 10 MINIT



LAPAR BETUL ATAU RUTIN?

Panduan 10 minit untuk malam ni.

> **Untuk:** Orang yang selalu cari snack lepas anak dah tidur, walaupun baru je makan malam.

Oleh Coach Nas
Ahli Farmasi Klinikal & Wellness Coach
@coachnas.pharmacist

SEBELUM MULA

Sebelum salahkan diri, pause dulu.

Kadang-kadang kita bukan lemah.

- Kadang-kadang badan memang lapar.
- Kadang-kadang makan malam tadi tak cukup.
- Kadang-kadang kita penat.
- Kadang-kadang tangan cari snack sebab itu dah jadi rutin malam.

Panduan ni bukan untuk paksa awak tahan lapar. Panduan ni bantu awak faham:

"Aku lapar betul, atau ni cuma rutin?"

Buat malam ni. Ambil 10 minit je 👍

1

LANGKAH 1

Pause 60 saat

Sebelum buka peti ais atau capai snack, berhenti sekejap. Tanya diri:

"Apa sebenarnya yang aku rasa sekarang?"

Pilih satu:

Lapar | Penat | Bosan | Stress | Mengantuk | Terbiasa nak mengunyah | Rasa nak reward diri

Ingat: Jangan judge diri. Cuma perasan dulu.

2

LANGKAH 2

Check makan malam tadi

Tanya: **"Makan malam tadi cukup ke?"** Check 3 benda ni:

1. **Ada protein tak?** Contoh: ayam, ikan, telur, daging, tauhu, tempe.
2. **Ada sayur atau fiber tak?** Contoh: sayur, sup, ulam, buah.
3. **Portion terlalu kecil ke?** Kadang-kadang kita tahan makan sangat waktu dinner, lepas tu malam jadi lapar kuat.

Kalau dinner tadi memang tak cukup, mungkin awak memang lapar betul. Itu bukan salah awak.

3

LANGKAH 3

Minum air dulu

Minum segelas air. Lepas tu tunggu 5 minit.

Bukan sebab air boleh "hilangkan lapar". Tapi sebab kita nak bagi badan sikit ruang untuk bagi signal yang lebih jelas.

Lepas 5 minit, tanya balik:

"Aku masih lapar, atau craving tu dah turun?"

4

LANGKAH 4

Guna skala lapar

Bagi nombor dari 1 sampai 10. **1** = langsung tak lapar, **10** = sangat lapar.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1–3
Kemungkinan besar rutin, bosan, penat atau craving. Pergi Langkah 6.

4–6
Tunggu sekejap dan pilih tindakan kecil dulu.

7–10
Makan sesuatu yang simple dan mengenyangkan. Pergi Langkah 5.

5

LANGKAH 5

Kalau lapar betul, pilih snack yang bantu

Kalau memang lapar, jangan paksa tahan sampai sakit hati 😅 Pilih snack yang lebih mengenyangkan. Contoh:

- Telur rebus
- Greek yogurt
- Susu rendah gula
- Buah
- Tuna
- Ayam / ikan leftover
- Sup
- Air kosong + buah
- Protein yang mudah

Tujuan dia bukan perfect.

Tujuan dia: makan cukup, bukan makan sampai terbabas.

6

LANGKAH 6

Kalau bukan lapar, tukar rutin malam

Kalau awak sedar ni bukan lapar, buat satu benda lain selama 10 minit. Pilih satu:

- Gosok gigi
- Mandi air suam
- Minum air kosong
- Stretching ringan
- Tutup lampu dapur
- Duduk jauh dari makanan
- Tidur 15 minit awal
- Breathing 1 minit
- Siapkan baju kerja esok

Atau tulis satu ayat: **"Malam ni aku tak perlu makan sebab rutin."**

Jangan lawan craving dengan kosong. Ganti dengan rutin lain.

FORMULA MALAM NI

Setiap kali rasa nak snack malam:

Pause → **Check dinner** → **Minum air** → **Rate lapar** → **Pilih tindakan**

Kalau lapar betul:
makan snack yang bantu.

Kalau bukan lapar:
tukar rutin malam.

PRINT ATAU SCREENSHOT

Checklist 10 minit

Tick ikut turutan:

- [ ] Saya pause 60 saat
- [ ] Saya tanya apa yang saya rasa
- [ ] Saya check makan malam tadi cukup atau tidak
- [ ] Saya minum air
- [ ] Saya tunggu 5 minit
- [ ] Saya bagi skor lapar 1–10: _____
- [ ] Saya pilih tindakan yang sesuai

MALAM NI, BUAT NI JE

Jangan cuba ubah semua benda. Malam ni cuma buat satu benda:

Pause sebelum snack.

Itu win pertama. Sebab bila awak mula pause, awak mula dapat balik control.

LEPAS NI APA?

Bila awak perlukan plan yang sesuai dengan rutin awak

Panduan ni bantu awak faham sama ada awak lapar betul, atau cuma terperangkap dalam rutin malam.

Tapi panduan ni tak tahu keadaan sebenar awak.

Dia tak tahu waktu kerja awak, waktu dinner, tidur, stress, makanan yang ada kat rumah, atau kenapa craving malam tu selalu datang.

Kalau nak saya bantu tengok rutin awak, DM saya:

MALAM

di Instagram **@coachnas.pharmacist**

Kita tengok dulu rutin malam awak, lepas tu saya bantu susun langkah paling sesuai untuk kurangkan snacking malam, tanpa diet extreme 😊

Coach Nas
Ahli Farmasi Klinikal & Wellness Coach | WeDo Transformations
@coachnas.pharmacist

Panduan ni kongsi tips habit secara umum, bukan nasihat perubatan. Kalau awak ada diabetes atau ambil ubat yang boleh turunkan gula dalam darah (contohnya insulin), rasa lapar, menggeletar atau berpeluh waktu malam mungkin tanda gula rendah. Jangan tunggu atau tahan, dan bincang dengan doktor atau ahli farmasi awak.