

关于锁具装箱的数学模型

黄宗虎 李 波 李春福

(电子科技大学 610054)

指导教师 徐全智

编者按 本文首先利用组合计数的方法求得一批锁具的总数并按槽高和的奇偶性分类装箱,说明团体顾客一次购买量不超过 49 箱时一定不会出现互开现象.作者试图利用图论的 König 定理证明方案的最优性,但在证明过程中,从奇类锁与偶类锁具的对称性并不能得到图论中所含饱和 V_1 中每个顶点的匹配结论.最后,引进平均互开对数概念,用概率论方法简洁地得到随机装箱时顾客的抱怨程度的量化结果.

整篇文章建模假设合理,综合运用多种学科工具,较圆满完成题目的要求,并有一定的创见.叙述简洁清楚,结构严谨是一篇较优秀的参赛论文.

摘 要 本文建立了一个关于如何对一批弹子锁具进行装箱和标志的模型.

本文首先用组合数学的方法求得了一批锁具的总数为 5880 件,接着分析了能够互开的锁具之间的特性,从而得到以下装箱方案:根据钥匙槽高度之和的不同奇偶性将锁具分类装箱.按照这个方案,当购买量不超过 49 箱时,就可以保证一定不会出现互开的情形.文中用图论知识证明了这个方案是最优的.本文从概率论的角度,引进平均互开对数 $E(m_k)$,衡量了按原方案装箱时顾客的抱怨程度.并将本文的方案与原方案进行比较,得出新方案明显减少了顾客抱怨程度的结论.

一、问题的重述与分析

某锁厂生产一种弹子锁具,每个锁具的钥匙有 5 个槽,令 $h_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$ 为钥匙第 i 个槽的高度,则一批锁具应满足如下三个条件.

条件 1 对任意一种槽高排列 $h_1 h_2 h_3 h_4 h_5$ 有

$$h_i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} (i = 1, 2, 3, 4, 5)$$

条件 2 对任意一种槽高排列 $h_1 h_2 h_3 h_4 h_5$,至少有三个槽高互不相同.

条件 3 对任意一种槽高排列 $h_1 h_2 h_3 h_4 h_5$,有

$$|h_i - h_{i-1}| \neq 5 (i = 2, 3, 4, 5).$$

而同时满足下面两个条件的两个锁具可以互开,并把这两个锁具称为一个互开对:

* 1. 两个锁的钥匙有四个槽高度相同;

* 2. 其余一个槽高度相差 1.

锁厂销售部门原先在一批锁具中随机地取 60 个装为一箱出售,这样一来,成箱购买锁具的顾客总抱怨购得的锁具有互开现象.

我们所关心的是:每一批锁具共有多少个,如何衡量随机装箱造成的团体顾客的抱怨程度以及采取何种方案装箱来尽量避免团体顾客的抱怨.

由一批锁具中,互开对总数是确定的,但在随机装箱之后,对于每一箱而言,锁具互开现象就不可避免地有了随机性,因而可以用统计平均值定量地衡量随机装箱造成的团体顾

客的抱怨程度.

为了能够提出一种方案来装箱和标志,以尽量避免团体顾客的抱怨,就需要找出能够互开的锁具之间的特性,从而使能够互开的锁具分开装箱和标记.

文中用到的符号及其说明

符号	说明	符号	说明
$h_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$	锁具钥匙的第 i 个槽的高度	$\alpha_0(G)$	图 G 的最小覆盖中的顶点个数
H	$H = \sum_{i=1}^5 h_i$	$\beta_1(G)$	图 G 的最大匹配中的边数
D	满足条件 1 但不满足条件 2 或条件 3 的钥匙槽高度的排列方式的集合,称为除去集	$\beta_0(G)$	图 G 的最大独立顶点集中的顶点个数
$D_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$	D 的一个完全划分	$N_G(V_0)$	图 G 中 V_0 的邻集
E	一批锁具中平均每把锁具与其它锁具所能组成的互开对数	M	图的最大匹配
E_K	K 箱锁具中平均每把锁具与其它锁具所能组成的互开对数	$ V $	集合 V 的元素个数
m	总互开对数	sd	互开对数
$E(m_k)$	K 箱锁具中平均含有的互开对数		
S	某锁具		
V	锁具集合 / 顶点集合		
X	互开锁具对的关系构成的边的集合		
$G(V, X)$	由 V 和 X 组成的图		
$P(G)$	图 G 的顶点个数		

二、模型假设

1. 锁具厂在生产锁具过程中能够准确地知道钥匙的每个槽的高度.
2. 对于同一批中两个锁具,若二者相对应的 5 个槽的高度中有 4 个相同,且另一个槽的高度差为 1,则一定能互开.

三、模型的建立及求解

1. 确定一批锁具的总数

我们根据生产一批锁具的三个条件,用排列组合的知识对一批锁具的总数目进行求解,其主要过程如下:

- (1) 根据条件 1, 钥匙槽高度的可能排列有 $6^5 = 7776$ 种
- (2) 受条件 2 和条件 3 的约束, 实际制锁时还要除去一部分钥匙槽高度的排列方式, 我们称这些排列方式形成的集合为除去集 D .
- (3) 条件 3 可等价于钥匙槽高度排列方式中不能出现 1 和 6 相邻的情况.
- (4) 对除去集 D 可进行如下划分:

令 $D_1 = \{h_i | h_1 = h_2 = h_3 = h_4 = h_5 \text{ 的排列}\}$;

$D_2 = \{h_i (i = 1, 2, 3, 4, 5) \text{ 中只有两个不同数的排列}\}$;

$D_3 = \{h_i (i = 1, 2, 3, 4, 5) \text{ 中有三个不同数且 1 和 6 相邻的排列}\}$;

$D_4 = \{h_i (i = 1, 2, 3, 4, 5) \text{ 中有四个不同数且 1 和 6 相邻的排列}\}$;

$D_5 = \{h_i (i = 1, 2, 3, 4, 5) \text{ 各不相同且 1 和 6 相邻的排列}\}$;

显然, $D_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$ 是 D 的一个完全划分, 即 $D_1 \cup D_2 \cup D_3 \cup D_4 \cup D_5 = D$ 且 $D_i \cap D_j = \emptyset (i, j = 1, 2, 3, 4, 5 \text{ 且 } i \neq j)$ 我们分别求出了 $D_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$ 中的元素个数(详细计算见附录 1) 如下: $|D_1| = 6$; $|D_2| = 450$; $|D_3| = 456$; $|D_4| = 792$; $|D_5| = 192$ ($|D|$ 表示集合 D 中元素的个数)

综上, 一批锁具的总数为

$$7776 - (6 + 456 + 792 + 192) = 5880 \text{ 件}$$

可装的箱数为

$$\frac{5880}{60} = 98 \text{ 箱}$$

2. 装箱方案

(1) 对锁具进行分类

当两个锁具相对应的 5 个槽的高度中有 4 个相同, 另一个槽的高度差为 1 时, 它们可以互开. 我们惊奇地发现了下面的规律:

定理 在一批锁具中, 能够互开的两锁具的槽高排列 $h_1 h_2 h_3 h_4 h_5$ 和 $h'_1 h'_2 h'_3 h'_4 h'_5$,

其各槽高度之和 $H = \sum_{i=1}^5 h_i$ 和 $H' = \sum_{i=1}^5 h'_i$ 必然具有不同的奇偶性.

因为互开的两个锁具有四个槽高度相同, 仅有一个槽高度差 1, 那么高度之和 $H = \sum_{i=1}^5 h_i$ 和 $H' = \sum_{i=1}^5 h'_i$ 必为两个相邻的自然数, 而两个相邻的自然数中, 必有一个为奇数, 另一个为偶数.

根据定理, 我们把锁具按钥匙槽高度之和 H 的奇偶分为两类, H 为奇数的属于奇类, H 为偶数的属于偶类. 这样, 能够互开的锁具一定分属于奇类和偶类.

(2) 求解奇类和偶类中锁具的个数

对一个锁具的钥匙槽高度的排列 $h_1 h_2 h_3 h_4 h_5$, 我们用 7 分别减去每个高度 $h_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$, 形成另一个与其对偶的排列: $(7 - h_1)(7 - h_2)(7 - h_3)(7 - h_4)(7 - h_5)$ 记原排列

的高度和 $H_0 = \sum_{i=1}^5 h_i$, 新排列的高度和 $H_1 = \sum_{i=1}^5 (7 - h_i)$

则有

$$H_0 - H_1 = 35$$

为使上式成立, H_0, H_1 中必有一个偶数和一个奇数. 而每一个奇(偶)类中的排列必能从偶(奇)类中找出与其对应的对偶排列, 这种对偶关系是一一对应的. 所以:

$$\text{奇类中锁具数} = \text{偶类中锁具数} = \frac{5880}{2} = 2940$$

故奇类和偶类中的锁具数都为 2940 件.

(3) 装箱和标记

基于以下讨论,我们可得到如下方案:

① 生产锁具过程中记录每个钥匙槽的高度,从而确定 H 的奇偶性,将生产出来的锁具分为奇类和偶类.

② 将奇类和偶类分别装为 49 箱并做“奇”和“偶”的标志.

这样,销售部门可以根据所做标记只选同类的箱子售给团体顾客.只要他们一次购买的箱数不超过 49 箱(即 2940 个锁具),我们就可以保证他们的锁具不会有互开现象,他们也不会抱怨了.

3. 对方案最优性的证明

我们用计算机对互开对总数进行穷举法计算(见附录 2),得到在一批锁具中互开对总数为 22778 对.

我们将锁具的互开关系用图表示出来.锁具集合用顶点集合 V 表示,如果两个锁具 $V_i, V_j (i, j = 1, 2, \dots, 5880 \text{ 且 } i \neq j)$ 能够互开,就用边 X_{ij} 连接起来,所有 X_{ij} 组成边集合 X ,用这种方法得到的图 $G_0(V, X)$ 有 5880 个顶点和 22778 条边.

我们引用图论中的一些概念:

最大匹配

最小覆盖

最大独立顶点集

邻集 $N_G(V_0)$

二分图 $G(V_1, V_2, X)$

最大匹配中的边数 $\beta_1(G)$

最大覆盖中的顶点个数 $\alpha_0(G)$

最大独立顶点集中顶点个数 $\beta_0(G)$

这些概念在一般图论理论书中可见到(可参见文献[1],[2]).

我们的目的是寻找图 G_0 中的最大独立顶点集,即不包含互开锁对的最大锁具集合.

引理 1 二分图 $G(V_1, V_2, X)$ 含有饱和 V_1 的每个顶点的匹配的充要条件是对所有 $V_0 \subseteq V_1, |N_G(V_0)| \geq |V_0|$ ($|V_0|$ 表示集合 V_0 中元素的个数). (1) (见[1])

引理 2 在二分图 G 中,最大匹配 M 的边数等于最小覆盖的顶点数 $\alpha_0(G)$.

引理 3 $\alpha_0(G) + \beta_0(G) = P(G)$. (见[1])

其中 $P(G)$ 为图 G 的顶点总数.

对二分图 $G_0(V, X)$,我们将奇(偶)类顶点集合定义为 $V_1(V_2)$ 得到 $G_0(V_1, V_2, X)$.

定理 二分图 $G_0(V_1, V_2, X)$ 的 V_1, V_2 是它的两个最大独立顶点集.

证明:我们的图 $G_0(V, X)$,对表示奇类锁具的顶点集合 V_1 ,由奇类锁具与偶类锁具的对称性可知, $G_0(V_1, V_2, X)$ 满足(1),即图 $G_0(V_1, V_2, X)$ 含有饱和 V_1 中每个顶点的匹配 M .

又因为 V_1 中各顶点互不邻接,则

$$\frac{P(G_0)}{2} \leq |M| \leq \beta_1(G_0) = \alpha_0(G_0) \quad (\text{由引理 2 得})$$

$$\beta_0(G_0) = P(G_0) - \alpha_0(G_0) \quad (\text{由引理 3 得})$$

$$\leq P(G_0) - \frac{P(G_0)}{2}$$

$$= \frac{P(G_0)}{2} = \frac{5880}{2} = 2940$$

即图 G_0 的最大独立顶点集中的顶点数不大于 2940,而我们划分的独立集(奇类集和偶

类集)的顶点个数为 2940, 因此奇类集 V_1 和偶类集 V_2 是 $G_0(V_1, V_2, X)$ 的两个最大独立顶点集. 定理得证.

所以, 我们的方案可以使锁具不出现互开情况时购买量达到最大. 这就证明了我们的方案是最优的.

4. 定量分析顾客抱怨互开的程度

(1) 对于随机装箱的方案

在一批锁具中, 互开对总数为 $m = 22778$ 对, 则平均每个锁具与其它所有锁具能组成的互开对数为 $E = \frac{m}{2940} = 7.75$ (对)

对于任一个指定锁具 S , 从其它 5879 把钥匙中任取一把, 能打开该锁的概率是均等的. 这样, 如果从另外 5879 个锁具中随意取出 59 个锁具与 S 装成一箱, 则在这一箱中能与 S 组成互开对的锁具个数平均有

$$E_1 = \frac{E \times 59}{5879} = 0.078 \text{ (个)}$$

平均含有的互开对数为

$$E(m_1) = \frac{60E_1}{2} = 2.33 \text{ (对)}$$

同理可以得知: k 箱锁具中, 能与某一个锁具互开的锁具个数平均为 $E_k = E \times \frac{60k-1}{5879}$, 平均含有的互开对数为

$$E(m_k) = \frac{60k \times E_k}{2} = \frac{60k(60k-1)}{2 \times 5879} \times E = \frac{22778}{5879 \times 98} \times k \times (60k-1)$$

显然, E_k 和 $E(m_k)$ 的大小反映了购买 k 箱的顾客的抱怨程度, 即 E_k 或 $E(m_k)$ 越大, 顾客抱怨程度越大.

表 1 $k=1, k=2$ 和 $k=49$ 的具体结果

箱数 k	1	2	49
含有的互开对数 $E(m_k)$	2.33	9.41	5693.5
能与某一锁具 S 互开的锁具数 E_k	0.078	0.157	3.87

(2) 对于奇偶分类装箱的方案

由前面的分析知, 给箱子进行奇偶标志后再出售, 只要顾客购买量 k 不超过 49 箱, 就可以保证不出现互开的情况, 顾客自然不会抱怨. 当购买量 k 超过 49 箱时, 可以先从奇(偶)类锁具中取出 49 箱, 再从偶(奇)类锁具中任取 $k-49$ 箱出售给顾客, 互开对显然只产生在 49 箱奇(偶)类锁具与 $k-49$ 箱偶(奇)类锁具之间. 此时, k 箱锁具中的平均互开对数为

$$E'(m_k) = 22778 \times \frac{60 \times (k-49)}{2940} = 22778 \times \frac{k-49}{49} \text{ (对)},$$

对比随意装箱的互开对数为

$$E(m_k) = \frac{22778}{5879 \times 98} \times k(60k-1),$$

可知:


当 $k \leq 49$ 时, $E'(m_k) = 0, E(m_k) > 0$

此时顾客的抱怨被避免了;

当 $49 < k < 98$ 时, $E'(m_k) < E(m_k)$

此时顾客的抱怨程度减少了,

我们在右面画出了 $E'(m_k)$ 和 $E(m_k)$ 的比较图.



(3) 在奇偶分类基础上再分类

对于某个锁具 S , 一批中能与它互开的锁具个数 sd 是一定的, 那么 sd 的范围是多大呢, 我们用穷举法利用计算机得到 $4 \leq sd \leq 10$, 并且得到了对应于每个 sd 的属于奇类的锁具个数(见下面程序结果), 由于奇偶的对称性, 偶类也有同样的结果.

程序运行结果如下

Total: = 5880

odd: = 2940 Even: 2940

互开总对数: 22778

互开对为 3, 0; 互开对为 4, 45; 互开对为 5, 105;

互开对为 6, 296; 互开对为 7, 699; 互开对为 8, 901;

互开对为 9, 744; 互开对为 10, 150; 互开对为 11, 0;

我们设想在奇偶分类后, 再对奇(偶)类按每个锁具的 sd 从小到大对锁具进行装箱, 并标记以序号 $1, 2, \dots, 49$. 这样当团体顾客购买箱数 $k > 49$ 时, 取奇(偶)类 49 箱后剩下的 $k - 49$ 箱在偶(奇)类中按序号从小到大取箱, 使得在 k 箱中互开总数尽量减少, 这样必然更能减小顾客的抱怨程度.

四、模型评价

1. 本模型利用数的奇妙的奇偶性为制锁厂提供了一项很好的锁具装箱方案. 此方案在最大范围内消除了锁具的互开现象, 而且方案简单明了, 施行方便.

2. 本模型综合运用了多种方法对问题进行求解. 其中穷举法简单易懂, 用计算机编程求解的运行时间仅几秒钟; 而概率、图论、组合数学等方理论性较强, 逻辑严密, 而且易于为大家所接受.

3. 当锁具的种类变化时, 即锁具的槽数和每个槽的可能高度的集合发生变化时, 我们的方案仍然适用, 将我们的计算机程序稍作修改, 就能很快得出一批锁具的总数和奇类、偶

类锁具的个数.

4. 我们的模型还能应用到其它类似性质的事物上, 如对条形码的排列组合和识别分类问题, 只需将可能高度改为可能码数, 槽数改为条形码的条数即可.

参考文献

- [1] 王朝瑞,《图论》(修订本),北京工业学院出版社出版,1987年.
[2] 李慰萱,《图论》,湖南科学技术出版社,1980年.

六、附录清单

附录1 除去集 D 的元素个数的详细求解

附录2 程序框图、源程序及运行结果(略)

1. 程序说明

2. PASCAL 源程序

附 录 1

除去集 $D_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$ 的元素个数的详细求解

1. 根据 D_1 的性质, $h_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$ 都取同一个数, 明显有 D_1 个元素个灵敏为

$$C_6^1 = 6 \text{ 个}$$

2. 根据 D_2 的性质, $h_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$ 中只有两个不同数 ω_1 和 ω_2 , 我们进行如下考虑, 让每个 $h_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$ 都可以任取 ω_1 和 ω_2 , 有 2^5 种方式, 但这样做又重复了 D_1 中五个槽高均为 ω_1 和五个槽高均为 ω_2 的两种组合, 因而须从 2^5 中减去 2, 最后考虑到 $\omega_1, \omega_2 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 可有 C_6^2 种取法, 故而 D_2 的元素个数为

$$C_6^2(2^5 - 2) = 450 \text{ 个}$$

3. 根据 D_3 的性质, $h_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$ 中必有 1 和 6, 记另外一个与 1 和 6 不同的高度数为 ω , 我们考虑如下完全划分:

(a) $h_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$ 中三个 1 和一个 6.

第一步, 从 $h_1 h_2 h_3 h_4 h_5$ 中选出了三个来安排 1, 有 C_5^3 种方法, 第二步, 从剩余的两个槽位中选一个来安排 6, 剩余最后一个位置自然要排 ω , 因而有 $P_2^1 C_5^3$ 种安排方法. 但这样做纳入了 $\bar{D}$ 集中的两个元素 111 ω 6 和 6 ω 111, 须从安排方法中减去, 又 ω 可以 $\{2, 3, 4, 5\}$ 中任取一数, 故而共有排列方式

$$C_5^3(2C_5^2 - 2) = 72 \text{ 种}$$

(b) $h_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$ 中三个 6 和一个 1.

与(a)同理可知共有排列方式

$$C_5^3(2C_5^2 - 2) = 72 \text{ 种}$$

(c) $h_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$ 中有两个 1 和两个 6.

第一步从 $h_1 h_2 h_3 h_4 h_5$ 中任选两上来排 1, 有 C_5^2 种选法; 第二步, 从剩余三个位置中任选两个安排 6, 剩下最后一个位置自然要排 ω , 因而有 $C_3^2 C_5^2$ 种排法. 但这样做纳入 $\bar{D}$ 集中的两元素 11 ω 66 和 66 ω 11, 须从排法中减去 2. 又 ω 可以 $\{2, 3, 4, 5\}$ 中任取一数, 故而共有排列

方式.

$$C_4^1(C_3^3C_3^2 - 2) = 112 \text{ 种}$$

(d) $h_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$ 中有两个 1 和一个 6.

第一步, 从 $h_1h_2h_3h_4h_5$ 中选出二个安排 1, 有 C_5^2 种方法, 第二步, 从剩余 3 个位置中选一个排 6, 剩余的二个位置都排 ω , 因而有 $C_3^2C_3^1$ 种排法. 但这样做纳入了 $\bar{D}$ 中的 9 个元素 $11\omega\omega6, 11\omega6\omega, 6\omega\omega11, \omega6\omega11, 1\omega1\omega6, 1\omega6\omega1, 6\omega1\omega1, \omega11\omega6$ 和 $6\omega11\omega$, 须从排法中减去. 又 ω 可以 $\{2, 3, 4, 5\}$ 中任取一个数, 故而共有排列方式

$$C_4^1(C_3^3C_3^1 - 9) = 84 \text{ 种}$$

(e) $h_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$ 中有两个 6 和一个 1.

与(d) 同理可知共有排列方式

$$C_4^1(C_3^3C_3^1 - 9) = 84 \text{ 种}$$

(f) $h_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$ 中只有一个 1 和一个 6.

这样考虑, 三个 ω 可形成四个间隔位, 将 1, 6 做为一个数插入四个间隔位有 C_4^1 种方法, 这样得到的组合方式显然属于 D_3 , 同样可将 6, 1 做为一个数插入四个间隔位, 而 ω 可从 $\{2, 3, 4, 5\}$ 中任取一数, 故而共有排列

$$C_4^1(P_4^1P_2^2) = 32 \text{ 种}$$

综上所述, D_3 集中元素的个数为

$$72 + 72 + 112 + 84 + 84 + 32 = 456 \text{ 个}$$

4. 根据 D_4 的性质, $h_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$ 中必有 1 和 6, 记另外两个与 1 和 6 不同而且相互之间也不同的高度数为 ω_1, ω_2 , 我们考虑如下完全划分:

(a) $h_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$ 中有两个 1 和一个 6.

与 3-(d) 的情况相类比, 现在的情况是 $\omega_1 \neq \omega_2$ 且 $\omega_1, \omega_2 \in \{2, 3, 4, 5\}$, 而前面的情况是有两个相同的 ω 且 $\omega \in \{2, 3, 4, 5\}$. 因而同理容易推知现在共有排列方式

$$C_4^2[P_2^2(C_3^3C_3^1 - 9)] = 252 \text{ 种}$$

(b) $h_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$ 中有一个 1 和两个 6.

同理, 与 3-(e) 的情况类比可知共有排列方式

$$C_4^2[P_2^2(C_3^3C_3^1 - 9)] = 252 \text{ 种}$$

(c) $h_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$ 中只有一个 1 和一个 6.

与 3-(f) 的情况类比, 现在的情况相当于原来的构成间隔位的方式增多了, 可以是两个 ω_1 和一个 ω_2 或两个 ω_2 和一个 ω_1 构成间隔位, 它们都有 $C_3^2C_3^1$ 种方式, 又 $\omega_1, \omega_2 \in \{2, 3, 4, 5\}$, 因而现在的情形下共有排列方式

$$C_4^2[C_3^2C_3^1(P_4^1P_2^2) + C_3^2C_3^1(P_4^1P_2^2)] = 288 \text{ 种}$$

综上所述, D_4 集中元素个数为

$$252 + 252 + 288 = 792 \text{ 个}$$

5. 根据 D_5 的性质, $h_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$ 中只有一个 1 和一个 6, 记其余三个与 1 和 6 不同的数为 $\omega_1, \omega_2, \omega_3 \in \{2, 3, 4, 5\}$, 故有 P_4^3 种构成间隔位的形成. 由此可知 D_5 集中元素的个数为

$$P_4^3(P_4^1P_2^2) = 192 \text{ 个}$$

装箱与销售模型

兰州铁道学院 刘 振 杨文青 何新宇

指导教师 俞建宁

编者按 本文较详细地讨论了装箱和连续销售问题,证明了从任一箱起顺次销售能保证至少有 35 箱不会发生互开现象,进而用字典装箱可改进到 42 箱.这点是很有创见和特色的.

假 设

1. 两把锁具对应的 5 个槽的高度中有 4 个对应相同,另一个槽的高度差为 1 时,两锁必能互开.

模型 I (1)

在考虑使团体顾客不再或减少抱怨的前提下、兼顾销售方便,我们拟采用连续数字作为箱的编号,销售时按箱的编号连续销售.

设一批锁具中第 i 把钥匙从一端开始顺次各槽的高度值组成一个向量记为 B_i ,

$$B_i = (b_1^{(i)}, b_2^{(i)}, \dots, b_m^{(i)}),$$

其中 m 为一批锁具中各钥匙槽的个数(本模型 $m = 5$).

从而可有如下结论:

结论 1:若 $|B_i| - |B_j| \neq 1$, 则第 i 把锁和第 j 把锁不能互开(证略).

由结论 1 得如下推论.

推论 1:要使团体顾客不再或减少抱怨,必须使 $||B_i| - |B_j|| = 1$ 的两锁具装入编号相距尽可能大的箱中.

推论 2:模同为偶数的锁具间不能互开.

模同为奇数的锁具间不能互开.

模相等的锁具间不能互开.

由以上分析得到下面的装箱方案.

将模为偶数的锁装入前 i 箱,模为奇数的锁装入后 j 箱($i + j = Y$, Y 为总箱数,本题 $Y = 98$),且把模为偶数和奇数的锁具分别按模从小到大的顺序排列后,依次装箱.

记模为 $|B_i|$ 的所有锁具数为 $\alpha(|B_i|)$.

本文用计算机程序对不同 $|B_i|$ 的 α 进行计算,结果如下:

$$2(8) = 20, 2(9) = 50, 2(10) = 120, 2(11) = 162, 2(12) = 251,$$

$$2(13) = 322, 2(14) = 405, 2(15) = 508, 2(16) = 539,$$

$$2(17) = 563,$$

$$2(18) = 563, 2(19) = 539, 2(20) = 508, 2(21) = 405, 2(22) = 322,$$

$$2(23) = 251, 2(24) = 162, 2(25) = 120, 2(26) = 50, 2(27) = 20.$$

由统计数据及装箱方案可得表 1:

表1 模型 I (1) 的装箱方案

$n \mid B_i \mid$ (编号)	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27
$\alpha \mid B_i \mid$	20	120	251	405	539	563	508	322	162	50	50	162	322	508	563	539	405	251	120	20
混合箱	1	3	7	14	23	32	41	46	49	50	53	58	67	76	85	92	96	98		
顺次装箱 (自然排序)		2	4	8	15	24	33	42	47	51	54	59	68	77	86	93	97			
			5	9	16	25	34	43	48	52	55	60	69	78	87	94				
			6	10	17	26	35	44					56	61	70	79	88	95		
				11	18	27	36	45					57	62	71	80	89			
				12	19	28	37						63	72	81	90				
				13	20	29	38						64	73	82	91				
					21	30	39							65	74	83				
					22	31	40							66	75	84				

对表1说明如下:

(1) 表中第一行为上述装箱方案对应的模 $|B_i|$ 的排列.

(2) 表中第二行为模为 $|B_i|$ 的锁具的个数.

(3) 第三行以下为模为 $|B_i|$ 的锁装入箱的对应编号.

若锁具 $|B_i|$ 与锁具 $|B_j|$ 能互开, 记 $|B_i|$ 所在箱与 $|B_j|$ 所在箱在自然下的距离为 S_{ij} .

记 $M(S_{ij})$ 为从任意箱处顺次连续拿取一定不会出现互开锁的最大箱数, 则

$$M(S_{ij}) = \min |S_{ij}| - 1.$$

据表1有:

$$S_{ij} = \{50, 49, 48, 47, 46, 45, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36\},$$

$$M(S_{ij}) = 36 - 1 = 35.$$

据以上结果作购买量和出售方案对照表(表2), 表2中曲线上各标值表示由该点对应箱号开始顺次连续购买, 一定不会出现互开锁的最大箱数. 显然, 保证一定不会出现互开锁的最大购买量为49箱.

表2使用说明:

- (1) 若购买箱数 $N \leq 35$ 箱, 可以从任一标号开始, 顺次连续取.
- (2) 若购买箱数 $N = 49$ 箱, 只能从第1箱或第50箱或第98箱连续取.
- (3) 若购买 $35 < a \leq N \leq b < 49$ 箱, (其中 a, b 为表2上可取的标值范围的外限)
 - (i) 当 b 位于 a 点左边时, b 点取对应箱号的上限, a 点取对应箱号的下限.
 - (ii) 当 b 位于 a 的右边时, b 取对应箱号的下限, a 取对应箱号的上限.

在向量集空间 ZK 中,对于 $||B_i|| - ||B_j|| = 1$ 的两个子向量集 $|a|B_i|$ 和 $|a|B_j|$,在按字典排序的条件下,为了保证不互开,只有当首位数 $|b_1^{(i)} - b_1^{(j)}| = 1$ 时向量所对应的锁具编号才相距“最近”。

下面对向量集空间 ZK 中的每一个子向量集 $|a|B_i|$ 按首位数 $b_1^{(i)} = 1, 2, \dots, 6$ 的大小进行字典排序,由表 2 图象可知,只需在 $|B_i|$ 为 $14 \leftrightarrow 13, 16 \leftrightarrow 15, 18 \leftrightarrow 17, 20 \leftrightarrow 19, 22 \leftrightarrow 21$ 这五种情况间进行分析, $M(S_{ij})$ 必在其间,具体分析见表 3。

分析表 3,可得 $M(S_{ij}) = 42.7$,取下整为 42。

也可用计算机进行全范围搜索求解。

将有序向量集空间中的各向量按 $1, 2, 3, \dots, 5880$ 标记以后,运用计算机依据前述的方案进行搜索,求出各种可能情况下的最小距离 $M(S_{ij})$,以该最小距离对应的向量数,标记号差值。

运行结果为:

最小距离对应向量标号之差为 2562。

相应向量 128 个,即互开锁具数为 128 把。

由 $M(S_{ij}) = 2562/60 = 42.7$,取下整为 42 箱。

装箱方案:将字典排序后的有序向量集空间中的 5880 个向量按顺序提出来,排成一列。然后将其对应锁具每 60 把一箱,依次装箱,并把各箱的 $1 \sim 98$ 依次编号。

销售方案:出售时按箱编号顺次取出。显然,保证不互开的最小“最大购买量”为 42 - 49。

若购买 42 箱,可以从任一箱开始顺次连续拿取,两模型都是在连续生产、循环销售的条件下建立的。但模型 I (1) 和模型 I (2) 相比,模型 I (1) 生产简单,装箱方便。模型 I (2) 在保证不会出现互开锁的前提下,购买箱数由 35 箱增到 42 箱,可是在一定程度上增加了生产、装箱的复杂度。




表 3

箱距	B ₁	14						16						18						20						22						总和
		2	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
13	1	44.38																														90
	2		44.35																													80
	3			45.95																												60
	4				44.28																											52
	5					44.28																										30
	6						44.28																									10
15	1							43.05																								102
	2								43.05																							112
	3									43.05																						102
	4										43.15																					85
	5											43.22																				70
	6												43.22																			34
17	1													43.00																		78
	2													42.70																		112
	3													42.80																		106
	4													42.80																		104
	5													42.70																		96
	6														43.55																	67
19	1																															50
	2																															84
	3																															96
	4																															107
	5																															106
	6																															95
21	1																															19
	2																															52
	3																															60
	4																															84
	5																															44.72
	6																															98
总和		98	92	84	60	52	19	95	106	108	96	84	50	67	96	104	106	112	78	34	70	88	102	112	102	12	28	52	60	80	90	

关于不互开箱数上限的一个讨论

魏明骏 于清娟 王振宇

(中国科学技术大学 230026)

指导教师 程继新

编者按 本文讨论了锁具分箱问题中,顾客最多购买多少箱时不会出现互开现象的问题,且给出了箱数的一个上限.虽然所得上限过大,但证明方法巧妙、简洁,具有启发性,特将有关部分予以发表.

我们按槽高之和的奇偶性将锁具划分为 A 、 B 两个集合.容易证明,每个集合的锁具数为 $5880/2 = 2940$ 个, A 和 B 中的锁具可分别装 49 箱.以 $A \cup B = V$ 为顶集,当且仅当 $a \in A, b \in B, a$ 与 b 可互开时,在顶 a 与 b 间连一条边,得一图 $G(V, E)$.可以证明 $G(V, E)$ 为二分图, A 与 B 为独立集.于是,不互开锁具箱数的下限为 49.下面,我们证明不互开箱数的上限为 54.证明如下:

假设团体顾客购买了 n 箱锁具而不互开,且 $n > 54$, n 箱锁具必分属于 A 、 B 两个集合.不妨设其中有 n_1 箱锁具,这些锁具的集合 $N_1 \subset A$, (可以证明 $N_1 \neq A$) 和有 n_2 箱锁具,这些锁具的集合 $N_2 \subset B$.令 $A - N_1 = N_3, |N_3| = n_3$ (集合 N_3 中的锁具装在 n_3 箱中), $B - N_2 = N_4, |N_4| = n_4$, 且 n_1, n_2, n_3, n_4 满足:

$$n_1 + n_2 = n, n_1 + n_3 = 49, n_2 + n_4 = 49 \quad (1)$$

$$n_3 + n_4 = 98 - (n_1 + n_2)$$

$$n_1 + n_2 = n > 54$$

$$n_3 + n_4 < 44 \quad (2)$$

由于 n 箱锁具不互开,所以在 G 中 $N_1 \cup N_2$ 为独立集;又 $N_1 \cup N_3 = A$ 为独立集,所以 N_1 中的顶只能与 N_4 中的顶相邻,而 N_4 中的顶则与 $N_1 \cup N_3$ 中的顶可能相邻.所以 N_1 中顶的总度数 D_1 与 N_4 中顶的总度数 D_4 满足:

$$D_1 \leq D_4 \quad (3)$$

$$D_2 \leq D_3,$$

$$D_1 + D_2 \leq D_3 + D_4 \quad (4)$$

借助计算机可统计出 G 中顶的总度数 $D = 45556$,

$$\sum_{i=1}^4 D_i = D, \text{ 再由 (4) 得}$$

$$D_3 + D_4 \geq D/2 = 22778 \quad (5)$$

借助计算机统计,我们还可以知道度数的精确分布(即不同度数各有多少锁具)如下:

$$R(1) = R(2) = R(3) = 0, R(4) = 90, R(5) = 210,$$

$$R(6) = 592, R(7) = 1398, R(8) = 1802,$$

$$R(9) = 1488, R(10) = 300$$

其中 $R(i)$ 表示 i 度顶的个数.

由此,可求出43箱锁具能容纳的最大度数为22728;

44箱锁具能容纳的最大度数为23208.

于是

$$\text{当 } n_3 + n_4 < 44 \text{ 时, } D_3 + D_4 < 22778 \quad (6)$$

与(5)矛盾,由此证出 $n > 54$ 不成立,即不互开锁具箱数的上限为54,证毕.

参考文献

- [1] 王树禾编著,《图论及其算法》,中国科学技术大学出版社,1990.

确实,数学是决定性的相互交叉的学科。数学是取得全面进步的出发点。数学既是强有力的洞察工具,又是科学的共同语言。我把她称为科学的“世界语”。(原文:Indeed, Mathematics is the ultimate cross-cutting discipline. It is the springboard for advances across the board. Mathematics is both a powerful tool for insight, and it's a common language for science, I refer it as the "Esperanto" of science. Rita Colwell (Director of NSF)(美国科学基金会主任 Rita Colwell)

NSF Launches Major Initiative in Mathematics, Allyn Jackson, Notices of AMS, v.48(2001), no. 2, 190 - 192.

独立集最大性的讨论

杨 琼 尹雪钰 李 程

(北京师范大学 100875)

指导教师 曾文艺

编者按 本部分将最优装箱问题转化为图论的二分图问题,用图论方法说明了 S, T 分别是两个极大无关集且 $|S| = |T| = 2940$,并借助计算机找到了一个匹配,其边数为 2928,说明了最大匹配边数 ≥ 2928 ,再利用 Konig 定理得出最大独立集个数 $\leq 2952 < 3000$,从而得到文中不能互开的最大箱数为 49 箱。

本部分思路清晰,行文流畅;但未能从理论上证明 2940 就是最大独立集数,只是用计算机给出了 2952 这个上界。

三 采取我们的方案,团体顾客购买量不超过 49 箱,可以保证一定不会出现互开情形。

我们分析如下:(注: $S = \{\text{各位数字和为奇数的合格锁的集合}\}$

$T = \{\text{各位数字和为偶数的合格锁的集合}\}$)

将锁看成点,两个锁具互开则可看成两点之间存在一条边,则一批锁具构成顶点数为 $P = 5880$ 的简单图。由前所证,在同一 S 或 T 集合中不会有互开关系,互开关系只会发生在 S 中点与 T 中点之间。由图论中二部图定义,这 P 个锁具构成二部图 $G = (S, T, E)$

我们引入以下几个概念:(见[1] 田丰等,《图与网络流理论》,科学出版社)

(1) 边无关集:给定图 $G = (V, E)$,若边集 $M \subseteq E$ 中任两条边都没有公共顶点,称 M 是 G 的边无关集;记最大边无关集的边数为 $\beta_1(G)$,显然 $\beta_1(G) \leq P/2$ ([1]p. 60)

(2) 点无关集:对图 $G = (V, E)$,若点集 $I \subseteq V$ 中任意两个点间都不存在边,称 I 是最大点无关集;包含点数最多的点无关集称为最大点无关集,其中点的个数记为 $\beta_0(G)$ ([1]p. 77)

再不加证明地引入以下几个定理:(其中 $\alpha_0(G)$ 为图的点覆盖数)

① 设 $G = (S, T, E)$ 是二部图,则 $\beta_1(G) = \alpha_0(G)$ ([1]p. 64)

② $\alpha_1(G) + \beta_0(G) = P(G)$

易由 ①② 得,对于二部图, $\beta_1(G) + \beta_0(G) = P(G)$ (*)

显然对于本题的二部图 $G = (S, T, E)$, $S = T = 2940$,而 S, T 都是极大点无关集,即再往 S 或 T 中增加集合外一点,则集合不再是无关集,于是 $\beta_0(G) \geq 2940$ (**)

另外,我们利用计算机程序(见算法)找出了一条边无关集,其中边数为 2928,从而最大边无关数 $\beta_1(G) \geq 2928$,由 (*) 得

$$\beta_0(G) = P(G) - \beta_1(G) \leq 2952$$

综合 (*) 得 $2940 \leq \beta_0(G) \leq 2952$,这就是说明我们如从一批锁具中任取 50 箱,其锁数 $3000 > 2952 \geq \beta_0(G)$,其中必存在相关(可互开)的锁。

由前面的装箱办法,我们将 S 类中的 2940 把锁装成 49 箱, T 类中的 2940 把锁装成 49

箱;从上面的分析可知我们提出的两个内部不互开的 49 箱的分类是最优的. 团体顾客购买不超过 49 箱,可以保证一定不会出现互开.

附

利用程序找尽量大的边无关集的计算步骤:

算法主要目的是找出尽可能多的匹配,从而提高 $\beta_1(G)$ 的下限,也即缩小了最大点无关集个数 $\beta_0(G)$ 的上限.

① 产生 5880 把合格锁,按数字特征(锁各位数字之和分组)

② 对每把锁求出与之互开的锁

③ 标记所有的锁为没有匹配(NoMate)

④ 从数字特征的 8 的组开始,在标记为 NoMate 的锁中查找互开锁(与之互开的锁数字特征必为 9),找到后将两锁都标记为已匹配(HasMate)

⑤ 依次对特征为 9 - 27 的所有锁进行步骤 ④,若发现与某未匹配锁互开的锁都已匹配,则产生一不可匹配的锁,直到所有锁都处理完.

程序运行后,给出 2928 对匹配点,即 2928 条无关的边,因此 $\beta_1(G) \geq 2928$.

那么数学的“应用”是由什么组成的呢?在我看来它能描述如下,它的任务在于基于物质世界某些对象的性态所遵从的一般规律,预言这些对象在给定条件下的行为。通过把物质对象对应到认定能“表示”这些物质对象的数学对象以及把控制前者的规律对应到数学对象之间的数学关系,就能构造所研究的情形的数学模型;这样,把原来的问题翻译为数学问题,如果能以精确或近似方式求解此数学问题,就可以再把所得到的解翻译回去,从而“解”出原先提出的问题。

《当代数学——为了人类心智的荣耀》——让·迪厄多内著,沈永欢译,上海教育出版社, pp.21 - 22, 1999.

抱怨程度模型

顾宗良 党 京 卢敦陆

(合肥工业大学 230009)

指导教师 周永务

编者按 在本次竞赛中,很大部分试卷中都用了平均互开次数的数学期望值定义为抱怨程度的度量.这自然就得出购买箱数越多,抱怨程度越大,这不太符合顾客的心理状态.本文认为顾客抱怨程度与购买箱数成反比,与检验结果成指数关系,在定义抱怨程度函数上是有特色的.

1. 总体互开概率

将一批 5880 个锁具两两比较,总的比较依次数为 C_{5880}^2 ,其中能互开的次数可通过编程让计算机统计出

两两比较次数总和为 $TOTAL = C_{5880}^2$

两两比较中能互开的次数和为 $HK = 22778$

互开率为 $P_{\text{总}} = \frac{HK}{TOTAL} = \frac{22778}{C_{5880}^2} = 0.132\%$

通过 $P_{\text{总}}$ 我们可看出这批锁具的互开程度,并可衡量一批锁具的技术指标.若 $P_{\text{总}}$ 越小,互开现象就越小,锁具的安全性越好.

2. 团体顾客购买若干箱时互开概率

(1) 根据总体概率分析估算

若抽取 1 箱,里面 60 个锁具两两比较次数为 C_{60}^2 .若认为每箱的互开率与一批总体互开率 $P_{\text{总}}$ 相同,则互开次数的数学期望 $E_1 = C_{60}^2 \cdot P = 2.34$.

设在 C_{60}^2 次独立重复抽取事件中,互开次数 $\xi \sim B(C_{60}^2, P)$, $P(i)$ 代表在 $C_{60}^2 = 1770$ 次抽取中出现 i 对互开现象的概率.

由二项分布的基本原理得:

$$P(K) = P(\xi = K) = C_{1770}^K P^K (1-P)^{1770-K}$$

$$(K = 0, 1, 2, \dots, 1770, P = 0.132\%)$$

上述分布律亦可用下表表示:

K	0	1	2	3	4	5
P(K)	0.096	0.226	0.264	0.205	0.120	0.056
K	6	7	8	9	≥ 10	
P(K)	0.022	0.007	0.002	0.001	≈ 0	

从表上表我们可以看出,一箱内不存在互开的可能性是很小的,仅 0.096,而出现两次互

开的概率最大,可见互开现象较严重,所以采用新的装箱、标志方法非常重要.

同理抽取二箱时,互开次数 $\xi \sim B(C_{120}^2, P)$

$$E_2 = C_{120}^2 \cdot P = 9.42$$

$$P = (\xi = K) = P(K) = C_{7140}^K P^K (1-P)^K$$

作出的表格为:

K	0	1	2	3	4	5	6
P(K)	8E-5	0.00076	0.0036	0.011	0.026	0.050	0.078
K	7	8	9	10	11	12	13
P(K)	0.106	0.125	0.131	0.123	0.105	0.083	0.060
K	14	15	16	17	18	19	≥ 20
P(K)	0.041	0.025	0.015	0.0083	0.0043	0.0029	0.0021

对一般情况抽取 n 箱时,互开次数 $\xi \sim B(C_{60 \cdot n}^2, P)$

(2) 随机抽样模拟

i) 在实际生活中,一般顾客在大多数情况下,往往采取从已买的若干箱锁具中抽取若干个锁具,检验统计后进行估计的方法,由此行出互开程度的大小.我们认为此种方法虽然在理论上是合理的,但实际中的检验方法不可能满足估计量的评选标准,因为,即使取一箱,在其中任取一对检验,也有 $C_{60}^2 = 1770$ 种可能,若取两箱, C_{120}^2 就更大,在实际中不可能.做到与之可类比的检验次数,而取到任意一箱的种数也有 C_{5880}^{60} 种,况且不同的人在一批锁具中的不同箱子中,可能按照不同抽取方法,不同的抽取次数来抽样检验,故一般顾客采取的抽样方法在估计中的置信程度、偏差程度、有效性、相合性等方面存在很大欠缺,为此我们采取计算机随机抽样方法来模拟互开的概率情况.

ii) 利用计算机模拟随机抽样.对此我们有多种方法:蒙特卡洛模拟中的迭代取中法移位法、同余法.但考虑问题的实际情况,我们采用了线性同余法来模拟(见程序(略)).


我们基本方法如下:

从一批总体 5880 个中随机抽取 60 个组成一箱,箱内 60 个锁具两两比较,互开次数记为 N , N 的取值 $0, 1, 2, 3, \dots, C_{60}^2$.

通过计算大量产生随机数,模拟抽取,并进行比较,对 N 值取值为 $0, 1, 2, 3, \dots$ 的次数加以分类统计,记为 $M_i (i = 1, 2, 3, \dots)$,以 $P(i) = \frac{M_i}{M}$ 代表一箱内出现 i 对的概率,则根据强大数定律得:当随机抽样次数 M 充分大时, $P(i)$ 趋向一批总体概率分布.


我们利用计算机模拟顾客购买一箱和两箱锁具的互开情况,计算结果如下表和图.

一箱	K_0	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5
次数	991	2300	2689	2173	1100	527
互开率	0.0991	0.2300	0.2689	0.2173	0.1100	0.0527
一箱	K_6	K_7	K_8	K_9	$K \geq 10$	
次数	82	27	11	1	0	
互开率	0.0082	0.0027	0.0110	0.0001	0	



从图表可以看出,抽取一箱时互开时数为 2 的概率最大

二箱次数	K_0	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	K_6
互开率	$8E-5$	0.0008	0.0033	0.0112	0.0257	0.0508	0.0771
二箱次数	K_7	K_8	K_9	K_{10}	K_{11}	K_{12}	K_{13}
互开率	0.1053	0.1254	0.1325	0.1212	0.1053	0.0826	0.0587
二箱次数	K_{14}	K_{15}	K_{16}	K_{17}	K_{18}	K_{19}	$K \geq 20$
互开率	0.0424	0.0236	0.0157	0.0087	0.0045	0.0029	0.0005



从图可以看出,抽取二箱时,互开对数为 9 的概率最大

抱怨函数的构造:

抱怨函数的构造建立在以下假设的基础上。

1. 假设团体顾客在购买时,至多一次购买 G 箱($G \leq 98$),且顾客从所购的 G 箱中随机抽取检验的箱数占其购买箱数的百分率 g 与他所购买的箱数成二次关系。

即有: $g = -aG^2 + bG + c$ (其中 a, b, c 为常数)

由于箱数必须为整数,故我们认为顾客抽取的检验指数符合 $J = \text{INT}(g \times G + 0.5)$ 的规律。

这是因为考虑到团体顾客购买后不可能象单个顾客购买几把或十几把可以完全检验所锁的互开次数。

例如:若想检验一箱锁中有几次互开,需检验 $C_{60}^2 = 1770$ 次。

若检验二箱,则需 $C_{120}^2 = 7140$ 次

故此团体顾客购买后只能从中抽取一定数量的箱数来检验,且考虑到顾客的心理,当他购买箱数较少时,自然检验率较高,能发现几乎所有的互开情况,当购买数量大时,相对检验

率会减少,有的互开情况发现不了。

2. 由于当团体顾客购买量较大(通常为几十箱)时,他也不可能对抽出箱内的锁作完全互开试验,因此,我们又假设顾客在对所抽取的箱中的锁作检验时,从每箱当中抽取相同数量的锁具 n 把,然后把 n 把锁具混合起来作完全互开试验,这样检验的工作量不大,而又达到了检验目的。例如,从 40 箱里抽出 3 箱检验,再从 3 箱的每箱中又抽出 10 把锁具混合起来,对这 30 把锁具作完全检验。

显然,顾客的抱怨程度最主要一方面取决于他所购买的总数量,另一方面取决于他作检验的结果(即互开次数)。并且从心理学的解度考虑,顾客更偏重于检验的结果。由此我们认为顾客的抱怨程度与购买的总箱数成反比,与检验结果成 e 的指数关系

由此,就可以定义出抱怨函数的表示为

$$C(T, \delta_n) = \frac{K_1}{T} e^{K_2 \delta_n},$$

其中 K_1, K_2 为常数,其实际意义为:

K_1 : 表示顾客购买箱数在整个抱怨程度中所占的比重

K_2 : 表示检验到互开次数在整个抱怨程序中所点的比重。

其确定可分别依实际的用户而确定。

T : 表示顾客购买的总箱数。

δ_n : 表示顾客检验到有 n 次互开的互开率。

即 δ_n 等于 $J \times n$ 把锁作完全互开试验后得到的 n 次互开比上 $J \times n$ 把锁的所有组合

$$\delta_n = \frac{n \text{ 次互开}}{C_{J \times n}^n} \times 100\%$$

下面我们针对在一批锁具中购一、二箱的情况作具体分析。

我们用计算机进行 1000 次的模拟数据检验(程序见附录(略)),结果见下表。

互开次数 n	0	1	2	3	4	5	6	≥ 7
概率 $P_n(\%)$	13.7	26.9	28.6	17.9	8.7	2.9	0.9	0

n : 一箱中有 n 次互开; P_n : 1000 次检验下一箱中有 n 次互开的概率。

我们认为:

① 如果甲顾客购买箱数是乙顾客的两倍,而甲、乙检验到相同的 δ_n ,则甲的抱怨程度是乙的两倍;

② 如果仅购买一箱,由互开数大于 7 的为 0 次,故检验到的互开率为 $\frac{6}{C_{10}^2} = \frac{2}{15}$ 时抱怨达到极值设为 100。

由 ①, 得到 $K_1 = 1$,

由 ②, 得到 $K_2 = \frac{15}{2} \ln 100$

则得到抱怨函数的具体表达式为 $C(T, \delta) = \frac{1}{T} e^{\delta \frac{15}{2} \ln 100}$

对购买一箱者:

$$\delta_n = \frac{n}{C_{10}^2}$$

为简便起见,我们假设顾客多次重复做了这样的试验,并对各种互开情况顾客均能检验到,则平均互开率:

$$\begin{aligned}\bar{\delta}_1 &= \sum_{n=1}^6 \delta_n \cdot P_n \\ &= \frac{1}{C_{10}^2} (1 \times 0.269 + 2 \times 0.286 + 3 \times 0.179 + 4 \times 0.087 \\ &\quad + 5 \times 0.029 + 6 \times 0.009) = 0.04\end{aligned}$$

对于二箱的情况:

$$\begin{aligned}\delta'_n &= \frac{n}{C_{20}^2} \\ \bar{\delta}_2 &= \sum_{n=1}^6 \delta'_n P_n \\ &= \frac{1}{C_{20}^2} (1 \times 0.269 + 2 \times 0.286 + 3 \times 0.179 + 4 \times 0.087 \\ &\quad + 5 \times 0.029 + 6 \times 0.009) = 0.01\end{aligned}$$

则购买一箱的顾客的平均抱怨程度为:

$$\bar{C}(1, \bar{\delta}_1) = e^{\bar{\delta}_1 \cdot \frac{15}{2} \ln 100} = e^{0.04 \times \frac{15}{2} \ln 100} = 3.98$$

则买二箱的顾客的平均抱怨程度为:

$$\bar{C}(2, \bar{\delta}_2) = \frac{1}{2} e^{\bar{\delta}_2 \cdot \frac{15}{2} \ln 100} = 0.5 \times e^{0.01 \times \frac{15}{2} \ln 100} = 0.71$$

对结果的解释:

由上述结果可以看出,购买一箱锁具的顾客的平均抱怨率明显高于购买两箱锁具的顾客的平均抱怨率,这是与我们的一贯看法所吻合的.因为虽然在个别情况下购买两箱锁具的顾客的抱怨率会高于购买一箱锁具的顾客的抱怨率,但顾客购买的数量越少,就越容易检验出其中的互开情况,而如果购买的数量较大,相对就不易检验出互开的情况,并且由于购买数量在一定数量上起了平衡顾客心理的作用,故上述的结果在数值上差别就不难理解.

关于顾客抱怨程度的定量描述

喻甫祥 薛剑歌 林 东

(中国科学技术大学 230026)

指导教师 王树禾 徐俊明

编者按 本文在讨论锁具随机装箱情况(即原来的装箱方法)之下,顾客不满意程度的描述时,首先引入了三个特征量:互开的“锁具对”的数目 x ,能被某把其他锁具打开的锁具的个数 y ,必须报废的锁具的最小数目 a .通过计算机模拟求出了 x 和 y 的期望值.作者们在讨论一把锁被 n 把其他锁具打开的问题中,证明了 $n \geq 3$ 的情况出现的概率很小,可以忽略.在此基础上给出了抱怨程度的一个描述,并给出了改进的描述方法.虽然其中的一些问题还有待于进一步探讨,仍不失为一种富有特色的考虑方法.

1. 分析和假设

当锁具随机装箱后出售给团体顾客时,可能由于某些锁具互开而引起抱怨.我们设计概率模型来定量地衡量团体顾客抱怨互开的程度.模型应该较好地反映出大多数时候团体顾客抱怨互开的程度,而又能兼顾到极端情况,尽量使团体顾客抱怨程度极大而抱怨函数却极小的情况很少出现.

假设团体顾客发现购买的锁具中有互开的情况时,会更换一些锁具以避免互开,我们称这些被更换的锁具被报废.我们引入三个特征量:互开锁的“锁具对”的数目 x ,能被某把其它锁具打开的锁具的个数 y ,必须报废的锁具的最小数目 a .如果以每个锁具为顶点,能互开的锁具之间用一条边相连,构造出一个图 G ,那么 x 就是 G 的边数, y 就是 G 的非孤立顶点数, a 就是 G 的点覆盖数.

另外,我们用五位数来代表锁具,各位数字分别与相应槽的高度相对应,按五位数的数字和的奇偶性,把锁具分为奇锁具和偶锁具两大类,容易证明,一批具有 5880 个,其中奇、偶锁具各有 2940 个;不同的奇锁具之间不互开,不同的偶锁具之间也不互开,因此 G 是一个二分图.

2. 模型的设计

抱怨程度与互开的锁具对数 x ,能被其它某把锁具打开的锁具的个数 y 以及必须报废的锁具的最小数目 a 有关.

理论推导可以得到 x 的期望值,在一箱中,由于边的总数为 22778,可以得到 x 的期望值为 $E_x = \frac{22778}{C_{5880}^2} \times C_{60}^2 = 2.33$.通过计算机模拟的方法可以得到 x, y 的分布和数学期望.如当团体顾客的购买量为一箱时, x 和 y 的数学期望分别为 2.33 和 4.43;两箱时,则分别为 9.40 和 17.39.

称出现一个锁具能与其它两个锁具互开的情况为一个二分叉,能与其它三个锁具互开的情况为三分叉,依次类推.在一箱锁具中,出现一个锁具被(至少三个)其它锁具打开的概

率 p_0 是相当小的,证明如下:(设一箱中一个给定锁具被至少三个其它锁具打开的概率为 p_1)

$$P_1 \leq \max \left\{ \sum_{l_1=3}^l \frac{\binom{l}{l_1} \binom{5879-l}{59-l_2}}{\binom{5879}{59}} : l \leq 10 \right\} \leq 0.0001$$

$$\therefore p_0 \leq 60p_1 \leq 0.006$$

所以这种情况可以忽略不计.

在剩余的情况中,我们用函数 $2x + y$ 来衡量顾客抱怨的程度.若四个锁具能分为两对,每对中两个锁具可以互开,不同对中的两个锁具不能互开,我们称之为情况 A;同时我们用情况 B 来表示三个锁具形成一个二分叉.显然,情况 A 和情况 B 都恰有两对互开的锁具,但是情况 A 可能需要报废两个锁具,情况 B 一般只需要报废一个锁具.所以我们可以说情况 A 比情况 B 更坏一些,在排除了三分叉和更多分叉的情况后,我们可以看出如果有一个锁具能被另两个不同的锁具打开(即出现情况 B),则 $2x + y$ 小于将这三把锁及另外某把锁 A 的情况且不影响其它锁具的互开关系时它的值,而且可以得出有 $n_1 = 2x - y$ 个锁具能被两个不同的锁具打开,有 $n_2 = 2(y - x)$ 个锁具能被恰好一个其它的锁具打开, (n_1 和 n_2 满足 $2n_1 + n_2 = 2x$, $n_1 + n_2 = y$) 其它的锁具都不会被箱中任意别的锁具打开.这样当每增加一对锁具能互相打开而不影响其它锁具的互开关系时 $2x + y$ 将增大.可见, $2x + y$ 对 A 和 B 这两种情况给予了恰当的区分.由此可知 $2x + y$ 在绝大多数情况下比较好地描述了顾客的不满意程度.根据计算机模拟的结果可得到 $2x + y$ 对 A 和 B 这两种情况给予了恰当的区分.由此可知 $2x + y$ 在绝大多数情况下比较好地描述了顾客的不满意程度.根据计算机模拟的结果可得到 $2x + y$ 的数学期望值是

$$E(2x + y) = 2Ex + Ey = 2 \times 2.33 + 4.43 = 9.09.$$

另外当箱数为二时,计算可得存在一个锁具被另外四个锁具打开的概率小于百分之二,所以这种情况也可以忽略不计.这时 $2x + y$ 仍能比较好地反映顾客的不满意程度.此时的数学期望值为

$$E(2x + y) = 2Ex + Ey = 2 \times 9.40 + 17.39 = 36.19.$$

为了更精确地描述顾客的不满意程度,我们引进新的参数 y_1 和 y_2 . y_1 为能被箱中某个另外的锁具的个数, y_2 为能被箱中某个另外的锁具打开的偶锁具的个数.我们用 $u = y_1 y_2$ 表征顾客不满意程度.由一条变时,顾客的不满意程度也变大.容易看出 u 很好的反映了这种要求.另外我们可以考虑另一个参数 a 为最少要报废的锁具数目(即顾客使用其它的锁具可以做到任意两把锁具不可以互开).从经济的角度来看, a 十分精确地反映了顾客的不满意程度.而且可以看出 a 大致为 $\min(y_1, y_2)$, 由于 y 的分布已由计算机模拟得出,而且 x 的分布用 poisson 分布 ($\lambda = 2.33$) 较好地逼近,所以 u 中包含了相当多的 a 信息量.由于 a 的分布很难用数学方法或计算机模拟得到,而 u 的分布在箱数不多时用计算机可以很快得到,所以我们采用 u 作为表征顾客不满意程度的量.

下面估算 u 中包含 a 的信息量 $I(u, a)$ 与 a 的熵值 $H(a)$ 的比值(即 u 反映 a 的程度):当箱数为一时,由计算机模拟得到的 $c = \min(y_1, y_2)$ 的分布 ($t = 1000$) 知:

$$P\{a = 0\} = P(u = 0) = 0.102$$

$$0.224 = P\{u=1\} \leq P\{a=1\} \leq P\{u=1\} + P\{u=2\} + 0.01 = 0.274$$

$$0.614 \leq P\{a \geq 2\} \leq 0.664$$

所以

$$H(a) \geq 0.84$$

$$\frac{H_u(a)}{H(a)} = \sum_{k=0}^{900} P\{u=k\} \frac{H_{u-k}(a)}{H(a)}$$

$$\leq -0.0061 \ln 0.006 - 0.049 \ln 0.049 \leq 0.15$$

$$(1) \quad \frac{I(u,a)}{H(a)} \geq 0.85, I(u,a) \geq 0.7$$

注:分三种情况

A) 存在一把锁可以被与它不同的三把锁打开.

B) $0 \leq u \leq 20$, 且不在 A) 中.

C) $21 \leq u \leq 900$, 且不在 A) 中.

由此很容易看出熵值估计式的正确性.

由(1)式知道如果给定 u , 则在大约百分之八十五以上的程度上决定了 a , 所以我们取 u 作为表征量是十分合理的.

3. 模型的评价

我们的模型对下述情况没有给出很好的描述: 抱怨函数较大但团体顾客因为实际需要报废的锁具数并不多而不十分抱怨. 这是一种“好”的情况(销售部门担心的是对团体顾客抱怨互开的程度估计不足), 这类情况里较多的出现二分叉、三分叉等, 前面已指出这类情况发生的概率很小. 发生概率较大的是接近极坏的情况, 二分叉、三分叉等出现较少, 需要报废的锁具数目与 x 十分接近, 此时 $y \approx 2x$, $2x + y \approx 4x$, $\sqrt{y_1 y_2} \approx x$, 可见两种抱怨函数在多数情况下是一致的.

在以上的讨论中, 我们认为两个锁具只要满足互开时锁具对应槽的高度关系就能互开的概率 $p=1$, 事实上并不能保证它们一定能互开, 即应有 $0 < p < 1$, 若某个团体顾客购买的锁具中存在 n 对满足互开时锁具对应槽的高度关系, 如果认为每一对都有概率 p 的可能互开, 那么实际能互开的锁具的对数(数学期望) 大约为 pn . 因此对生产厂家来说, 通过提高工艺水平来降低 p , 可以降低团体顾客抱怨互开的程度.

关于“锁具装箱”问题的评阅工作

中国科学院系统科学研究所

项可凤

“锁具装箱”问题(B题)送交评阅的试卷共 58 份,由于经过赛区筛选,卷子质量普遍较好,绝大多数卷子都达到或超过组委会所提供的参考答案的要求.根据这样情况,我们评阅小组认为凡是未达到参考答案要求,或文字表达极差的卷子,经评卷小组成员半数以上认定,评卷组长确认,按未达到标准而被淘汰.这样,在阅卷第一阶段,就淘汰了 17 份卷子.评卷的第二阶段要在余下的 41 份卷子中,评选出全国一等奖.对于一等奖,我们认为其内容上必须超过参考答案要求,特别在下述几个方面,至少要在二、三个问题上有创见或特色:

1)不能互开锁具的最大数的论证

这是一个较难的理论问题.参考答案只要求按槽高之和的奇偶分成二类,各分装 49 箱,2940 把锁不能互开.但 2940 是否为不能互开的最大数呢?有少量卷子用图论方法给出讨论或给出算法.我们认为,能在这个问题上给出论证本身就反映学生思考问题的严密性和解决理论问题的能力.

2)关于装箱销售问题

在这个问题上,大多数卷子仅仅讨论了按槽高之和的奇偶标记分箱,可以保证团体顾客购买不超过 49 箱时,不会出现互开问题.我们认为仅讨论到这一步还不够.在门市销售中,实际的顾客流是序贯的.有少量卷子,讨论了序贯销售时,装箱的标记方法,按此方法,在连续销售中,可以保证任意购买不超过 42 箱均不会出现互开问题,这样的讨论就更深入和符合实际了.

3)关于顾客抱怨程度

这个问题灵活性较大,没有固定解答,学生有较大发挥余地,答案也是形形色色的.但大部分卷子都用平均互开总对数,或它的单调增函数去定义抱怨程度.因此,购买箱数越多,抱怨程度越大.我们认为这样定义抱怨函数有一定不合理性.因为购买越多,自然互开概率越大,这是顾客所意料中的,不应有太多的抱怨.顾客所不能容忍的是在购买少量锁具而出现互开现象.因此,我们更欣赏把购买箱数作为一个因素考虑到抱怨函数中.理想的抱怨函数应该是,开始随购买量增加而增加,到一定量后下降,这才更合理.

4)在参赛的卷子中,普遍存在不重视文字表述问题.我们认为,入选一等奖的卷子,必须文字叙述清楚、简练、流畅.

根据上述 4 条原则,经过评卷小组成员反复地横向比较,一致同意确定 15 份优秀卷子,作为全国一等奖提名.

最后,余下 26 份卷子都是至少有评卷小组成员半数以上同意入选的,自然就是全国二等奖.在二等奖中,成绩跨度较大,这是因为数学建模竞赛和一般竞赛不同,它没有标准答案,只能从横向比较中确定优劣.