

Valeurs a connaître:

Paramètre	Valeur normale	Unités	Commentaire
pH	7,35 - 7,45	-	Équilibre acido-basique
HCO ₃ ⁻	22 - 26	mmol/L	Réserve alcaline
PaCO ₂	35 - 45	mmHg	Pression partielle en CO ₂ artériel
Chlorémie	98 - 106	mmol/L	Anion principal du liquide extracellulaire
Kaliémie	3,5 - 5	mmol/L	Principal cation intracellulaire
Glycémie à jeun	0.70 - 1.10	g/L	Source d'énergie principale
Calcémie totale	2,2 - 2,6	mmol/L	Calcium lié aux protéines et ionisé
Calcium ionisé	1,1 - 1,3	mmol/L	Forme active du calcium
Calcium corrigé	Calculé (voir en dessous)	mmol/L	Corrige l'influence de l'albuminémie
Albuminémie	35 - 50 g/L	g/L	Protéine plasmatique
Osmolarité plasmatique	280 - 295	mosm/L	Concentration totale des particules
Osmolarité plasmatique effective	275 - 290	mosm/L	Concentration effective des particules
Trou osmotique	< 10	mosm/L	Écart entre l'osmolarité mesurée et calculée
Natrémie	135 - 145	meq/L	Principal cation extracellulaire
Natriurèse	20	mmol/L	Excrétion urinaire de sodium
PaO ₂	75 - 100	mmHg	
Urée	0,18 - 0,45	g/L	Produit du métabolisme protéique
Créatinine	7 - 13	mg/L	Marqueur de la fonction rénale
ASAT (SGOT)	10 - 40	UI/L	Enzyme principalement hépatique
Lipasémie	< 160	UI/L	Enzyme pancréatique

- Hypoglycémie < 0,6 g/L
- Ca corrigé = (ca mesurée + ((40 - albuminémie) x 0,02)
- OsmPc = (Na x 2) + glycémie + urée (mmol/L) = 280 - 295 mosm/L
- OsmPc active = Tonicité plasmatique = (Na x 2) + glycémie (mmol/L) = 275 - 290 mosm/L
- Na corrigée = Na labo + 0,3 (Δ glycémie)

N.B: 1 g de glucose = 5 mmol

- PaO₂ < 60 => hypoxémie
- PaCO₂ > 45 => Hypercapnie

TA = Na⁺ - (Cl⁻ + HCO₃⁻) = 12 +/- 2mmol/L