

Biosintética

# amoxicilina + clavulanato de potássio

Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999

## APRESENTAÇÕES

Comprimidos revestidos: frascos com 14 ou 20 comprimidos.

## USO ORAL

## USO ADULTO

## COMPOSIÇÃO

Cada comprimido revestido de amoxicilina + clavulanato de potássio contém:  
amoxicilina..... 875 mg  
(equivalente a 1.005 mg de amoxicilina tri-hidratada)  
ácido clavulânico..... 125 mg  
(equivalente a 149 mg de clavulanato de potássio)  
Excipientes: dióxido de silício, estearato de magnésio, amidoglicolato de sódio, celu-  
lose microcristalina, crospovidona, citrato de trietila, etilcelulose, hipromelose, talco e  
dióxido de titânio.

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

A amoxicilina + clavulanato de potássio é um antibiótico usado em adultos indicado para tratamento de infecções em diferentes partes do corpo que são causadas por deter-  
minados tipos de bactérias.

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Amoxicilina + clavulanato de potássio é um antibiótico que age eliminando as bactérias que causam infecções. O medicamento contém duas diferentes substâncias ativas deno-  
minadas amoxicilina e ácido clavulânico.

A amoxicilina pertence à família das penicilinas. O ácido clavulânico pode ajudar na  
proteção da amoxicilina.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Amoxicilina + clavulanato de potássio não é indicado para pacientes com alergia a be-  
talactâmicos, como penicilinas e cefalosporinas. Amoxicilina + clavulanato de potássio  
não é indicado para pacientes que já tiveram icterícia (acúmulo de bilirrubina, que cau-  
sa coloração amarelada da pele) ou problemas de funcionamento do fígado associados  
ao uso de amoxicilina + clavulanato de potássio ou de penicilina.

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Antes de iniciar o tratamento com amoxicilina + clavulanato de potássio, seu médico  
deve fazer uma pesquisa cuidadosa de suas possíveis reações alérgicas a penicilinas,  
cefalosporinas ou outras substâncias que provocam alergia (alérgenos). Houve relatos  
de reações alérgicas graves e potencialmente fatais (incluindo reações anafiláticas e  
reações adversas sérias na pele) em pacientes que receberam tratamento com penicili-  
na. Essas reações ocorrem com mais facilidade em pessoas que já apresentaram alergia  
à penicilina.

O uso prolongado de amoxicilina + clavulanato de potássio pode, ocasionalmente, re-  
sultar em crescimento exagerado de microrganismos não sensíveis a este medicamento.  
Foi relatada colite pseudomembranosa (inflamação no cólon) com o uso de antibióti-  
cos, que pode ter gravidade variada entre leve e risco à vida. Se você apresentar diarreia  
prolongada ou significativa, ou sentir cólicas abdominais, o tratamento deve ser inter-  
rompido imediatamente e seu médico irá avaliar sua condição física.

Seu médico deve fazer o monitoramento apropriado de possíveis reações se você pre-  
cisar usar anticoagulantes orais ao mesmo tempo que amoxicilina + clavulanato de  
potássio. Pode ser necessário realizar alguns ajustes de dose do anticoagulante oral.  
Converse com seu médico caso você use esses medicamentos.

A amoxicilina + clavulanato de potássio deve ser usado com cautela em pacientes que  
apresentam problemas de fígado.

Em pacientes com problemas nos rins a dosagem de amoxicilina + clavulanato de po-  
tássio deve ser ajustada de acordo com o grau de disfunção. Se é o seu caso, consulte o  
médico para que ele defina o ajuste correto a fazer.

Durante a administração de altas doses de amoxicilina + clavulanato de potássio, é re-  
comendável manter ingestão adequada de líquidos para evitar cristalúria (formação de  
cristais na urina), associada ao uso da amoxicilina (ver “O Que Fazer se Alguém Usar  
uma Quantidade Maior do Que a Indicada Deste Medicamento?”).

Seu médico deve considerar a possibilidade de superinfecções por fungos ou bactérias du-  
rante o tratamento. Se ocorrer superinfecção, ele poderá recomendar a descontinuação do  
tratamento com amoxicilina + clavulanato de potássio e prescrever a terapia apropriada.

### Efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e de operar máquinas

Não se observaram efeitos adversos sobre a capacidade de dirigir veículos e de operar  
máquinas.

### Gravidez e Lactação (amamentação)

Caso você fique grávida durante ou logo após o tratamento com amoxicilina + clav-  
ulanato de potássio, suspenda a medicação e avise imediatamente seu médico. Como  
ocorre com todos os medicamentos, o uso de amoxicilina + clavulanato de potássio  
deve ser evitado na gravidez, especialmente durante o primeiro trimestre, a menos que  
o médico o considere essencial.

Você pode tomar amoxicilina + clavulanato de potássio durante o período de amamen-  
tação. Não há efeitos nocivos conhecidos para o bebê lactente.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação  
médica ou do cirurgião-dentista.**

### Interações medicamentosas

Converse com seu médico antes de iniciar o tratamento com amoxicilina + clavulanato  
de potássio, caso você esteja usando algum dos medicamentos a seguir:

O uso simultâneo de amoxicilina + clavulanato de potássio com probenecida (utilizada  
em associação com outros medicamentos no tratamento de infecções) não é recomen-  
dável.

O uso de alopurinol (utilizado no tratamento da gota) durante o tratamento com amoxi-  
cilina, um dos componentes de amoxicilina + clavulanato de potássio, pode aumentar a  
probabilidade de reações alérgicas da pele.

Como ocorre com outros antibióticos, amoxicilina + clavulanato de potássio pode afe-  
tar a flora intestinal, causando menor reabsorção de estrógenos, e assim reduzir a eficá-  
cia dos contraceptivos (anticoncepcionais) orais combinados (medicamentos utilizados  
para evitar a gravidez).

A amoxicilina + clavulanato de potássio deve ser usado com cautela em pacientes sob  
tratamento com anticoagulantes orais, como acenocumarol e varfarina, devido ao maior  
risco de sangramento.

A amoxicilina + clavulanato de potássio deve ser usado com cautela em pacientes sob  
tratamento com dissulfiram, utilizado no tratamento do alcoolismo e micofenolato de  
mofetila, utilizado para prevenção da rejeição em transplantes.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum  
outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para  
a sua saúde.**

### 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDI- CAMENTO?

#### Cuidados de armazenamento

Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade. O  
medicamento deve ser armazenado na embalagem original até sua total utilização.

#### Aspectos físicos/características organolépticas

Comprimido revestido, branco a levemente amarelado, com forma alongada e sulcado  
em ambos os lados.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**


**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua emba-  
lagem original.**

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de va-  
lidade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para  
saber se poderá utilizá-lo.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS  
CRIANÇAS.**

### 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Pressione e gire para abrir o medicamento, conforme a figura abaixo:



#### Modo de usar

##### Uso oral

Os comprimidos devem ser engolidos inteiros, sem mastigar. Se necessário, podem ser  
partidos pela metade e engolidos, mas não mastigados.

Para reduzir o desconforto gastrointestinal (ou seja, no estômago ou intestino), tome os  
comprimidos no início da refeição.

##### Posologia

Um comprimido de amoxicilina + clavulanato de potássio, duas vezes ao dia.

##### Pacientes com insuficiência renal (dos rins)

Para pacientes com comprometimento moderado do funcionamento dos rins TFG ≥30  
mL/min, nenhum ajuste de dosagem é necessário. Para pacientes com comprometimen-

to grave do funcionamento dos rins TFG <30 mL/min, o uso de amoxicilina + clavulanato de potássio não é recomendável.

**Pacientes com insuficiência hepática (do fígado)**

Quem tem problemas de fígado deve usar amoxicilina + clavulanato de potássio com cautela, e o médico deve monitorar a função hepática do paciente em intervalos regulares. No momento, os dados existentes são insuficientes para servir como base de recomendação de dosagem.

A duração do tratamento deve ser apropriada para a indicação e não se deve exceder 14 dias sem revisão médica. O tratamento pode iniciar-se por via intravenosa e continuar com uma preparação oral.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.**

**Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

**Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.**

**7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Se você esquecer uma dose, tome-a assim que se lembrar, mas continue com o horário normal das demais. Só não tome duas doses com intervalo menor que 4 horas.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

**8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

As reações adversas estão listadas abaixo de acordo com a frequência.

**Reação muito comum (ocorre em 10% dos pacientes que utilizam este medicamento)**

- diarreia (em adultos).

**Reações comuns (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento)**

- candidíase mucocutânea (infecção causada por fungo), caracterizada pela presença de lesões esbranquiçadas em boca e mucosas;  
- diarreia, enjoo e vômito (essas reações podem ser reduzidas com o uso de amoxicilina + clavulanato de potássio no início de uma refeição em crianças).

**Reações incomuns (ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento)**

- tontura;  
- dor de cabeça;  
- desconforto abdominal;  
- aumento moderado de enzimas do fígado (como AST ou ALT), erupções na pele, coceira e vermelhidão.

**Reações raras (ocorrem de 0,01% a 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento)**

- diminuição reversível de glóbulos brancos (células de defesa) e diminuição de plaquetas (células responsáveis pela coagulação) do sangue;  
- eritema multiforme (lesões das mucosas e da pele).

**Reações muito raras (ocorrem em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento)**

- falta de glóbulos brancos, que pode resultar em infecções frequentes, como febre, calafrios, inflamação da garganta ou úlceras na boca;  
- baixa contagem de plaquetas, que pode resultar em sangramento ou hematomas (manchas roxas que surgem com mais facilidade que o normal);  
- destruição de glóbulos vermelhos e consequentemente anemia, que pode resultar em cansaço, dores de cabeça e falta de ar causada pela prática de exercícios físicos, vertigem, palidez e amarelamento da pele e/ou dos olhos;  
- sinais repentinos de alergia, tais como erupções da pele, prurido (coceira) ou urticária, inchaço da face, dos lábios, da língua ou de outras partes do corpo, falta de ar, respiração ofegante ou problemas para respirar; se esses sintomas ocorrerem, pare de usar o medicamento e procure socorro médico o mais rápido possível;  
- convulsões podem ocorrer em pacientes com função renal prejudicada ou que estejam recebendo doses altas do medicamento;  
- hipercinesia (presença de movimentos exacerbados e incontroláveis), tontura;  
- efeitos relacionados ao sistema digestivo, como diarreia grave, que também pode conter sangue e ser acompanhada de cólicas abdominais;  
- sua língua pode mudar de cor, ficando amarela, marrom ou preta, e dar a impressão de ter pelos;  
- efeitos relacionados ao fígado; esses sintomas podem manifestar-se como enjoo, vômito, perda de apetite, sensação geral de mal-estar, febre, coceira, amarelamento da pele e dos olhos e escurecimento da urina. As reações relacionadas ao fígado podem ocorrer até dois meses após o início do tratamento;  
- sintomas semelhantes aos da gripe com erupção cutânea, febre, glândulas inchadas e resultados anormais de exames de sangue (incluindo o aumento dos glóbulos brancos (eosinofilia) e enzimas hepáticas) (Reação do medicamento com eosinofilia e sintomas sistêmicos (DRESS)).

**Outras reações adversas**

- trombocitopenia púrpura;  
- ansiedade, insônia e confusão mental (relatos raros);  
- glossite (inflamação e inchaço da língua).

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

**9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

É pouco provável que ocorram problemas em caso de superdosagem de amoxicilina + clavulanato de potássio. Se houver efeitos gastrintestinais evidentes, como enjoo, vômito e diarreia, procure seu médico para que os sintomas sejam tratados.

A amoxicilina + clavulanato de potássio pode ser removido da circulação por hemodiálise.

Observou-se a formação de cristais na urina após o uso da amoxicilina.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento se possível. Ligue para 0800 722 6001 se você precisar de mais orientações.**

**DIZERES LEGAIS**

MS – 1.0573.0535.

Farmacêutica Responsável: Gabriela Mallmann - CRF-SP nº 30.138

Registrado por:

**Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.**

Av. Brigadeiro Faria Lima, 201 - 20º andar

São Paulo - SP

CNPJ 60.659.463/0029-92

Indústria Brasileira

Fabricado por:

Sandoz GmbH

Kundl - Áustria

Importado por:

**Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.**

Av. das Nações Unidas, 22.428 - São Paulo - SP

Embalado por:

Blisfarma Antibióticos Ltda.

Diadema - SP

Ou

Sandoz GmbH

Kundl - Áustria

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA  
SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA**

**Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em 14/11/2018.**



BU150087100 BU 01a VP 01/19