

# SANASAR®

benzoato de benzila

250mg/mL

HERTZ®

## Forma Farmacêutica e Apresentação:

Emulsão tópica: Frasco com 100 mL

## USO ADULTO E PEDIÁTRICO

### USO EXTERNO

### Composição

Cada mL de SANASAR emulsão contém:  
benzoato de benzila ..... 250 mg  
Veículo\* q.s.p. .... 1mL  
\* simeticona, ácido oléico, hidróxido de sódio, metilparabeno, propilparabeno, lauril sulfato de sódio, essência de cravo, goma xantana, propilenoglicol e água deionizada.

### Informações ao Paciente

SANASAR, quando aplicado topicamente (uso externo), em concentrações de 10% a 30%, atua, eficazmente e seletivamente, na escabiose (sarna) e pediculose (piolhos e lêndeas), destruindo o ecto-parasita causador da moléstia, sem prejudicar o hospedeiro. Evitar calor excessivo (temperatura superior a 40°C). Manter sempre bem fechado. O produto se conserva estável por um período de 24 meses, a partir da data da sua fabricação.

O prazo de validade está gravado nas embalagens. Não use medicamento com o prazo vencido.

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez, na vigência do tratamento ou após o seu término. O uso em gestantes e crianças deve obedecer cuidados e observações rigorosos.

Diluir com água (crianças: 3 partes de água; idosos: igual volume de água) para amenizar a irritação local.

Não amamentar durante o tratamento.

Como normas gerais de higiene, recomenda-se:

- Ferver as roupas de cama e de uso pessoal, mantendo-as limpas;
- Manter as unhas curtas e limpas. No caso de pediculose (piolhos) e ftiase (chatos), manter os cabelos curtos e limpos;
- Não coçar exageradamente e colocar luvas de proteção nas crianças;
- Evitar o contato com possíveis portadores e seus objetos de uso;
- Alertar os responsáveis pelas instituições coletivas frequentadas pelo portador da parasita.

### Manter o produto longe dos olhos.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Se houver interrupção do tratamento, pode ocorrer reinfestação.

Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis tais como: vertigens, náuseas, vômitos, diarreias, cefaléias e reações cutâneas.

### TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

O produto é contraindicado nos casos de hipersensibilidade ao benzoato de benzila, lesões da pele, feridas abertas, queimaduras ou condições que possibilitem maior absorção. Caso ocorra hipersensibilidade ao produto, consultar o médico. Evitar o contato do produto com os olhos e mucosas.

Evitar a contaminação de alimentos pelo produto.

Não reutilizar a embalagem vazia.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

## NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

### Informações Técnicas

**Características:** O benzoato de benzila corresponde ao éster fenilmetílico do ácido benzóico. Seu mecanismo de ação provável atua no sistema nervoso do parasita, causando sua morte.

### Indicações

No tratamento das ectoparasitoses, pediculoses (piolhos e lêndeas) e escabioses (sarna).

### Contraindicações

Hipersensibilidade ao benzoato de benzila. O risco / benefício deve ser avaliado em inflamações epidérmicas agudas, escoriações abertas ou feridas com exsudato.

### Precauções e Advertências

SANASAR é indicado somente para uso externo. Não deve ser ingerido ou inalado. Não amamentar durante o tratamento. O uso em gestantes e crianças deve obedecer cuidados e observações rigorosos.

Diluir com água (crianças: 3 partes de água; idosos: igual volume de água) para amenizar a irritação local.

Evitar o contato com olhos e mucosas.

**Interações Medicamentosas:** Não há relatos até o momento.

**Interferência em exames:** Não há relatos até o momento.

### Reações Adversas/ Colaterais

Irritação local. Embora raro, é possível ocorrer reações de hipersensibilidade ou absorção maior que o comum, tais como: vertigem, cefaléia, náuseas, vômitos, diarreia, convulsões, dispnéias e reações cutâneas.

### Posologia

Tomar banho quente com o sabonete e, antes que o corpo esteja completamente enxuto, aplicar a emulsão no corpo inteiro abaixo do pescoço e deixar secar. Lavar o resíduo e reaplicar o produto em 24 horas. Para o

tratamento do couro cabeludo, proceder à limpeza também com água quente e sabão, retirar o excesso de água e massagear o couro cabeludo com o produto, deixando secar naturalmente. Repetir o mesmo processo após 24 horas. Fazer a aplicação por 3 noites seguidas.

SANASAR Emulsão deve ser reaplicado por mais 8 a 14 dias, após a primeira aplicação, devido a possível reinfestação por permanência de ovos. Caso a pele apresente lesões, estas devem ser tratadas antes de iniciar o tratamento com benzoato de benzila.

### Superdosagem

No caso de ingestão accidental, o tratamento é, principalmente, de suporte. Deve-se induzir ao vômito, nos indivíduos conscientes e realizar lavagem gástrica nos inconscientes. No caso de superdosagem, os sintomas mais comuns são: excitação central, dermatite de contato e retenção urinária. Procure orientação médica.

### Pacientes Idosos

Para amenizar a irritação local, deve-se diluir SANASAR emulsão em igual volume de água.

### SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

**CONSERVAÇÃO:** Conservar o produto em sua embalagem original e em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

**Data de fabricação, data de vencimento e lote:** Vide cartucho.



**SAC 0800 7049001**  
www.kleyhertz.com.br

**KLEY HERTZ S.A - Indústria e Comércio**  
Rua Com. Azevedo, 224 - Porto Alegre - RS  
Farmacêutica Resp.: Paula Camiel Antonio  
CRF-RS 4228 - Reg. no M.S. 1.0689.0013  
C. N. P. J. nº 92.695.691/0001-03  
INDÚSTRIA BRASILEIRA