

1. 二项式定理推广

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{n-k} x^k$$

$$\text{当 } x=1 \text{ 时 } 2^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

$$\text{当 } x=-1 \text{ 时 } \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

$$(2) \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k = \frac{1}{1+x} = (1-x+x^2-x^3+\dots)$$

$$(3) \sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x} = (1+x+x^2+x^3+\dots) \quad (1+x^k+x^{2k}+x^{3k}+\dots) = \frac{1}{1-x^k}$$

等比数列求和公式: $\frac{a_1 - a_n q}{1-q}$

$$(4) \frac{1}{(1+x)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \binom{n+k-1}{k} x^k$$

$$\frac{1}{(1-x)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} x^k = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{n-1} x^k$$

$$(5) \text{广义二项式定理: 当 } |r| < 1 \text{ 时有 } (1-r)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} r^k$$

$$(6) e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

2. 普通母函数解决组合问题

给定一个无穷序列 (a_0, a_1, \dots, a_n) 称 $f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$ 为序列 $(a_0, a_1, \dots, a_n, \dots)$ 的

普通母函数

求重集 $B = \{\infty \cdot a, 3 \cdot b, 5 \cdot c, 7 \cdot d, \}$ 的 10-组合数.

解: 设重集 B 的 n 组合数为 a_n 则 $\{a_n\}$ 的普通母函数为

$$f(x) = (1+x+x^2+\dots) (1+x+x^2+x^3) (1+x+x^2+x^3+\dots x^5) (1+x+\dots x^7)$$

$$= \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1-x^4}{1-x} \cdot \frac{1-x^6}{1-x} \cdot \frac{1-x^8}{1-x}$$

$$= (1-x^4-x^6-x^8+x^{10}+x^{12}+x^{14}-x^{18}) \cdot \frac{1}{(1-x)^4}$$

$$= (1-x^4-x^6-x^8+x^{10}+x^{12}+x^{14}-x^{18}) \sum_{k=0}^{\infty} \binom{3+k}{k} x^k$$

$$a_{10} = \binom{3+10}{10} - \binom{3+6}{6} - \binom{3+4}{4} - \binom{3+2}{2} + 1 = 158$$

例 证明 从 n 个不同物体中允许重复选取 r 个物体的方式数是 $F(n, r)$

证明: 设 a_k 为所求的 k 组合数 则 $\{a_k\}$ 的母函数为

$$f(x) = (1 + x + x^2 + \dots)^n$$

$$= \frac{1}{(1-x)^n}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} x^k$$

$$\text{可得 } x^r \text{ 的系数为 } a_r = \binom{n+r-1}{r} = F(n, r)$$

例 求从 n 个不同物体中允许重复选取, 但每个物体出现奇数次的方式

解: 设 a_r 为所求的 r 组合数 则 $\{a_r\}$ 的母函数是

$$f(x) = (x + x^3 + x^5 + \dots)^n$$

$$= x^n (1 + x^2 + x^4 + \dots)^n$$

$$= x^n \left(\frac{1}{2} (1 + x + x^2 + \dots + 1 - x + x^2) \right)^n$$

$$= x^n \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} \right) \right)^n = \frac{x^n}{(1-x^2)^n}$$

由广义二项式定理可得

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} x^{2k+n}$$

$$\text{令 } k = \frac{r-n}{2} \text{ 可得}$$

$$f(x) = \sum_{r=n}^{\infty} \binom{n + \frac{r-n}{2} - 1}{\frac{r-n}{2}} x^r$$

$$a_r = \binom{n + \frac{r-n}{2} - 1}{\frac{r-n}{2}} = F(n, \frac{r-n}{2})$$

4.8 求从 n 个不同的物体中允许重复的取 r 个物体, 但每个物体至少出现 3 次的方式数.

解: 设 a_r 为所求的 r 组合数 则 $\{a_r\}$ 的母函数为

$$f(x) = (x^3 + x^4 + x^5 + \dots)^n$$

$$= x^{3n} (1 + x + x^2 + \dots)^n$$

$$= \frac{x^{3n}}{(1-x)^n} = x^{3n} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} x^k$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} x^{3n+k}$$

$$\text{令 } k = r - 3n \text{ 可得}$$

$$f(x) = \sum_{r=3n}^{\infty} \binom{n + (r-3n) - 1}{r-3n} x^r$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} f(n, r-3n) x^r$$

$$a_r = f(n, r-3n)$$

4.10 有两颗骰子，每个骰子六个面上刻有 1, 2, 3, 4, 5, 6 个点. 问掷骰子后，点数之和为 r ，两颗骰子的点数有多少种搭配方式？

解: $f(x) = (1+x+x^2+\dots+x^6)^2$
 x^r 的系数 a_r 即为搭配方式

4.11 设有重量分别为 1 克、2 克、3 克、5 克和 7 克的砝码（砝码的数量不限）去称重量为 r 克的物体的方式数为 a_r ，求序列 $(a_1, a_2, \dots, a_r, \dots)$ 的普通母函数.

解: 该问题可转换为求

$B = \{\infty \cdot 1, \infty \cdot 2, \infty \cdot 3, \infty \cdot 5, \infty \cdot 7\}$ 的 r 组合数

$$f(x) = (1+x+x^2+\dots)(1+x^2+x^4+\dots)(1+x^3+x^6+\dots)(1+x^5+x^{10}+\dots)(1+x^7+x^{14}+\dots)$$

1 重量体现在指数上

$$= \frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)(1-x^5)(1-x^7)}$$

3. 指数母函数解决排列问题

给定一个无穷序列 (a_0, a_1, \dots) 那么

$$f_e(x) = a_0 + a_1 \frac{x}{1!} + a_2 \frac{x^2}{2!} + \dots + a_n \frac{x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^n}{n!}$$

4.15 设 a_r 表示重集 $B = \{4 \cdot A, 1 \cdot B, 2 \cdot C, 1 \cdot D, 2 \cdot E, \}$ 的 r -排列的个数，求序列 $(a_0, a_1, a_2, \dots, a_r, \dots)$ 的指数母函数.

解: $f_e(x) = (1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!}) (1 + \frac{x}{1!})^2 (1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!})^2$

4.16 求在重集 $B = \{\infty \cdot 1, \infty \cdot 2, \infty \cdot 3\}$ 中，0 出现偶数次的长为 r 的字的个数.

解: $f_e(x) = (1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots) (1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots)^3$
 x^r 的系数 a_r 即为所求的排列数

4.14 求由数字 2, 3, 4, 5, 6, 7 组成的 r 位数中，3 和 5 都出现偶数次，2 和 4 至少出现一次的 r 位数的个数.

解: $f_e(x) = (1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots)^2 (\frac{x}{1!} + \frac{x^3}{3!} + \dots)^2 (1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots)^2$
 $= (\frac{e^x + e^{-x}}{2})^2 \cdot (e^x - 1)^2 \cdot e^{2x}$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{4}(e^{2x} + e^{-2x} + 2)(e^{2x} - 2e^x + 1) \cdot e^{2x} \\
&= \frac{1}{4}(e^{4x} - 2e^{3x} + e^{2x} + 1 - 2e^x + e^{-2x} + 2e^{2x} - 4e^x + 2)e^{2x} \\
&= \frac{1}{4}(e^{6x} - 2e^{5x} + e^{4x} + e^{2x} - 2e^x + 1 + 2e^{4x} - 4e^{3x} + 2e^{2x}) \\
&= \frac{1}{4}(e^{6x} - 2e^{5x} + 3e^{4x} - 4e^{3x} + 3e^{2x} - 2e^x + 1) \\
&= \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{\infty} (6^k - 2 \cdot 5^k + 3 \cdot 4^k - 4 \cdot 3^k + 3 \cdot 2^k - 2) \frac{x^k}{k!} + 1
\end{aligned}$$

可得 $a_k = \begin{cases} 0, & k=0 \\ \frac{1}{4}(6^k - 2 \cdot 5^k + 3 \cdot 4^k - 4 \cdot 3^k + 3 \cdot 2^k - 2), & k > 0 \end{cases}$

求不包含 3, 5, 7, 出现偶数次 1, 2, 至少出现一次 4, 8 的 r 位十进制数的个数.

解: 设 a_r 为所求 r 排列数
 $\{a_r\}$ 的指数母函数为

$$\begin{aligned}
f(x) &= (1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots)^2 (\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots)^2 (1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots)^3 \\
&= (\frac{e^x + e^{-x}}{2})^2 (e^x - 1)^2 e^{3x} \\
&= \frac{1}{4}(e^{7x} - 2e^{5x} + 3e^{3x} - 4e^{2x} + 3e^x - e^x) \\
&= \sum_{r=0}^{\infty} \frac{1}{4}(7^r - 2 \cdot 5^r + 3 \cdot 4^r - 4 \cdot 3^r - 2^r + 1) \frac{x^r}{r!}
\end{aligned}$$

可得 $a_r = \frac{1}{4}(7^r - 2 \cdot 5^r + 3 \cdot 4^r - 4 \cdot 3^r - 2^r + 1)$

首位取 0 的 r 位序列个数为 a_{r-1} 故所求 r 位十进制数为

$$a_r - a_{r-1} = \begin{cases} \frac{1}{4}(6 \cdot 7^{r-1} - 10 \cdot 5^{r-1} + 12 \cdot 4^{r-1} - 12 \cdot 3^{r-1} + 6 \cdot 2^{r-1} - 2 \cdot 2^{r-1}), & r > 0 \\ 0, & r = 0 \end{cases}$$

4. 用母函数证明组合恒等式