

Les Muscles Oculomoteurs

Resume structure – Dr Saadouli D

I. Introduction

Musculature **extrinseque** de l'oeil – **6 muscles**.

- Innerves par **3 paires craniennes** (NC III, IV, VI)
- Regis par la **loi de Hering** et la **loi de Sherrington**

II. Innervation

NC III – Moteur oculaire commun	Droit superieur, droit inferieur, droit medial, oblique inferieur + releveur de la paupiere sup.
NC IV – Pathetique / Trochleaire	Oblique superieur
NC VI – Moteur oculaire externe	Droit lateral

III. Origine, Trajet, Terminaison

A. Les 4 Muscles Droits

Origine commune : Tendon de Zinn au sommet de l'orbite (formation fibreuse blanc nacre → 4 bandelettes divergentes).

Trajet : divergent en eventail vers l'avant ; forment un **cone musculaire** a sommet posterieur (30-40 mm de long).

Terminaison – Spirale de Tillaux (distance limbe) :

- Droit medial : **6 mm**
- Droit inferieur : **7 mm**
- Droit lateral : **7,5 mm**
- Droit superieur : **8 mm**

B. Oblique Superieur

- **Plus long** ; muscle **digastrique**.
- Origine : tendon de Zinn (au-dessus et en dedans du trou optique).
- Trajet en 2 parties : directe (origine → trochlée) + reflechie (trochlée → globe).
- **Trochlée** (poulie en U) a 5 mm en arriere de l'angle supero-interne orbitaire.

- Terminaison : quadrant **supero-externe posterieur**.

Attention : sinusites frontales → paralysie possible de l'oblique superieur.

C. Oblique Inferieur

- **Plus court** ; seul a ne pas partir du sommet de l'orbite.
- Origine : plancher de l'orbite (antero-interne, en dehors du canal lacrymo-nasal).
- Trajet : sous le droit inferieur, s'enroule sur le globe.
- Terminaison : quadrant **infero-externe posterieur** ; 1-2 mm de la macula.

IV. Actions et Champs d'Action

Droit medial	Adduction (en dedans)
Droit lateral	Abduction (en dehors)
Droit superieur	Elevation + intorsion Champ : haut-dehors
Droit inferieur	Abaissement + extorsion Champ : bas-dehors
Oblique superieur	Abaissement + abduction + intorsion Champ : bas-dedans
Oblique inferieur	Elevation + abduction + extorsion Champ : haut-dedans

Important : **Action** ≠ **Champ d'action**. En clinique, c'est le champ d'action de chaque muscle que l'on etudie.

V. Lois de la Motilite Oculaire

Loi de Hering	Les muscles agonistes des deux yeux recoivent des innervations egales et simultanees (ex : droit lateral OD + droit medial OG en dextroversion).
Loi de Sherrington	Contraction d'un muscle entraine l' inhibition reciproque de son antagoniste ipsilateral (ex : contraction du droit medial → relachement du droit lateral).

POINTS CLES A RETENIR

- 6 muscles oculomoteurs, innerves par les NC III, IV et VI.
- Les 4 droits + l'oblique superieur naissent du tendon de Zinn.
- Spirale de Tillaux : distance limbe des droits = 6 – 7 – 7,5 – 8 mm.
- L'oblique superieur est le seul a passer par une trochlée.
- L'oblique inferieur est le seul a ne pas partir du sommet de l'orbite.
- Loi de Hering (innervation egale) + loi de Sherrington (inhibition reciproque).