2017考研数学（二）参考答案

一、选择题

(1) A

解 由 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x>0,\\ b, & x\leqslant 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，得 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=b$.

又 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x}{2ax}=\dfrac{1}{2a}=b$.

所以 $ab=\dfrac{1}{2}$.故应选 A.

(2) B

解 由 $f''(x)>0$ 知曲线 $y=f(x)$ 在$[-1,1]$上是凹的，因此当 $f(x)$ 为凹的偶函数时满足题设条件 $f(-1)=f(1)$，此时 $\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x=\int_{0}^{1}f(x)\mathrm{d}x$，显然可排除选项 C，D；

取 $f(x)=2x^2-1$，则 $f(-1)=f(1)=1$，$f(0)=-1$，$f''(x)=4>0$，

且 $\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}(2x^2-1)\mathrm{d}x=2\int_{0}^{1}(2x^2-1)\mathrm{d}x=-\dfrac{2}{3}<0$，

于是排除 A，故应选 B.

(3) D

解 取 $x_n=2\pi$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n=\lim\limits_{n\to\infty}\sin 2\pi=0$，

但 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=2\pi\neq 0$，因此选项 A 是错误的；

又取 $x_n=-1$，则

$x_n+\sqrt{|x_n|}=0$；$x_n+x_n^2=0$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+\sqrt{|x_n|})=0$；$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+x_n^2)=0$，

但 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=-1\neq 0$，于是排除 B 及 C；故应选 D.

(4) C

解 由题设条件知特征方程为：

$r^2-4r+8=0$，特征根：$\lambda_1=2+2i$，$\lambda_2=2-2i$.

对于微分方程：$y''-4y'+8y=\mathrm{e}^{2x}$ 其特解 y_1^* 可设为：

$$y_1^*=A\mathrm{e}^{2x}$$

而微分方程：$y''-4y'+8y=\mathrm{e}^{2x}\cos 2x$ 的特解 y_2^* 可设为：

$$y_2^*=x\mathrm{e}^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$$

由二阶常系数非齐次线性微分特解的结构知原方程的特解 y^* 为 y_1^* 与 y_2^* 之和，即

$$y^*=y_1^*+y_2^*=A\mathrm{e}^{2x}+x\mathrm{e}^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x).$$

故应选 C.

(5) D

解 因为对于任意的(x,y)都有 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0$，所以函数 $z=f(x,y)$ 关于自变量 x 是单

调增函数，从而知

$$f(0,1)<f(1,1) \qquad (*)$$

同理由$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$，得

$$f(1,1)<f(1,0) \qquad (**)$$

由(*)式及(**)式得

$$f(0,1)<f(1,0)$$

故应选 D.

(6) C

解 令$s_1(t),s_2(t)$表示甲，乙两人的路程，由题意，计时开始时，甲在乙前方10m，要想在t_0时刻乙追上甲，应有$s_1(t_0)-s_2(t_0)=-10$.根据题干图中阴影部分面积数值为10,20,3，可得

$t=10$时，$s_1(t)-s_2(t)=\int_0^{10}[v_1(t)-v_2(t)]\mathrm{d}t=10$.

$15<t<20$时，$s_1(t)-s_2(t)=\int_0^{t}[v_1(t)-v_2(t)]\mathrm{d}t=10+\int_{10}^{t}[v_1(t)-v_2(t)]\mathrm{d}t$

$$>10+\int_{10}^{25}[v_1(t)-v_2(t)]\mathrm{d}t=10-20=-10.$$

$t=25$时，$s_1(t)-s_2(t)=\int_0^{25}[v_1(t)-v_2(t)]\mathrm{d}t$

$$=\int_0^{10}[v_1(t)-v_2(t)]\mathrm{d}t+\int_{10}^{25}[v_1(t)-v_2(t)]\mathrm{d}t$$

$$=10-20=-10.$$

$t>25$时，$s_1(t)-s_2(t)=\int_0^{t}[v_1(t)-v_2(t)]\mathrm{d}t$

$$=\int_0^{25}[v_1(t)-v_2(t)]\mathrm{d}t+\int_{25}^{t}[v_1(t)-v_2(t)]\mathrm{d}t$$

$$=-10+\int_{25}^{t}[v_1(t)-v_2(t)]\mathrm{d}t>-10.$$

故应选 C.

(7) B

解 由$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0 & & \\ & 1 & \\ & & 2\end{pmatrix}$，可知，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=0$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=2\boldsymbol{\alpha}_3$，

所以 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3$.

(8) B

解 因为$\boldsymbol{A}$和$\boldsymbol{B}$都是上三角矩阵，所以特征值都是1,2,2.

所以，要判别$\boldsymbol{A}$和$\boldsymbol{B}$能否相似对角化，只需考察属于2的线性无关的特征向量的个数即可.

对于$\boldsymbol{A}$，属于2的线性无关的特征向量的个数$3-r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=3-1=2$.

对于$\boldsymbol{B}$，属于2的线性无关的特征向量的个数$3-r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=3-2=1$.

所以，$\boldsymbol{A}$可以和$\boldsymbol{C}$相似，但是$\boldsymbol{B}$不能.

故应选 B.

二、填空题

(9) $y=x+2$

解 因为 $a=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{y(x)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x\left(1+\arcsin\dfrac{2}{x}\right)}{x}$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\arcsin\frac{2}{x}\right)=1$$

$$b=\lim_{x\to+\infty}(y(x)-ax)=\lim_{x\to+\infty}\left[x\left(1+\arcsin\frac{2}{x}\right)-x\right]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x\cdot\arcsin\frac{2}{x}=\lim_{x\to+\infty}x\cdot\frac{2}{x}=2$$

所以 $y=ax+b=x+2$ 为已知曲线的一条斜渐近线；

当 $x\to-\infty$ 时，同理知斜渐近线仍为 $y=x+2$;

故应填 $y=x+2$.

(10) $-\dfrac{1}{8}$

解 $\because \dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\dfrac{dy}{dt}}{\dfrac{dx}{dt}}=\dfrac{\cos t}{1+e^t}$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\cdot\frac{1}{\dfrac{dx}{dt}}=\left(\frac{\cos t}{1+e^t}\right)'\cdot\frac{1}{1+e^t}$$

$$=\frac{-\sin t\cdot(1+e^t)-\cos t\cdot e^t}{(1+e^t)^2}\cdot\frac{1}{1+e^t}$$

$$=\frac{\sin t\cdot(1+e^t)+\cos t\cdot e^t}{(1+e^t)^3}$$

$$=-\frac{\sin t+(\sin t+\cos t)\cdot e^t}{(1+e^t)^3}$$

$\therefore \left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=-\dfrac{1}{8}$，故应填 $-\dfrac{1}{8}$.

(11) 1

解 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2}dx=\int_0^{+\infty}\ln(1+x)\cdot d\left(\frac{-1}{1+x}\right)$

$$=-\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x)}{1+x}+0+\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(1+x)^2}=\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(1+x)^2}$$

$$=-\left.\frac{1}{1+x}\right|_0^{+\infty}=-(0-1)=1$$

故应填 1.

(12) xye^y

解 由题意 $f'_x(x,y)=ye^y$，$f'_y(x,y)=x(1+y)e^y$.

所以有 $f(x,y)=\int f'_x(x,y)\mathrm{d}x=\int y\mathrm{e}^y\mathrm{d}x=xy\mathrm{e}^y+C(y)$.

$f'_y(x,y)=[xy\mathrm{e}^y+C(y)]'=x(1+y)\mathrm{e}^y+C'(y)=x(1+y)\mathrm{e}^y$

$\therefore C'(y)=0\Rightarrow C(y)=C$.


因此 $f(x,y)=xy\mathrm{e}^y+C$，又 $f(0,0)=0$.

所以 $C=0$. 故 $f(x,y)=xy\mathrm{e}^y$.

故应填 $xy\mathrm{e}^y$.

(13) $-\ln\cos 1$

解 由已知二次积分的上、下限可得积分区域 D 如右图所示，交换二次积分的积分次序得：



$$\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^1\frac{\tan x}{x}\mathrm{d}x=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\frac{\tan x}{x}\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1\frac{\tan x}{x}\mathrm{d}x\int_0^x\mathrm{d}y=\int_0^1\frac{\tan x}{x}\cdot y\Big|_0^x\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1\tan x\,\mathrm{d}x=-\int_0^1\frac{1}{\cos x}\mathrm{d}(\cos x)=-\ln|\cos x|\Big|_0^1$$

$$=-\ln|\cos 1|=-\ln\cos 1\quad(\because\cos 1>0)$$

故应填 $-\ln\cos 1$.

(14) -1

解 设 $\begin{pmatrix}4&1&-2\\1&2&a\\3&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$，直接解得 $a=-1$.

三、解答题

(15) **解** 令 $x-t=u$，则 $t=x-u$，$\mathrm{d}t=-\mathrm{d}u$.

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^x\sqrt{x-t}\,\mathrm{e}^t\mathrm{d}t}{\sqrt{x^3}}=\lim_{x\to0^+}\frac{\mathrm{e}^x\int_0^x\sqrt{u}\,\mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u}{\sqrt{x^3}}$$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^x\sqrt{u}\,\mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u}{\sqrt{x^3}}$$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{\sqrt{x}\,\mathrm{e}^{-x}}{\frac{3}{2}\sqrt{x}}$$

$$=\frac{2}{3}.$$

(16) **解** 因为 $y=f(\mathrm{e}^x,\cos x)$，所以

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\partial f(u,v)}{\partial u}\mathrm{e}^x-\frac{\partial f(u,v)}{\partial v}\sin x,$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\partial f(u,v)}{\partial u}\mathrm{e}^x+\left(\frac{\partial^2 f(u,v)}{\partial u^2}\mathrm{e}^x-\frac{\partial^2 f(u,v)}{\partial u\partial v}\sin x\right)\mathrm{e}^x$$

$$-\frac{\partial f(u,v)}{\partial v}\cos x-\left(\frac{\partial^2 f(u,v)}{\partial u\partial v}e^x-\frac{\partial^2 f(u,v)}{\partial v^2}\sin x\right)\sin x.$$

当 $x=0$ 时，$u=e^0=1$，$v=\cos 0=1$，所以

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=\frac{\partial f(1,1)}{\partial u},$$

$$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}=\frac{\partial f(1,1)}{\partial u}+\frac{\partial^2 f(1,1)}{\partial u^2}-\frac{\partial f(1,1)}{\partial v}.$$

(17) **解**
$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)\cdot\frac{1}{n}$$

$$=\int_0^1 x\ln(1+x)dx$$

$$=\frac{1}{2}x^2\ln(1+x)\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{x^2}{1+x}dx$$

$$=\frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{2}\int_0^1\left(x-1+\frac{1}{1+x}\right)dx$$

$$=\frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{4}(x-1)^2\Big|_0^1-\frac{1}{2}\ln(1+x)\Big|_0^1$$

$$=\frac{1}{4}.$$

(18) **解** 由 $x^3+y^3-3x+3y-2=0$，得

$$3x^2+3y^2y'-3+3y'=0,\qquad ①$$

$$6x+6y(y')^2+3y^2y''+3y''=0.\qquad ②$$

在 ① 式中令 $y'=0$ 得 $x=-1$，$x=1$.

当 x 分别取 -1 和 1 时，由 $x^3+y^3-3x+3y-2=0$ 得 $y(-1)=0$，$y(1)=1$.

将 $x=-1$，$y(-1)=0$ 及 $y'(-1)=0$ 代入 ② 式得 $y''(-1)=2$.

因为 $y'(-1)=0$，$y''(-1)>0$，所以 $y(-1)=0$ 是 $y(x)$ 的极小值.

将 $x=1$，$y(1)=1$ 及 $y'(1)=0$ 代入 ② 式得 $y''(1)=-1$.

因为 $y'(1)=0$，$y''(1)<0$，所以 $y(1)=1$ 是 $y(x)$ 的极大值.

(19) **解** (Ⅰ) 由题设知 $f(x)$ 连续且 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，所以 $f(0)=0$.

由 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}<0$ 与极限的保号性可知，存在 $a\in(0,1)$ 使得 $\dfrac{f(a)}{a}<0$，即 $f(a)<0$.

又 $f(1)>0$，所以存在 $b\in(a,1)\subset(0,1)$，使得 $f(b)=0$，即方程 $f(x)=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在一个实根.

(Ⅱ) 由(Ⅰ)知 $f(0)=f(b)=0$，根据罗尔定理，存在 $c\in(0,b)\subset(0,1)$，使得

$$f'(c)=0.$$

令 $F(x)=f(x)f'(x)$，由题设知 $F(x)$ 在区间 $[0,b]$ 上可导，且

$$F(0)=0,F(c)=0,F(b)=0.$$

根据罗尔定理，存在 $\xi\in(0,c)$，$\eta\in(c,b)$，使得 $F'(\xi)=F'(\eta)=0$，即 ξ,η 是方程 $f(x)f''(x)+(f'(x))^2=0$ 在区间 $(0,1)$ 内的两个不同实根.

(20) **解** $\iint\limits_D (x+1)^2 \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint\limits_D (x^2+2x+1)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

D 的边界曲线在极坐标系下的方程为 $r = 2\sin\theta\ (0 \leqslant \theta \leqslant \pi)$，所以

$$\iint\limits_D x^2 \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{2\sin\theta} r^3 \cos^2\theta \,\mathrm{d}r$$

$$= 4\int_0^{\pi} \sin^4\theta \cos^2\theta \,\mathrm{d}\theta$$

$$= \int_0^{\pi} \frac{1-\cos 2\theta}{2} \sin^2 2\theta \,\mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \sin^2 2\theta \,\mathrm{d}\theta - \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \cos 2\theta \sin^2 2\theta \,\mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{1}{4}\int_0^{\pi} (1-\cos 4\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$\frac{\pi}{4}.$$

又因为 $\iint\limits_D (2x+1)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint\limits_D 2x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + \iint\limits_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0 + \pi = \pi$，

所以 $\iint\limits_D (x+1)^2 \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \frac{5\pi}{4}$.

(21) **解** 曲线 $l: y = y(x)$ 在点 $P(x,y)$ 的切线方程为

$$Y - y = y'(X - x).$$

令 $X = 0$ 得 $Y_P = y - xy'$.

曲线 $l: y = y(x)$ 在点 $P(x,y)$ 的法线方程为

$$y'(Y - y) = -X + x.$$

令 $Y = 0$ 得 $X_P = x + yy'$.

由题设知 $x + yy' = y - xy'$，整理得

$$y' = \frac{y-x}{y+x} = \frac{\frac{y}{x}-1}{\frac{y}{x}+1}.$$

令 $\frac{y}{x} = u$，则 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = u + x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$，代入上述方程并分离变量得

$$\frac{1+u}{1+u^2}\mathrm{d}u = -\frac{1}{x}\mathrm{d}x.$$

两边积分得 $\arctan u + \frac{1}{2}\ln(1+u^2) = -\ln|x| + C$，

即 $\arctan\frac{y}{x} + \frac{1}{2}\ln(x^2+y^2) = C$.

因为曲线 l 过点 $(1,0)$，所以 $C = 0$，于是曲线 l 上点的坐标 (x,y) 满足的方程为

$$\arctan\frac{y}{x} + \frac{1}{2}\ln(x^2+y^2) = 0.$$

(22) **解** （Ⅰ）由 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$，知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，故 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 2$.

又因为 $\boldsymbol{A}$ 有 3 个不同的特征值，所以 $\boldsymbol{A}$ 至少有 2 个不为零的特征值，从而 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$.

故 $r(\boldsymbol{A})=2$.

（Ⅱ）由 $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，知 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$，故 $\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$ 为方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个解.

又 $r(\boldsymbol{A})=2$，所以 $\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

因为 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，所以 $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 为方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的一个特解.

故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$，其中 k 为任意常数.

(23) **解** 二次型 f 的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&-4\\1&-1&1\\-4&1&a\end{pmatrix}.$$

由题设知 $|\boldsymbol{A}|=0$. 又 $|\boldsymbol{A}|=6-3a$，于是 $a=2$.

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\lambda(\lambda+3)(\lambda-6)$，所以特征值为 $-3,6,0$.

不妨设 $\lambda_1=-3,\lambda_2=6,\lambda_3=0$.

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 属于特征值 $\lambda_1=-3$ 的单位特征向量为 $\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$；

属于特征值 $\lambda_2=6$ 的单位特征向量为 $\boldsymbol{\beta}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$；

属于特征值 $\lambda_3=0$ 的单位特征向量为 $\boldsymbol{\beta}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^{\mathrm{T}}$.

故所求的一个正交矩阵为 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$.

2016年考研数学二真题与解析

一、选择题　1—8小题．每小题4分，共32分．

1．当$x\to 0^+$时，若$\ln^{\alpha}(1+2x)$，$(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$均是比$x$高阶的无穷小，则$\alpha$的可能取值范围是（　）

（A）$(2,+\infty)$　　（B）$(1,2)$　　（C）$(\frac{1}{2},1)$　　（D）$(0,\frac{1}{2})$

【详解】$\ln^{\alpha}(1+2x)\sim 2^{\alpha}x^{\alpha}$，是$\alpha$阶无穷小，$(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}\sim\frac{1}{2^{\frac{1}{\alpha}}}x^{\frac{2}{\alpha}}$是$\frac{2}{\alpha}$阶无穷小，由题意可知$\begin{cases}\alpha>1\\ \frac{2}{\alpha}>1\end{cases}$

所以α的可能取值范围是$(1,2)$，应该选（B）.

2．下列曲线有渐近线的是

（A）$y=x+\sin x$　　（B）$y=x^2+\sin x$（C）$y=x+\sin\frac{1}{x}$　　（D）$y=x^2+\sin\frac{1}{x}$

【详解】对于$y=x+\sin\frac{1}{x}$，可知$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{y}{x}=1$且$\lim\limits_{x\to\infty}(y-x)=\lim\limits_{x\to\infty}\sin\frac{1}{x}=0$，所以有斜渐近线$y=x$

应该选（C）

3．设函数$f(x)$具有二阶导数，$g(x)=f(0)(1-x)+f(1)x$，则在$[0,1]$上（　）

（A）当$f'(x)\geq 0$时，$f(x)\geq g(x)$　（B）当$f'(x)\geq 0$时，$f(x)\leq g(x)$

（C）当$f''(x)\geq 0$时，$f(x)\geq g(x)$　（D）当$f''(x)\geq 0$时，$f(x)\leq g(x)$

【分析】此题考查的曲线的凹凸性的定义及判断方法.

【详解1】如果对曲线在区间$[a,b]$上凹凸的定义比较熟悉的话，可以直接做出判断．显然

$g(x)=f(0)(1-x)+f(1)x$就是联接$(0,f(0)),(1,f(1))$两点的直线方程．故当**$f''(x)\geq 0$时，**曲线是凹的，也就是$f(x)\leq g(x)$，应该选（D）

【详解2】如果对曲线在区间$[a,b]$上凹凸的定义不熟悉的话，可令

$F(x)=f(x)-g(x)=f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x$，则$F(0)=F(1)=0$，且$F''(x)=f''(x)$，故当

$f''(x)\geq 0$时，曲线是凹的，从而$F(x)\leq F(0)=F(1)=0$，即$F(x)=f(x)-g(x)\leq 0$，也就是

$f(x)\le g(x)$，应该选（D）

4．曲线$\begin{cases}x=t^2+7,\\ y=t^2+4t+1\end{cases}$ 上对应于$t=1$的点处的曲率半径是（　　）

（A）$\frac{\sqrt{10}}{50}$（B）$\frac{\sqrt{10}}{100}$　　(C）$10\sqrt{10}$　（D）$5\sqrt{10}$

【详解】 曲线在点$(x,f(x))$处的曲率公式$K=\frac{|y''|}{\sqrt{(1+y'^2)^3}}$，曲率半径$R=\frac{1}{K}$.

本题中$\frac{dx}{dt}=2t,\frac{dy}{dt}=2t+4$，所以$\frac{dy}{dx}=\frac{2t+4}{2t}=1+\frac{2}{t}$，$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{-\frac{2}{t^2}}{2t}=-\frac{1}{t^3}$，

对应于$t=1$的点处$y'=3,y''=-1$，所以$K=\frac{|y''|}{\sqrt{(1+y'^2)^3}}=\frac{1}{10\sqrt{10}}$，曲率半径$R=\frac{1}{K}=10\sqrt{10}$.

应该选（C）

5．设函数$f(x)=\arctan x$，若$f(x)=xf'(\xi)$，则$\lim\limits_{x\to0}\frac{\xi^2}{x^2}=$（　　）

（A）1　　（B）$\frac{2}{3}$　　（C）$\frac{1}{2}$　　（D）$\frac{1}{3}$

【详解】注意（1）$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}$，（2）$x\to0$时$,\arctan x=x-\frac{1}{3}x^3+o(x^3)$.

由于$f(x)=xf'(\xi)$．所以可知$f'(\xi)=\frac{1}{1+\xi^2}=\frac{f(x)}{x}=\frac{\arctan x}{x}$，$\xi^2=\frac{x-\arctan x}{(\arctan x)^2}$，

$$\lim_{x\to0}\frac{\xi^2}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{x-arx\tan x}{x(\arctan x)^2}=\lim_{x\to0}\frac{x-(x-\frac{1}{3}x^3)+o(x^3)}{x^3}=\frac{1}{3}.$$

6．设$u(x,y)$在平面有界闭区域D上连续，在D的内部具有二阶连续偏导数，且满足$\frac{\partial^2u}{\partial x\partial y}\neq0$及

$\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}=0$，则（　　）.

（A）$u(x,y)$的最大值点和最小值点必定都在区域D的边界上；

（B）$u(x,y)$的最大值点和最小值点必定都在区域D的内部；

（C）$u(x,y)$的最大值点在区域D的内部，最小值点在区域D的边界上；

（**D**）$u(x,y)$的最小值点在区域 *D* 的内部，最大值点在区域 *D* 的边界上.

【详解】$u(x,y)$ 在平面有界闭区域 *D* 上连续，所以$u(x,y)$在 D 内必然有最大值和最小值．并且如果在内部存在驻点(x_0,y_0)，也就是$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial y}=0$，在这个点处$A=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2},C=\frac{\partial^2 u}{\partial y^2},B=\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}$，由条件，显然$AC-B^2<0$，显然$u(x,y)$不是极值点，当然也不是最值点，所以$u(x,y)$的最大值点和最小值点必定都在区域 *D* 的边界上.
所以应该选（A）.

7．行列式$\begin{vmatrix}0&a&b&0\\a&0&0&b\\0&c&d&0\\c&0&0&d\end{vmatrix}$等于

（A）$(ad-bc)^2$　　（B）$-(ad-bc)^2$　　（C）$a^2d^2-b^2c^2$　　（D）$-a^2d^2+b^2c^2$

【详解】

$$\begin{vmatrix}0&a&b&0\\a&0&0&b\\0&c&d&0\\c&0&0&d\end{vmatrix}=-a\begin{vmatrix}a&0&b\\0&d&0\\c&0&d\end{vmatrix}+b\begin{vmatrix}a&0&b\\0&c&0\\c&0&d\end{vmatrix}=-ad\begin{vmatrix}a&b\\c&d\end{vmatrix}+bc\begin{vmatrix}a&b\\c&d\end{vmatrix}=-(ad-bc)^2$$

应该选（B）.

8．设$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是三维向量，则对任意的常数k,l，向量$\alpha_1+k\alpha_3$，$\alpha_2+l\alpha_3$线性无关是向量$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关的

（A）必要而非充分条件　　（B）充分而非必要条件
（C）充分必要条件　　（D） 非充分非必要条件

【详解】若向量$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，则

（$\alpha_1+k\alpha_3$，$\alpha_2+l\alpha_3$）$=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\k&l\end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)K$，对任意的常数$k,l$，矩阵 K 的秩都等于 2，所以向量$\alpha_1+k\alpha_3$，$\alpha_2+l\alpha_3$一定线性无关.

而当$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$时，对任意的常数$k,l$，向量$\alpha_1+k\alpha_3$，$\alpha_2+l\alpha_3$线性无关，但$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性相关；故选择（A）.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分. 把答案填在题中横线上）

9. $\int_{-\infty}^{1}\frac{1}{x^2+2x+5}dx=$_____.

【详解】$\int_{-\infty}^{1}\frac{1}{x^2+2x+5}dx=\int_{-\infty}^{1}\frac{dx}{(x+1)^2+4}=\frac{1}{2}\arctan\frac{x+1}{2}|_{-\infty}^{1}=\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{4}-(-\frac{\pi}{2})\right)=\frac{3\pi}{8}$.

10. 设 $f(x)$ 为周期为 4 的可导奇函数，且 $f'(x)=2(x-1),x\in[0,2]$，则 $f(7)=$_____.

【详解】当 $x\in[0,2]$ 时，$f(x)=\int 2(x-1)dx=x^2-2x+C$，由 $f(0)=0$ 可知 $C=0$，即 $f(x)=x^2-2x$；$f(x)$ 为周期为 4 奇函数，故 $f(7)=f(-1)=f(1)=1$.

11. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $e^{2yz}+x+y^2+z=\frac{7}{4}$ 确定的函数，则 $dz|_{\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)}=$_____.

【详解】设 $F(x,y,z)=e^{2yz}+x+y^2+z-\frac{7}{4}$，$F_x=1,F_y=2ze^{2yz}+2y,F_z=2ye^{2yz}+1$，当 $x=y=\frac{1}{2}$ 时，$z=0$，$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=-\frac{1}{2}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=-\frac{1}{2}$，所以 $dz|_{\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)}=-\frac{1}{2}dx-\frac{1}{2}dy$.

12. 曲线 L 的极坐标方程为 $r=\theta$，则 L 在点 $(r,\theta)=\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 处的切线方程为_____.

【详解】先把曲线方程化为参数方程 $\begin{cases}x=r(\theta)\cos\theta=\theta\cos\theta\\ y=r(\theta)\sin\theta=\theta\sin\theta\end{cases}$，于是在 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 处，$x=0,y=\frac{\pi}{2}$，$\frac{dy}{dx}|_{\frac{\pi}{2}}=\frac{\sin\theta+\theta\cos\theta}{\cos\theta-\theta\sin\theta}|_{\frac{\pi}{2}}=-\frac{2}{\pi}$，则 L 在点 $(r,\theta)=\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 处的切线方程为 $y-\frac{\pi}{2}=-\frac{2}{\pi}(x-0)$，即 $y=-\frac{2}{\pi}x+\frac{\pi}{2}$.

13. 一根长为 1 的细棒位于 x 轴的区间 $[0,1]$ 上，若其线密度 $\rho(x)=-x^2+2x+1$，则该细棒的质心坐标 $\bar{x}=$_____.

【详解】质心坐标 $\bar{x}=\frac{\int_0^1 x\rho(x)dx}{\int_0^1\rho(x)dx}=\frac{\int_0^1(-x^3+2x^2+x)dx}{\int_0^1(-x^2+2x+1)dx}=\frac{\frac{11}{12}}{\frac{5}{3}}=\frac{11}{20}$.

14. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+2ax_1x_3+4x_2x_3$ 的负惯性指数是 1，则 a 的取值范围

是_____.

【详解】由配方法可知

$$\begin{aligned} f(x_1,x_2,x_3) &= x_1^2 - x_2^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3 \\ &= (x_1 + ax_3)^2 - (x_2 - 2x_3)^2 + (4 - a^2)x_3^2 \end{aligned}$$

由于负惯性指数为 1，故必须要求 $4-a^2 \geq 0$，所以 a 的取值范围是 $[-2,2]$.

三、解答题

15.（本题满分 10 分）

求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\int_1^x (t^2(e^{\frac{1}{t}}-1)-t)dt}{x^2 \ln(1+\frac{1}{x})}$.

【分析】. 先用等价无穷小代换简化分母，然后利用洛必达法则求未定型极限.

【详解】

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\int_1^x (t^2(e^{\frac{1}{t}}-1)-t)dt}{x^2 \ln(1+\frac{1}{x})} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\int_1^x (t^2(e^{\frac{1}{t}}-1)-t)dt}{x} = \lim_{x\to\infty}(x^2(e^{\frac{1}{x}}-1)-x)$$

$$= \lim_{x\to\infty}\left(x^2(\frac{1}{x}+\frac{1}{2x^2}+o(\frac{1}{x^2})-x \right) = \frac{1}{2}$$

16.（本题满分 10 分）

已知函数 $y=y(x)$ 满足微分方程 $x^2+y^2y'=1-y'$，且 $y(2)=0$，求 $y(x)$ 的极大值和极小值.

【详解】

解：把方程化为标准形式得到 $(1+y^2)\dfrac{dy}{dx}=1-x^2$，这是一个可分离变量的一阶微分方程，两边分别积分

可得方程通解为：$\dfrac{1}{3}y^3+y=x-\dfrac{1}{3}x^3+C$，由 $y(2)=0$ 得 $C=\dfrac{2}{3}$，

即 $\dfrac{1}{3}y^3+y=x-\dfrac{1}{3}x^3+\dfrac{2}{3}$.

令 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1-x^2}{1+y^2}=0$，得 $x=\pm1$，且可知 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{-2x(1+y^2)^2-2y(1-x^2)^2}{(1+y^2)^3}$；

当 $x=1$ 时，可解得 $y=1$，$y''=-1<0$，函数取得极大值 $y=1$；

当 $x=-1$ 时，可解得 $y=0$，$y''=2>0$，函数取得极小值 $y=0$.

17.（本题满分 10 分）

设平面区域 $D=\{(x,y)\,|\,1\le x^2+y^2\le 4, x\ge 0. y\ge 0\}$. 计算 $\iint\limits_D \dfrac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}dxdy$

【详解】由对称性可得

$$\iint\limits_D \frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}dxd=\iint\limits_D \frac{y\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}dxd=\frac{1}{2}\iint\limits_D \frac{(x+y)\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}dxdy$$

$$=\frac{1}{2}\iint\limits_D \frac{\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{1}dxd=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_1^2 r\sin\pi r dr=-\frac{3}{4}$$

18.（本题满分 10 分）

设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数，$z=f(e^x\cos y)$ 满足 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(4z+e^x\cos y)e^{2x}$. 若 $f(0)=0, f'(0)=0$，求 $f(u)$ 的表达式.

【详解】

设 $u=e^x\cos y$，则 $z=f(u)=f(e^x\cos y)$，

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'(u)e^{x\cos y}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''(u)e^{2x}\cos^2 y+f'(u)e^x\cos y;$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-f'(u)e^x\sin y, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f''(u)e^{2x}\sin^2 y-f'(u)e^x\cos y;$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f''(u)e^{2x}=f''(e^x\cos y)e^{2x}$$

由条件 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(4z+e^x\cos y)e^{2x}$，

可知

$$f''(u)=4f(u)+u$$

这是一个二阶常用系数线性非齐次方程.

对应齐次方程的通解为：

$f(u)=C_1e^{2u}+C_2e^{-2u}$ 其中 C_1, C_2 为任意常数.

对应非齐次方程特解可求得为 $y^*=-\dfrac{1}{4}u$.

故非齐次方程通解为 $f(u)=C_1e^{2u}+C_2e^{-2u}-\dfrac{1}{4}u$.

将初始条件 $f(0)=0, f'(0)=0$ 代入，可得 $C_1=\frac{1}{16}, C_2=-\frac{1}{16}$.

所以 $f(u)$ 的表达式为 $f(u)=\frac{1}{16}e^{2u}-\frac{1}{16}e^{-2u}-\frac{1}{4}u$.

19.（本题满分 10 分）

设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a.b]$ 上连续，且 $f(x)$ 单调增加，$0\le g(x)\le 1$，证明：

（1） $0\le\int_a^x g(t)dt\le x-a,\ x\in[a,b]$；

（2） $\int_a^{a+\int_a^b g(t)dt} f(x)dx\le\int_a^b f(x)g(x)dx$.

【详解】

（1）证明：因为 $0\le g(x)\le 1$，所以 $\int_a^x 0dx\le\int_a^x g(t)dt\le\int_a^x 1dt\ \ x\in[a,b]$.

即 $0\le\int_a^x g(t)dt\le x-a,\ x\in[a,b]$.

（2）令 $F(x)=\int_a^x f(u)g(u)du-\int_a^{a+\int_a^x g(t)dt} f(u)du$，

则可知 $F(a)=0$，且 $F'(x)=f(x)g(x)-g(x)f\left(a+\int_a^x g(t)dt\right)$，

因为 $0\le\int_a^x g(t)dt\le x-a,$ 且 $f(x)$ 单调增加，

所以 $f\left(a+\int_a^x g(t)dt\right)\le f(a+x-a)=f(x)$. 从而

$F'(x)=f(x)g(x)-g(x)f\left(a+\int_a^x g(t)dt\right)\ge f(x)g(x)-g(x)f(x)=0,\qquad x\in[a,b]$

也是 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 单调增加，则 $F(b)\ge F(a)=0$，即得到

$$\int_a^{a+\int_a^b g(t)dt} f(x)dx\le\int_a^b f(x)g(x)dx.$$

20.（本题满分 11 分）

设函数 $f(x)=\frac{x}{1+x}, x\in[0,1]$，定义函数列

$$f_1(x)=f(x),\ f_2(x)=f(f_1(x)),\ \cdots, f_n(x)=f(f_{n-1}(x)),\cdots$$

设 S_n 是曲线 $y=f_n(x)$，直线 $x=1,\ y=0$ 所围图形的面积. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} nS_n$.

【详解】

$$f_1(x)=\frac{x}{1+x}, f_2(x)=\frac{f_1(x)}{1+f_1(x)}=\frac{\frac{x}{1+x}}{1+\frac{x}{1+x}}=\frac{x}{1+2x},\ f_3(x)=\frac{x}{1+3x},\cdots,$$

利用数学归纳法可得 $f_n(x)=\dfrac{x}{1+nx}$.

$$S_n=\int_0^1 f_n(x)dx=\int_0^1\frac{x}{1+nx}dx=\frac{1}{n}\int_0^1(1-\frac{1}{1+nx})dx=\frac{1}{n}(1-\frac{\ln(1+n)}{n}),$$

$$\lim_{n\to\infty}nS_n=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{\ln(1+n)}{n}\right)=1.$$

21.（本题满分 11 分）

已知函数 $f(x,y)$ 满足 $\dfrac{\partial f}{\partial y}=2(y+1)$，且 $f(y,y)=(y+1)^2-(2-y)\ln y$，求曲线 $f(x,y)=0$ 所成的图形绕直线 $y=-1$ 旋转所成的旋转体的体积.

【详解】

由于函数 $f(x,y)$ 满足 $\dfrac{\partial f}{\partial y}=2(y+1)$，所以 $f(x,y)=y^2+2y+C(x)$，其中 $C(x)$ 为待定的连续函数.

又因为 $f(y,y)=(y+1)^2-(2-y)\ln y$，从而可知 $C(y)=1-(2-y)\ln y$，

得到 $f(x,y)=y^2+2y+C(x)=y^2+2y+1-(2-x)\ln x$.

令 $f(x,y)=0$，可得 $(y+1)^2=(2-x)\ln x$. 且当 $y=-1$ 时，$x_1=1,x_2=2$.

曲线 $f(x,y)=0$ 所成的图形绕直线 $y=-1$ 旋转所成的旋转体的体积为

$$V=\pi\int_1^2(y+1)^2dx=\pi\int_1^2(2-x)\ln xdx=(2\ln 2-\frac{5}{4})\pi$$

22.（本题满分 11 分）

设 $A=\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\1&2&0&3\end{pmatrix}$，E 为三阶单位矩阵.

（1） 求方程组 $AX=0$ 的一个基础解系；

（2） 求满足 $AB=E$ 的所有矩阵.

【详解】（1）对系数矩阵 A 进行初等行变换如下：

$$A=\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\1&2&0&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\0&4&-3&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\0&0&1&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-2\\0&0&1&-3\end{pmatrix},$$

得到方程组 $AX=0$ 同解方程组

$$\begin{cases} x_1 = -x_4 \\ x_2 = 2x_4 \\ x_3 = 3x_4 \end{cases}$$

得到 $AX = 0$ 的一个基础解系 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$.

（2）显然 B 矩阵是一个 4×3 矩阵，设 $B = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \\ x_4 & y_4 & z_4 \end{pmatrix}$

对矩阵 (AE) 进行进行初等行变换如下：

$$(AE) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -3 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\to \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & -4 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 6 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

由方程组可得矩阵 B 对应的三列分别为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix},$$

即满足 $AB = E$ 的所有矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 2 - c_1 & 6 - c_2 & -1 - c_3 \\ -1 + 2c_1 & -3 + 2c_2 & 1 + 2c_3 \\ -1 + 3c_1 & -4 + 3c_2 & 1 + 3c_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$$

其中 c_1, c_2, c_3 为任意常数.

23.（本题满分 11 分）

证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$ 相似.

【详解】证明：设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\\1&1&\cdots&1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&1&\cdots&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&\cdots&0&1\\0&\cdots&0&2\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&\cdots&0&\boldsymbol{n}\end{pmatrix}$.

分别求两个矩阵的特征值和特征向量如下：

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&\cdots&-1\\-1&\lambda-1&\cdots&-1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\-1&-1&\cdots&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-\boldsymbol{n})\lambda^{n-1},$$

所以 A 的 $\boldsymbol{n}$ 个特征值为 $\lambda_1=\boldsymbol{n},\lambda_2=\lambda_3=\cdots\lambda_n=0$；

而且 A 是实对称矩阵，所以一定可以对角化．且 $\boldsymbol{A}\sim\begin{pmatrix}\lambda&&&\\&0&&\\&&\cdots&\\&&&0\end{pmatrix}$；

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda&0&\cdots&-1\\0&\lambda&\cdots&-2\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&\lambda-\boldsymbol{n}\end{vmatrix}=(\lambda-\boldsymbol{n})\lambda^{n-1}$$

所以 B 的 $\boldsymbol{n}$ 个特征值也为 $\lambda_1=\boldsymbol{n},\lambda_2=\lambda_3=\cdots\lambda_n=0$；

对于 $n-1$ 重特征值 $\lambda=0$，由于矩阵 $(0E-B)=-B$ 的秩显然为 1，所以矩阵 B 对应 $n-1$ 重特征值 $\lambda=0$ 的特征向量应该有 $n-1$ 个线性无关，进一步矩阵 B 存在 n 个线性无关的特征向量，即矩阵 B 一定可以对角化，且 $B\sim\begin{pmatrix}\lambda & & & \\ & 0 & & \\ & & \cdots & \\ & & & 0\end{pmatrix}$

从而可知 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1 & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}0 & \cdots & 0 & 1\\ 0 & \cdots & 0 & 2\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & \cdots & 0 & n\end{pmatrix}$ 相似.