

الشهادة التكميلية المهنية - الرياضيات

رياضيات التكميلية المهنية

شرح مبسط، أمثلة محلولة، تطبيقات من المطبخ والمطعم، وتمارين متدرجة من السهل إلى الصعب - وفق أسئلة الامتحانات الرسمية 2015 • 2016 • 2017.

1 النشر والاختزال

2 التحليل إلى عوامل

3 كثيرة الحدود $P(x)$: نشر وتحليل

4 الجذور التربيعية

5 إنطاق المقام

6 حلّ نظام معادلتين بمجهولين



المحتويات

كيف تستعمل هذا الكتاب؟



أمثلة محلولة

حلول خطوة بخطوة – كثير منها من الامتحانات الرسمية نفسها.



الشرح والقواعد

فكرة الدرس بكلمات بسيطة، ثم بطاقات القواعد التي يجب حفظها.



تمارين متدرجة

ثلاثة مستويات؛ الإجابات كلها في آخر الكتاب.



تطبيقات

مسائل من عالم المطبخ والمطعم والحلويات تُظهر فائدة الدرس.

مستويات التمارين

سهل  تمارين مباشرة على القاعدة

متوسط  قاعدتان أو أكثر في التمرين

صعب  مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

كل الأعداد مكتوبة بالأرقام الإنكليزية (0 1 2 3 ...) والمتغيرات بالرمزين x و y كما في النسخة الإنكليزية/الفرنسية من الامتحان.

النشر والاختزال

Expand and reduce

1

التحليل إلى عوامل

Factorize

2

كثيرة الحدود $P(x)$: نشر وتحليل

Polynomials

3

الجذور التربيعية

Square roots

4

إنطاق المقام

Rationalize the denominator

5

حلّ نظام معادلتين بمجهولين

Systems of equations

6

الامتحانات الرسمية ونماذج

Official exams 2015 · 2016 · 2017

7

بطاقة المراجعة السريعة

Formula sheet

8

الإجابات

Answer key

9

النشر والاختزال

Expand and reduce · Développer et réduire

كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

Français	English	عربي
Développer et réduire	Expand and reduce	انشر واختزل
Développer et réduire	Expand and reduce	تخلص من الأقواس واجمع

ماذا ستتعلم؟

- توزيع عدد أو حدّ على قوس.
- ضرب قوسين (التوزيع المزدوج).
- استعمال المتطابقات الهامة الثلاث.
- جمع الحدود المتشابهة وترتيب النتيجة تنازليًا.

1 الشرح

النشر يعني التخلص من الأقواس بتحويل الجداء (الضرب) إلى مجموع. و**الاختزال** يعني جمع الحدود المتشابهة (حدود x^2 معًا، حدود x معًا، والأعداد معًا) ثم كتابة النتيجة مرتبة: $ax^2 + bx + c$.

التوزيع المزدوج

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

التوزيع البسيط

$$k(a + b) = ka + kb \quad k(a - b) = ka - kb$$

مربع فرق

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

مربع مجموع

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

جداء مجموع بفرق

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

إشارة **الناقص** أمام قوس تغيّر إشارة **كل** حدّ داخله: $-(x^2 - 4x + 4) = -x^2 + 4x - 4$. لذلك احتفظ بالقوس بعد النشر ثم تخلص منه في خطوة مستقلة. وتذكّر: $(a - b)^2 \neq a^2 - b^2$.

مثال 1

$$A = 3(2x - 5) - 2(x - 4)$$

$$A = 6x - 15 - 2x + 8$$

نوزّع 3 ثم نوزّع -2 (انتبه للإشارات)

1

$$A = 4x - 7$$

نجمع حدود x ونجمع الأعداد

2

امتحان 2015

مثال 2

$$B = (x - 2)(3 - 2x) - (x - 1)(x + 1)$$

$$(x - 2)(3 - 2x) = 3x - 2x^2 - 6 + 4x = -2x^2 + 7x - 6$$

التوزيع المزدوج

1

$$(x - 1)(x + 1) = x^2 - 1$$

متطابقة: جداء مجموع بفرق

2

$$B = -2x^2 + 7x - 6 - (x^2 - 1)$$

نحتفظ بالقوس بسبب الناقص

3

$$B = -2x^2 + 7x - 6 - x^2 + 1 = -3x^2 + 7x - 5$$

نغيّر الإشارات ونختزل

4

امتحان 2015

مثال 3

$$C = (2x - 1)^2 - (x - 2)^2$$

$$(2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$$

مربع فرق

1

$$(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$$

مربع فرق

2

$$C = 4x^2 - 4x + 1 - x^2 + 4x - 4$$

الناقص يغيّر إشارات القوس الثاني

3

$$C = 3x^2 - 3$$

حدًا x يتلاشيان

4

مثال 4

$$D = (3x + 2)(3x - 2) + (x + 3)^2$$

$$D = (9x^2 - 4) + (x^2 + 6x + 9)$$

متطابقتان

1

$$D = 10x^2 + 6x + 5$$

نختزل

2

3 تطبيقات من المطبخ والمطعم

👨‍🍳 قالب الكعك المربع

قالب كعك مربع طول ضلعه $(x + 4)$ cm. قص الحلواني من زاويته مربعًا ضلعه 2 cm. ما المساحة الباقية؟

الحل

$$A = (x + 4)^2 - 2^2 = x^2 + 8x + 16 - 4 = x^2 + 8x + 12$$

👨‍🍳 صينية الحلويات

صينية مستطيلة طولها $(2x + 3)$ cm وعرضها $(x + 1)$ cm. اكتب مساحتها بشكل منشور.

الحل

$$A = (2x + 3)(x + 1) = 2x^2 + 2x + 3x + 3 = 2x^2 + 5x + 3$$

إذا كان $x = 10$: $A = 2(10)^2 + 5(10) + 3 = 200 + 50 + 3 = 253 \text{ cm}^2$

أي صينية $23 \times 11 \text{ cm}$.

4 تمارين

انشر واختزل كل عبارة:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

$$-3(x - 4) + 2x$$

2

$$5(2x - 3)$$

1

$$(x + 3)^2$$

4

$$(x + 2)(x + 5)$$

3

$$(x - 6)(x + 6)$$

6

$$(x - 4)^2$$

5

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

$$(3x + 1)^2 - 9x^2$$

8

$$(2x - 3)(x + 4)$$

7

$$(2x + 5)(2x - 5) - (x + 1)(x - 2)$$

10

$$(x - 3)(2 - x)$$

9

$$(x + 2)(3x - 1) - 2(x - 1)^2$$

11

المستوى 3 • صعب  مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

$$(3x - 2)^2 - (x + 3)^2$$

13

$$(x + 4)(1 - 3x) - (2x - 1)(2x + 1)$$

12

$$(1 - 2x)^2 - (2x + 3)(2x - 3) - 4(1 - x)$$

15

$$(2x - 1)(x + 3) - (x - 2)^2 + 3(x - 1)$$

14

$$\left(\frac{x}{2} + 1\right)^2 - \left(\frac{x}{2} - 1\right)^2$$

16

التحليل إلى عوامل

Factorize · Factoriser

2

كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Factoriser	Factorize	حلل إلى عوامل
Factoriser	Factorize	ضع ضمن أقواس

- إخراج العامل المشترك (عدد، حرف، أو قوس كامل).
- التعريف على المتطابقات الهامة بالاتجاه المعاكس.
- إظهار عامل مشترك «مخفي» باستعمال متطابقة أولًا.

1 الشرح

التحليل هو عكس النشر: نحول المجموع إلى **جدا** عوامل. النتيجة الصحيحة تكون مكتوبة على شكل (...)(...). طريقة التفكير دائمًا بالترتيب: **(1)** هل يوجد عامل مشترك ظاهر؟ **(2)** هل العبارة متطابقة هامة؟ **(3)** هل يمكن تحليل جزء منها ليظهر عامل مشترك؟

قوس مشترك

$$(A)(B) + (A)(C) = (A)[(B) + (C)]$$

العامل المشترك

$$ka + kb = k(a + b)$$

فرق مربعين

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

مربع كامل

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

قلب الإشارة

$$(3 - 2x) = -(2x - 3)$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

عند إخراج قوس مشترك من **فرق**، ضع القوس الثاني كاملاً بين قوسين قبل التبسيط: $(A)(B) - (A)(C) = (A)[B - (C)]$ - الناقص يظل كل حدود C . وتحقق دائماً بنشر النتيجة ذهنياً: يجب أن تعود للعبارة الأصلية.

مثال 1

$$A = 6x^2 - 9x$$

$$A = 3x \cdot 2x - 3x \cdot 3$$

العامل المشترك هو 3x

1

$$A = 3x(2x - 3)$$

2

مثال 2

$$B = (x + 1)(2x - 3) + (x + 1)(x + 5)$$

$$B = (x + 1)[(2x - 3) + (x + 5)]$$

القوس (x+1) مشترك

1

$$B = (x + 1)(3x + 2)$$

نختزل داخل القوس الكبير

2

امتحان 2015

مثال 3

$$C = (2x + 1)^2 - (x - 3)^2$$

$$C = a^2 - b^2, \quad a = 2x + 1, \quad b = x - 3$$

فرق مربعين

1

$$C = [(2x + 1) - (x - 3)][(2x + 1) + (x - 3)]$$

(a+b)(a-b)

2

$$C = (2x + 1 - x + 3)(2x + 1 + x - 3)$$

3

$$C = (x + 4)(3x - 2)$$

4

$$D = (4x^2 - 9) - (2x - 3)(1 - 3x)$$

$$4x^2 - 9 = (2x - 3)(2x + 3)$$

نحلل الجزء الأول فيظهر العامل $(2x-3)$

1

$$D = (2x - 3)(2x + 3) - (2x - 3)(1 - 3x)$$

2

$$D = (2x - 3)[(2x + 3) - (1 - 3x)]$$

نخرج $(2x-3)$

3

$$D = (2x - 3)(2x + 3 - 1 + 3x) = (2x - 3)(5x + 2)$$

4

تطبيقات من المطبخ والمطعم

3

حساب ذهني في الصندوق

احسب بسرعة دون آلة حاسبة: $53^2 - 47^2$.

الحل

$$53^2 - 47^2 = (53 - 47)(53 + 47) = 6 \times 100 = 600$$

عجينة الحلواني

رقاقة عجين مربعة ضلعها $(x + 5)$ cm، قُطع منها مربع ضلعه 3 cm. عبّر عن المساحة الباقية على شكل جداء، واستنتج بُعْدَي مستطيل له المساحة نفسها.

الحل

$$A = (x + 5)^2 - 3^2 = (x + 5 - 3)(x + 5 + 3) = (x + 2)(x + 8)$$

$A = 14 \times 12$ لـ $x = 12$ و $(x + 8)$ و $(x + 2)$

$280 \text{ cm}^2 = 20 -$ حساب ذهني سريع بفضل التحليل!

تمارين

4

حلل كل عبارة إلى عوامل:

المستوى 1 • سهل  تمارين مباشرة على القاعدة

$$4x^2 - 6x$$

2

$$5x + 15$$

1

$$x^2 + 8x + 16$$

4

$$x^2 - 49$$

3

$$25 - 4x^2$$

6

$$9x^2 - 6x + 1$$

5

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

$$(2x + 3)(x - 1) - (2x + 3)(4x + 2)$$

8

$$(x - 2)(3x + 1) + (x - 2)(x + 4)$$

7

$$(2x - 1)^2 - (x + 2)^2$$

10

$$(x + 3)^2 - 16$$

9

$$(x - 5)^2 + (x - 5)(2x + 1)$$

11

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

$$(x^2 - 4) - (x + 2)(3 - 2x)$$

13

$$(9x^2 - 1) + (3x + 1)(x - 2)$$

12

$$(5 - x)(2x + 1) + (x^2 - 25)$$

15

$$(4x^2 - 12x + 9) - (2x - 3)(x + 1)$$

14

$$(3x - 2)^2 - (3x - 2)(x + 5) + (9x^2 - 4)$$

16

كثيرة الحدود $P(x)$: نشر وتحليل

Polynomials · Polynômes

⊙ ماذا ستتعلم؟

□ كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

Français	English	عربي
On donne le polynôme	Given the polynomial	لتكن كثيرة الحدود
Développer et réduire $P(x)$	Expand and reduce $P(x)$	انشر واخزل $P(x)$
Factoriser $P(x)$	Factorize $P(x)$	حلّل $P(x)$

➤ فهم الرمز $P(x)$ ودرجة كثيرة الحدود.

➤ الإجابة عن سؤال الامتحان الكامل: نشر ثم تحليل.

➤ التحقق من النتيجتين بقيمة عددية.

➤ حلّ المعادلة $P(x) = 0$ باستعمال الشكل المحلّل.

1 الشرح

كثيرة الحدود عبارة جبرية مثل $P(x) = 6x^2 + 10x - 4$. أكبر أس للمتغير x هو **درجتها** (هنا 2). الرمز $P(3)$ يعني أن نعوض x بالعدد 3.

في الامتحان الرسمي يأتي سؤال واحد جزأين: (أ) انشر واخزل $P(x)$ ، (ب) حلّل $P(x)$. الشكلان مختلفان في الكتابة لكنهما **متساويان** لكل قيمة x - وهذا يعطينا طريقة ذهنية للتحقق.

الشكل المحلّل

$$P(x) = (\dots)(\dots)$$

الشكل المنشور

$$P(x) = ax^2 + bx + c$$

الجداء المعلوم

$$A \cdot B = 0 \text{ يعني } A = 0 \text{ أو } B = 0.$$

التحقق الذهبي

نحسب $P(0)$ أو $P(1)$ بالشكلين: يجب أن نحصل على العدد نفسه.

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

في التحليل ابحث عن العامل المشترك **المخفي**: غالبًا يظهر بعد تحليل $4x^2 - 16$ أو $x^2 - 9$ إلى فرق مربعين، أو بعد قلب إشارة قوس مثل $-(x - 2) = (2 - x)$.

امتحان 2016

مثال 1

$$P(x) = (3x - 1)(5x + 3) - (3x - 1)^2$$

$$(3x - 1)(5x + 3) = 15x^2 + 4x - 3$$

أ) النشر: توزيع مزدوج

1

$$(3x - 1)^2 = 9x^2 - 6x + 1$$

مرّيع فرق

2

$$P(x) = 15x^2 + 4x - 3 - 9x^2 + 6x - 1 = 6x^2 + 10x - 4$$

نختزل

3

$$P(x) = (3x - 1)[(5x + 3) - (3x - 1)]$$

ب) التحليل: $(3x-1)$ مشترك

4

$$P(x) = (3x - 1)(2x + 4) = 2(3x - 1)(x + 2)$$

5

$$P(1) = 6 + 10 - 4 = 12 \quad ; \quad 2(2)(3) = 12 \quad \checkmark$$

تحقق

6

امتحان 2017

مثال 2

$$P(x) = (x - 5)(2 - x) - (4x^2 - 16)$$

$$(x - 5)(2 - x) = 2x - x^2 - 10 + 5x = -x^2 + 7x - 10$$

أ) النشر

1

$$P(x) = -x^2 + 7x - 10 - 4x^2 + 16 = -5x^2 + 7x + 6$$

2

$$4x^2 - 16 = 4(x - 2)(x + 2) \quad ; \quad (2 - x) = -(x - 2)$$

ب) نُظهر العامل $(x-2)$

3

$$P(x) = -(x - 2)(x - 5) - 4(x - 2)(x + 2)$$

4

$$P(x) = -(x - 2)[(x - 5) + 4(x + 2)] = -(x - 2)(5x + 3)$$

5

$$P(x) = (2 - x)(5x + 3)$$

شكل أنيق للنتيجة

6

$$P(0) = 6 \quad ; \quad (2)(3) = 6 \quad \checkmark$$

تحقق

7

مثال 3

$$P(x) = (2x + 3)^2 - (2x + 3)(x - 4)$$

$$P(x) = 4x^2 + 12x + 9 - (2x^2 - 5x - 12) = 2x^2 + 17x + 21$$

(أ) النشر

1

$$P(x) = (2x + 3)[(2x + 3) - (x - 4)] = (2x + 3)(x + 7)$$

(ب) التحليل

2

$$2x + 3 = 0 \quad ; \quad x + 7 = 0$$

(ج) حلّ $P(x) = 0$: أحد العاملين يساوي 0

3

$$x = -\frac{3}{2} \quad ; \quad x = -7$$

للمعادلة حلّان

4

تطبيقات من المطبخ والمطعم

3

قاعة المطعم

مساحة قاعة مطعم (بالمتر المربع) تُعطى بـ $A(x) = (x + 6)^2 - 4$. (أ) حلّ $A(x)$. (ب) أوجد x إذا كانت مساحة القاعة 96 m^2 .

الحلّ

$$(x + 4)(x + 8) = 96 \iff x^2 + 12x - 64 = 0 \iff (x - 4)(x + 16) = 0$$

(أ) $A(x) = (x + 6 - 2)(x + 6 + 2) = (x + 4)(x + 8)$. (ب) $A(x) = 96 \iff x^2 + 12x - 64 = 0$ و $x > 0$ إذاً $x = 4$: القاعة $8 \text{ m} \times 12 \text{ m}$.

تمارين

4

لكل كثيرة حدود: (أ) انشر واختر $P(x)$, (ب) حلّ $P(x)$.

المستوى 1 • سهل  تمارين مباشرة على القاعدة

$$P(x) = (x + 2)(x - 3) + (x + 2)(2x + 1)$$

1

$$P(x) = x(x - 4) + 3(x - 4)$$

2

$$P(x) = (x - 1)^2 - 9$$

3

$$P(x) = (2x - 1)(x + 5) - (2x - 1)(3x - 2)$$

4

$$P(x) = (x + 3)^2 - (2x - 1)^2$$

5

$$P(x) = (x - 4)(2x + 3) + (x^2 - 16)$$

6

$$P(x) = (2x - 3)^2 - (4x^2 - 9) + (2x - 3)(x + 1)$$

7

$$P(x) = (3 - x)(2x + 5) - (x^2 - 9)$$

8

$$P(x) = (x + 1)(4x - 3) - (x + 1)^2 + 3(x^2 - 1)$$

9

$$P(x) = (x - 3)(5 - x) - 2(x^2 - 9) \text{ — ثم حل المعادلة } P(x) = 0$$

10

الجذور التربيعية

Square roots · Racines carrées

كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

Français	English	عربي
Simplifier les expressions	Simplify the expressions	بسط / اختزل العبارات
Effectuer et simplifier	Effectuate and simplify	أجرِ العمليات وبسط

ماذا ستتعلم؟

- تبسيط جذر بإخراج أكبر مربع كامل.
- جمع وطرح الجذور المتشابهة.
- ضرب عبارات فيها جذور واستعمال المتطابقات معها.

1 الشرح

الجذر التربيعي لعدد موجب a هو العدد الموجب الذي مربعه a : $\sqrt{25} = 5$ لأن $5^2 = 25$. لتبسيط جذر نكتب العدد على شكل (مربع كامل $\times$ عدد آخر) ونُخرج المربع الكامل: $\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3}$.

الجذور المتشابهة (نفس العدد تحت الجذر) تُجمع مثل الحدود المتشابهة: $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$ ، تمامًا كما $3x + 5x = 8x$. أمّا $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ فلا تُجمع.

جذر الجداء

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

الخاصية الأساسية

$$(\sqrt{a})^2 = a \quad \sqrt{a^2} = a \quad (a \geq 0)$$

الجمع

$$m\sqrt{a} + n\sqrt{a} = (m + n)\sqrt{a}$$

جذر القسمة

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

مع المتطابقات

$$(\sqrt{a} \pm \sqrt{b})^2 = a + b \pm 2\sqrt{ab}$$

المربّعات الكاملة – احفظها!

$$\sqrt{1}$$

1

$$\sqrt{4}$$

2

$$\sqrt{9}$$

3

$$\sqrt{16}$$

4

$$\sqrt{25}$$

5

$$\sqrt{36}$$

6

$$\sqrt{49}$$

7

$$\sqrt{64}$$

8

$$\sqrt{81}$$

9

$$\sqrt{100}$$

10

$$\sqrt{121}$$

11

$$\sqrt{144}$$

12

$$\sqrt{169}$$

13

$$\sqrt{196}$$

14

$$\sqrt{225}$$

15

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$: مثلاً $\sqrt{9+16} = 5$ بينما $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$ ، و $(2\sqrt{3})^2 = 4 \times 3 = 12$ وليس 2×3 .

مثال 1

$$\sqrt{72}$$

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$$

36 أكبر مربع كامل يقسم 72

1

مثال 2

امتحان 2016

$$A = 3\sqrt{12} - 2\sqrt{27} + \sqrt{48} - 4\sqrt{3}$$

$$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}; \sqrt{27} = 3\sqrt{3}; \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$$

نبسط كل جذر

1

$$A = 6\sqrt{3} - 6\sqrt{3} + 4\sqrt{3} - 4\sqrt{3}$$

2

$$A = 0$$

3

مثال 3

امتحان 2017

$$B = 3\sqrt{8} - 2\sqrt{18} + \sqrt{75} - \sqrt{32}$$

$$B = 3(2\sqrt{2}) - 2(3\sqrt{2}) + 5\sqrt{3} - 4\sqrt{2}$$

نبسط

1

$$B = 6\sqrt{2} - 6\sqrt{2} + 5\sqrt{3} - 4\sqrt{2}$$

2

$$B = 5\sqrt{3} - 4\sqrt{2}$$

لا يمكن جمع $3\sqrt{3}$ مع $2\sqrt{2}$

3

مثال 4

امتحان 2016

$$C = (\sqrt{6} - \sqrt{2})(2\sqrt{2} + \sqrt{6})$$

$$C = 2\sqrt{12} + 6 - 4 - \sqrt{12}$$

توزيع مزدوج: $6 = 6\sqrt{1} \cdot 6\sqrt{1}$ و $4 = 2\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2}$

1

$$C = \sqrt{12} + 2 = 2\sqrt{3} + 2$$

2

$$D = (2\sqrt{3} - \sqrt{5})^2 + (2\sqrt{3} + \sqrt{5})^2$$

$$(2\sqrt{3} - \sqrt{5})^2 = 12 - 4\sqrt{15} + 5 = 17 - 4\sqrt{15}$$

مرّفع فرق

1

$$(2\sqrt{3} + \sqrt{5})^2 = 17 + 4\sqrt{15}$$

مرّفع مجموع

2

$$D = 34$$

الجذران يتلاشيان

3

3 تطبيقات من المطبخ والمطعم

هل تتسع الباغيت؟

صينية فرن مربعة ضلعها 30 cm. يريد الطاهي وضع رغيف باغيت طوله 40 cm على قطرها. هل يتسع؟

الحل

$$= \sqrt{30^2 + 30^2} = \sqrt{1800} = \text{القطر} \\ 30\sqrt{2} \approx 42.4 \text{ cm} > 40$$

الطاولة المربعة

مساحة سطح طاولة مربعة 50 dm^2 . ما طول ضلعها؟

الحل

$$c = \sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2} \approx 7.07 \text{ dm}$$

4 تمارين

بسط كل عبارة:

المستوى 1 • سهل

تمارين مباشرة على القاعدة

$$\sqrt{45}$$

2

$$\sqrt{50}$$

1

$$2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - \sqrt{3}$$

4

$$\sqrt{300}$$

3

$$(\sqrt{7})^2 + (2\sqrt{3})^2$$

6

$$\sqrt{2} \times \sqrt{18}$$

5

المستوى 2 • متوسط

قاعدتان أو أكثر في التمرين

$$2\sqrt{50} - 3\sqrt{8} + \sqrt{18}$$

8

$$\sqrt{12} + \sqrt{27} + \sqrt{75}$$

7

$$(\sqrt{5} + 2)(\sqrt{5} - 2)$$

10

$$\sqrt{3}(2\sqrt{3} - \sqrt{6})$$

9

$$(\sqrt{3} + 1)^2$$

11

المستوى 3 • صعب  مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

$$(3\sqrt{2} - \sqrt{3})(\sqrt{2} + 2\sqrt{3})$$

13

$$5\sqrt{20} - 3\sqrt{45} + 2\sqrt{80} - \sqrt{125}$$

12

$$(2\sqrt{3} - 1)^2 - (2\sqrt{3} + 1)(2\sqrt{3} - 1)$$

15

$$(\sqrt{5} - \sqrt{3})^2 + (\sqrt{5} + \sqrt{3})^2$$

14

$$2\sqrt{18} - \sqrt{50} + \sqrt{8} - \sqrt{32}$$

16

إنطاق المقام

Rationalize the denominator · Rendre rationnel le dénominateur

كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

Français	English	عربي
Rendre rationnel le dénominateur	Rationalize the denominator	أنطق المقام
Rendre rationnel le dénominateur	Rationalize the denominator	تخلص من الجذور في المقام

ماذا ستتعلم؟

- التخلص من جذر وحيد في المقام.
- استعمال المرافق للتخلص من مجموع أو فرق فيه جذور.
- تبسيط الكسر الناتج.

1 الشرح

إنطاق المقام يعني كتابة الكسر نفسه بمقام **خالي من الجذور**. الفكرة: ضرب البسط والمقام بالعدد نفسه (فلا تتغير قيمة الكسر) بحيث يختفي الجذر من المقام.

الحالة 1: المقام $a\sqrt{b}$ ← ضرب بـ $\sqrt{b}$. **الحالة 2:** المقام $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ أو $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ ← ضرب بالمرافق (نفس الجذرين مع عكس الإشارة الوسطى)، فتعطي المتطابقة $(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = a - b$ عددًا بلا جذور.

المرافق

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} \longleftrightarrow \sqrt{a} - \sqrt{b}$$

جذر وحيد

$$\frac{k}{a\sqrt{b}} = \frac{k\sqrt{b}}{ab}$$

مقام بفرق

$$\frac{k}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{k(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{a - b}$$

مقام بمجموع

$$\frac{k}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{k(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{a - b}$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

اضرب **البسط أيضًا** – وليس المقام وحده! وبعد الضرب ببسط: إذا كان كل حدود البسط تقبل القسمة على المقام، اقسم.

مثال 1

$$\frac{6}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$

1

نضرب بـ $3\sqrt{}$

مثال 2

امتحان 2015

$$\frac{2 + \sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$$

$$= \frac{(2 + \sqrt{3})\sqrt{3}}{2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3} + 3}{6}$$

1

نضرب البسط والمقام بـ $3\sqrt{}$

مثال 3

امتحان 2016

$$\frac{3 - 2\sqrt{3}}{5\sqrt{3}}$$

$$= \frac{(3 - 2\sqrt{3})\sqrt{3}}{5 \times 3} = \frac{3\sqrt{3} - 6}{15}$$

1

$$= \frac{3(\sqrt{3} - 2)}{15} = \frac{\sqrt{3} - 2}{5}$$

2

نبسط على 3

مثال 4

امتحان 2015

$$\frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}}$$

$$= \frac{(\sqrt{2} - \sqrt{3})(\sqrt{2} - \sqrt{3})}{(\sqrt{2} + \sqrt{3})(\sqrt{2} - \sqrt{3})}$$

1

نضرب بالمرافق $3\sqrt{}$ - $2\sqrt{}$

$$= \frac{2 - 2\sqrt{6} + 3}{2 - 3} = \frac{5 - 2\sqrt{6}}{-1}$$

2

$$= 2\sqrt{6} - 5$$

3

$$\frac{\sqrt{6} - 2\sqrt{3}}{\sqrt{6} - \sqrt{3}}$$

$$= \frac{(\sqrt{6} - 2\sqrt{3})(\sqrt{6} + \sqrt{3})}{6 - 3}$$

نضرب بالمرافق $3\sqrt{6} + 6\sqrt{3}$

1

$$= \frac{6 + \sqrt{18} - 2\sqrt{18} - 6}{3} = \frac{-\sqrt{18}}{3}$$

2

$$= \frac{-3\sqrt{2}}{3} = -\sqrt{2}$$

3

3 تطبيقات من المطبخ والمطعم

ضلع الصينية من قطرها

قطر صينية مربعة 40 cm. ضلعها $c = \frac{40}{\sqrt{2}}$. اكتب c بمقام منطوق واحسب قيمته التقريبية.

الحل

$$c = \frac{40\sqrt{2}}{2} = 20\sqrt{2} \approx 20 \times 1.414 = 28.28 \text{ cm}$$

4 تمارين

أنطق المقام ثم بسط:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

$$\frac{12}{\sqrt{6}}$$

2

$$\frac{5}{\sqrt{5}}$$

1

$$\frac{1}{3\sqrt{2}}$$

4

$$\frac{3}{2\sqrt{3}}$$

3

$$\frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3}}$$

5

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

$$\frac{4}{\sqrt{5} + 1}$$

7

$$\frac{2}{\sqrt{3} - 1}$$

6

$$\frac{1 + \sqrt{2}}{3\sqrt{2}}$$

9

$$\frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$$

8

$$\frac{\sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}}$$

10

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

$$\frac{3 + \sqrt{2}}{3 - \sqrt{2}}$$

12

$$\frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$$

11

$$\frac{2\sqrt{2} + \sqrt{3}}{2\sqrt{2} - \sqrt{3}}$$

14

$$\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{\sqrt{6} - \sqrt{2}}$$

13

$$\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$$

16

$$\frac{2}{\sqrt{3} + 1} + \frac{2}{\sqrt{3} - 1}$$

15

حلّ نظام معادلتين بمجهولين

Systems of equations · Systèmes d'équations

كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Résoudre le système suivant	Solve the following system	حلّ النظام (المنظومة) التالي

- فهم معنى حلّ النظام: زوج $(x ; y)$ يحقق المعادلتين معًا.
- الحلّ بطريقة التعويض.
- الحلّ بطريقة الحذف (الجمع).
- التخلّص من الكسور، وترجمة مسألة حياتية إلى نظام.

1 الشرح

النظام مكوّن من معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين x و y . حلّه هو الزوج $(x ; y)$ الذي يحقق المعادلتين في الوقت نفسه.

طريقة التعويض: نستخرج أحد المجهولين من معادلة (نختار المجهول الذي معاملته 1 أو -1) ونعوّضه في الأخرى.

طريقة الحذف: نضرب المعادلتين بعددين مناسبين حتى يصبح معامل أحد المجهولين متعاكسًا، ثم نجمع المعادلتين فيختفي.

إذا وجدت كسور: نضرب كل معادلة بالمضاعف المشترك الأصغر لمقاماتها أولًا.

التعويض

$$x + 2y = 4 \Rightarrow x = 4 - 2y$$

الشكل العام

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

التحقّق

نعوّض $(x ; y)$ في المعادلتين الأصليتين.

الحذف

نضرب المعادلتين ليتعاكس معامل أحد المجهولين، ثم نجمع $(1) + (2)$ فيختفي.

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

بعد إيجاد x و y **تحقّق دائمًا** في المعادلتين الأصليتين (وليس في المعادلات المحوّلة)، واكتب الحلّ على شكل زوج مرتّب $(x ; y)$ - الترتيب مهمّ.

امتحان 2015

مثال 1

$$\begin{cases} -x - 2y = -4 \\ 3x + y = -3 \end{cases}$$

$$-x - 2y = -4 \Rightarrow x = 4 - 2y$$

طريقة التعويض: نستخرج x من (1)

1

$$3(4 - 2y) + y = -3 \Rightarrow 12 - 5y = -3$$

نعوّض في (2)

2

$$-5y = -15 \Rightarrow y = 3$$

3

$$x = 4 - 2(3) = -2$$

4

$$-(-2) - 2(3) = -4 \checkmark \quad 3(-2) + 3 = -3 \checkmark$$

تحقق ← الحلّ (-2 ; 3)

5

امتحان 2016

مثال 2

$$\begin{cases} -5x + 2y = -1 \\ 3x - 3y = 6 \end{cases}$$

$$(1) \times 3 : -15x + 6y = -3$$

طريقة الحذف

1

$$(2) \times 2 : 6x - 6y = 12$$

2

$$-9x = 9 \Rightarrow x = -1$$

نجمع فيختفي y

3

$$3(-1) - 3y = 6 \Rightarrow y = -3$$

نعوّض في (2)

4

$$(x ; y) = (-1 ; -3)$$

5

$$\begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{2y}{3} = 4 \\ -\frac{x}{4} + y = -4 \end{cases}$$

$$(1) \times 6 : 3x - 4y = 24$$

تتخلص من الكسور (م.م.أ. = 6)

1

$$(2) \times 4 : -x + 4y = -16$$

(م.م.أ. = 4)

2

$$2x = 8 \Rightarrow x = 4$$

نجمع فيختفي y

3

$$-4 + 4y = -16 \Rightarrow y = -3$$

4

$$(x; y) = (4; -3)$$

5

3 تطبيقات من المطبخ والمطعم

بيض الحلواني

حضر حلواني 40 قالب كيك: الصغير يحتاج بيضتين والكبير 5 بيضات. استعمل 110 بيضات. كم قالبًا من كل نوع؟

الحل

$$\begin{cases} x + y = 40 \\ 2x + 5y = 110 \end{cases} \leftarrow \text{من (1): } x = 40 - y \text{، إذا} \\ 2(40 - y) + 5y = 110 \text{ أي } 80 - 2y + 5y = 110 \\ 30 \text{ قالبًا صغيرًا و } 10 \text{ قوالب كبيرة.}$$

فطور المناقيش

في فرن، ثمن 3 مناقيش و2 عصير هو 9 دولارات، وثمان 2 مناقيش و3 عصير هو 8.5 دولارات. ما ثمن المنقوشة وما ثمن العصير؟

الحل

$$\begin{cases} 3x + 2y = 9 \\ 2x + 3y = 8.5 \end{cases} \text{ نسقي } x \text{ ثمن المنقوشة و } y \text{ ثمن العصير:} \\ \text{نضرب (1) بـ 3 و (2) بـ 2} \\ \text{ونطرح: } 5x = 10 \text{ إذا } x = 2 \text{ و } y = 1.5 \text{ المنقوشة بـ} \\ 2 \text{ دولار والعصير بـ } 1.5 \text{ دولار.}$$

4 تمارين

حل الأنظمة والمسائل التالية:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

$$\begin{cases} 2x + y = 8 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

2

$$\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

1

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$$

4

$$\begin{cases} y = 2x \\ x + y = 9 \end{cases}$$

3

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

$$\begin{cases} 2x - 3y = -1 \\ 4x + y = 5 \end{cases}$$

6

$$\begin{cases} 3x + 2y = 1 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

5

$$\begin{cases} 5x + 2y = 4 \\ 3x + 4y = -6 \end{cases}$$

8

$$\begin{cases} -x + 3y = 5 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$$

7

9 مجموع عددين 50 والفرق بينهما 14. أوجد العددين.

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

$$\begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{y}{4} = 1 \\ \frac{x}{3} + \frac{y}{6} = 2 \end{cases}$$

11

$$\begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 3 \\ x - y = 4 \end{cases}$$

10

$$\begin{cases} \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{2} \\ x + y = 6 \end{cases}$$

12

13 في مقهى: ثمن 4 فناجين قهوة و 2 كرواسون هو 10 دولارات، و ثمن فنجانين و 3 كرواسون هو 9 دولارات. أوجد ثمن كلٍّ منهما.

14 في مطعم 20 طاولة: بعضها لشخصين وبعضها لأربعة أشخاص، ومجموع المقاعد 64. كم طاولة من كل نوع؟

الامتحانات الرسميّة ونماذج للتدريب

هذه أسئلة الامتحانات الرسميّة كما وردت (2015 · 2016 · 2017)، ثم نموذجان جديان على النمط نفسه تمامًا: أربعة أسئلة، 5 علامات لكل سؤال، المدة ساعة ونصف، والمستندات المسموح بها: لا شيء. حلّ كل امتحان في وقته الحقيقي ثم صحّح نفسك.

💡 **إنطاق المقام:** السؤال الأخير عادةً؛ المرافق هو المفتاح في الجزء ب.

💡 **$P(x)$:** بعد النشر والتحليل احسب $P(0)$ بالشكلين — يجب أن يتساويا.

💡 **النظام:** دائمًا تقريبًا السؤال الأول. تحقّق من الحلّ في المعادلتين.

الامتحان الرسمي 2015

الدورة الأولى · التكميلية المهنية

المستندات

لا شيء

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

pts 5

I حلّ النظام التالي Solve the following system

$$\begin{cases} -x - 2y = -4 \\ 3x + y = -3 \end{cases}$$

pts 5

II انشر واختزل Expand and reduce

$$(2x - 1)^2 - (x - 2)^2 \quad \text{ب)}$$

$$(x - 2)(3 - 2x) - (x - 1)(x + 1) \quad \text{أ)}$$

pts 5

III حلّ إلى عوامل Factorize

$$(4x^2 - 9) - (2x - 3)(1 - 3x) \quad \text{ب)}$$

$$(2x + 1)^2 - (x - 3)^2 \quad \text{أ)}$$

pts 5

IV أنطق المقام Rationalize

$$\frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} \quad \text{ب)}$$

$$\frac{2 + \sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \quad \text{أ)}$$

الإجابات في آخر الكتاب ← الامتحان الرسمي 2015

الامتحان الرسمي 2016

الدورة الأولى · التكميلية المهنية

المستندات

لا شيء

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

I **لتكن** $P(x) = (3x - 1)(5x + 3) - (3x - 1)^2$ Given P(x): a) expand and reduce b) factorize

pts 5

ب) حلّل P(x)

أ) انشروا اختزل P(x)

pts 5

II **أجرِ العمليات وبسط** Effectuate and simplifyب) $(\sqrt{6} - \sqrt{2})(2\sqrt{2} + \sqrt{6})$ أ) $3\sqrt{12} - 2\sqrt{27} + \sqrt{48} - 4\sqrt{3}$

pts 5

III **حلّ النظام التالي** Solve the following system

$$\begin{cases} -5x + 2y = -1 \\ 3x - 3y = 6 \end{cases}$$

pts 5

IV **أنطق المقام** Rationalize the denominatorب) $\frac{\sqrt{6} - 2\sqrt{3}}{\sqrt{6} - \sqrt{3}}$ أ) $\frac{3 - 2\sqrt{3}}{5\sqrt{3}}$ الإجابات في آخر الكتاب ← الامتحان الرسمي 2016

الامتحان الرسمي 2017

الدورة الأولى · التكميلية المهنية

المستندات

لا شيء

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

pts 5

I حلّ النظام التالي Solve the following system

$$\begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{2y}{3} = 4 \\ -\frac{x}{4} + y = -4 \end{cases}$$

pts 5

II ببسط العبارات التالية Simplify the following expressions

$$3\sqrt{8} - 2\sqrt{18} + \sqrt{75} - \sqrt{32} \quad \text{ب)}$$

$$(2\sqrt{3} - \sqrt{5})^2 + (2\sqrt{3} + \sqrt{5})^2 \quad \text{أ)}$$

III لتكن $P(x) = (x - 5)(2 - x) - (4x^2 - 16)$ Given P(x): a) expand and reduce b) factorize

pts 5

ب) حلّ P(x)

أ) انشروا اختزل P(x)

pts 5

IV أنطق المقام Rationalize the denominator

$$\frac{\sqrt{5} - 3}{\sqrt{2} + \sqrt{5}} \quad \text{ب)}$$

$$\frac{\sqrt{2} - 2\sqrt{3}}{3\sqrt{2}} \quad \text{أ)}$$

الإجابات في آخر الكتاب ← الامتحان الرسمي 2017

نموذج امتحان 1

على نمط الامتحان الرسمي . ساعة ونصف

المستندات

لا شيء

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

pts 5

Solve the following system حلّ النظام التالي I

$$\begin{cases} 2x - y = 7 \\ x + 3y = -7 \end{cases}$$

Given P(x): a) expand and reduce b) factorize $P(x) = (2x + 1)(x - 3) - (2x + 1)^2$ تكن II

pts 5

ب) حلّ P(x)

أ) انشر واختزل P(x)

pts 5

Effectuate and simplify أجر العمليات وبسط III

$$(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (\sqrt{2} - 1)^2$$

ب)

$$2\sqrt{75} - 3\sqrt{12} + \sqrt{27}$$

أ)

pts 5

Rationalize the denominator أنطق المقام IV

$$\frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1}$$

ب)

$$\frac{4 - \sqrt{2}}{2\sqrt{2}}$$

أ)

الإجابات في آخر الكتاب ← نموذج امتحان 1

نموذج امتحان 2

على نمط الامتحان الرسمي . ساعة ونصف

المستندات

لا شيء

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

pts 5

I حلّ النظام التالي Solve the following system

$$\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 2 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

pts 5

II انشر واخترل Expand and reduce

$$(3x - 2)^2 - (3x + 2)(3x - 2) \quad \text{ب)}$$

$$(x + 3)(2x - 1) - (x - 2)^2 \quad \text{أ)}$$

pts 5

III حلّ إلى عوامل Factorize

$$(x^2 - 9) + (x + 3)(2x - 5) \quad \text{ب)}$$

$$(x + 5)^2 - (2x - 1)^2 \quad \text{أ)}$$

pts 5

IV أنطق المقام Rationalize the denominator

$$\frac{2\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} \quad \text{ب)}$$

$$\frac{5 + \sqrt{5}}{3\sqrt{5}} \quad \text{أ)}$$

الإجابات في آخر الكتاب ← نموذج امتحان 2

بطاقة المراجعة السريعة

1 النشر والاختزال

التوزيع البسيط

$$k(a+b) = ka + kb \quad k(a-b) = ka - kb$$

التوزيع المزدوج

$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

مربع مجموع

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

مربع فرق

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

جاء مجموع بفرق

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$

2 التحليل إلى عوامل

العامل المشترك

$$ka + kb = k(a+b)$$

قوس مشترك

$$(A)(B) + (A)(C) = (A)[(B) + (C)]$$

مربع كامل

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2 \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$$

فرق مربعين

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

قلب الإشارة

$$(3-2x) = -(2x-3)$$

3 كثيرة الحدود P(x): نشر وتحليل

الشكل المنشور

$$P(x) = ax^2 + bx + c$$

الشكل المحلل

$$P(x) = (\dots)(\dots)$$

التحقق الذهبي

نحسب $P(0)$ أو $P(1)$ بالشكلين: يجب أن نحصل على العدد نفسه.

الجاء المعدوم

$$A \cdot B = 0 \text{ يعني } A = 0 \text{ أو } B = 0.$$

4 الجذور التربيعية

الخاصية الأساسية

$$(\sqrt{a})^2 = a \quad \sqrt{a^2} = a \quad (a \geq 0)$$

جذر الجداء

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

جذر القسمة

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

الجمع

$$m\sqrt{a} + n\sqrt{a} = (m+n)\sqrt{a}$$

مع المتطابقات

$$(\sqrt{a} \pm \sqrt{b})^2 = a + b \pm 2\sqrt{ab}$$

5 إنطاق المقام

جذر وحيد

$$\frac{k}{a\sqrt{b}} = \frac{k\sqrt{b}}{ab}$$

المرافق

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} \longleftrightarrow \sqrt{a} - \sqrt{b}$$

مقام بمجموع

$$\frac{k}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{k(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{a - b}$$

مقام بفرق

$$\frac{k}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{k(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{a - b}$$

6 حلّ نظام معادلتين بمجهولين

الشكل العام

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

التعويض

$$x + 2y = 4 \Rightarrow x = 4 - 2y$$

الحذف

نضرب المعادلتين ليتعاكس معامل أحد المجهولين، ثم نجمع (1) + (2) فيختفي.

التحقّق

نعوّض (x ; y) في المعادلتين الأصليّتين.

الإجابات

الإجابات النهائية لكل التمارين. الحلول المفصلة لأسئلة الامتحانات الرسمية موجودة في «أمثلة محلولة» داخل الدروس (ابحث عن الشارة **امتحان**).

1 النشر والاختزال

$$10x - 15 \quad \mathbf{1}$$

$$-x + 12 \quad \mathbf{2}$$

$$x^2 + 7x + 10 \quad \mathbf{3}$$

$$x^2 + 6x + 9 \quad \mathbf{4}$$

$$x^2 - 8x + 16 \quad \mathbf{5}$$

$$x^2 - 36 \quad \mathbf{6}$$

$$2x^2 + 5x - 12 \quad \mathbf{7}$$

$$6x + 1 \quad \mathbf{8}$$

$$-x^2 + 5x - 6 \quad \mathbf{9}$$

$$3x^2 + x - 23 \quad \mathbf{10}$$

$$x^2 + 9x - 4 \quad \mathbf{11}$$

$$-7x^2 - 11x + 5 \quad \mathbf{12}$$

$$8x^2 - 18x - 5 \quad \mathbf{13}$$

$$x^2 + 12x - 10 \quad \mathbf{14}$$

$$6 \quad \mathbf{15}$$

تلميح: كل حدود x تتلشى - النتيجة عدد ثابت.

$$2x \quad \mathbf{16}$$

تلميح: استعمل مربع مجموع ومربع فرق مع $a = \frac{x}{2}$.

2 التحليل إلى عوامل

$$5(x + 3) \quad \mathbf{1}$$

$$2x(2x - 3) \quad \mathbf{2}$$

$$(x - 7)(x + 7) \quad \mathbf{3}$$

$$(x + 4)^2 \quad \mathbf{4}$$

$$(3x - 1)^2 \quad \mathbf{5}$$

$$(5 - 2x)(5 + 2x) \quad \mathbf{6}$$

$$(x - 2)(4x + 5) \quad \mathbf{7}$$

$$-3(2x + 3)(x + 1) \quad \mathbf{8}$$

تلميح: بعد إخراج $(2x+3)$ تحصل على $(3x-3) = -(x+1) \cdot 3$.

$$(x - 1)(x + 7) \quad \mathbf{9}$$

$$(x - 3)(3x + 1) \quad \mathbf{10}$$

$$(x - 5)(3x - 4) \quad \mathbf{11}$$

$$(3x + 1)(4x - 3) \quad \mathbf{12}$$

$$(x + 2)(3x - 5) \quad \mathbf{13}$$

$$(2x - 3)(x - 4) \quad \mathbf{14}$$

تلميح: $4x^2 - 12x + 9$ مربع كامل.

$$(x - 5)(4 - x) \quad \mathbf{15}$$

تلميح: اكتب $5 - x = -(x - 5)$.

$$5(3x - 2)(x - 1) \quad \mathbf{16}$$

4 الجذور التربيعية

$$5\sqrt{2} \quad 1$$

$$3\sqrt{5} \quad 2$$

$$10\sqrt{3} \quad 3$$

$$6\sqrt{3} \quad 4$$

$$6 \quad 5$$

$$19 \quad 6$$

$$10\sqrt{3} \quad 7$$

$$7\sqrt{2} \quad 8$$

$$6 - 3\sqrt{2} \quad 9$$

$$1 \quad 10$$

$$4 + 2\sqrt{3} \quad 11$$

$$4\sqrt{5} \quad 12$$

$$5\sqrt{6} \quad 13$$

$$16 \quad 14$$

$$2 - 4\sqrt{3} \quad 15$$

$$-\sqrt{2} \quad 16$$

3 كثيرة الحدود P(x): نشر وتحليل

$$3x^2 + 4x - 4 ; (x + 2)(3x - 2) \quad 1$$

$$x^2 - x - 12 ; (x - 4)(x + 3) \quad 2$$

$$x^2 - 2x - 8 ; (x - 4)(x + 2) \quad 3$$

$$-4x^2 + 16x - 7 ; (2x - 1)(7 - 2x) \quad 4$$

$$-3x^2 + 10x + 8 ; (4 - x)(3x + 2) \quad 5$$

$$3x^2 - 5x - 28 ; (x - 4)(3x + 7) \quad 6$$

$$2x^2 - 13x + 15 ; (2x - 3)(x - 5) \quad 7$$

$$-3x^2 + x + 24 ; (3 - x)(3x + 8) \quad 8$$

$$\text{تلميح: } -(x^2 - 9) = 9 - x^2 = (3 - x)(3 + x)$$

$$6x^2 - x - 7 ; (x + 1)(6x - 7) \quad 9$$

$$-3x^2 + 8x + 3 ; (3 - x)(3x + 1) \quad 10$$

$$x = -\frac{1}{3} \text{ أو } x = 3$$

5 إنطاق المقام

$$\sqrt{5} \quad 1$$

$$2\sqrt{6} \quad 2$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \quad 3$$

$$\frac{\sqrt{2}}{6} \quad 4$$

$$\frac{3+\sqrt{3}}{3} \quad 5$$

$$\sqrt{3} + 1 \quad 6$$

$$\sqrt{5} - 1 \quad 7$$

$$\sqrt{3} - \sqrt{2} \quad 8$$

$$\frac{\sqrt{2+2}}{6} \quad 9$$

$$2\sqrt{3} + 3 \quad 10$$

$$4 + \sqrt{15} \quad 11$$

$$\frac{11+6\sqrt{2}}{7} \quad 12$$

$$2 + \sqrt{3} \quad 13$$

$$\frac{11+4\sqrt{6}}{5} \quad 14$$

$$2\sqrt{3} \quad 15$$

تلميح: أنطق كل كسر وحده ثم اجمع.

$$3\sqrt{2} + 2\sqrt{3} \quad 16$$

6 حلّ نظام معادلتين بمجهولين

$$(4; 3) \quad 1$$

$$(3; 2) \quad 2$$

$$(3; 6) \quad 3$$

$$(3; 1) \quad 4$$

$$(1; -1) \quad 5$$

$$(1; 1) \quad 6$$

$$(1; 2) \quad 7$$

$$(2; -3) \quad 8$$

$$\text{العددان 32 و 18} \quad 9$$

$$(6; 2) \quad 10$$

$$(4; 4) \quad 11$$

$$(5; 1) \quad 12$$

تلميح: اضرب الطرفين بـ 6: $2(x-2) = 3(y+1)$.

$$\text{القهوة 1.5 دولار، الكرواسون 2 دولار} \quad 13$$

$$\text{8 طاولات لشخصين و 12 طاولة لأربعة} \quad 14$$

الامتحان الرسمي 2016

$$2(3x-1)(x+2) \text{ (أ) } \cdot 6x^2 + 10x - 4 \text{ (ب) } \quad \text{I}$$

$$2 + 2\sqrt{3} \text{ (أ) } \cdot 0 \text{ (ب) } \quad \text{II}$$

$$(-1; -3) \quad \text{III}$$

$$-\sqrt{2} \text{ (أ) } \cdot \frac{\sqrt{3}-2}{5} \text{ (ب) } \quad \text{IV}$$

الامتحان الرسمي 2015

$$(-2; 3) \quad \text{I}$$

$$3x^2 - 3 \text{ (أ) } \cdot -3x^2 + 7x - 5 \text{ (ب) } \quad \text{II}$$

$$(2x-3)(5x+2) \text{ (أ) } \cdot (x+4)(3x-2) \text{ (ب) } \quad \text{III}$$

$$2\sqrt{6} - 5 \text{ (أ) } \cdot \frac{2\sqrt{3}+3}{6} \text{ (ب) } \quad \text{IV}$$

نموذج امتحان 1

$$(2; -3) \quad \text{I}$$

$$-(2x+1)(x+4) \text{ (أ) } \cdot -2x^2 - 9x - 4 \text{ (ب) } \quad \text{II}$$

$$4 - 2\sqrt{2} \text{ (أ) } \cdot 7\sqrt{3} \text{ (ب) } \quad \text{III}$$

$$2 + \sqrt{3} \text{ (أ) } \cdot \frac{2\sqrt{2}-1}{2} \text{ (ب) } \quad \text{IV}$$

الامتحان الرسمي 2017

$$(4; -3) \quad \text{I}$$

$$5\sqrt{3} - 4\sqrt{2} \text{ (أ) } \cdot 34 \text{ (ب) } \quad \text{II}$$

$$(2-x)(5x+3) \text{ (أ) } \cdot -5x^2 + 7x + 6 \text{ (ب) } \quad \text{III}$$

$$\frac{5-\sqrt{10}-3\sqrt{5}+3\sqrt{2}}{3} \text{ (أ) } \cdot \frac{1-\sqrt{6}}{3} \text{ (ب) } \quad \text{IV}$$

نموزج امتحان 2



(2; 3) **I**

$-12x + 8$ (ب · $x^2 + 9x - 7$ (أ **II**

$(x + 3)(3x - 8)$ (ب · $(6 - x)(3x + 4)$ (أ **III**

$8 - 3\sqrt{6}$ (ب · $\frac{\sqrt{5}+1}{3}$ (أ **IV**