



جمعية المبررات الخيرية

الشهادة التكميلية المهنية - الرياضيات

رياضيات التكميلية المهنية

إعداد المعلمين

حسين زعرور • محمد عبدالله

Teachers: Houssein Zaaror & Mohamad Abdallah

• أمين خدمة بالمطعم • طاهٍ • حلواني



الفهرس

2 الدرس 2: التحليل إلى عوامل 14

1. الشرح 14
2. أمثلة محلولة 15
3. تطبيقات من المطبخ والمطعم 16
4. تمارين 17
5. بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة 18
6. صح أم خطأ؟ 20
7. تقييم إضافي 20
8. التعلّم الاجتماعي العاطفي 21
9. سؤال بحث 22
10. نموذج امتحان الدرس مع الحلّ 23

1 الدرس 1: التوسيع والاختزال 3

1. الشرح 3
2. أمثلة محلولة 4
3. تطبيقات من المطبخ والمطعم 5
4. تمارين 5
5. بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة 7
6. صح أم خطأ؟ 9
7. تقييم إضافي 9
8. التعلّم الاجتماعي العاطفي 10
9. سؤال بحث 11
10. نموذج امتحان الدرس مع الحلّ 12

4 الدرس 4: الجذور التربيعية 36

1. الشرح 36
2. أمثلة محلولة 37
3. تطبيقات من المطبخ والمطعم 39
4. تمارين 39
5. بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة 41
6. صح أم خطأ؟ 42
7. تقييم إضافي 42
8. التعلّم الاجتماعي العاطفي 43
9. سؤال بحث 44
10. نموذج امتحان الدرس مع الحلّ 45

3 الدرس 3: كثيرة الحدود $P(x)$ توسيع وتحليل 25

1. الشرح 25
2. أمثلة محلولة 26
3. تطبيقات من المطبخ والمطعم 28
4. تمارين 28
5. بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة 30
6. صح أم خطأ؟ 31
7. تقييم إضافي 31
8. التعلّم الاجتماعي العاطفي 32
9. سؤال بحث 33
10. نموذج امتحان الدرس مع الحلّ 34

6 الدرس 6: حلّ نظام معادلتين بمجهولين 58

1. الشرح 58
2. أمثلة محلولة 59
3. تطبيقات من المطبخ والمطعم 61
4. تمارين 61
5. بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة 63
6. صح أم خطأ؟ 65
7. تقييم إضافي 65
8. التعلّم الاجتماعي العاطفي 66
9. سؤال بحث 67
10. نموذج امتحان الدرس مع الحلّ 68

5 الدرس 5: إنطاق المقام 47

1. الشرح 47
2. أمثلة محلولة 48
3. تطبيقات من المطبخ والمطعم 50
4. تمارين 50
5. بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة 51
6. صح أم خطأ؟ 53
7. تقييم إضافي 53
8. التعلّم الاجتماعي العاطفي 54
9. سؤال بحث 55
10. نموذج امتحان الدرس مع الحلّ 56

7 بطاقات المراجعة MCQ 70

8 الامتحانات الرسمية ونماذج التدريب 74

- | | | | | | |
|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|
| 77 | الامتحان الرسمي 2017 | 76 | الامتحان الرسمي 2016 | 75 | الامتحان الرسمي 2015 |
| 80 | نموذج امتحان 3 | 79 | نموذج امتحان 2 | 78 | نموذج امتحان 1 |
| 83 | نموذج امتحان 6 | 82 | نموذج امتحان 5 | 81 | نموذج امتحان 4 |

9 بطاقة المراجعة السريعة 84



التوسيع والاختزال

Expand and reduce · Développer et réduire

1

كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Développer et réduire	Expand and reduce	وسّع واختزل
Développer et réduire	Expand and reduce	تخلّص من الأقواس واجمع

- توزيع عدد أو حدّ على قوس.
- ضرب قوسين (التوزيع المزدوج).
- استعمال المتطابقات الهامة الثلاث.
- جمع الحدود المتشابهة وترتيب النتيجة تنازليًا.

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

النموذج الهندسي: مساحة المربع الكبير = مجموع مساحات الأجزاء الأربعة

1 الشرح

التوسيع يعني التخلّص من الأقواس بتحويل الجداء (الضرب) إلى مجموع. وال**اختزال** يعني جمع الحدود المتشابهة (حدود x^2 معًا، حدود x معًا، والأعداد معًا) ثم كتابة النتيجة مرتّبة: $ax^2 + bx + c$.

التوزيع المزدوج

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

التوزيع البسيط

$$k(a + b) = ka + kb \quad k(a - b) = ka - kb$$

مربع فرق

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

مربع مجموع

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$



جاء مجموع بفرق

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

إشارة **الناقص** أمام قوس تغيّر إشارة **كل** حدّ داخله: $-(x^2 - 4x + 4) = -x^2 + 4x - 4$. لذلك احتفظ بالقوس بعد التوسيع ثم تخلص منه في خطوة مستقلة. وتذكّر: $(a - b)^2 \neq a^2 - b^2$.

2 أمثلة محلولة

مثال 1

$$A = 3(2x - 5) - 2(x - 4)$$

$$A = 6x - 15 - 2x + 8$$

نوزّع 3 ثم نوزّع -2 (انتبه للإشارات)

$$A = 4x - 7$$

نجمع حدود x ونجمع الأعداد

مثال 2

امتحان 2015

$$B = (x - 2)(3 - 2x) - (x - 1)(x + 1)$$

$$(x - 2)(3 - 2x) = 3x - 2x^2 - 6 + 4x = -2x^2 + 7x - 6$$

التوزيع المزدوج

$$(x - 1)(x + 1) = x^2 - 1$$

متطابقة: جاء مجموع بفرق

$$B = -2x^2 + 7x - 6 - (x^2 - 1)$$

نحتفظ بالقوس بسبب الناقص

$$B = -2x^2 + 7x - 6 - x^2 + 1 = -3x^2 + 7x - 5$$

نغيّر الإشارات ونختزل



$$C = (2x - 1)^2 - (x - 2)^2$$

$$(2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$$

مرّبع فرق

1

$$(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$$

مرّبع فرق

2

$$C = 4x^2 - 4x + 1 - x^2 + 4x - 4$$

الناقص يغيّر إشارات القوس الثاني

3

$$C = 3x^2 - 3$$

حدًا x يتلاشيان

4

$$D = (3x + 2)(3x - 2) + (x + 3)^2$$

$$D = (9x^2 - 4) + (x^2 + 6x + 9)$$

متطابقان

1

$$D = 10x^2 + 6x + 5$$

نختزل

2

3 تطبيقات من المطبخ والمطعم

🍷 قالب الكعك المربع

قالب كعك مربع طول ضلعه $(x + 4)$ cm. قصّ الحلواني من زاويته مربعًا ضلعه 2 cm. ما المساحة الباقية؟

الحلّ

$$A = (x + 4)^2 - 2^2 = x^2 + 8x + 16 - 4 = x^2 + 8x + 12$$

🍷 صينيّة الحلويات

صينيّة مستطيلة طولها $(2x + 3)$ cm وعرضها $(x + 1)$ cm. اكتب مساحتها بشكل موشّع.

الحلّ

$$A = (2x + 3)(x + 1) = 2x^2 + 2x + 3x + 3 = 2x^2 + 5x + 3$$

إذا كان $x = 10$:
 $A = 200 + 50 + 3 = 253 \text{ cm}^2$
 أي صينيّة $23 \text{ cm} \times 11 \text{ cm}$

4 تمارين

وسّع واختزل كل عبارة:



المستوى 1 • سهل

تمارين مباشرة على القاعدة

وسّع

1

$$5(2x - 3)$$

وسّع

2

$$(x + 2)(x + 5)$$

وسّع

3

$$(x + 3)^2$$

وسّع

4

$$(x - 6)(x + 6)$$

أكمل الفراغ

5

$$(x + 5)^2 = x^2 + \square x + 25$$

أكمل الفراغ

6

$$(x - \square)(x + \square) = x^2 - 49$$

اكتشف الخطأ

7

$$2(x + 4) = 2x + 4$$

كتب سامي: $2(x + 4) = 2x + 4$. ما خطؤه؟ صحّح.



طبق بالأعداد

8

احسب $(x + 5)(x + 2)$ عندما $x = 3$ مَرتين: بالتعويض مباشرة، ثم في الشكل الموضَّع. هل النتيجةتان متساويتان؟

المستوى 2 • متوسط

قاعدتان أو أكثر في التمرين

وسّع

9

$$(2x - 3)(x + 4)$$

وسّع

10

$$(3x + 1)^2 - 9x^2$$

وسّع

11

$$(2x + 5)(2x - 5) - (x + 1)(x - 2)$$

وسّع

12

$$(2x + 1)^2 - (x - 1)(x + 1)$$

سؤال عكسي

13

$$(x + a)(x + b) = x^2 + 7x + 12$$

أوجد العددين a و b بحيث $(x + a)(x + b) = x^2 + 7x + 12$.



اكتشف الخطأ

14

$$(x - 3)^2 - (x + 1)(x - 1) = x^2 - 9 - x^2 - 1 = -10$$

كتب طالب: $(x - 3)^2 - (x + 1)(x - 1) = x^2 - 9 - x^2 - 1 = -10$. حدّد خطأين وصّحّح.





احسب ذهنيًا

15

استعمل المتطابقات لتحسب من دون آلة: 101^2 و 101×99 .

المستوى 3 • صعب

مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

وتّسع

17

$$(1 - 2x)^2 - (2x + 3)(2x - 3) - 4(1 - x)$$

وتّسع

16

$$(x + 4)(1 - 3x) - (2x - 1)(2x + 1)$$

وتّسع

18

$$\left(\frac{x}{2} + 1\right)^2 - \left(\frac{x}{2} - 1\right)^2$$

نموذج هندسيّ

19

مربع ضلعه $(a + b)$ مقسّم إلى أربعة أجزاء (انظر الرسم في بداية الدرس). اكتب مساحة كل جزء واستنتج توسيع $(a + b)^2$.

أنشئ

20



أوجد عددين a و b بحيث $(x + a)(x + b) - x^2 = 5x - 6$ ، ثم تحقّق بالتوسيع.



المستوى 4 • تحدّ

للمتفوّقين - فكّر خارج الصندوق

وتّسع

21

$$(x + 1)^2 - (x - 1)^2 - (2x + 1)(2x - 1) + 4x^2$$

مسألة

22

برهن أنّه لكل عدد x : $(x + 3)^2 - (x + 1)^2 = 4(x + 2)$. ثم احسب ذهنيًا $103^2 - 101^2$.

Skills Builder • Problem-Solving Steps

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



5

4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

صينية كنانة مستطيلة بُعدها $(x + 6)$ cm و $(x + 2)$ cm. قطع الحلواني منها مربعًا ضلعه x cm. عبّر عن المساحة الباقية بشكل موشّع، ثم احسبها عندما $x = 10$.

1 أفهم المسألة المعطى: بُعدها المستطيل و ضلع المربع. المطلوب: المساحة الباقية كعبارة، ثم قيمتها لـ $x = 10$.

2 أخطّط للحلّ المساحة الباقية = مساحة المستطيل - مساحة المربع: $A = (x + 6)(x + 2) - x^2$

3 أنفّذ $A = 80 + 12 = 92 \text{ cm}^2$ لـ $x = 10$ $A = x^2 + 2x + 6x + 12 - x^2 = 8x + 12$

4 أتحقّق حساب مباشر: $16 \times 12 - 10^2 = 192 - 100 = 92$ ✓

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



1 طاولة مستطيلة بُعدها $(2x + 1)$ dm و $(x + 3)$ dm، وُضع عليها مفرش مربع ضلعه $(x + 1)$ dm. عبّر عن مساحة الجزء غير المغطّى بشكل موشّع، ثم احسبها لـ $x = 4$.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقّق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقّق:





2 ثمن الكيلو من البنّ $(x + 4)$ دولار، واشترى مطعم $(x - 2)$ كيلو. عبّر عن المبلغ المدفوع بشكل موشّع، واحسبه عندما $x = 10$.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحمّق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقّق:



6 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.



خطأ ☐ صح ☐

$$(x + 3)^2 = x^2 + 9$$

1

خطأ ☐ صح ☐

$$(x - 5)(x + 5) = x^2 - 25$$

2

خطأ ☐ صح ☐

$$-(x - 4) = -x - 4$$

3

خطأ ☐ صح ☐

$$(2x)^2 = 4x^2$$

4

7 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

$$(2x + 1)(x - 4) =$$

2

$$2x^2 - 4$$

ب

$$2x^2 - 7x - 4$$

أ

$$2x^2 - 7x + 4$$

د

$$2x^2 + 9x - 4$$

ج

$$(x - 3)^2 =$$

1

$$x^2 - 6x + 9$$

ب

$$x^2 - 9$$

أ

$$x^2 - 3x + 9$$

د

$$x^2 + 9$$

ج



$$(x + 4)(x - 4) - x^2 =$$

4

-16 (ب)

16 (ا)

-8x (د)

 $2x^2 - 16$ (ج)

$$-2(x - 5) =$$

3

 $-2x + 5$ (ب) $-2x - 10$ (ا) $2x - 10$ (د) $-2x + 10$ (ج)

سؤال مفتوح

اشرح بمثال عددي لماذا $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$ ، ثم اكتب الحد الذي «نسيناه».

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

8



فردية · 5 دقائق

التأمل والتفكير



Reflection

خطئي معلّمي

أيّ المتطابقات الثلاث أسهل عليك، ولماذا؟ اكتب خطأ وقعت فيه اليوم، وكيف ستجنّبه في المرة القادمة.



ثنائية · 10 دقائق

Cooperation تعاون



ثنائي التوسيع

يكتب كلّ طالب لزميله عبارة مثل $(x + a)(x + b)$. يوسّعها الزميل، ثم يتبادلان التصحيح بالتعويض $x = 1$ في الشكّلين. من يجد خطأ يشرح سببه لزميله بلطف ومن دون سخريّة.



فردية · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات



Self-awareness & management

إشارة الناقص لا تخيفني

حين ترى إشارة ناقص أمام قوس، ما مدى ثقتك؟ لوّن مستواك، ثم اكتب استراتيجية واحدة تهدّئك (مثلاً: أبقى القوس، ثم أغيّر الإشارات في خطوة مستقلة).

أقلّ ثقة 1 2 3 4 5 واثق جداً

ثنائية · 5 دقائق

مهارات التواصل



Relationship skills

اشرح لمن غاب

زميلك غاب عن الحصّة. اشرح له بكلماتك الخاصّة، وفي ثلاث جمل فقط، كيف يوسّع $(a - b)^2$. ثم اطلب منه أن يعيد الشرح لك.



سؤال بحث



الخوارزمي وكتاب «الجبر والمقابلة»

ابحث عن العالم محمد بن موسى الخوارزمي: ما معنى كلمتي «الجبر» و«المقابلة»؟ وكيف كان يبرهن $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ بالرسم (مربع كبير مقسم إلى أربعة أجزاء)؟ ارسم الشكل ولون كل جزء.

المنتج المطلوب

ملصق (Poster) يضم الرسم وسيرة مختصرة

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

✓ قِيم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنت	
☐	☐	أوسّع جداء قوسين دون أخطاء إشارات.
☐	☐	أستعمل المتطابقات الثلاث بسرعة.
☐	☐	أختزل وأرتب النتيجة تنازلياً.





نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

10

نموذج امتحان

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

امتحان الدرس 1: التوسيع والاختزال

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

pts 5

I وسّع واختزل

(ب) $(3x - 2)^2$

(أ) $(x + 5)(2x - 3)$

pts 5

II وسّع واختزل

$$A = (2x + 1)(2x - 1) - (x - 3)^2$$

pts 5

III وسّع واختزل

$$B = (x - 4)(1 - 2x) + 2(x + 1)^2$$

pts 5

IV مسألة

لوح عجّين مستطيل بُعده $(x + 7)$ cm و $(x + 1)$ cm، قُطع منه مربع ضلعه x cm. عبّر عن المساحة الباقية بشكل موشّع، ثم احسبها عندما $x = 5$.



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I وّسع واختزل

$$= 2x^2 - 3x + 10x - 15$$

أ) 1 توزيع مزدوج

$$= 2x^2 + 7x - 15$$

2

$$= (3x)^2 - 2(3x)(2) + 2^2 = 9x^2 - 12x + 4$$

ب) 1 مربّع فرق

II وّسع واختزل

$$A = (4x^2 - 1) - (x^2 - 6x + 9)$$

1 متطابقتان، ونُبقي القوس

$$A = 4x^2 - 1 - x^2 + 6x - 9 = 3x^2 + 6x - 10$$

2 الناقص يغيّر الإشارات

III وّسع واختزل

$$(x - 4)(1 - 2x) = x - 2x^2 - 4 + 8x = -2x^2 + 9x - 4$$

1 توزيع مزدوج

$$2(x + 1)^2 = 2x^2 + 4x + 2$$

2

$$B = -2x^2 + 9x - 4 + 2x^2 + 4x + 2 = 13x - 2$$

3 حدّاً x^2 يتلاشيان

IV مسألة

$$A = (x + 7)(x + 1) - x^2 = x^2 + 8x + 7 - x^2 = 8x + 7$$

1 مساحة المستطيل - مساحة المربّع

$$x = 5 : A = 40 + 7 = 47 \text{ cm}^2$$

2 تحقّق: $47 = 25 - 6 \times 12$ ✓



التحليل إلى عوامل

Factorize · Factoriser


2

كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

ماذا ستتعلم؟

عربي	English	Français
حلّ إلى عوامل	Factorize	Factoriser
ضع ضمن أقواس	Factorize	Factoriser

- إخراج العامل المشترك (عدد، حرف، أو قوس كامل).
- التعرّف على المتطابقات الهامة بالاتجاه المعاكس.
- إظهار عامل مشترك «مخفي» باستعمال متطابقة أولاً.

التحليل يعيد المستطيلات إلى مستطيل واحد: الطول $\times$ العرض

1 الشرح

التحليل هو عكس التوسيع: نحوّل المجموع إلى **جداء** عوامل. النتيجة الصحيحة تكون مكتوبة على شكل $(\dots)(\dots)$. طريقة التفكير دائماً بالترتيب: **(1)** هل يوجد عامل مشترك ظاهر؟ **(2)** هل العبارة متطابقة هامة؟ **(3)** هل يمكن تحليل جزء منها ليظهر عامل مشترك؟

قوس مشترك

$$(A)(B) + (A)(C) = (A)[(B) + (C)]$$

العامل المشترك

$$ka + kb = k(a + b)$$

فرق مربعين

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

مربع كامل

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$



قلب الإشارة

$$(3 - 2x) = -(2x - 3)$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

عند إخراج قوس مشترك من **فرق**، ضع القوس الثاني كاملاً بين قوسين قبل التبسيط: $(A)(B) - (A)(C) =$
 $(A)[B - (C)]$ - الناقص يخال كل حدود C . وتحقق دائماً بتوسيع النتيجة ذهنياً: يجب أن تعود للعبارة الأصلية.

2 أمثلة محلولة

مثال 1

$$A = 6x^2 - 9x$$

$$A = 3x \cdot 2x - 3x \cdot 3$$

العامل المشترك هو $3x$

1

$$A = 3x(2x - 3)$$

2

مثال 2

$$B = (x + 1)(2x - 3) + (x + 1)(x + 5)$$

$$B = (x + 1)[(2x - 3) + (x + 5)]$$

القوس $(x+1)$ مشترك

1

$$B = (x + 1)(3x + 2)$$

نختزل داخل القوس الكبير

2



امتحان 2015

مثال 3

$$C = (2x + 1)^2 - (x - 3)^2$$

$$C = a^2 - b^2, \quad a = 2x + 1, \quad b = x - 3$$

فرق مربعين

1

$$C = [(2x + 1) - (x - 3)][(2x + 1) + (x - 3)]$$

(a+b)(a-b)

2

$$C = (2x + 1 - x + 3)(2x + 1 + x - 3)$$

3

$$C = (x + 4)(3x - 2)$$

4

امتحان 2015

مثال 4

$$D = (4x^2 - 9) - (2x - 3)(1 - 3x)$$

$$4x^2 - 9 = (2x - 3)(2x + 3)$$

نحلّل الجزء الأول فيظهر العامل (2x-3)

1

$$D = (2x - 3)(2x + 3) - (2x - 3)(1 - 3x)$$

2

$$D = (2x - 3)[(2x + 3) - (1 - 3x)]$$

نخرج (2x-3)

3

$$D = (2x - 3)(2x + 3 - 1 + 3x) = (2x - 3)(5x + 2)$$

4

تطبيقات من المطبخ والمطعم

3

حساب ذهني في الصندوق

احسب بسرعة دون آلة حاسبة: $53^2 - 47^2$.

الحل

$$53^2 - 47^2 = (53 - 47)(53 + 47) = 6 \times 100 = 600$$

عجينة الحلواني

رقاقة عجين مربعة ضلعها $(x + 5)$ cm، قُطع منها مربع ضلعه 3 cm. عبّر عن المساحة الباقية على شكل جداء، واستنتج بُعدي مستطيل له المساحة نفسها.

الحل

$$A = (x + 5)^2 - 3^2 = (x + 5 - 3)(x + 5 + 3) = (x + 2)(x + 8)$$

$x = 12$ لـ $x + 8$ و $x + 2$: $A = 14 \times 20 = 280$ cm² - حساب ذهني سريع بفضل التحليل!



4 تمارين

حلّل كل عبارة إلى عوامل:

المستوى 1 • سهل

تمارين مباشرة على القاعدة

حلّل

1

$$5x + 15$$

حلّل

2

$$4x^2 - 6x$$

حلّل

3

$$x^2 - 49$$

حلّل

4

$$x^2 + 8x + 16$$

أكمل الفراغ

5

$$x^2 - 10x + \square = (x - \square)^2 \text{ أكمل:}$$

صنّف

6

صنّف حسب طريقة التحليل (عامل مشترك / فرق مربّعين / مربّع كامل): $7x - 14$, $x^2 + 2x + 1$, $9x^2 - 1$.

اكتشف الخطأ

7

حلّلت ريم: $x^2 - 16 = (x - 4)^2$. هل هي على حقّ؟ علّل.



المستوى 2 • متوسط

قاعدتان أو أكثر في التمرين

حلّل

8

$$(x - 2)(3x + 1) + (x - 2)(x + 4)$$

حلّل

9

$$(x + 3)^2 - 16$$

حلّل

10

$$(2x - 1)^2 - (x + 2)^2$$

حلّل

11

$$(x - 5)^2 + (x - 5)(2x + 1)$$

احسب ذهنيًا

12

استعمل التحليل: $38 \times 12 + 38 \times 88$.

سؤال عكسيّ

13

اكتب العبارة الموسّعة التي تحليلها $(x - 3)(x + 5)$.



طبّق

14

مستطيل مساحته $x^2 + 7x$ وعرضه x . ما طوله؟ احسبه عندما $x = 5$.

حلّ

15

$$(9x^2 - 1) + (3x + 1)(x - 2)$$

حلّ

16

$$(4x^2 - 12x + 9) - (2x - 3)(x + 1)$$

حلّ

17

$$(5 - x)(2x + 1) + (x^2 - 25)$$

حلّ

18

$$(3x - 2)^2 - (3x - 2)(x + 5) + (9x^2 - 4)$$

فستّر

19

لماذا لا يُحلّل $x^2 + 4$ كفرق مربّعين، بينما يُحلّل $x^2 - 4$ ؟



أنشئ

20

اكتب عبارة فيها عامل مشترك «مخفي» $(2x + 1)$ يظهر بعد تحليل فرق مربّعين، ثم حلّها.



★

المستوى 4 • تحدّ

للمتفوّقين - فكّر خارج الصندوق



حلّ

21

$$(x^2 - 4) + (x - 2)^2 - (3x - 6)$$

حلّ

22

$$(2x + 3)^2 - (4x^2 - 9) - (2x + 3)(x - 1)$$

Skills Builder · Problem-Solving Steps

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



5

4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

مساحة قالب مربع هي $x^2 + 10x + 25 \text{ cm}^2$. ما طول ضلعه؟ احسبه عندما $x = 7$.

المعطى: مساحة مربع كعبارة. المطلوب: الضلع، أي العدد الذي مربّعه هذه المساحة.

1 أفهم المسألة

نبحث عن مربع كامل: $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$ مع $a = x$ و $b = 5$.

2 أخطط للحلّ

$x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$ إذاً الضلع $x + 5$. $x = 7$ ل: الضلع 12 cm.

3 أنفذ

$7^2 + 10(7) + 25 = 49 + 70 + 25 = 144 = 12^2 \checkmark$

4 أتحمّق

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



1 صينيّة مستطيلة مساحتها $x^2 - 16 \text{ cm}^2$ وطولها $(x + 4) \text{ cm}$. ما عرضها؟ تحقّق عندما $x = 20$.

ما المعطى؟ ما المطلوب؟

1 أفهم المسألة

ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

2 أخطط للحلّ

أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

3 أنفذ

هل الجواب منطقيّ؟ أعوّض وأنحّق:

4 أتحمّق





2 استعمال التحليل لتحسب ذهنيًا: أ) $97^2 - 3^2$ ، ب) $15 \times 63 + 15 \times 37$.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتأكد هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:



6 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.



خطأ ☐ صح ☐

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3) \quad 1$$

خطأ ☐ صح ☐

$$x^2 + 9 = (x + 3)(x - 3) \quad 2$$

خطأ ☐ صح ☐

$$4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2 \quad 3$$

خطأ ☐ صح ☐

$$6x + 3 = 3(2x + 3) \quad 4$$

7 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

$$5x^2 + 10x = \quad 2$$

$$5x(x + 2) \quad \text{ب}$$

$$5(x^2 + 10x) \quad \text{ا}$$

$$5x(x + 10) \quad \text{د}$$

$$10x(x + 1) \quad \text{ج}$$

$$x^2 - 36 = \quad 1$$

$$(x - 6)(x + 6) \quad \text{ب}$$

$$(x - 6)^2 \quad \text{ا}$$

$$x(x - 36) \quad \text{د}$$

$$(x - 18)(x + 18) \quad \text{ج}$$



$$(x - 1)(x + 2) + (x - 1)(3x) =$$

4

- (x - 1)(3x + 2) ☐ أ (x - 1)(4x + 2) ☐ ب
- (x + 1)(4x + 2) ☐ ج (x - 1)(4x - 2) ☐ د

$$x^2 + 6x + 9 =$$

3

- (x + 3)(x - 3) ☐ أ (x + 9)^2 ☐ ب
- (x + 6)(x + 3) ☐ ج (x + 3)^2 ☐ د



سؤال مفتوح

كيف تتأكد من أنّ تحليلك صحيح من دون أن تسأل أحدًا؟ اشرح طريقتين.

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

8



فردى · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



من الكلّ إلى الأجزاء

التحليل يفكّك عبارة كبيرة إلى عوامل صغيرة. متى تفكّك في حياتك مهمة كبيرة إلى أجزاء لتنجزها؟ (تحضير وصفة، ترتيب المطبخ...)



مجموعات من 4 · 15 دقيقة

تعاون

Cooperation



بطاقات الفريق

توزّع المجموعة 8 بطاقات، على كلّ منها عبارة. يحلّل كل طالب بطاقتين ويشرح طريقته للفريق، ثم يختار الفريق أصعب بطاقة ويعرض حلّها على الصفّ. كلّ صوت في الفريق مهمّ.



فردى · دقيقتان

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



ثلاثة أسئلة قبل البدء

قبل أيّ تحليل اسأل نفسك: عامل مشترك؟ متطابقة؟ عامل مخفي؟ وإذا علقّت أكثر من دقيقتين: خذ نفسًا عميقًا، ثم ارجع إلى بطاقات القواعد. كيف تشعر الآن؟

أقلّ ثقة 1 2 3 4 5 واثق جدًا

ثنائي · 5 دقائق

اتخاذ القرار المسؤول

Responsible decision-making



أيّ طريق أختار؟

للعبارة $4x^2 - 9$ طريقة واحدة مناسبة، وللعبارة $4x^2 - 6x$ طريقة أخرى. اختر لكلّ منهما الطريقة الأنسب وبتر قرارك أمام زميلك.



سؤال بحث



الأعداد الأوليّة: لبنات الأعداد

ابحث عن معنى «العدد الأولي»، ثم حلّل العددين 360 و84 إلى جداء أعداد أوليّة. ما الشبه بين تحليل الأعداد وتحليل العبارات الجبريّة؟

المنتج المطلوب

صفحة واحدة مع أمثلة من إعدادك

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

✓ قِيم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنتُ	
☐	☐	أجد العامل المشترك حتى لو كان قوفاً.
☐	☐	أتعرّف على فرق مربّعين والمربّع الكامل.
☐	☐	أظهر العامل المخفيّ قبل التحليل.





نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

10

نموذج امتحان

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

امتحان الدرس 2: التحليل إلى عوامل

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

pts 5

I حلّ إلى عوامل

ب) $49 - 9x^2$

أ) $7x^2 - 14x$

pts 5

II حلّ إلى عوامل

ب) $(x + 2)(3x - 1) - (x + 2)(x - 5)$

أ) $x^2 - 12x + 36$

pts 5

III حلّ إلى عوامل

$(x^2 - 25) + (x + 5)(2x - 3)$

pts 5

IV حلّ إلى عوامل

$(3x - 1)^2 - (x + 3)^2$



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I حلّ إلى عوامل

$$= 7x(x - 2)$$

أ) العامل المشترك $7x$ 1

$$= 7^2 - (3x)^2 = (7 - 3x)(7 + 3x)$$

ب) فرق مربّعين 1

II حلّ إلى عوامل

$$= x^2 - 2(x)(6) + 6^2 = (x - 6)^2$$

أ) مربّع كامل 1

$$= (x + 2)[(3x - 1) - (x - 5)]$$

ب) القوس $(x+2)$ مشترك 1

$$= (x + 2)(2x + 4) = 2(x + 2)^2$$

2

III حلّ إلى عوامل

$$x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$$

أ) تُظهر العامل $(x+5)$ 1

$$= (x + 5)[(x - 5) + (2x - 3)] = (x + 5)(3x - 8)$$

2

IV حلّ إلى عوامل

$$= [(3x - 1) - (x + 3)][(3x - 1) + (x + 3)]$$

فرق مربّعين 1

$$= (2x - 4)(4x + 2) = 4(x - 2)(2x + 1)$$

نُخرج 2 من كل قوس 2



كثيرة الحدود $P(x)$: توسيع وتحليل

Polynomials · Polynômes

كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

ماذا ستتعلم؟


Français	English	عربي
On donne le polynôme	Given the polynomial	لنكن كثيرة الحدود
Développer et réduire $P(x)$	Expand and reduce $P(x)$	وسّع واختزل $P(x)$
Factoriser $P(x)$	Factorize $P(x)$	حلّل $P(x)$

➤ فهم الرمز $P(x)$ ودرجة كثيرة الحدود.

➤ الإجابة عن سؤال الامتحان الكامل: توسيع ثم تحليل.

➤ التحقق من النتيجتين بقيمة عددية.

➤ حلّ المعادلة $P(x) = 0$ باستعمال الشكل المحلّل.



1 الشرح

كثيرة الحدود عبارة جبرية مثل $P(x) = 6x^2 + 10x - 4$. أكبر أس للمتغير x هو **درجتها** (هنا 2). الرمز $P(3)$ يعني أن نعوض x بالعدد 3.

في الامتحان الرسمي يأتي سؤال واحد بجزأين: (أ) وسّع واختزل $P(x)$ ، (ب) حلّل $P(x)$. الشكلان مختلفان في الكتابة لكنهما **متساويان** لكل قيمة x - وهذا يعطينا طريقة ذهبية للتحقق.

الشكل المحلّل

$$P(x) = (\dots)(\dots)$$

الشكل الموسّع

$$P(x) = ax^2 + bx + c$$



الجداء المعلوم

$A \cdot B = 0$ يعني $A = 0$ أو $B = 0$.

التحقق الذهبي

نحسب $P(0)$ أو $P(1)$ بالشكلين: يجب أن نحصل على العدد نفسه.

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

في التحليل إبحث عن العامل المشترك **المخفي**: غالبًا يظهر بعد تحليل $4x^2 - 16$ أو $x^2 - 9$ إلى فرق مربعين، أو بعد قلب إشارة قوس مثل $-(x - 2) = (2 - x)$.

2 أمثلة محلولة

امتحان 2016

مثال 1

$$P(x) = (3x - 1)(5x + 3) - (3x - 1)^2$$

$$(3x - 1)(5x + 3) = 15x^2 + 4x - 3$$

أ) التوسيع: توزيع مزدوج

$$(3x - 1)^2 = 9x^2 - 6x + 1$$

مربع فرق

$$P(x) = 15x^2 + 4x - 3 - 9x^2 + 6x - 1 = 6x^2 + 10x - 4$$

نختزل

$$P(x) = (3x - 1)[(5x + 3) - (3x - 1)]$$

ب) التحليل: $(3x - 1)$ مشترك

$$P(x) = (3x - 1)(2x + 4) = 2(3x - 1)(x + 2)$$

$$P(1) = 6 + 10 - 4 = 12 \quad ; \quad 2(2)(3) = 12 \checkmark$$

تحقق



$$P(x) = (x - 5)(2 - x) - (4x^2 - 16)$$

$$(x - 5)(2 - x) = 2x - x^2 - 10 + 5x = -x^2 + 7x - 10$$

(أ) التوسيع

1

$$P(x) = -x^2 + 7x - 10 - 4x^2 + 16 = -5x^2 + 7x + 6$$

2

$$4x^2 - 16 = 4(x - 2)(x + 2) ; (2 - x) = -(x - 2)$$

(ب) نُظهر العامل (x-2)

3

$$P(x) = -(x - 2)(x - 5) - 4(x - 2)(x + 2)$$

4

$$P(x) = -(x - 2)[(x - 5) + 4(x + 2)] = -(x - 2)(5x + 3)$$

5

$$P(x) = (2 - x)(5x + 3)$$

شكل أنيق للنتيجة

6

$$P(0) = 6 ; (2)(3) = 6 \checkmark$$

تحقق

7

$$P(x) = (2x + 3)^2 - (2x + 3)(x - 4)$$

$$P(x) = 4x^2 + 12x + 9 - (2x^2 - 5x - 12) = 2x^2 + 17x + 21$$

(أ) التوسيع

1

$$P(x) = (2x + 3)[(2x + 3) - (x - 4)] = (2x + 3)(x + 7)$$

(ب) التحليل

2

$$2x + 3 = 0 ; x + 7 = 0$$

(ج) حلّ $P(x) = 0$: أحد العاملين يساوي 0

3

$$x = -\frac{3}{2} ; x = -7$$

للمعادلة حلان

4



تطبيقات من المطبخ والمطعم

3

قاعة المطعم

مساحة قاعة مطعم (بالمتر المربع) تُعطى بـ $A(x) = (x + 6)^2 - 4$ (أ) حلّ $A(x)$. ب) أوجد x إذا كانت مساحة القاعة 96 m^2 .

الحلّ

$$(x + 4)(x + 8) = 96 \iff x^2 + 12x - 64 = 0 \iff (x - 4)(x + 16) = 0$$

ب) $A(x) = (x + 6 - 2)(x + 6 + 2) = (x + 4)(x + 8)$ (أ) $x^2 + 12x - 64 = 0$ إذاً $x > 0$: القاعة $8 \text{ m} \times 12 \text{ m}$

تمارين 4

لكل كثيرة حدود: (أ) وسّع واختزل $P(x)$ ، ب) حلّ $P(x)$.

المستوى 1 • سهل

وسّع وحلّ

1

$$P(x) = (x + 2)(x - 3) + (x + 2)(2x + 1)$$

وسّع وحلّ

2

$$P(x) = x(x - 4) + 3(x - 4)$$

وسّع وحلّ

3

$$P(x) = (x - 1)^2 - 9$$

طبّق بالأعداد

4

لتكن $P(x) = (x - 1)(x + 3)$. احسب $P(0)$ و $P(1)$ و $P(-3)$. ماذا تلاحظ؟

قارن

5

هل $P(x) = (x - 2)^2$ و $Q(x) = x^2 - 4$ متساويتان؟ احسب $P(0)$ و $Q(0)$ لتقرّر.

المستوى 2 • متوسط

وسّع وحلّ

6

$$P(x) = (2x - 1)(x + 5) - (2x - 1)(3x - 2)$$

وسّع وحلّ

7

$$P(x) = (x + 3)^2 - (2x - 1)^2$$



وسّع وحلّ

8

$$P(x) = (x - 4)(2x + 3) + (x^2 - 16)$$



سؤال عكسيّ

9

شكل كثيرة حدود المحلّل $P(x) = (x + 4)(2x - 1)$. اكتب شكلها الموسّع وحلّ $P(x) = 0$.



اكتشف الخطأ

10

كتب طالب: $(x + 1)^2 - (x + 1)(x - 2) = (x + 1)(x + 1 - x - 2) = -(x + 1)$. أين الخطأ؟

المستوى 3 • صعب

مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

وسّع وحلّ

11

$$P(x) = (2x - 3)^2 - (4x^2 - 9) + (2x - 3)(x + 1)$$

وسّع وحلّ

12

$$P(x) = (3 - x)(2x + 5) - (x^2 - 9)$$

مسألة

13

$$P(x) = (x - 3)(5 - x) - 2(x^2 - 9) \text{ ثم حلّ المعادلة } P(x) = 0$$

طبّق

14

$$P(x) = (x + 2)^2 - (x + 2)(x - 8) \text{ حيث } P(98) \text{ احسب بأسهل طريقة}$$

أنشئ

15



اكتب كثيرة حدود من الدرجة الثانية حلّها $x = 2$ و $x = -5$ ، ثم وسّعها.



المستوى 4 • تحدّ

للمتفوّقين - فكّر خارج الصندوق

مسألة

16

$$P(x) = (x + 2)(3x - 1) - (x + 2)^2 \text{ (أ) وسّع. (ب) حلّ. (ج) حلّ } P(x) = 0 \text{ (د) احسب } P(10) \text{ بأسهل طريقة.}$$

مسألة

17

$$P(x) = (x - 1)(x + 4) + (x^2 - 1) \text{ حلّ } P(x) \text{ ثم وسّع، وتحقّق من أنّ } P(0) \text{ هو نفسه في الشكلين.}$$



4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

ربح مطعم (بالدولار) عند بيع x وجبة هو $P(x) = (x - 10)(x + 30) - (x - 10)^2$. حلّ $P(x)$. كم وجبة يجب أن يبيع ليكون الربح صفرًا؟ وكم يربح عند بيع 60 وجبة؟

المعطى: عبارة الربح. المطلوب: الشكل المحلّل، ثم حلّ $P(x) = 0$ ، ثم $P(60)$.

① أفهم المسألة

العامل المشترك $(x - 10)$ ، ثم الجداء المعلوم، ثم نعوّض في الشكل الأسهل.

② أخطّط للحلّ

$P(x) = 0 \iff x =$ $P(x) = (x - 10)[(x + 30) - (x - 10)] = 40(x - 10)$
10 وجبات. $P(60) = 40 \times 50 = 2000$ دولارات.

③ أنفّذ

من الشكل الأصلي: $50 \times 90 - 50^2 = 4500 - 2500 = 2000 \checkmark$

④ أتحقّق

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



مساحة أرضيّة مطبخ (بالمتر المربّع) هي $A(x) = (x + 3)^2 - (x + 3)(x - 1)$. حلّ $A(x)$ ، ثم أوجد x إذا كانت المساحة 48 m^2 .

1

ما المعطى؟ ما المطلوب؟

① أفهم المسألة

ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

② أخطّط للحلّ

أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

③ أنفّذ

هل الجواب منطقيّ؟ أعوّض وأتحقّق:

④ أتحقّق





2 $P(x) = (2x - 1)(x + 5) - (2x - 1)(x + 1)$. حلّل $P(x)$ ، ثم أوجد x الذي يجعل $P(x) = 0$ ، واحسب $P(3)$.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقّق هل الجواب منطقي؟ أعوّض وأتحقّق:



6 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.



خطأ ☐ صح ☐

1 $(x - 2)(2 - x) = -(x - 2)^2$

خطأ ☐ صح ☐

2 $x^2 - 16 = (x - 8)(x + 8)$

خطأ ☐ صح ☐

3 $(x + 1)(x + 2) = x^2 + 2$

خطأ ☐ صح ☐

4 $(3 - x) = -(x - 3)$

7 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

2 الشكل الموسّع لـ $(x + 1)(2x - 3)$ هو

- أ $2x^2 - x - 3$ ب $2x^2 - 3$ ج $2x^2 + x - 3$ د $2x^2 - 5x - 3$

1 إذا كانت $P(x) = (x - 2)(x + 5)$ فإنّ $P(2) =$

- أ 0 ب 7 ج -10 د 14



3 الشكل المحلل لـ $x^2 - 4x$ هو

- ☐ أ $x(x - 4)$
☐ ب $(x - 2)^2$
☐ ج $x(x + 4)$
☐ د $(x - 4)^2$

4 حلول المعادلة $(x - 3)(2x + 1) = 0$ هي

- ☐ أ $x = 3$ أو $x = -\frac{1}{2}$
☐ ب $x = -3$ أو $x = \frac{1}{2}$
☐ ج $x = 3$ فقط
 ☐ د $x = \frac{1}{2}$ فقط

سؤال مفتوح



قارن بين الشكل الموسّع والشكل المحلل لكثيرة حدود: متى تستعمل كلّ منهما؟ أعط مثالاً.

Social-Emotional Learning · SEL

8 التعلّم الاجتماعي العاطفي: أنشطة



فردية · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



لماذا شكلان؟

لماذا نحتاج إلى شكلين لـ $P(x)$ ؟ متى يكون الشكل المحلل أفضل، ومتى يكون الموسّع أفضل؟ أجب بجملتين.



ثنائية · 10 دقائق

Cooperation تعاون



الخبير والمدقق

يوسّع طالب $P(x)$ ويحلّله الآخر، ثم يحسب كلّ منهما $P(0)$ من شكله. إذا اختلف العدداً يبحثان معاً عن الخطأ من دون لوم، فالهدف هو الفهم وليس الفوز.

مجموعات · 10 دقائق

الوعي الاجتماعي

Social awareness



ربح بلا هدر

ربح المطعم $P(x)$ يهّم صاحبه والعاملين فيه. ناقشوا: كيف يربح المطعم من دون هدر الطعام؟ اقترحوا فكرة لإبصال الفائض إلى المحتاجين، بروح العطاء في جمعيّة المبرّات.



فردية · طوال الحصّة

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness &

management



هدف في الوقت

ضع هدفًا: «سأحلّ سؤال $P(x)$ كاملاً في ... دقائق». بعد التمارين قارن الوقت الفعليّ بهدفك. ماذا ستغيّر في المرة القادمة؟



سؤال بحث



نقطة التعادل في مطعم

اسأل صاحب فرن أو مطعم في منطقتك (أو ابحث): كم تكلف المنقوشة الواحدة، وبكم تُباع، وما الكلفة الثابتة اليومية (إيجار، كهرباء...)? اكتب عبارة الربح $P(x)$ عند بيع x منقوشة، وأوجد عدد المناقيش الذي يجعل الربح صفراً (نقطة التعادل).

المنتج المطلوب

عرض شفهي لمدة 3 دقائق

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

✓ قيم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنت	
☐	☐	أجيب عن جزأي سؤال $P(x)$ كاملاً.
☐	☐	أتحقق من نتيجتي بحساب $P(0)$.
☐	☐	أحل المعادلة $P(x) = 0$ من الشكل المحلل.





نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

10

نموذج امتحان

امتحان الدرس 3: كثيرة الحدود $P(x)$: توسيع وتحليل

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات
لا شيء

العلامة
20

المدة
30 دقيقة

pts 5

I لتكن $P(x) = (2x - 3)(x + 4) - (2x - 3)^2$ وسّع واختزل $P(x)$

$P(x)$

pts 5

II حلّ $P(x)$

$P(x)$

pts 5

III حلّ المعادلة $P(x) = 0$

$P(x) = 0$

pts 5

IV احسب $P(0)$ بالشكلين وتحقّق

$P(0)$



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I لتكن $P(x) = (2x - 3)(x + 4) - (2x - 3)^2$ وسّع واخترزل $P(x)$

$$(2x - 3)(x + 4) = 2x^2 + 5x - 12$$

توزيع مزدوج

1

$$(2x - 3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$$

مربع فرق

2

$$P(x) = 2x^2 + 5x - 12 - 4x^2 + 12x - 9 = -2x^2 + 17x - 21$$

3

II حلّ $P(x)$

$$P(x) = (2x - 3)[(x + 4) - (2x - 3)]$$

العامل $(2x - 3)$ مشترك

1

$$P(x) = (2x - 3)(7 - x)$$

2

III حلّ المعادلة $P(x) = 0$

$$(2x - 3)(7 - x) = 0 \iff 2x - 3 = 0 ; 7 - x = 0$$

الجداء المعدوم

1

$$x = \frac{3}{2} ; x = 7$$

للمعادلة حلّان

2

IV احسب $P(0)$ بالشكلين وتحقّق

$$-2(0)^2 + 17(0) - 21 = -21$$

الشكل الموسّع

1

$$(2(0) - 3)(7 - 0) = (-3)(7) = -21 \checkmark$$

الشكل المحلّل

2



الجذور التربيعية

Square roots · Racines carrées

4

كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

ماذا ستتعلم؟


Français	English	عربي
Simplifier les expressions	Simplify the expressions	بسط / اختزل العبارات
Effectuer et simplifier	Effectuate and simplify	أجرِ العمليات وبسط

➤ تبسيط جذر بإخراج أكبر مربع كامل.

➤ جمع وطرح الجذور المتشابهة.

➤ ضرب عبارات فيها جذور واستعمال المتطابقات معها.

30



30 cm

 $30\sqrt{2} \text{ cm}$
 $\approx 42.4 \text{ cm} > 40 \text{ cm}$

هل تتسع باغيت طولها 40 cm على قطر صينية ضلعها 30 cm؟

1 الشرح

الجذر التربيعي لعدد موجب a هو العدد الموجب الذي مربعه a : $\sqrt{25} = 5$ لأن $5^2 = 25$. لتبسيط جذر نكتب العدد على شكل (مربع كامل $\times$ عدد آخر) ونُخرج المربع الكامل: $\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3}$.

الجذور المتشابهة (نفس العدد تحت الجذر) تُجمع مثل الحدود المتشابهة: $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$ ، تمامًا كما $3x + 5x = 8x$. أمّا $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ فلا تُجمع.

جذر الجداء

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

الخاصية الأساسية

$$(\sqrt{a})^2 = a \quad \sqrt{a^2} = a \quad (a \geq 0)$$



الجمع

$$m\sqrt{a} + n\sqrt{a} = (m + n)\sqrt{a}$$

جذر القسمة

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

مع المتطابقات

$$(\sqrt{a} \pm \sqrt{b})^2 = a + b \pm 2\sqrt{ab}$$

المربّعات الكاملة – احفظها!

$$\sqrt{1}$$

1

$$\sqrt{4}$$

2

$$\sqrt{9}$$

3

$$\sqrt{16}$$

4

$$\sqrt{25}$$

5

$$\sqrt{36}$$

6

$$\sqrt{49}$$

7

$$\sqrt{64}$$

8

$$\sqrt{81}$$

9

$$\sqrt{100}$$

10

$$\sqrt{121}$$

11

$$\sqrt{144}$$

12

$$\sqrt{169}$$

13

$$\sqrt{196}$$

14

$$\sqrt{225}$$

15

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ مثلاً $\sqrt{9+16} = 5$ بينما $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$ و $(2\sqrt{3})^2 = 4 \times 3 = 12$ وليس 2×3 .

2 أمثلة محلولة

مثال 1

$$\sqrt{72}$$

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$$

36 أكبر مربع كامل يقسم 72

1

امتحان 2016

مثال 2

$$A = 3\sqrt{12} - 2\sqrt{27} + \sqrt{48} - 4\sqrt{3}$$

$$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}; \sqrt{27} = 3\sqrt{3}; \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$$

نبسّط كل جذر

1

$$A = 6\sqrt{3} - 6\sqrt{3} + 4\sqrt{3} - 4\sqrt{3}$$

2

$$A = 0$$

3



امتحان 2017

مثال 3

$$B = 3\sqrt{8} - 2\sqrt{18} + \sqrt{75} - \sqrt{32}$$

$$B = 3(2\sqrt{2}) - 2(3\sqrt{2}) + 5\sqrt{3} - 4\sqrt{2}$$

نيسط

1

$$B = 6\sqrt{2} - 6\sqrt{2} + 5\sqrt{3} - 4\sqrt{2}$$

2

$$B = 5\sqrt{3} - 4\sqrt{2}$$

لا يمكن جمع $3\sqrt{}$ مع $2\sqrt{}$

3

امتحان 2016

مثال 4

$$C = (\sqrt{6} - \sqrt{2})(2\sqrt{2} + \sqrt{6})$$

$$C = 2\sqrt{12} + 6 - 4 - \sqrt{12}$$

توزيع مزدوج: $6 = 6\sqrt{1} \cdot 6\sqrt{1}$ و $4 = 2\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2}$

1

$$C = \sqrt{12} + 2 = 2\sqrt{3} + 2$$

2

امتحان 2017

مثال 5

$$D = (2\sqrt{3} - \sqrt{5})^2 + (2\sqrt{3} + \sqrt{5})^2$$

$$(2\sqrt{3} - \sqrt{5})^2 = 12 - 4\sqrt{15} + 5 = 17 - 4\sqrt{15}$$

مربع فرق

1

$$(2\sqrt{3} + \sqrt{5})^2 = 17 + 4\sqrt{15}$$

مربع مجموع

2

$$D = 34$$

الجذران يتلاشيان

3



تطبيقات من المطبخ والمطعم

3

هل تتسع الباغيت؟

صينية فرن مربعة ضلعها 30 cm. يريد الطاهي وضع رغيف باغيت طوله 40 cm على قطرها. هل يتسع؟

الحل

بفيثاغورس: القطر = $\sqrt{30^2 + 30^2} = \sqrt{1800} = 30\sqrt{2} \approx 42.4 \text{ cm} > 40$. نعم، يتسع.

الطاولة المربعة

مساحة سطح طاولة مربعة 50 dm^2 . ما طول ضلعها؟

الحل

$$c = \sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2} \approx 7.07 \text{ dm}$$

تمارين

4

بسّط كل عبارة:

المستوى 1 • سهل

بسّط

1

$$\sqrt{50}$$

بسّط

2

$$\sqrt{45}$$

بسّط

3

$$2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - \sqrt{3}$$

بسّط

4

$$\sqrt{2} \times \sqrt{18}$$

أكمل الفراغ

5

$$\sqrt{72} = \sqrt{\square \times 2} = \square\sqrt{2}$$

اكتشف الخطأ

6

كتب علي: $5 = \sqrt{25} = \sqrt{9} + \sqrt{16}$. صحّح له.



رتّب

7

رتّب تصاعدياً دون آلة حاسبة: $3\sqrt{2}$, $2\sqrt{3}$, 4. (تلميح: رتّب كل عدد)

المستوى 2 • متوسط

بسّط

8

$$\sqrt{12} + \sqrt{27} + \sqrt{75}$$

بسّط

9

$$2\sqrt{50} - 3\sqrt{8} + \sqrt{18}$$



بسط

11

$$(\sqrt{3} + 1)^2$$

بسط

10

$$\sqrt{3}(2\sqrt{3} - \sqrt{6})$$



سؤال عكسي

12

أوجد العدد a إذا كان $\sqrt{a} = 5\sqrt{3}$.

طبّق

13

مرّّع مساحته 45 cm^2 . احسب ضلعه بأبسط شكل، وقيّمته التقريبية.

قارن

14

أيّهما أكبر: $\sqrt{50}$ أم 7؟ علّل دون آلة حاسبة.

المستوى 3 • صعب

مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

بسط

16

$$(3\sqrt{2} - \sqrt{3})(\sqrt{2} + 2\sqrt{3})$$

بسط

15

$$5\sqrt{20} - 3\sqrt{45} + 2\sqrt{80} - \sqrt{125}$$

بسط

17

$$(2\sqrt{3} - 1)^2 - (2\sqrt{3} + 1)(2\sqrt{3} - 1)$$



فتر

18

برهن أنّ $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$ أكبر من $a + b$ لأيّ عددين موجبين a و b . جرّب مع $a = 2$ و $b = 3$.

أنشئ

19

اكتب ثلاثة جذور مختلفة يصبح كلّ منها على شكل $k\sqrt{2}$ بعد التبسيط، ثم اجمعها.

المستوى 4 • تحدّ

للمتفوّقين - فكّر خارج الصندوق

بسط

20

$$4\sqrt{27} - 2\sqrt{75} + \sqrt{300} - 7\sqrt{3}$$

بسط

21

$$(1 + \sqrt{2})^2 + (1 - \sqrt{2})^2 - (\sqrt{3})^4$$



4

أتَحَقَّقْ

Check

3

أُنَفِّذْ

Solve

2

أُخَطِّطُ لِلْحَلِّ

Plan

1

أَفْهَمُ الْمَسْأَلَةَ

Understand



مسألة محلولة

طاولة مربعة مساحة سطحها 72 dm^2 . ما طول ضلعها بأبسط شكل؟ وما محيطها؟

1 أفهم المسألة

المعطى: مساحة مربع. المطلوب: الضلع والمحيط، بأبسط شكل.

2 أخطط للحلّ

الضلع هو الجذر التربيعي للمساحة، ثم نبسط الجذر، والمحيط $4 \times$ الضلع.

3 أنفذ

$c = \sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2} \text{ dm}$ ؛ المحيط $24\sqrt{2} \approx 33.9 \text{ dm}$.

4 أتَحَقَّقْ

$(6\sqrt{2})^2 = 36 \times 2 = 72 \checkmark$

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



1

مطيخ مستطيل بُعْدَاه $m\sqrt{50}$ و $m\sqrt{8}$. احسب مساحته ومحيطه بأبسط شكل.

1 أفهم المسألة

ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحلّ

ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ

أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتَحَقَّقْ

هل الجواب منطقي؟ أعوِّض وأتَحَقَّقْ:





2 صينيّة مربّعة ضلعها 20 cm. احسب طول قطرها بأبسط شكل، ثم قرّبه إلى أقرب mm ($\sqrt{2} \approx 1.414$).

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطّط للحلّ ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفّذ أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتحقّق هل الجواب منطقيّ؟ أعوّض وأتحقّق:



6 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.



1 $\sqrt{9 + 16} = 7$ صح ☐ خطأ ☐

2 $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ صح ☐ خطأ ☐

3 $(3\sqrt{2})^2 = 18$ صح ☐ خطأ ☐

4 $\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{5}$ صح ☐ خطأ ☐

7 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

2 $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} =$

8 $\sqrt{2}$ (ب)

8 (د)

8 $\sqrt{4}$ (ا)

15 $\sqrt{2}$ (ج)

1 $\sqrt{48} =$

3 $\sqrt{4}$ (ب)

8 $\sqrt{3}$ (د)

4 $\sqrt{3}$ (ا)

6 $\sqrt{2}$ (ج)

4 $\sqrt{2} \times \sqrt{8} =$

4 (ب)

2 $\sqrt{2}$ (د)

$\sqrt{10}$ (ا)

16 (ج)

3 $(\sqrt{5})^2 + (\sqrt{3})^2 =$

$\sqrt{8}$ (ب)

34 (د)

8 (ا)

2 $\sqrt{2}$ (ج)



سؤال مفتوح



صديقك كتب $4\sqrt{5} = \sqrt{20}$. اشرح له خطأه وصحّحه.

.....
.....
.....

Social-Emotional Learning · SEL

التعلّم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

8



فردّي · 5 دقائق

التأمّل والتفكير

Reflection



كيف أقنع صديقي؟

صديقك يظنّ أنّ $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$. كيف تقنعه بمثال عدديّ بسيط، ومن دون أن تُشعره بالحرج؟

.....
.....



ثنائيّ · 10 دقائق

تعاون Cooperation



سباق المربّعات

يذكر طالب عددًا (مثل 72) ويبسّط زميله جذره خلال 20 ثانية، ثم يتبادلان الأدوار. سجّلا النقاط لكما معًا كفريق واحد، لا كمتنافسين.



فردّي · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



مقياس ثقّتي بالجذور

لَوْن مستوى ثقّتك أمام الجذور. ما الذي يرفع ثقّتك درجة واحدة؟ (حفظ جدول المربّعات، 5 دقائق تمرين يوميًا...)

أقلّ ثقة 1 2 3 4 5 واثق جدًّا

.....

ثنائيّ · 5 دقائق

مهارات التواصل

Relationship skills



مدّد يد العون

اختر زميلًا يجد صعوبة، وساعده في تمرين واحد من دون أن تحلّه عنه. ثم اسأله: ما الذي ساعدك أكثر؟

.....
.....



سؤال بحث



سرّ ورقة A4

قس طول ورقة A4 وعرضها بالمليمتر، واحسب النسبة $\frac{297}{210}$. قارنها بـ $\sqrt{2} \approx 1.414$. ابحث: لماذا اختيرت هذه النسبة؟ (تلميح: ماذا يحدث عندما نطوي الورقة إلى نصفين؟)

المنتج المطلوب

تقرير قصير مع صور للطّي

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

✓ قِيم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً

أتقنُ

☐☐

أبسط أي جذر بإخراج المربع الكامل.

☐☐

أجمع الجذور المتشابهة فقط.

☐☐

أستعمل المتطابقات مع الجذور.





نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

10

نموذج امتحان

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

امتحان الدرس 4: الجذور التربيعية

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

pts 5

I بسّط

(ب) $\sqrt{128}$

(أ) $\sqrt{75}$

pts 5

II بسّط

$2\sqrt{45} - \sqrt{20} + 3\sqrt{5}$

pts 5

III أجر العمليات

(ب) $(2\sqrt{5} - 1)(2\sqrt{5} + 1)$

(أ) $(\sqrt{3} + 2)^2$

pts 5

IV أجر العمليات وبسّط

$(3\sqrt{2} - \sqrt{6})(\sqrt{2} + \sqrt{6})$



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I بسّط

$$= \sqrt{25 \times 3} = 5\sqrt{3}$$

أ) 1

$$= \sqrt{64 \times 2} = 8\sqrt{2}$$

ب) 1

II بسّط

$$= 2(3\sqrt{5}) - 2\sqrt{5} + 3\sqrt{5}$$

نبسّط كل جذر

1

$$= 6\sqrt{5} - 2\sqrt{5} + 3\sqrt{5} = 7\sqrt{5}$$

2

III أجزّ العمليات

$$= 3 + 4\sqrt{3} + 4 = 7 + 4\sqrt{3}$$

أ) 1 مربع مجموع

$$= (2\sqrt{5})^2 - 1^2 = 20 - 1 = 19$$

ب) 1 جداء مجموع بفرق

IV أجزّ العمليات وبسّط

$$= 6 + 3\sqrt{12} - \sqrt{12} - 6$$

توزيع مزدوج

1

$$= 2\sqrt{12} = 4\sqrt{3}$$

2



إنطاق المقام

5

Rationalize the denominator · Rendre rationnel le dénominateur

كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

ماذا ستتعلم؟


➤ التخلص من جذر وحيد في المقام.

➤ استعمال المرافق للتخلص من مجموع أو فرق فيه جذور.

➤ تبسيط الكسر الناتج.

Français	English	عربي
Rendre rationnel le dénominateur	Rationalize the denominator	أنطق المقام
Rendre rationnel le dénominateur	Rationalize the denominator	تخلص من الجذور في المقام

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \xrightarrow{\times \sqrt{2} / \sqrt{2}} \frac{\sqrt{2}}{2}$$

 ≈ 0.707 

العدد نفسه بكتابتين: الثانية أسهل في الحساب والمقارنة

1 الشرح

إنطاق المقام يعني كتابة الكسر نفسه بمقام خالٍ من الجذور. الفكرة: نضرب البسط والمقام بالعدد نفسه (فلا تتغير قيمة الكسر) بحيث يختفي الجذر من المقام.

الحالة 1: المقام $a\sqrt{b}$ ← نضرب بـ $\sqrt{b}$. **الحالة 2:** المقام $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ أو $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ ← نضرب بالمرافق (نفس الحدين مع عكس الإشارة الوسطى)، فتعطي المتطابقة $(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = a - b$ عددًا بلا جذور.



المرافق

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} \longleftrightarrow \sqrt{a} - \sqrt{b}$$

جذر وحيد

$$\frac{k}{a\sqrt{b}} = \frac{k\sqrt{b}}{ab}$$

مقام بفرق

$$\frac{k}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{k(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{a - b}$$

مقام بمجموع

$$\frac{k}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{k(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{a - b}$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

اضرب البسط أيضًا - وليس المقام وحده! وبعد الضرب ببسط: إذا كان كل حدود البسط تقبل القسمة على المقام، اقسم.

2 أمثلة محلولة

مثال 1

$$\frac{6}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$

1

نضرب بـ $\sqrt{3}$

امتحان 2015

مثال 2

$$\frac{2 + \sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$$

$$= \frac{(2 + \sqrt{3})\sqrt{3}}{2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3} + 3}{6}$$

1

نضرب البسط والمقام بـ $\sqrt{3}$



امتحان 2016

مثال 3

$$\frac{3 - 2\sqrt{3}}{5\sqrt{3}}$$

$$= \frac{(3 - 2\sqrt{3})\sqrt{3}}{5 \times 3} = \frac{3\sqrt{3} - 6}{15}$$

1

$$= \frac{3(\sqrt{3} - 2)}{15} = \frac{\sqrt{3} - 2}{5}$$

2

نيسط على 3

امتحان 2015

مثال 4

$$\frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}}$$

$$= \frac{(\sqrt{2} - \sqrt{3})(\sqrt{2} - \sqrt{3})}{(\sqrt{2} + \sqrt{3})(\sqrt{2} - \sqrt{3})}$$

1

نضرب بالمرافق $3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}$

$$= \frac{2 - 2\sqrt{6} + 3}{2 - 3} = \frac{5 - 2\sqrt{6}}{-1}$$

2

$$= 2\sqrt{6} - 5$$

3

امتحان 2016

مثال 5

$$\frac{\sqrt{6} - 2\sqrt{3}}{\sqrt{6} - \sqrt{3}}$$

$$= \frac{(\sqrt{6} - 2\sqrt{3})(\sqrt{6} + \sqrt{3})}{6 - 3}$$

1

نضرب بالمرافق $3\sqrt{2} + 6\sqrt{3}$

$$= \frac{6 + \sqrt{18} - 2\sqrt{18} - 6}{3} = \frac{-\sqrt{18}}{3}$$

2

$$= \frac{-3\sqrt{2}}{3} = -\sqrt{2}$$

3



تطبيقات من المطبخ والمطعم

3

ضلع الصينيّة من قطرها



قطر صينيّة مربّعة 40 cm. ضلعها $c = \frac{40}{\sqrt{2}}$. اكتب c بمقام منطوق واحسب قيمته التقريبية.

الحلّ

$$c = \frac{40\sqrt{2}}{2} = 20\sqrt{2} \approx 20 \times 1.414 = 28.28 \text{ cm}$$

الضرب في 1.414 أسهل بكثير من القسمة عليه!

تمارين

4

أنطق المقام ثم بسّط:

المستوى 1 • سهل

تمارين مباشرة على القاعدة

أنطق

2

$$\frac{3}{2\sqrt{3}}$$

أنطق

1

$$\frac{5}{\sqrt{5}}$$

أنطق

3

$$\frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3}}$$

أكمل الفراغ

4

$$\frac{4}{\sqrt{2}} = \frac{4 \times \square}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \square \text{ :أكمل}$$

اكتشف الخطأ

5

كتبت هلا: $\frac{3}{\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$ (ضربت البسط وحده). صحّحي.



المرافق

6

اكتب مرافق كلٍّ من: $\sqrt{6} - \sqrt{2}$, $3 - \sqrt{5}$, $\sqrt{7} + 2$ ، واحسب جداء كل عدد بمرافقه.

المستوى 2 • متوسط

قاعدتان أو أكثر في التمرين

أنطق

8

$$\frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$$

أنطق

7

$$\frac{2}{\sqrt{3} - 1}$$



أنطق

$$\frac{3}{\sqrt{5} - \sqrt{2}}$$

10

أنطق

$$\frac{\sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}}$$

9

قارن

11 أيهما أكبر: $\frac{1}{\sqrt{2}}$ أم $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ؟ أنطق ثم قارن.

طبّق

12 مستطيل مساحته 10 وطوله $\sqrt{5}$. أوجد عرضه بمقام منطق.

المستوى 3 • صعب

مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

أنطق

$$\frac{3 + \sqrt{2}}{3 - \sqrt{2}}$$

14

أنطق

$$\frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$$

13

أنطق

$$\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$$

16

أنطق

$$\frac{2}{\sqrt{3} + 1} + \frac{2}{\sqrt{3} - 1}$$

15

فسّر



17 لماذا يعطي ضرب $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ بمرافقه عددًا بلا جذور؟ برهن باستعمال مطابقة، ثم جرّب مع $\sqrt{5} + \sqrt{2}$.

سؤال عكسي



18 أوجد العدد k إذا كان $\frac{k}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$.



المستوى 4 • تحدّ

للمتفوّقين - فكّر خارج الصندوق

أنطق

$$\frac{1}{\sqrt{2} + 1} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} + \frac{1}{2 + \sqrt{3}}$$

19

أنطق

$$\frac{2 + \sqrt{5}}{2 - \sqrt{5}} + \frac{2 - \sqrt{5}}{2 + \sqrt{5}}$$

20



بناء المهارات: خطوات حل المسألة

4

أتحقق

Check

3

أنفذ

Solve

2

أخطط للحل

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

لوح شوكولا مستطيل مساحته 6 dm^2 وطوله $(\sqrt{3} + 1) \text{ dm}$. أوجد عرضه بمقام منطقي، ثم قيمته التقريبية.

المعطى: المساحة والطول. المطلوب: العرض = المساحة ÷ الطول، بمقام خالٍ من الجذور.

① أفهم المسألة

$$w = \frac{6}{\sqrt{3} + 1} \text{ نضرب بالمرافق } \sqrt{3} - 1.$$

② أخطط للحل

$$w = \frac{6(\sqrt{3} - 1)}{3 - 1} = 3(\sqrt{3} - 1) = 3\sqrt{3} - 3 \approx 2.20 \text{ dm}$$

③ أنفذ

$$(\sqrt{3} + 1)(3\sqrt{3} - 3) = 9 - 3\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - 3 = 6 \checkmark$$

④ أتحقق

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



1 صينية مستطيلة مساحتها 4 dm^2 وطولها $(\sqrt{5} + 1) \text{ dm}$. أوجد عرضها بمقام منطقي وتحقق من جوابك.

① أفهم المسألة

ما المعطى؟ ما المطلوب؟

② أخطط للحل

ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

③ أنفذ

أكتب الحل خطوة بخطوة:

④ أتحقق

هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:





2 قطر منديل مربع 10 cm، وضلعه $\frac{10}{\sqrt{2}}$. اكتب الضلع بمقام منطوق، ثم احسب مساحة المنديل.

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتحقق هل الجواب منطوق؟ أعوض وأتحقق:



6 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحح العبارة الخاطئة.



خطأ ☐ صح ☐

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad 1$$

خطأ ☐ صح ☐

$$\frac{2}{\sqrt{2}} = 1 \quad 2$$

خطأ ☐ صح ☐

$$\frac{1}{\sqrt{3}+1} = \frac{\sqrt{3}-1}{2} \quad 3$$

خطأ ☐ صح ☐

$$(\sqrt{5}-\sqrt{3})(\sqrt{5}+\sqrt{3})=2 \quad 4$$

7 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

2 مرافق العدد $\sqrt{5}-2$ الذي يجعل الجداء عددًا بلا جذور هو

- (أ) $\sqrt{5}+2$ (ب) $2\sqrt{5}$
 (ج) $\sqrt{5}-2$ (د) $5-2$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \quad 1$$

- (أ) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (ب) $\frac{\sqrt{3}}{9}$
 (ج) $\sqrt{3}$ (د) $\frac{1}{3}$



$$\frac{1}{\sqrt{3}-1} =$$

4

$$\sqrt{3} + 1 \quad \text{ب}$$

$$\frac{\sqrt{3} + 1}{2} \quad \text{ا}$$

$$\sqrt{3} - 1 \quad \text{د}$$

$$\frac{\sqrt{3} - 1}{2} \quad \text{ج}$$

$$\frac{6}{\sqrt{2}} =$$

3

$$6\sqrt{2} \quad \text{ب}$$

$$3\sqrt{2} \quad \text{ا}$$

$$3 \quad \text{د}$$

$$\sqrt{3} \quad \text{ج}$$



سؤال مفتوح

لماذا لا تتغير قيمة الكسر عندما نضرب بسطه ومقامه بالمرافق؟

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

8



فردية · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



الكعكة لا تتغير

لماذا نضرب البسط والمقام بالعدد نفسه؟ فكّر في كعكة تُقطع إلى ضعف عدد القطع: هل يتغير نصيبك؟



ثنائية · 10 دقائق

Cooperation تعاون



ارفع المرافق

يكتب المعلم مقامات على اللوح، مثل $\sqrt{2} + \sqrt{5}$ و $3 - \sqrt{7}$ ، ويرفع كلّ ثنائي بطاقة المرافق الصحيح. نناقش الأخطاء معًا، ونعتبرها فرصًا للتعلم.



فردية · أثناء التمارين

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



صبر الخطوات الطويلة

قسّم التمرين إلى ثلاث مراحل (الضرب بالمرافق، ثم التبسيط، ثم التحقق)، وضع ✓ بعد كلّ مرحلة. كيف ساعدك ذلك على التركيز؟

أقلّ ثقة 1 2 3 4 5 واثق جدًا

ثنائية · 5 دقائق

اتخاذ القرار المسؤول

Responsible decision-making



قرار في الامتحان

إذا كتبتّ الجواب $\frac{1}{\sqrt{2}}$ في سؤال «أنطق المقام»، فهل تحصل على العلامة كاملة؟ ناقش أهمية قراءة المطلوب بدقة قبل الإجابة.



سؤال بحث



الحساب قبل الآلات الحاسبة

ابحث كيف كان الناس يحسبون قبل الآلات الحاسبة. احسب يدويًا $1.414 \div 1$ ثم $1.414 \div 2$ ، وقارن الصعوبة.

لماذا فضّل الرياضيون كتابة $\frac{\sqrt{2}}{2}$ بدل $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ؟

المنتج المطلوب

فقرة مكتوبة مع الحسابات

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

✓ قيّم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً

أتقنُ

☐☐

أنطق مقامًا فيه جذر واحد.

☐☐

أستعمل المرافق بشكل صحيح.

☐☐

أبسط الكسر في النهاية.





نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

10

نموذج امتحان

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

امتحان الدرس 5: إنطاق المقام

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

pts 5

I أنطق المقام

ب) $\frac{4}{3\sqrt{2}}$

أ) $\frac{15}{\sqrt{5}}$

pts 5

II أنطق المقام

$\frac{2 + \sqrt{2}}{\sqrt{2}}$

pts 5

III أنطق المقام

$\frac{5}{\sqrt{7} - \sqrt{2}}$

pts 5

IV أنطق المقام وببسط

$\frac{\sqrt{5} + 1}{\sqrt{5} - 1}$



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I أنطق المقام

$$= \frac{15\sqrt{5}}{5} = 3\sqrt{5}$$

أ) 1

نضرب بـ $5\sqrt{5}$

$$= \frac{4\sqrt{2}}{3 \times 2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

ب) 1

II أنطق المقام

$$= \frac{(2 + \sqrt{2})\sqrt{2}}{2} = \frac{2\sqrt{2} + 2}{2} = \sqrt{2} + 1 \quad 1$$

III أنطق المقام

$$= \frac{5(\sqrt{7} + \sqrt{2})}{7 - 2} = \sqrt{7} + \sqrt{2} \quad 1$$

نضرب بالمرافق $2\sqrt{7} + 7\sqrt{2}$

IV أنطق المقام وبسط

$$= \frac{(\sqrt{5} + 1)^2}{5 - 1} = \frac{6 + 2\sqrt{5}}{4} \quad 1$$

نضرب بالمرافق $1 + 5\sqrt{5}$

$$= \frac{3 + \sqrt{5}}{2} \quad 2$$

نبسط على 2



حلّ نظام معادلتين بمجهولين

Systems of equations · Systèmes d'équations

كيف يأتي السؤال في الامتحان؟

ماذا ستتعلم؟


Français	English	عربي
Résoudre le système suivant	Solve the following system	حلّ النظام (المنظومة) التالي

➤ فهم معنى حلّ النظام: زوج $(x ; y)$ يحقق المعادلتين معًا.

➤ الحلّ بطريقة التعويض.

➤ الحلّ بطريقة الحذف (الجمع).

➤ التخلص من الكسور، وترجمة مسألة حياتية إلى نظام.



منقوشة: 2 دولار

عصير: 1.5 دولار

حلّ النظام هو نقطة تقاطع المستقيمين: مسألة المناقيش والعصير

1 الشرح

النظام مكوّن من معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين x و y . حلّه هو الزوج $(x ; y)$ الذي يحقق المعادلتين في الوقت نفسه.

طريقة التعويض: نستخرج أحد المجهولين من معادلة (نختار المجهول الذي معاملته 1 أو -1) ونعوضه في الأخرى.

طريقة الحذف: نضرب المعادلتين بعددين مناسبين حتى يصبح معامل أحد المجهولين متعاكسًا، ثم نجمع المعادلتين فيختفي.

إذا وُجدت كسور: نضرب كل معادلة بالمضاعف المشترك الأصغر لمقاماتها أولاً.



التعويض

$$x + 2y = 4 \Rightarrow x = 4 - 2y$$

الشكل العام

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

التحقق

نعوّض $(x ; y)$ في المعادلتين الأصليتين.

الحذف

نضرب المعادلتين ليتعاكس معامل أحد المجهولين، ثم نجمع $(1) + (2)$ فيختفي.

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

بعد إيجاد x و y **تحقق دائماً** في المعادلتين الأصليتين (وليس في المعادلات المحوَّلة)، واكتب الحلّ على شكل زوج مرتّب $(x ; y)$ - الترتيب مهمّ.

2 أمثلة محلولة

امتحان 2015

مثال 1

$$\begin{cases} -x - 2y = -4 \\ 3x + y = -3 \end{cases}$$

$$-x - 2y = -4 \Rightarrow x = 4 - 2y$$

طريقة التعويض: نستخرج x من (1)

1

$$3(4 - 2y) + y = -3 \Rightarrow 12 - 5y = -3$$

نعوّض في (2)

2

$$-5y = -15 \Rightarrow y = 3$$

3

$$x = 4 - 2(3) = -2$$

4

$$-(-2) - 2(3) = -4 \checkmark \quad 3(-2) + 3 = -3 \checkmark$$

تحقق - الحلّ $(-2 ; 3)$

5



امتحان 2016

مثال 2

$$\begin{cases} -5x + 2y = -1 \\ 3x - 3y = 6 \end{cases}$$

$$(1) \times 3 : -15x + 6y = -3$$

طريقة الحذف

1

$$(2) \times 2 : 6x - 6y = 12$$

2

$$-9x = 9 \Rightarrow x = -1$$

نجمع فيختفي y

3

$$3(-1) - 3y = 6 \Rightarrow y = -3$$

نعوّض في (2)

4

$$(x; y) = (-1; -3)$$

5

امتحان 2017

مثال 3

$$\begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{2y}{3} = 4 \\ -\frac{x}{4} + y = -4 \end{cases}$$

$$(1) \times 6 : 3x - 4y = 24$$

نتخلص من الكسور (م.م.أ. = 6)

1

$$(2) \times 4 : -x + 4y = -16$$

(م.م.أ. = 4)

2

$$2x = 8 \Rightarrow x = 4$$

نجمع فيختفي y

3

$$-4 + 4y = -16 \Rightarrow y = -3$$

4

$$(x; y) = (4; -3)$$

5



تطبيقات من المطبخ والمطعم

3

بيض الحلواني

حضّر حلواني 40 قالب كيك: الصغير يحتاج بيضتين والكبير 5 بيضات. استعمل 110 بيضات. كم قالبًا من كل نوع؟

الحلّ

$$\begin{cases} x + y = 40 \\ 2x + 5y = 110 \end{cases} \leftarrow \text{من (1): } x = 40 - y$$

إذاً $2(40 - y) + 5y = 110$ أي $80 - 2y + 5y = 110$ و $y = 10$ و $x = 30$:
30 قالبًا صغيرًا و10 قوالب كبيرة.

فطور المناقيش

في فرن، ثمن 3 مناقيش و2 عصير هو 9 دولارات، و ثمن 2 مناقيش و3 عصير هو 8.5 دولارات. ما ثمن المنقوشة وما ثمن العصير؟

الحلّ

نسّمّي x ثمن المنقوشة و y ثمن العصير:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 9 \\ 2x + 3y = 8.5 \end{cases}$$

نضرب (1) بـ 3 و (2) بـ 2 :
ونطرح: $5x = 10$ إذاً $x = 2$ و $y = 1.5$. المنقوشة بـ 2 دولار والعصير بـ 1.5 دولار.

تمارين

4

حلّ الأنظمة والمسائل التالية:

المستوى 1 • سهل

حلّ

$$\begin{cases} y = 2x \\ x + y = 9 \end{cases}$$

2

حلّ

$$\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

1

حلّ

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}$$

3

تحقق

هل الزوج $(-1; 2)$ حلّ للنظام $\begin{cases} 3x + y = 5 \\ x - 2y = 4 \end{cases}$ ؟ علّل.

4

أكمل الفراغ

أكمل ليكون $(3; 1)$ حلًّا: $\begin{cases} 2x + y = \square \\ x - y = \square \end{cases}$

5

**ترجم****6**

ترجم إلى نظام، ثم حلّه: ثمن فنجانَي قهوة وكعكة 5 دولارات، وثمان فنجان و3 كعكات 7.5 دولارات.

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

حلّ**8**

$$\begin{cases} 2x - 3y = -1 \\ 4x + y = 5 \end{cases}$$

حلّ**7**

$$\begin{cases} 3x + 2y = 1 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

حلّ**9**

$$\begin{cases} 5x + 2y = 4 \\ 3x + 4y = -6 \end{cases}$$

مسألة**10**

مجموع عددين 50 والفرق بينهما 14. أوجد العددين.

اختر الطريقة**11**

اختر الطريقة الأنسب (تعويض أم حذف) وعلّل، ثم حلّ: $\begin{cases} y = 3x - 1 \\ 2x + y = 9 \end{cases}$

اكتشف الخطأ**12**

في حلّ $\begin{cases} x + y = 6 \\ x - y = 2 \end{cases}$ كتب طالب: «بالجمع $2y = 8$ إذًا $y = 4$ ». صحّح.

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

حلّ**14**

$$\begin{cases} \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{2} \\ x + y = 6 \end{cases}$$

حلّ**13**

$$\begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 3 \\ x - y = 4 \end{cases}$$

مسألة**15**

في مقهى: ثمن 4 فناجين قهوة و2 كرواسون هو 10 دولارات، وثمان فنجانين و3 كرواسون هو 9 دولارات. أوجد ثمن كلّ منهما.



مسألة

16 في محلّ حلويات: ثمن 3 kg معمول و 2 kg بقلّوة هو 54 دولارًا، و ثمن 2 kg معمول و 3 kg بقلّوة هو 56 دولارًا. ما ثمن الكيلو من كلّ منهما؟

أنشئ



17 صمّم نظامًا حلّه $(-1; 4)$ ، ثم اكتب مسألة حياتيّة تناسبه.



★ المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين – فكّر خارج الصندوق

حلّ

$$\begin{cases} \frac{x+y}{3} + \frac{x-y}{2} = 3 \\ 3x - 2y = 8 \end{cases}$$

18

مسألة

19 باع مطعم 120 وجبة في يوم: وجبة الدجاج بـ 6 دولارات ووجبة اللحم بـ 9 دولارات، وبلغ الإيراد 882 دولارًا. كم وجبة من كل نوع؟

Skills Builder • Problem-Solving Steps

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



5

4

أتحقّق

Check

3

أنفّذ

Solve

2

أخطّط للحلّ

Plan

1

أفهم المسألة

Understand



مسألة محلولة

في مطعم: ثمن وجبتين و3 عصائر 19 دولارًا، وثمان 3 وجبات وعصيرين 26 دولارًا. ما ثمن الوجبة وما ثمن العصير؟

1 أفهم المسألة

مجهولان: x ثمن الوجبة و y ثمن العصير. معلومتان ← معادلتان.

2 أخطط للحلّ

النظام
$$\begin{cases} 2x + 3y = 19 \\ 3x + 2y = 26 \end{cases}$$
 ونحلّه بطريقة الحذف.

3 أنفذ

$57 = 6x + 9y : (1) \times 3$ و $52 = 6x + 4y : (2) \times 2$. بالطرح $5y = 5$ إذًا $y = 1$ ثم $x = 8$.

4 أتتحقق

$19 = 3(1) + 2(8) = 19 \checkmark$ و $26 = 3(8) + 2(1) = 26 \checkmark$ ← الوجبة 8 دولارات والعصير دولار واحد.

دورك الآن: حلّ بالتّباع الخطوات الأربع



1 في صفّ 32 طالبًا، وعدد البنات يزيد 6 على عدد الصبيان. كم بنتًا وكم صبيًا في الصفّ؟

1 أفهم المسألة

ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحلّ

ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ

أكتب الحلّ خطوة بخطوة:

4 أتتحقق

هل الجواب منطقي؟ أعوِّض وأتحقق:





2 عند حلواني 50 علبة: الصغيرة تتسع لـ 6 قطع والكبيرة لـ 10 قطع، ووضع فيها كلها 380 قطعة. كم علبة من كل نوع؟

1 أفهم المسألة ما المعطى؟ ما المطلوب؟

2 أخطط للحل ما القاعدة أو المعادلة التي سأستعملها؟

3 أنفذ أكتب الحل خطوة بخطوة:

4 أتتحقق هل الجواب منطقي؟ أعوض وأتحقق:



6 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحح العبارة الخاطئة.



خطأ ☐ صح ☐

1 الزوج (2 ; 1) حلّ للنظام $\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$

خطأ ☐ صح ☐

2 الزوج (1 ; 2) حلّ للنظام $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$

خطأ ☐ صح ☐

3 بضرب $1 = \frac{x}{2} + \frac{y}{3}$ بـ 6 نحصل على $3x + 2y = 6$

خطأ ☐ صح ☐

4 بضرب $2 = x + y$ بـ 2 نحصل على $2x + y = 4$

7 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

2 من المعادلة $2x + y = 7$ نستخرج $y =$

7 + 2x (ب)

7 - 2x (أ)

$\frac{7-x}{2}$ (د)

2x - 7 (ج)

1 حلّ النظام $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ هو

(2 ; 3) (ب)

(3 ; 2) (أ)

(1 ; 4) (د)

(4 ; 1) (ج)



4 عددان مجموعهما 20 والفرق بينهما 4. هما

10 و 10 (ب)

8 و 12 (أ)

4 و 16 (د)

6 و 14 (ج)

3 بضرب $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1$ بالعدد 6 نحصل على

$3x + 2y = 6$ (ب)

$2x + 3y = 6$ (أ)

$x + y = 6$ (د)

$2x + 3y = 1$ (ج)



سؤال مفتوح

متى تختار طريقة التعويض، ومتى تختار طريقة الحذف؟ أعطِ مثالاً لكل حالة.

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

8



فردية · 5 دقائق

التأمل والتفكير

Reflection



معلوماتان ومجهولان

في أي موقف حقيقي استعملت معلوماتين لتكتشف أمرين مجهولين؟ اكتب الموقف، ثم حاول أن تحوله إلى نظام معادلتين.



مجموعات · 15 دقيقة

تعاون

Cooperation



مطعم الصف

تصمم كل مجموعة قائمة أسعار لطبقين، وتكتب معلومتين عن طليبتين (مثل: 2 منقوشة + 3 عصير = ...). ثم تتبادل المجموعات المسائل وتحلها، وتتأكد كل مجموعة من حل الأخرى.

مجموعات · 10 دقائق

الوعي الاجتماعي

Social awareness



حملة الخير

صمموا مسألة نظام معادلتين عن حملة تبرع بالطعام في المدرسة (مثلاً: وجبات صغيرة وكبيرة، وعدد كلي، ومجموع كلي)، وحلّوها معاً، ثم اعرضوها على الصف.



فردية · 3 دقائق

الوعي وإدارة الذات

Self-awareness & management



طريقتي المفضلة

أي طريقة تريحك أكثر: التعويض أم الحذف؟ لماذا؟ متى تستجرب الطريقة الأخرى لتقوي نفسك فيها؟

أقل ثقة 1 2 3 4 5 واثق جداً



سؤال بحث



خلطة البنّ في السوق

زُر محلّ بنّ أو ابحث عن سعري نوعين من البنّ. تريد تحضير خلطة وزنها 10 kg بسعر محدّد للكيلو. اكتب نظام معادلتين يعطي وزن كل نوع وحلّه. هل النتيجة منطقية؟

المنتج المطلوب

مسألة من تصميمك مع حلّها لتبادلها مع زملائك

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

✓ قيّم نفسك قبل أن تنتقل إلى الدرس التالي

أحتاج تمريناً	أتقنتُ	
☐	☐	أحلّ بالتعويض وبالحدف.
☐	☐	أتخلّص من الكسور أوّلاً.
☐	☐	أترجم مسألة حياتية إلى نظام.





نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

10-

نموذج امتحان

امتحان الدرس 6: حلّ نظام معادلتين بمجهولين

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

pts 5

I حلّ النظام

$$\begin{cases} x + y = 9 \\ x - y = 3 \end{cases}$$

pts 5

II حلّ النظام

$$\begin{cases} 3x + y = 7 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$$

pts 5

III حلّ النظام

$$\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{4} = 2 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

pts 5

IV مسألة

ثمن قاليّ كيك وعلبة بسكويت 23 دولارًا، وثمان قالب كيك وعلبتيّ بسكويت 19 دولارًا. أوجد ثمن كلّ منهما.



✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان

I حلّ النظام

$$2x = 12 \Rightarrow x = 6 \quad (1)$$

نجمع المعادلتين

$$6 + y = 9 \Rightarrow y = 3 \quad (2)$$

$$(x ; y) = (6 ; 3) \quad (3)$$

II حلّ النظام

$$y = 7 - 3x \quad (1)$$

التعويض من (1)

$$2x - 3(7 - 3x) = 1 \Rightarrow 11x = 22 \Rightarrow x = 2 \quad (2)$$

$$y = 7 - 6 = 1 \Rightarrow (2 ; 1) \quad (3)$$

III حلّ النظام

$$(1) \times 4 : 2x + y = 8 \quad (1)$$

نتخلّص من الكسور

$$x = y + 1 \Rightarrow 2y + 2 + y = 8 \Rightarrow y = 2 \quad (2)$$

التعويض

$$x = 3 \Rightarrow (3 ; 2) \quad (3)$$

IV مسألة

$$\begin{cases} 2x + y = 23 \\ x + 2y = 19 \end{cases} \quad (1)$$

x ثمن القالب، y ثمن اللعبة

$$(1) \times 2 - (2) : 3x = 27 \Rightarrow x = 9 \quad (2)$$

الحذف

$$y = 23 - 18 = 5 \quad (3)$$

القالب 9 دولارات واللعبة 5 دولارات

بطاقات المراجعة: اختيار من متعدد

قُصَّ البطاقات على الخط المتقطع، واختبر نفسك أو زميلك. الجواب مكتوب مقلوبًا في أسفل كل بطاقة: اقلب البطاقة بعد أن تختار .

3 الدرس 1 $(x - 5)(x + 5) =$ $x^2 - 25$ أ $x^2 + 25$ ب $x^2 - 10x - 25$ ج $x^2 - 5$ د الدرس 1 3	2 الدرس 1 $3(x - 2) - x =$ $2x - 6$ أ $2x - 2$ ب $4x - 6$ ج $2x + 6$ د الدرس 1 2	1 الدرس 1 $(x + 2)^2 =$ $x^2 + 4$ أ $x^2 + 4x + 4$ ب $x^2 + 2x + 4$ ج $2x + 4$ د الدرس 1 1
6 الدرس 1 $-(x - 7) + 2x =$ $x + 7$ أ $3x - 7$ ب $x - 7$ ج $-x + 7$ د الدرس 1 6	5 الدرس 1 $(2x - 3)^2 =$ $4x^2 - 9$ أ $4x^2 - 12x + 9$ ب $4x^2 - 6x + 9$ ج $2x^2 - 12x + 9$ د الدرس 1 5	4 الدرس 1 $(x + 1)(x + 3) =$ $x^2 + 3$ أ $x^2 + 4x + 3$ ب $x^2 + 3x + 4$ ج $x^2 + 4x + 4$ د الدرس 1 4
9 الدرس 2 $x^2 - 8x + 16 =$ $(x - 4)^2$ أ $(x + 4)^2$ ب $(x - 8)^2$ ج $(x - 4)(x + 4)$ د الدرس 2 9	8 الدرس 2 $x^2 - 1 =$ $(x - 1)^2$ أ $(x - 1)(x + 1)$ ب $x(x - 1)$ ج $(x + 1)^2$ د الدرس 2 8	7 الدرس 2 $4x + 8 =$ $4(x + 8)$ أ $4(x + 2)$ ب $2(x + 8)$ ج $8(x + 1)$ د الدرس 2 7



الدرس 2	الدرس 2	الدرس 2
10 $3x^2 - 6x =$ ☐ أ $3x(x - 2)$ ☐ ب $3x(x - 6)$ ☐ ج $3(x - 2)$ ☐ د $x(3 - 6x)$ پ: رښتيا	11 $16x^2 - 9 =$ ☐ أ $(4x - 3)(4x + 3)$ ☐ ب $(4x - 3)^2$ ☐ ج $(8x - 3)(8x + 3)$ ☐ د $(16x - 9)(x + 1)$ پ: رښتيا	12 $(x + 2)(x - 1) + (x + 2)(2x) =$ ☐ أ $(x + 2)(3x - 1)$ ☐ ب $(x + 2)(2x - 1)$ ☐ ج $(x + 2)(3x + 1)$ ☐ د $(x - 2)(3x - 1)$ پ: رښتيا
الدرس 3	الدرس 3	الدرس 3
13 إذا كانت $P(x) = x^2 - 4$ فإن $P(3) =$ ☐ أ 5 ☐ ب 13 ☐ ج -1 ☐ د 9 پ: رښتيا	14 تعدم $P(x) = (x + 1)(x - 6)$ عندما ☐ أ $x = 6$ أو $x = -1$ ☐ ب $x = -6$ أو $x = 1$ ☐ ج $x = 6$ فقط ☐ د $x = -1$ فقط پ: رښتيا	15 الشكل الموضح لـ $(x - 1)(x + 4)$ ☐ أ $x^2 + 3x - 4$ ☐ ب $x^2 - 3x - 4$ ☐ ج $x^2 + 3x + 4$ ☐ د $x^2 - 4$ پ: رښتيا
الدرس 3	الدرس 3	الدرس 3
16 الشكل المحلل لـ $(x + 3)^2 - (x + 3)$ ☐ أ $(x + 3)(x + 2)$ ☐ ب $(x + 3)(x + 4)$ ☐ ج $(x + 3)^2$ ☐ د $x(x + 3)$ پ: رښتيا	17 إذا كانت $P(x) = 2x^2 - x$ فإن $P(0) + P(1) =$ ☐ أ 1 ☐ ب 0 ☐ ج 2 ☐ د 3 پ: رښتيا	18 أي عبارة تساوي $(x - 2)(x + 2)$؟ ☐ أ $x^2 - 4$ ☐ ب $x^2 + 4$ ☐ ج $x^2 - 4x + 4$ ☐ د $x^2 + 4x + 4$ پ: رښتيا



21	الدرس 4	20	الدرس 4	19	الدرس 4
$(2\sqrt{5})^2 =$		$\sqrt{12} + \sqrt{3} =$		$\sqrt{27} =$	
20 (أ) 10 (ب) $4\sqrt{5}$ (ج) 100 (د)		$3\sqrt{3}$ (أ) $\sqrt{15}$ (ب) $2\sqrt{3}$ (ج) $4\sqrt{3}$ (د)		$3\sqrt{3}$ (أ) $9\sqrt{3}$ (ب) $3\sqrt{9}$ (ج) $2\sqrt{7}$ (د)	
پ: ځوابونه		پ: ځوابونه		پ: ځوابونه	
24	الدرس 4	23	الدرس 4	22	الدرس 4
$\sqrt{80} =$		$(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1) =$		$\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}} =$	
$4\sqrt{5}$ (أ) $16\sqrt{5}$ (ب) 20 (ج) $5\sqrt{4}$ (د)		2 (أ) 4 (ب) 3 (ج) $\sqrt{3}$ (د)		3 (أ) 9 (ب) 6 (ج) 4 (د)	
پ: ځوابونه		پ: ځوابونه		پ: ځوابونه	
27	الدرس 5	26	الدرس 5	25	الدرس 5
$\frac{3}{\sqrt{5} + \sqrt{2}} =$		$\frac{1}{2\sqrt{3}} =$		$\frac{2}{\sqrt{2}} =$	
$\sqrt{5} - \sqrt{2}$ (أ) $\sqrt{5} + \sqrt{2}$ (ب) $3(\sqrt{5} - \sqrt{2})$ (ج) $\frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{3}$ (د)		$\frac{\sqrt{3}}{6}$ (أ) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (ب) $2\sqrt{3}$ (ج) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (د)		$\sqrt{2}$ (أ) $2\sqrt{2}$ (ب) 1 (ج) 4 (د)	
پ: ځوابونه		پ: ځوابونه		پ: ځوابونه	



30	الدرس 5	29	الدرس 5	28	الدرس 5
$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{10}} =$	مرافق $2 + \sqrt{3}$ هو	$\frac{4}{\sqrt{3} + 1} =$			
أ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ب $\sqrt{2}$ ج $\frac{1}{2}$ د 2	أ $2 - \sqrt{3}$ ب $2 + \sqrt{3}$ ج $\sqrt{3}$ د 1	أ $2\sqrt{3} - 2$ ب $\sqrt{3} - 1$ ج $4\sqrt{3} + 4$ د $2\sqrt{3} + 1$			
پ: رښتيا	پ: رښتيا	پ: رښتيا			
33	الدرس 6	32	الدرس 6	31	الدرس 6
لحذف y من $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 3x - y = 5 \end{cases}$ نقوم بـ	حل $\begin{cases} y = x \\ x + y = 6 \end{cases}$	حل $\begin{cases} x + y = 4 \\ x - y = 2 \end{cases}$			
أ جمع المعادلتين ب طرح المعادلتين ج ضرب (1) ب 2 د لا شيء	أ (3 ; 3) ب (6 ; 0) ج (2 ; 4) د (0 ; 6)	أ (3 ; 1) ب (1 ; 3) ج (2 ; 2) د (4 ; 0)			
پ: رښتيا	پ: رښتيا	پ: رښتيا			
36	الدرس 6	35	الدرس 6	34	الدرس 6
3 قهوة + كعكة = 7 دولارات، وقهوة + كعكة = 3 دولارات. ثمن القهوة؟	بضرب $3 + \frac{x}{2} + y = 2$ نحصل على	إذا كان $2x + 3y = 12$ و $x = 3$ فإن $y =$			
أ 2 دولار ب 1 دولار ج 3 دولارات د 1.5 دولار	أ $x + 2y = 6$ ب $x + y = 6$ ج $2x + 2y = 3$ د $x + 2y = 3$	أ 2 ب 3 ج 6 د 4			
پ: رښتيا	پ: رښتيا	پ: رښتيا			



الامتحانات الرسميّة ونماذج للتدريب

هذه أسئلة الامتحانات الرسميّة كما وردت (2015 · 2016 · 2017)، ثم ستّة نماذج جديدة على النمط نفسه تمامًا: أربعة أسئلة، 5 علامات لكل سؤال، المدة ساعة ونصف، والمستندات المسموح بها: لا شيء. حلّ كل امتحان في وقته الحقيقي ثم صحّح نفسك.

💡 **إ نطاق المقام:** السؤال الأخير عادةً؛ المرافق هو المفتاح في الجزء ب.

💡 **$P(x)$:** بعد التوسيع والتحليل احسب $P(0)$ بالشكلين — يجب أن يتساويا.

💡 **النظام:** دائمًا تقريبًا السؤال الأول. تحقّق من الحلّ في المعادلتين.



رسمي

الامتحان الرسمي 2015

الدورة الأولى · التكميلية المهنية

المستندات
لا شيءالتوزيع
5 علامات / سؤالالمدة
ساعة ونصف

pts 5

Solve the following system **حلّ النظام التالي** I

$$\begin{cases} -x - 2y = -4 \\ 3x + y = -3 \end{cases}$$

pts 5

Expand and reduce **وسّع واختزل** II

$$(2x - 1)^2 - (x - 2)^2 \quad \text{ب)}$$

$$(x - 2)(3 - 2x) - (x - 1)(x + 1) \quad \text{أ)}$$

pts 5

Factorize **حلّ إلى عوامل** III

$$(4x^2 - 9) - (2x - 3)(1 - 3x) \quad \text{ب)}$$

$$(2x + 1)^2 - (x - 3)^2 \quad \text{أ)}$$

pts 5

Rationalize **أنطق المقام** IV

$$\frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} \quad \text{ب)}$$

$$\frac{2 + \sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \quad \text{أ)}$$



رسمي

الامتحان الرسمي 2016

الدورة الأولى · التكميلية المهنية

المستندات
لا شيءالتوزيع
5 علامات / سؤالالمدة
ساعة ونصف

I لتكن $P(x) = (3x - 1)(5x + 3) - (3x - 1)^2$ Given P(x): a) expand and reduce b) factorize

pts 5

(ب) حلّل P(x)

(أ) وسّع واختزل P(x)

pts 5

II أجز العمليات وبسط Effectuate and simplify

(ب) $(\sqrt{6} - \sqrt{2})(2\sqrt{2} + \sqrt{6})$ (أ) $3\sqrt{12} - 2\sqrt{27} + \sqrt{48} - 4\sqrt{3}$

pts 5

III حلّ النظام التالي Solve the following system

$$\begin{cases} -5x + 2y = -1 \\ 3x - 3y = 6 \end{cases}$$

pts 5

IV أنطق المقام Rationalize the denominator

(ب) $\frac{\sqrt{6} - 2\sqrt{3}}{\sqrt{6} - \sqrt{3}}$ (أ) $\frac{3 - 2\sqrt{3}}{5\sqrt{3}}$



رسمي

الامتحان الرسمي 2017

الدورة الأولى · التكميلية المهنية

المستندات
لا شيءالتوزيع
5 علامات / سؤالالمدة
ساعة ونصف

pts 5

Solve the following system **حلّ النظام التالي** I

$$\begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{2y}{3} = 4 \\ -\frac{x}{4} + y = -4 \end{cases}$$

pts 5

Simplify the following expressions **بسّط العبارات التالية** II

$$3\sqrt{8} - 2\sqrt{18} + \sqrt{75} - \sqrt{32} \quad \text{ب)}$$

$$(2\sqrt{3} - \sqrt{5})^2 + (2\sqrt{3} + \sqrt{5})^2 \quad \text{أ)}$$

Given P(x): a) expand and reduce b) factorize **لتكن** $P(x) = (x - 5)(2 - x) - (4x^2 - 16)$ III

pts 5

ب) حلّ P(x)

أ) وسّع واختزل P(x)

pts 5

Rationalize the denominator **أنطق المقام** IV

$$\frac{\sqrt{5} - 3}{\sqrt{2} + \sqrt{5}} \quad \text{ب)}$$

$$\frac{\sqrt{2} - 2\sqrt{3}}{3\sqrt{2}} \quad \text{أ)}$$



تدريب

نموذج امتحان 1

على نمط الامتحان الرسمي • ساعة ونصف

المستندات
لا شيءالتوزيع
5 علامات / سؤالالمدة
ساعة ونصف

pts 5

I حلّ النظام التالي Solve the following system

$$\begin{cases} 2x - y = 7 \\ x + 3y = -7 \end{cases}$$

II لتكن $P(x) = (2x + 1)(x - 3) - (2x + 1)^2$ Given P(x): a) expand and reduce b) factorize

pts 5

(ب) حلّ P(x)

(أ) وسّع واختزل P(x)

pts 5

III أجر العمليات وبسّط Effectuate and simplify

$$(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (\sqrt{2} - 1)^2 \quad (ب)$$

$$2\sqrt{75} - 3\sqrt{12} + \sqrt{27} \quad (أ)$$

pts 5

IV أنطق المقام Rationalize the denominator

$$\frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1} \quad (ب)$$

$$\frac{4 - \sqrt{2}}{2\sqrt{2}} \quad (أ)$$



تدريب

نموذج امتحان 2

على نمط الامتحان الرسمي • ساعة ونصف

المستندات

لا شيء

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

pts 5

I حلّ النظام التالي Solve the following system

$$\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 2 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

pts 5

II وسّع واختزل Expand and reduce

$$(3x - 2)^2 - (3x + 2)(3x - 2) \quad \text{ب)}$$

$$(x + 3)(2x - 1) - (x - 2)^2 \quad \text{أ)}$$

pts 5

III حلّ إلى عوامل Factorize

$$(x^2 - 9) + (x + 3)(2x - 5) \quad \text{ب)}$$

$$(x + 5)^2 - (2x - 1)^2 \quad \text{أ)}$$

pts 5

IV أنطق المقام Rationalize the denominator

$$\frac{2\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} \quad \text{ب)}$$

$$\frac{5 + \sqrt{5}}{3\sqrt{5}} \quad \text{أ)}$$



تدريب

نموذج امتحان 3

على نمط الامتحان الرسمي • ساعة ونصف

المستندات

لا شيء

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

pts 5

I حلّ النظام التالي Solve the following system

$$\begin{cases} 3x + 2y = 4 \\ 5x - y = 11 \end{cases}$$

II لتكن $P(x) = (x + 4)(2x - 1) - (x^2 - 16)$ Given P(x): a) expand and reduce b) factorize

pts 5

(ب) حلّ P(x)

(أ) وسّع واختزل P(x)

pts 5

III أجرِ العمليات وبسّط Effectuate and simplify

$$(\sqrt{5} - 2)(\sqrt{5} + 2) - (\sqrt{3} - 1)^2 \quad (ب)$$

$$\sqrt{45} - 2\sqrt{20} + 3\sqrt{5} \quad (أ)$$

pts 5

IV أنطق المقام Rationalize the denominator

$$\frac{\sqrt{7} + \sqrt{2}}{\sqrt{7} - \sqrt{2}} \quad (ب)$$

$$\frac{6 - \sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \quad (أ)$$



تدريب

نموذج امتحان 4

على نمط الامتحان الرسمي . ساعة ونصف

المستندات

لا شيء

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

pts 5

I حلّ النظام التالي Solve the following system

$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - 2y = -1 \end{cases}$$

II لتكن $P(x) = (x - 3)(3x + 2) - (x^2 - 9)$ Given P(x): a) expand and reduce b) factorize

pts 5

(ب) حلّ P(x)

(أ) وسّع واختزل P(x)

pts 5

III أجر العمليات وبسّط Effectuate and simplify

$$(b) (\sqrt{6} + \sqrt{2})^2$$

$$(a) 3\sqrt{12} - \sqrt{27} + 2\sqrt{3}$$

pts 5

IV أنطق المقام Rationalize the denominator

$$(b) \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}}$$

$$(a) \frac{3 + \sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$$



تدريب

نموذج امتحان 5

على نمط الامتحان الرسمي • ساعة ونصف

المستندات

لا شيء

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

pts 5

Solve the following system **حلّ النظام التالي** I

$$\begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{y}{2} = 1 \\ x + y = 8 \end{cases}$$

pts 5

Expand and reduce **وسّع واختزل** II

$$(3x + 1)(3x - 1) - (3x - 2)^2 \quad \text{ب)}$$

$$(2x - 5)(x + 3) - (x - 1)^2 \quad \text{أ)}$$

pts 5

Factorize **حلّ إلى عوامل** III

$$(x - 7)(2x + 1) + (x^2 - 49) \quad \text{ب)}$$

$$9x^2 - (x + 4)^2 \quad \text{أ)}$$

pts 5

Rationalize the denominator **أنطق المقام** IV

$$\frac{2}{\sqrt{7} + \sqrt{5}} \quad \text{ب)}$$

$$\frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1} \quad \text{أ)}$$



تدريب

نموذج امتحان 6

على نمط الامتحان الرسمي . ساعة ونصف

المستندات

لا شيء

التوزيع

5 علامات / سؤال

المدة

ساعة ونصف

pts 5

Solve the following system

حلّ النظام التالي

I

$$\begin{cases} 4x - y = 5 \\ 3x + 2y = 12 \end{cases}$$

Given P(x): a) expand and reduce b) factorize

$$P(x) = (5x + 2)(x - 1) - (x - 1)^2$$

II

pts 5

(ب) حلّ P(x)

(أ) وسّع واختزل P(x)

pts 5

Effectuate and simplify

أجر العمليات وبسط

III

$$(2\sqrt{3} + \sqrt{2})(2\sqrt{3} - \sqrt{2}) - (\sqrt{3})^2$$

(ب)

$$\sqrt{200} - 3\sqrt{18} + \sqrt{50}$$

(أ)

pts 5

Rationalize the denominator

أنطق المقام

IV

$$\frac{1 + \sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}}$$

(ب)

$$\frac{5 - \sqrt{10}}{\sqrt{5}}$$

(أ)



بطاقة المراجعة السريعة

1 التوسيع والاختزال

التوزيع البسيط

$$k(a + b) = ka + kb \quad k(a - b) = ka - kb$$

التوزيع المزدوج

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

مربع مجموع

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

مربع فرق

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

جداء مجموع بفرق

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

2 التحليل إلى عوامل

العامل المشترك

$$ka + kb = k(a + b)$$

قوس مشترك

$$(A)(B) + (A)(C) = (A)[(B) + (C)]$$

مربع كامل

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

فرق مربعين

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

قلب الإشارة

$$(3 - 2x) = -(2x - 3)$$

3 كثيرة الحدود P(x): توسيع وتحليل

الشكل الموشع

$$P(x) = ax^2 + bx + c$$

الشكل المحلل

$$P(x) = (\dots)(\dots)$$

التحقق الذهبي

نحسب $P(0)$ أو $P(1)$ بالشكلين: يجب أن نحصل على العدد نفسه.

الجداء المعدوم

$$A \cdot B = 0 \text{ يعني } A = 0 \text{ أو } B = 0$$

4 الجذور التربيعية

الخاصية الأساسية

$$(\sqrt{a})^2 = a \quad \sqrt{a^2} = a \quad (a \geq 0)$$

جذر الجداء

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

جذر القسمة

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

الجمع

$$m\sqrt{a} + n\sqrt{a} = (m + n)\sqrt{a}$$

مع المتطابقات

$$(\sqrt{a} \pm \sqrt{b})^2 = a + b \pm 2\sqrt{ab}$$



5 إنطاق المقام

جذر وحيد

$$\frac{k}{a\sqrt{b}} = \frac{k\sqrt{b}}{ab}$$

المرافق

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} \longleftrightarrow \sqrt{a} - \sqrt{b}$$

مقام بمجموع

$$\frac{k}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{k(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{a - b}$$

مقام بفرق

$$\frac{k}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{k(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{a - b}$$

6 حلّ نظام معادلتين بمجهولين

الشكل العام

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

التعويض

$$x + 2y = 4 \Rightarrow x = 4 - 2y$$

الحذف

نضرب المعادلتين ليتعاكس معامل أحد المجهولين، ثم نجمع (1) + (2) فيختفي.

التحقّق

نعوّض (x ; y) في المعادلتين الأصليّتين.