


**Exercice 1 :**

Un long solénoïde avec 15 tours par cm a une petite boucle de surface  $2 \text{ cm}^2$ , placée à l'intérieur du solénoïde perpendiculairement à son axe. Si le courant véhiculé par le solénoïde change régulièrement de 2,0 A à 4,0 A en 0,1 s.

- 1- quelle est la force électromotrice induite dans la boucle pendant que le courant change?

**Exercice 2 :**

On considère un cadre plan de côté  $a$ , comportant  $N$  spires, est placé devant un fil rectiligne traversé par un courant  $I$  constant.



- 1- déterminer l'expression de l'inductance mutuelle entre le fil droit la boucle carrée du côté  $a$
- 2- Supposons maintenant que le fil droit transporte un courant de 50 A et que la boucle se déplace vers la droite avec une vitesse constante,  $v = 10 \text{ m/s}$

2-1 Calculez la force électromotrice induite dans la boucle à l'instant où  $x = 0,2 \text{ m}$ .

Prenez  $a = 0,1 \text{ m}$  et supposez que la boucle a une grande résistance.

**Exercice 3 :**

- 1- Définir les quatre équations de Maxwell
- 2- A partir de ces équations, monter que :
  - 2.1 L'équation de propagation du potentiel vecteur  $\vec{A}$  est :

$$\mu_0 \vec{j} + \Delta \vec{A} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

- 2.2 L'équation de propagation du potentiel électrique  $V$  est :

$$\Delta V - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} + \frac{\rho}{\epsilon_0} = 0$$

- 3- Dédurre que :

$$\Delta \vec{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0 \quad \text{et} \quad \Delta \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

avec  $\vec{B}$  et  $\vec{E}$  sont respectivement les composantes du champs magnétique et du champ électrique

4- Si  $\mu_0 \varepsilon_0 C^2 = 1$ , trouver l'équation d'Alembert lorsque l'ensemble des deux vecteurs  $(\vec{E}, \vec{B})$  constitue une onde électromagnétique avec C est la célérité de la lumière

5- A partir du vecteur de Poynting  $\vec{\Pi} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \wedge \vec{B}$ , montrer que l'énergie

électromagnétique  $W_{em}$  est de la forme :  $W_{em} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \vec{E}^2 + \frac{1}{2 \mu_0} \vec{B}^2$

6- Soit une onde monochromatique polarisée elliptiquement  $\vec{E}(\vec{E}_x, \vec{E}_y)$  avec

$$\vec{E}_x = E_{0x} \cos w(t + \frac{z}{c}) \vec{e}_x \quad \text{et} \quad \vec{E}_y = E_{0y} \cos(w(t + \frac{z}{c}) - \varphi) \vec{e}_y$$

En éliminant le temps entre  $\vec{E}_x$  et  $\vec{E}_y$ , montrer que :

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 - 2 \left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right) \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right) \cos(\varphi) = \sin^2(\varphi)$$

**On donne :**

$$\overrightarrow{div}(\vec{A} \wedge \vec{B}) = \vec{A} \overrightarrow{rot}(\vec{B}) + \vec{B} \overrightarrow{rot}(\vec{A})$$

$$\overrightarrow{rot} \overrightarrow{rot}(\vec{A}) = \overrightarrow{grad}(\overrightarrow{div} \vec{A}) - \Delta \vec{A}$$