

46. **Une translocation robertsonienne :**
- A- A lieu entre les chromosomes acrocentriques.
 - B- Donne un phénotype normal.
 - C- Donne des conséquences méiotiques.
 - D- Donne un phénotype anormal.
 - E- Peut impliquer le chromosome X.
47. **Dans une maladie autosomique récessive :**
- A- La maladie ne s'exprime que chez les homozygotes.
 - B- Les deux parents sont obligatoirement malades (chacun exprime la maladie).
 - C- Les hétérozygotes sont sains (ils n'expriment pas la maladie).
 - D- La consanguinité n'a aucune influence sur l'apparition de la maladie.
 - E- Le risque de transmission chez la descendance est de 50% lorsque les 2 parents sont sains.
48. **Une translocation réciproque**
- A- Donne toujours un phénotype anormal
 - B- A lieu seulement entre deux chromosomes acrocentriques.
 - C- Peut se déséquilibrer lors de la méiose
 - D- Donne un phénotype anormal quand il y a une cassure d'un gène.
 - E- Peut résulter d'un accident méiotique.
49. **Le caryotype :**
- A- Est réalisé pendant l'interphase.
 - B- Correspond à l'identification et au dénombrement de tous les chromosomes d'une cellule.
 - C- Est réalisé pendant l'anaphase.
 - D- Est réalisé pendant la métaphase.
 - E- Constitue l'analyse chromosomique la plus sensible.
50. **La triploïdie :**
- A- Correspond à trois copies de chaque chromosome.
 - B- Correspond à trois copies d'un seul chromosome.
 - C- Correspond à 69 chromosomes.
 - D- Correspond à 47 chromosomes.
 - E- Peut résulter d'une anomalie de la fécondation.