

UNIVERSITÉ DE NGAOUNDÉRE  
*FACULTÉ DES SCIENCES*

THE UNIVERSITY OF NGAOUNDERE  
*FACULTY OF SCIENCE*



***DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES ET  
INFORMATIQUE  
DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND COMPUTER  
SCIENCE***

---

**Deep Analysis and prediction of chikungunya  
using ensemble regression approach**

---

**Mémoire en vue d'obtention du Master II**

**Filière : Informatique**

**Spécialité : Systèmes et Logiciels en Environnements distribués**

**Par**

**MOHAMED EL BACHIR BOUBA NGANADAKOUA**

**( Master I Systèmes et Logiciels en Environnements distribués )**

**Matricule : 19A666FS**

**Sous la direction de :**

DR.ABBOUBAKAR HAMADJAM

Chargé de cours IUT

Université de Ngaoundéré

Superviseur

PR.DR.ING DAYANG PAUL

Maitre de conférences

Université de Ngaoundéré

Directeur

**Année académique 2023-2024**

# Dédicace

*à mon père BOUBA Nana Dekwa,  
à ma mère HABIBA Kouyessi,  
à mes sœurs.*

# Remerciements

La réalisation de ce mémoire a été un long voyage, parsemé de défis et d'apprentissages, et n'aurait pas été possible sans le soutien et l'assistance de nombreuses personnes. C'est avec une profonde gratitude que je tiens à exprimer mes sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la concrétisation de ce travail.

- Tout d'abord, je remercie Allah le Tout-Puissant qui m'a donné la volonté et la force nécessaires pour parfaire ce travail et le mener à terme ;
- Le Doyen de la Faculté des Sciences de l'Université de Ngaoundéré, le Professeur NGAMENI Emmanuel, pour son soutien et ses encouragements ;
- Le Chef du Département de Mathématiques et Informatique de la Faculté des Sciences de l'Université de Ngaoundéré : le Pr. Dr. Ing DAYANG Paul pour le suivi de notre formation et la supervision de ce travail ;
- Mon directeur de mémoire, Dr. ABOUBAKAR Hamadjam, Chargé de Cours à l'Université de Ngaoundéré, au Département de Génie Informatique à l'Institut Universitaire de Technologie, pour m'avoir proposé ce sujet et pour ses précieux conseils ;
- Les enseignants du Département de Mathématiques et Informatique de la Faculté des Sciences de l'Université de Ngaoundéré, ainsi que les membres du jury, pour avoir accepté d'examiner ce travail ;
- Ma famille, pour leurs nombreux conseils, encouragements et soutien tout au long de mes études ;
- Mes camarades de promotion, pour la convivialité, le partage de connaissances et l'entraide dont nous avons bénéficié ensemble.

À tous, un grand merci.

# Table des matières

Dédicace	i
Remerciements	ii
Table des matières	iii
Liste de figures	vi
Liste des tableaux	vii
Notation et abréviations	viii
Abstract	ix
Résumé	x
General Introduction	0
1 Épidémiologie de la Chikungunya	1
1.1 Origine de la Chikungunya . . . . .	1
1.2 Agent Pathogène . . . . .	2
1.3 Mode de Transmission . . . . .	2
1.3.1 Vecteurs : Les moustiques Aedes . . . . .	3
1.3.2 La transmission . . . . .	3
1.4 Symptômes et Diagnostic . . . . .	4
1.4.1 Symptômes . . . . .	4
1.4.2 Méthodes de diagnostic . . . . .	4
1.5 Méthodes de Contrôle et Traitement . . . . .	4
1.5.1 Méthodes de contrôle . . . . .	4
1.5.2 Options de traitement . . . . .	5
1.6 Cas du Tchad . . . . .	5
1.6.1 Point saillants . . . . .	6
1.6.2 Contexte . . . . .	6

<b>2</b>	<b>Revue de la Littérature et Concepts de Base</b>	<b>8</b>
2.1	Introduction . . . . .	9
2.1.1	Objectifs du Chapitre . . . . .	9
2.1.2	Méthodologie de la Revue . . . . .	9
2.2	Machine Learning . . . . .	9
2.2.1	Définition et Concepts Fondamentaux . . . . .	9
2.2.2	Techniques de Machine Learning . . . . .	9
2.2.2.1	Régression Linéaire . . . . .	9
2.2.2.2	Régression Logistique . . . . .	9
2.2.2.3	Arbres de Décision . . . . .	9
2.2.2.4	Forêts Aléatoires . . . . .	9
2.2.3	Applications du Machine Learning à l'Épidémiologie . . . . .	9
2.2.4	Avantages et Limites du Machine Learning . . . . .	9
2.3	Deep Learning . . . . .	9
2.3.1	Définition et Concepts Fondamentaux . . . . .	9
2.3.2	Réseaux de Neurones Artificiels . . . . .	9
2.3.2.1	Perceptron Multicouche (MLP) . . . . .	9
2.3.2.2	Réseaux de Neurones Convolutifs (CNN) . . . . .	9
2.3.2.3	Réseaux de Neurones Récurents (RNN) . . . . .	9
2.3.3	Applications du Deep Learning à l'Épidémiologie . . . . .	9
2.3.4	Avantages et Limites du Deep Learning . . . . .	9
2.4	Ensemble Regression Learning . . . . .	9
2.4.1	Définition et Concepts Fondamentaux . . . . .	9
2.4.2	Techniques d'Ensemble Learning . . . . .	9
2.4.2.1	Bagging . . . . .	9
2.4.2.2	Boosting . . . . .	9
2.4.2.3	Stacking . . . . .	9
2.4.3	Applications de l'Ensemble Regression Learning . . . . .	9
2.4.4	Avantages et Limites de l'Ensemble Regression Learning . . . . .	9
2.5	Comparaison des Approches . . . . .	9
2.5.1	Machine Learning vs Deep Learning . . . . .	9
2.5.2	Machine Learning et Deep Learning vs Ensemble Learning . . . . .	9
2.6	Études de Cas et Travaux Antérieurs . . . . .	9
2.6.1	Études sur le Chikungunya . . . . .	9
2.6.2	Applications Pratiques des Techniques d'Ensemble . . . . .	9
2.7	Conclusion . . . . .	9
2.7.1	Synthèse des Connaissances Actuelles . . . . .	9
2.7.2	Orientations Futures et Opportunités de Recherche . . . . .	9

<b>3</b>	<b>Implémentation des Modèles</b>	<b>10</b>
3.1	Introduction . . . . .	10
3.2	Présentation des Outils Utilisés . . . . .	10
3.2.1	Langages et librairies (e.g., Python, Scikit-learn, TensorFlow) . . . . .	10
3.2.2	Infrastructure matérielle (e.g., GPU, serveurs) . . . . .	10
3.3	Méthodes de l'Apprentissage Automatique . . . . .	10
3.3.1	Le jeu de données . . . . .	10
3.3.2	Préparation et nettoyage des données . . . . .	10
3.3.3	Implémentation des modèles de machine learning . . . . .	10
3.4	Méthodes de l'Apprentissage Profond . . . . .	10
3.4.1	Le jeu de données . . . . .	11
3.4.2	Préparation des données pour le deep learning . . . . .	11
3.4.3	Implémentation des modèles de deep learning . . . . .	11
	<b>General Conclusion</b>	<b>13</b>
	<b>Bibliographie</b>	<b>14</b>

# Liste de figures

1.1	CHIKV in the Western Hemisphere. . . . .	2
1.2	Electron microscopic image of chikungunya virus . . . . .	2
1.3	Aedes aegypti mosquito full of blood . . . . .	3
1.4	Transmission mode Chikungunya . . . . .	3
1.5	Region infecté au Tchad . . . . .	6
1.6	Evolution journalière des cas et décès du Chikungunya . . . . .	7

# Liste des tableaux



# Notation et abréviations

<b>CHIKV</b>	Chikungunya virus
<b>WHO</b>	World Health Organization
<b>PAHO</b>	Pan American Health Organization
<b>OMS</b>	Organisation Mondiale de la Sante
<b>CDC</b>	Centers for Disease Control and Prevention
<b>Ae</b>	Aedes

# Abstract

Chikungunya virus, transmitted by **Aedes aegypti** and **Aedes albopictus** mosquitoes, poses a significant public health threat globally due to its rapid spread and debilitating impact on affected populations. In recent years, outbreaks have afflicted populations in East and Central Africa, South America and Southeast Asia [8]. Predicting chikungunya epidemics is a challenge, due to the complex interaction of environmental, social and biological factors. Traditional epidemiological surveillance methods, while essential, may be insufficient to proactively predict epidemics. This research focuses specifically on **Chad**, a country where chikungunya has recently emerged as a major public health concern. With the increase in chikungunya cases in Chad, it is crucial to develop accurate predictive models to anticipate epidemics and implement effective control measures. The advent of artificial intelligence (AI) and machine learning techniques offers new opportunities to improve epidemiological forecasting.

This thesis aims to develop and evaluate a predictive model for chikungunya epidemics using ensemble regression approaches. Ensemble methods combine several learning algorithms to improve predictive accuracy over individual models. The research exploits comprehensive datasets including epidemiological, climatic and environmental variables to train and validate predictive models. Leading machine learning algorithms such as Random Forest, Gradient Boosting and XGBoost are implemented and compared to identify the most effective approach.

The study begins with a detailed exploration of chikungunya epidemiology, transmission dynamics, clinical manifestations and current control strategies. It reviews the existing literature on AI applications in disease prediction, highlighting the potential of ensemble regression techniques to improve the accuracy and reliability of epidemiological forecasts.

Through a rigorous methodology and an in-depth analysis of the results, this thesis evaluates the performance of ensemble regression models in predicting chikungunya epidemics. Performance metrics such as sensitivity, specificity and predictive value are used to assess model efficiency and robustness. In addition, the study examines the interpretability of model results and discusses implications for public health interventions.

The findings of this research contribute to advancing the field of infectious disease prediction by demonstrating the effectiveness of ensemble regression techniques for improving the prediction of chikungunya epidemics.

# Résumé

Le virus du chikungunya, transmis par les moustiques **Aedes aegypti** et **Aedes albopictus**, constitue une menace importante pour la santé publique mondiale en raison de sa propagation rapide et de son impact débilisant sur les populations touchées. Ces dernières années, des épidémies ont touché des populations d’Afrique centrale et orientale, d’Amérique du Sud et d’Asie du Sud-Est [8]. Prédire les épidémies de chikungunya est un défi, en raison de l’interaction complexe de facteurs environnementaux, sociaux et biologiques. Les méthodes traditionnelles de surveillance épidémiologique, bien qu’essentielles, peuvent s’avérer insuffisantes pour prévoir les épidémies de manière proactive. Cette recherche se concentre spécifiquement sur le **Tchad**, un pays où le chikungunya a récemment émergé comme un problème majeur de santé publique. Avec l’augmentation des cas de chikungunya au Tchad, il est crucial de développer des modèles prédictifs précis pour anticiper les épidémies et mettre en œuvre des mesures de contrôle efficaces. L’avènement de l’intelligence artificielle (IA) et des techniques d’apprentissage automatique offre de nouvelles opportunités pour améliorer les prévisions épidémiologiques.

Cette thèse vise à développer et évaluer un modèle prédictif pour les épidémies de chikungunya en utilisant des approches de régression d’ensemble. Les méthodes d’ensemble combinent plusieurs algorithmes d’apprentissage pour améliorer la précision prédictive par rapport aux modèles individuels. La recherche exploite des ensembles de données complets comprenant des variables épidémiologiques, climatiques et environnementales pour former et valider des modèles prédictifs. Les principaux algorithmes d’apprentissage automatique tels que Random Forest, Gradient Boosting et XGBoost sont mis en œuvre et comparés afin d’identifier l’approche la plus efficace.

L’étude commence par une exploration détaillée de l’épidémiologie du chikungunya, de la dynamique de transmission, des manifestations cliniques et des stratégies de contrôle actuelles. Elle passe en revue la littérature existante sur les applications de l’IA dans la prédiction des maladies, en soulignant le potentiel des techniques de régression d’ensemble pour améliorer la précision et la fiabilité des prévisions épidémiologiques.

Grâce à une méthodologie rigoureuse et à une analyse approfondie des résultats, cette thèse évalue la performance des modèles de régression d’ensemble dans la prévision des épidémies de chikungunya. Des mesures de performance telles que la sensibilité, la spécificité et la valeur prédictive sont utilisées pour évaluer l’efficacité et la robustesse des modèles. En outre, l’étude examine l’interprétabilité des résultats des modèles et discute des implications pour les interventions de santé publique.

Les résultats de cette recherche contribuent à faire progresser le domaine de la prédiction des maladies infectieuses en démontrant l’efficacité des techniques de régression d’ensemble pour améliorer la prédiction des épidémies de chikungunya.

# Introduction Générale

Le chikungunya est une maladie virale transmise par la piqure d'un moustique infecté et endémique en Afrique de l'Est et dans certaines régions d'Asie. Les symptômes du chikungunya sont la fièvre, des douleurs articulaires, des maux de tête, des douleurs musculaires, un gonflement des articulations ou une éruption cutanée. Les décès dus au chikungunya sont rares. Le virus peut entraîner de graves problèmes chez certaines personnes, en particulier les personnes âgées et les personnes souffrant d'autres maladies chroniques. Une détection précoce du chikungunya peut empêcher la maladie de se propager. Notre projet vise à prédire si une personne est atteinte ou non du chikungunya et à prendre des mesures de précaution en fonction du résultat. Il n'existe pas de traitement antiviral spécifique pour le chikungunya. La prise en charge clinique se concentre sur le soulagement des symptômes, comme le soulagement des douleurs articulaires à l'aide d'antipyrétiques, d'analgésiques appropriés, d'une consommation suffisante de liquides et d'une relaxation générale [9]. Les progrès récents dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) ont permis d'améliorer considérablement les prédictions grâce à des algorithmes qui se sont révélés capables de saisir les relations non linéaires entre les données d'entrée et de sortie. Ces algorithmes sont généralement connus sous le nom d'algorithmes d'apprentissage automatique qui sont basés sur des données historiques et actuelles.

L'objectif de ce mémoire de master est de développer un modèle de prédiction du chikungunya. Pour ce faire, nous avons opté pour une méthode d'apprentissage automatique issue de l'intelligence artificielle et basée sur l'approche de régression d'ensemble.

Dans ce travail, nous nous intéressons à répondre à la problématique : Comment utiliser l'apprentissage automatique par l'approche ensembliste pour prédire et analyser le chikungunya ?

Les objectifs spécifiques sont donc les suivants.

- Comprendre les concepts liés à la régression d'ensemble et au chikungunya ;
- Prédire le chikungunya au Tchad ;
- Analyser la situation du chikungunya au Tchad.

Le reste du manuscrit est organisé comme suit. Le premier chapitre est consacré à l'épidémiologie du chikungunya et à un focus sur le cas du Tchad. Le deuxième chapitre donne une introduction à l'apprentissage automatique pour les maladies. Dans le troisième chapitre, nous présentons la conception générale et détaillée du modèle proposé. Dans le quatrième chapitre, nous illustrons l'efficacité de notre modèle par des résultats de simulation. Le travail se termine par une conclusion générale et quelques perspectives.

# Chapitre 1

## Épidémiologie de la Chikungunya

### Introduction

Le chikungunya est une maladie virale transmise à l'homme par des moustiques infectés par le virus du chikungunya. Les moustiques impliqués dans la transmission sont *Aedes aegypti* et *Aedes albopictus* [8].

### 1.1 Origine de la Chikungunya

La fièvre **Chikungunya** est une maladie virale décrite pour la première fois en 1952 lors d'une épidémie dans le sud de la **Tanzanie**. Le nom vient d'un mot de la langue *Makonde*, parlée dans le sud-est de la Tanzanie et le nord du Mozambique, qui signifie "*devenir contorsionné*" ou "*ce qui se plie*". Le virus a été isolé pour la première fois en Thaïlande en 1958.[11]

### Évolution géographique et épidémiologique

En **avril 2005**, il a été confirmé que le CHIKV était à l'origine d'une épidémie de maladie ressemblant à la dengue sur les îles Comores, situées au large de la côte est du Mozambique septentrional ; il s'agissait de la première émergence connue du CHIKV dans la région du sud-ouest de l'océan Indien. En raison de similitudes cliniques, cette épidémie a d'abord été suspectée d'être causée par le virus de la dengue, soulignant le fait que la maladie CHIKV est souvent mal diagnostiquée et que le nombre réel de cas dans une région donnée peut être sous-estimé. Peu après, les premiers cas de CHIKV ont été signalés à Mayotte, à Maurice et sur l'île française de La Réunion. Le nombre de cas dans ces régions a rapidement augmenté, notamment en raison de taux d'attaque atteignant **35% à 75%**. À la fin de l'année **2005**, après une période apparente d'environ 32 ans pendant laquelle le CHIKV n'a pas été détecté, l'Inde a signalé des cas de maladie à CHIKV dans de nombreux États, le nombre officiel de cas suspects atteignant finalement plus de 1,3 million. L'épidémie de CHIKV a continué à se propager, provoquant d'importantes flambées au Sri Lanka et dans de nombreux autres pays d'Asie du Sud-Est. Au cours de cette épidémie, le CHIKV a été introduit dans des pays où il n'est pas endémique par des voyageurs virémiques, et la transmission autochtone du CHIKV a été observée pour la première fois dans de nombreux pays, dont l'Italie, la France, la Nouvelle-Calédonie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Bhoutan et le Yémen. La propagation rapide et explosive du CHIKV a incité l'Organisation panaméricaine de la santé

(OPS) et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) à publier un guide de préparation qui prévoyait de futures épidémies potentielles de CHIKV dans les Amériques. Cette prédiction s’est maintenant concrétisée, puisqu’en décembre 2013, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a signalé la première transmission locale du CHIKV dans l’hémisphère occidental, sur l’île caribéenne de Saint-Martin. Le 18 juillet 2014, le CHIKV avait provoqué plus de 440 000 cas de maladie dans plus de 20 pays des Caraïbes, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud (Fig. 1). En outre, les CDC ont signalé plus de 230 cas importés d’infection à CHIKV sur le territoire continental des États-Unis, ainsi que des cas acquis localement en Floride. Ainsi, en moins de 10 ans, le CHIKV s’est propagé depuis les côtes du Kenya dans l’océan Indien, le Pacifique et les Caraïbes, provoquant des millions de cas de maladie dans plus de 50 pays. En d’autres termes, le CHIKV est redevenu un véritable agent pathogène mondial.



FIGURE 1.1 – CHIKV in the Western Hemisphere.

## 1.2 Agent Pathogène

Le virus du chikungunya (CHIKV), un alphavirus transmis par les moustiques, dont le génome est constitué d’un ARN monocaténaire à sens positif de  $\sim 12$  kb [7].




FIGURE 1.2 – Electron microscopic image of chikungunya virus

## 1.3 Mode de Transmission

Comprendre les mécanismes de transmission du virus chikungunya est essentiel pour développer des stratégies de prévention efficaces. Cette section examine les principaux vecteurs de la maladie, les conditions environne-

mentales qui favorisent la propagation du virus et les dynamiques de transmission entre les hôtes humains et animaux.

### 1.3.1 Vecteurs : Les moustiques Aedes

Le virus du chikungunya est un alphavirus, similaire aux virus de Mayaro et de Ross River, appartenant à la famille *Togaviridae*, au genre *Alphavirus*. Le virus du chikungunya est principalement transmis à l'homme par la piqûre d'un moustique infecté, principalement *Aedes aegypti* (Voir Figure 1.3) et *Ae. albopictus*.



FIGURE 1.3 – *Aedes aegypti* mosquito full of blood

### 1.3.2 La transmission

Le **CHIKV** se transmet selon deux cycles différents :

- **Cycle urbain** : transmission de l'homme au moustique.
- **Cycle sylvatique** : transmission de l'animal au moustique, puis à l'homme [5].

Le cycle sylvatique est la principale forme de transmission en Afrique [5]. Ailleurs, dans les zones plus densément peuplées, le CHIKV se maintient principalement dans un cycle urbain, dans lequel les humains sont les principaux hôtes et les moustiques du genre *Aedes* les vecteurs [5] (voir figure 1.4). bien que *Ae. aegypti* continue d'être un vecteur viral important, comme on l'a vu lors de la flambée épidémique dans les Caraïbes en 2013 [5]. La transmission verticale de la mère à l'enfant a été postulée pour expliquer les incidences postérieures à 2005 [5], étant particulièrement délétère lorsque :

- la mère est infectée jusqu'à quatre jours après l'accouchement [5],

bien que cette hypothèse ait été contestée [5].




FIGURE 1.4 – Transmission mode Chikungunya

## 1.4 Symptômes et Diagnostic

La reconnaissance des symptômes et l'établissement d'un diagnostic précis sont essentiels pour la gestion efficace des cas de chikungunya. Cette section examine les manifestations cliniques typiques de l'infection par le virus chikungunya ainsi que les méthodes diagnostiques utilisées pour identifier la maladie.

### 1.4.1 Symptômes

Chez les patients symptomatiques, la maladie à **CHIKV** se déclare généralement 4 à 8 jours (entre 2 et 12 jours) après la piqûre d'un moustique infecté. Elle se caractérise par une brusque poussée de fièvre, souvent accompagnée de fortes douleurs articulaires. Les douleurs articulaires sont souvent invalidantes et durent généralement quelques jours, mais peuvent être prolongées et durer des semaines, des mois, voire des années. D'autres signes et symptômes courants sont le gonflement des articulations, les douleurs musculaires, les maux de tête, les nausées, la fatigue et les éruptions cutanées. Comme ces symptômes se confondent avec ceux d'autres infections, notamment celles dues aux virus de la dengue et du Zika, les cas peuvent être mal diagnostiqués. En l'absence de douleurs articulaires importantes, les symptômes des personnes infectées sont généralement légers et l'infection peut passer inaperçue.

La plupart des patients se rétablissent complètement de l'infection ; toutefois, des cas occasionnels de complications oculaires, cardiaques et neurologiques ont été signalés dans le cadre d'infections par le **CHIKV**. Les patients situés aux extrémités du spectre d'âge sont plus exposés à une maladie grave. Les nouveau-nés infectés pendant l'accouchement et les personnes âgées souffrant de pathologies sous-jacentes peuvent devenir gravement malades et l'infection par le **CHIKV** peut augmenter le risque de décès [12].

Une fois qu'une personne est guérie, les données disponibles suggèrent qu'elle est probablement immunisée contre les infections futures [1].

### 1.4.2 Méthodes de diagnostic

Le diagnostic peut être retardé en raison de la confusion possible des symptômes avec ceux de la dengue ou du Zika. Les tests *immuno-enzymatiques* (ELISA) peuvent être utilisés pour confirmer la présence d'anticorps **anti-CHIKV**, les niveaux d'anticorps IgM étant les plus élevés trois à cinq semaines après l'infection et persistant jusqu'à deux mois. La PCR peut également être utilisée pour génotyper le virus [7].

## 1.5 Méthodes de Contrôle et Traitement

La gestion efficace de l'épidémie de chikungunya repose sur une combinaison de stratégies de contrôle des vecteurs et d'interventions médicales. Cette section explore les diverses approches utilisées pour prévenir la transmission du virus et traiter les symptômes chez les patients infectés.

### 1.5.1 Méthodes de contrôle

La prévention de l'infection en évitant les piqûres de moustiques est la **meilleure protection**. Les patients suspectés d'être infectés par le **CHIKV** doivent éviter les piqûres de moustiques pendant la première semaine de la maladie afin d'empêcher la transmission aux moustiques, qui peuvent à leur tour infecter d'autres personnes.



La principale méthode pour réduire la transmission du **CHIKV** consiste à contrôler les moustiques vecteurs. Pour ce faire, il faut mobiliser les communautés, qui jouent un rôle essentiel dans la réduction des sites de reproduction des moustiques en :

- vidant et en nettoyant chaque semaine les récipients contenant de l’eau,
- éliminant les déchets,
- soutenant les programmes locaux de lutte contre les moustiques.

Pendant les épidémies, des insecticides peuvent être :

- pulvérisés pour tuer les moustiques adultes volants,
- appliqués sur les surfaces à l’intérieur et autour des conteneurs où les moustiques se posent,
- utilisés pour traiter l’eau dans les conteneurs afin de tuer les larves immatures.

Les autorités sanitaires peuvent également prendre des mesures d’urgence pour contrôler la population de moustiques.

Pour se protéger pendant les épidémies de **chikungunya**, il est conseillé de :

- porter des vêtements qui minimisent l’exposition de la peau aux vecteurs qui piquent pendant la journée,
- utiliser des moustiquaires aux fenêtres et aux portes pour empêcher les moustiques de pénétrer dans les maisons,
- appliquer des répulsifs sur la peau exposée ou sur les vêtements en respectant scrupuleusement les instructions figurant sur l’étiquette du produit.

Les répulsifs doivent contenir du **DEET**, de l’**IR3535** ou de l’**icaridine** [?].

### 1.5.2 Options de traitement

Le traitement actuel vise à atténuer la gravité des symptômes plutôt qu’à guérir la maladie. Le traitement repose principalement sur l’utilisation d’**antipyrétiques** et d’**AINS**. Cependant, aucune étude n’a évalué systématiquement l’efficacité de ces traitements, et les symptômes peuvent disparaître sans intervention. L’utilisation de **corticostéroïdes** pour le traitement de la phase aiguë a connu un succès mitigé et est utilisée avec hésitation en raison de la possibilité d’aggravation des symptômes après le traitement. Il est particulièrement important de maintenir des niveaux de liquide adéquats.

Il existe également des preuves émergentes que les médicaments qui entravent le transport du cholestérol, tels que les composés **amphiphiles cationiques de classe II U18666A** et l’**imipramine**, peuvent être efficaces contre la fusion membranaire du **CHIKV**, et ont un potentiel d’action contre d’autres arbovirus.

Pour les arthralgies chroniques graves, des **antirhumatismaux modificateurs de la maladie (ARMM)**, notamment le **méthotrexate**, l’**hydroxychloroquine** ou la **sulfasalazine**, ont été proposés. Comme pour les traitements aigus, l’efficacité systématique des **DMARD** pour le traitement chronique est inconnue, bien que des rapports décrivent des résultats positifs avec une cessation des symptômes dans les 4 à 6 mois [5].

## 1.6 Cas du Tchad

L’analyse spécifique des cas de chikungunya au Tchad permet de comprendre l’impact de cette maladie dans un contexte régional spécifique. Cette section examine les Points saillant, la mise en contexte du problème dans ce pays et ainsi que les mesures prises par l’état pour la gestion de l’infection par le virus chikungunya dans ce

pays d'Afrique centrale.

### 1.6.1 Point saillants



FIGURE 1.5 – Region infecté au Tchad

### 1.6.2 Contexte

Au Tchad, à partir du mois de juillet 2020, le Médecin Chef du District d'Abéché a été alerté par le Responsable du Centre de Santé Samalat de la survenue des cas d'une pathologie surnommée localement Kourgnalé, caractérisée par une forte fièvre, des céphalées, des douleurs articulaires intenses et invalidantes et parfois associées aux vomissements et traités comme cas de paludisme. A partir du mois d'août l'augmentation des cas enregistrés a retenu l'attention des autorités sanitaires locales. Les prélèvements biologiques envoyés au Laboratoire Mobile de Ndjaména ont mis en évidence le virus de Chikungunya le 12 août 2020 et confirmé par l'Institut Pasteur de Yaoundé le 26 août 2020. Selon les investigations épidémiologiques et entomologiques réalisées (243 patients ont été enquêtés dans 138 ménages) par l'équipe d'appui du niveau central, il a été mis en évidence la présence d'Aedes Egyptis. Du 14/08 au 03/09/2020, 13 488 cas ont été enregistrés avec zéro décès ; La tranche d'âge la plus touchée est celle de 15 ans et plus et le sexe féminin est prédominant ; Plus de trois quarts des patients développent des fortes fièvres, des céphalées, des douleurs articulaires atroces et invalidantes et un tiers de ces malades ont développé des éruptions cutanées maculo-papuleux.




FIGURE 1.6 – Evolution journalière des cas et décès du Chikungunya



## Chapitre 2

# Revue de la Littérature et Concepts de Base

### 2.1 Introduction

#### 2.1.1 Objectifs du Chapitre

#### 2.1.2 Méthodologie de la Revue

### 2.2 Machine Learning

#### 2.2.1 Définition et Concepts Fondamentaux

#### 2.2.2 Techniques de Machine Learning

##### 2.2.2.1 Régression Linéaire

##### 2.2.2.2 Régression Logistique

##### 2.2.2.3 Arbres de Décision

##### 2.2.2.4 Forêts Aléatoires

#### 2.2.3 Applications du Machine Learning à l'Épidémiologie

#### 2.2.4 Avantages et Limites du Machine Learning

### 2.3 Deep Learning

#### 2.3.1 Définition et Concepts Fondamentaux

#### 2.3.2 Réseaux de Neurones Artificiels

##### 2.3.2.1 Perceptron Multicouche (MLP)

##### 2.3.2.2 Réseaux de Neurones Convolutifs (CNN)

##### 2.3.2.3 Réseaux de Neurones Récurrents (RNN)

#### 2.3.3 Applications du Deep Learning à l'Épidémiologie

# Chapitre 3

## Implémentation des Modèles

### 3.1 Introduction

### 3.2 Présentation des Outils Utilisés

Bla

#### 3.2.1 Langages et librairies (e.g., Python, Scikit-learn, TensorFlow)

Bla

#### 3.2.2 Infrastructure matérielle (e.g., GPU, serveurs)

Bla

### 3.3 Méthodes de l'Apprentissage Automatique

Bla

#### 3.3.1 Le jeu de données

Bla

#### 3.3.2 Préparation et nettoyage des données

Bla

#### 3.3.3 Implémentation des modèles de machine learning

Bla

### 3.4 Méthodes de l'Apprentissage Profond

Bla

### **3.4.1 Le jeu de données**

Bla

### **3.4.2 Préparation des données pour le deep learning**

Bla

### **3.4.3 Implémentation des modèles de deep learning**

Bla

# Conclusion



# General Conclusion

Roads face several problems in managing traffic, reducing pollution and helping to improve road safety. ITS issues in making roads smarter, more efficient and better managed. Prediction of road traffic speeds plays a crucial role in intelligent transport systems. Prediction helps to avoid traffic congestion over time, to achieve intelligent recall of traffic congestion.

For accurate prediction of traffic speeds, we have proposed in this work a machine learning method called KnnLSTM-KF. This method, predicts the characteristics of traffic speeds over time.

In order to validate our work, we conducted experiments on four hybrid machine learning models : Simple KNN, KNN-KF, KNN-LSTM and KNN-LSTM-KF. Dataset of traffic flow of New York City in the United States was used for simulations. Comparative study shown that, the proposed KnnLSTM-KF model outperformed other hybrid models in terms of MAPE and MSE.

This research can be improved as follows :

- Taken into account other parameters such as road conditions and weather ;
- Used GPS positions (longitude and latitude) taken every five minutes on road links ;
- Extended these experiments to other types of vehicles.

# Bibliographie

- [1] Auerswald, H., Boussioux, C., In, S., et al. : Broad and long-lasting immune protection against various chikungunya genotypes demonstrated by participants in a cross-sectional study in a cambodian rural community. *Emerging Microbes & Infections* **7**(1), 13 (2018). DOI 10.1038/s41426-018-0013-0
- [2] CDC : Transmission of chikungunya virus. <https://www.cdc.gov/ncezid> Visité le 10/juin/2024
- [3] cdc — US centers for disease control, prevention : National center for emerging and zoonotic infectious diseases (ncezid). <https://www.cdc.gov/ncezid> Visité le 12/juin/2024
- [4] Dr Jean Bosco NDIHOKUBWAYO, D.B.H.e.a. : Rapport de la situation Épidémiologique chikungunya
- [5] Ganesan, V., Duan, B., Reid, S. : Chikungunya virus : Pathophysiology, mechanism, and modeling. *Viruses* **9**(12), 368 (2017). DOI 10.3390/v9120368
- [6] Moreira, J., Soares, C., Jorge, A., Sousa, J. : Ensemble approaches for regression : A survey. *ACM Computing Surveys* **45**, 10 :1–10 :40 (2012). DOI 10.1145/2379776.2379786
- [7] Morrison, T.E. : Reemergence of chikungunya **88**(20), 11,644 – 11,647. DOI <https://doi.org/10.1128/jvi.01432-14>
- [8] PAHO : Chikungunya - paho/who — pan american health organization. <https://www.paho.org/en/topics/chikungunya> Visité le 12/juin/2024
- [9] Reddy, B.V.K., Patel, S., Singh, A., Singh, N., Ranjit, S., Dantkale, S. : Data science system of predicting and detecting the chikungunya virus using ensemble techniques. In : 2022 4th International Conference on Inventive Research in Computing Applications (ICIRCA), pp. 1420–1423 (2022). DOI 10.1109/ICIRCA54612.2022.9985708
- [10] Rougeron, V., Sam, I.C., Caron, M., Nkoghe, D., Leroy, E., Roques, P. : Chikungunya, a paradigm of neglected tropical disease that emerged to be a new health global risk. *Journal of clinical Virology* **64**, 144–152 (2015)
- [11] WHO : Chikungunya — world health organization. [https://www.who.int/health-topics/chikungunya#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/chikungunya#tab=tab_1) Visité le 10/juin/2024
- [12] WHO : Chikungunya fact sheet. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail> Visité le 12/juin/2024
- [13] WHO : Disease outbreak news - tchad. <https://www.who.int/fr/emergencies/disease-outbreak-news/item/chikungunya-chad> Visité le 10/juin/2024