

Grammaires Hors-contexte

Grammaires : Séance 2

Marie-Laure Potet

Grenoble INP-Ensimag

2020-2021

Summary

- 1 Rappels
- 2 Propriétés de décomposition des dérivations
- 3 Dérivations canoniques
- 4 Grammaires et langages ambigus
- 5 Preuve sur les grammaires

Grammaire hors-contexte

Soit $G = \langle V_T, V_N, S, R \rangle$ une grammaire. G est dite **hors-contexte** si et seulement si les règles sont de la forme :

- $A \rightarrow w$

avec $A \in V_N$ et $w \in (V_T \cup V_N)^*$.

Un langage L est dit hors-contexte si il existe une grammaire hors-contexte G telle que $L(G) = L$.

⇒ Une classe qui fournit un bon compromis Expressivité/décidabilité :

- Permet de décrire la syntaxe des langages de programmation
- Des algorithmes efficaces de reconnaissance (TL2)

Exemples

Exemple 1 : Une grammaire d'expressions arithmétiques :

$$V_T = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +, -, *, (,)\}$$

$$exp \rightarrow num \mid exp + exp \mid exp - exp \mid exp * exp \mid (exp)$$

$$num \rightarrow 0 \mid \dots \mid 9 \mid 0 \, num \mid \dots \mid 9 \, num$$

⇒ On verra une " meilleure " grammaire plus tard.

Exemple 2 : les instructions :

statement	→	compound_statement		if_statement
				assignment_statement
compound_statement	→	statement ;		
assignment_statement	→	var = exp ;		
if_statement	→	if (exp) then statement suite end ;		
suite	→	ε else statement		

Ici les terminaux sont en **gras**.

Summary

- 1 Rappels
- 2 Propriétés de décomposition des dérivations**
- 3 Dérivations canoniques
- 4 Grammaires et langages ambigus
- 5 Preuve sur les grammaires

Rappels

Soit $G = \langle V_T, V_N, S, R \rangle$ une grammaire et $V = V_T \cup V_N$:

- $xuy \Rightarrow xvy$ ssi $u \rightarrow v \in R$ avec $x, y, u, v \in V^*$
- \Rightarrow^p les dérivations de longueur p (avec $\Rightarrow^1 = \Rightarrow$)
- \Rightarrow^* les dérivations de longueur quelconque

Soit $w \in V^*$. Le langage engendré par w est défini par :

$$L(w) = \{x \in V_T^* \mid w \Rightarrow^* x\}$$

et :

$$L(G) = \{x \in V_T^* \mid S \Rightarrow^* x\}$$

Composition des dérivations

✓ Propriété de composition des dérivations :

$$\begin{array}{c}
 u_1 \Rightarrow^{p_1} v_1 \qquad u_2 \Rightarrow^{p_2} v_2 \\
 \hline
 u_1 u_2 \Rightarrow^{p_1+p_2} v_1 v_2
 \end{array}$$

Théorème de décomposition des dérivations

Soit $G = \langle V_T, V_N, S, R \rangle$ une grammaire hors-contexte et
 $V = V_T \cup V_N$ et

$$u_1 \dots u_n \Longrightarrow^p w$$

avec $u_i \in V^*$ et $w \in V^*$ alors $\exists v_1 \dots \exists v_n$ avec $v_i \in V^*$ tels que :

- ① $w = v_1 \dots v_n$
- ② $u_i \Longrightarrow^{p_i} v_i$
- ③ $\sum_{i=1}^n p_i = p$

Preuve par induction sur p (dans poly)

Preuve du théorème de décomposition

Cas $p = 0$ $u_1 \dots u_n \Rightarrow^0 w$.

On a :

$$1 \quad w = u_1 \dots u_n$$

$$2 \quad u_i \Rightarrow^0 u_i$$

$$3 \quad \sum_{i=1}^n 0 = 0$$

Preuve du théorème de décomposition (suite)

Cas $p + 1$: $u_1 \dots u_n \Longrightarrow^{p+1} w$.

Supposons que la première règle est appliquée à u_k ($u_k \rightarrow t$). On a donc :

$$u_1 \dots u_n \Longrightarrow u_1 \dots u_{k-1} t u_{k+1} \dots u_n \Longrightarrow^p w$$

Par hypothèse d'induction $\exists v_1 \dots \exists v_n$ avec $v_i \in V^*$ tels que :

- ① $w = v_1 \dots v_n$
- ② $u_i \Longrightarrow^{p_i} v_i$ pour $i \in 1..k-1 \cup k+1..n$
- ③ $t \Longrightarrow^{p_k} v_k$
- ④ $\sum_{i=1}^n p_i = p$


et donc $u_k \Longrightarrow^{p_k+1} v_k$

Summary

- 1 Rappels
- 2 Propriétés de décomposition des dérivations
- 3 Dérivations canoniques**
- 4 Grammaires et langages ambigus
- 5 Preuve sur les grammaires

Dérivations canoniques


- On s'intéresse généralement aux dérivations les plus à gauche :
 - $xuy \Rightarrow xvy$ ssi $u \rightarrow v \in R$ avec $x, y, u, v \in V^*$
 - $xuy \Rightarrow_{\text{gauche}} xvy$ ssi $u \rightarrow v \in R$ avec $x \in V_T^*$ et $y, u, v \in V^*$
- Autre représentation : les arbres de dérivation
 - les noeuds sont des éléments de $V_T \cup V_N \cup \{\epsilon\}$
 - La racine est étiquetée par l'axiome
 - les feuilles sont des éléments de $V_T \cup \{\epsilon\}$
 - l'application d'une règle $A \rightarrow X_1 \dots X_n$ avec $X_i \in V_T \cup V_N \cup \{\epsilon\}$ produit le sous-arbre :



Exemple (suite)

Dérivation 2 :

$$S \Rightarrow SS \Rightarrow aSbS \Rightarrow abS \Rightarrow ab$$



mot des feuilles : $a \in b \in = ab$

Summary

- 1 Rappels
- 2 Propriétés de décomposition des dérivations
- 3 Dérivations canoniques
- 4 Grammaires et langages ambigus
- 5 Preuve sur les grammaires

Grammaire ambiguë

Définition: (Grammaire ambiguë)

Une grammaire G est dite ambiguë ssi il existe au moins un mot de $L(G)$ pour lequel il existe plusieurs dérivations canoniques.

⇒ La grammaire précédente est ambiguë. Autre mot possible ϵ .

Ambiguïté

Pourquoi on n'aime pas l'ambiguïté ?

Une grammaire d'expressions arithmétiques :

$$V_T = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +, -, *, (,)\}$$


$$exp \rightarrow num \mid exp + exp \mid exp - exp \mid exp * exp \mid (exp)$$

$$num \rightarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$$


2 interprétations pour : $2 + 3 * 5$

⇒ On verra une " meilleure " grammaire plus tard.

Arbre 1



Arbre 2



Langage ambigu

Définition: (Langage ambigu)

Un langage L est dit (intrinséquement) ambigu ssi toute grammaire G qui le décrit (i.e telle que $L(G) = L$) est ambiguë.

Il existe des langages intrinséquement ambigus : $a^n b^n c^i \cup a^n b^i c^i$
(intuitivement $a^n b^n c^n$ n'est pas un langage hors-contexte).

Là on se distingue des langages réguliers.

Exemple

Une grammaire ambiguë:

Soit la grammaire suivante G_1 sur le vocabulaire $\{a, b\}$:

$$S \rightarrow SS \mid aSb \mid \epsilon$$

On peut décrire le même langage de manière non ambiguë, par la grammaire G_2 suivante :

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AS \mid \epsilon \\ A &\rightarrow aSb \end{aligned}$$

Mais bon, est-ce le même langage ? Comment on est sûr que cette grammaire n'est pas ambiguë ?

Condition suffisante pour qu'une grammaire ne soit pas ambiguë

Théorème:

Une condition suffisante pour qu'une grammaire G ne soit pas ambiguë est que les deux propositions ci-dessous soient vérifiées :

Condition 1 :

pour tout couple de règles $(A \rightarrow \alpha, A \rightarrow \beta)$ de G tel que $\alpha \neq \beta$, $L(\alpha) \cap L(\beta) = \emptyset$;

Condition 2 :

pour toute règle de la forme $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_n$, où $X_i \in V_T \cup V_N$, $\forall w \in V_T^$ tel que $X_1 X_2 \dots X_n \Rightarrow^* w$, $\exists ! (w_1, w_2, \dots, w_n)$ tel que $w_i \in V_T^*$, $w = w_1 w_2 \dots w_n$ et $\forall i, X_i \Rightarrow^* w_i$.*

Application à l'exemple : G2

La grammaire G_2 ($S \rightarrow AS \mid \epsilon$, $A \rightarrow aSb$) vérifie les conditions 1 et 2 :

- **Condition 1 OK** : $L(\epsilon) = \{\epsilon\}$, $L(AS)$ des mots de longueur supérieure à 2
- **Condition 2 OK** :
il faut montrer une seule possibilité d'appliquer la règle $S \rightarrow AS$, i.e. un mot de $L(A)$ n'a pas de préfixe propre dans $L(A)$. Pour cela on montre les propriétés suivantes :
 - tout mot de $L(S)$ et de $L(A)$ a autant de a que de b
 - tout préfixe de $L(S)$ et de $L(A)$ a autant ou plus de a que de b .
 $v \in L(S) \cup L(A) \Rightarrow |v|_a \geq |v|_b$.

Donc un préfixe propre de $L(A)$ s'écrit av avec v préfixe d'un mot de $L(S)$ et on a $|av|_a > |v|_b$. Donc $av \notin L(A)$.

Summary

- 1 Rappels
- 2 Propriétés de décomposition des dérivations
- 3 Dérivations canoniques
- 4 Grammaires et langages ambigus
- 5 Preuve sur les grammaires**

Principe

- Soit une grammaire hors-contexte $G = (V_T, V_N, S, R)$
- Soit L la définition d'un langage de la forme $L = \{w \mid w \in V_T^* \wedge P(w)\}$, avec P un prédicat.

La preuve de $L(G) = L$ se fait en 2 temps :

- 1 la preuve de $L(G) \subseteq L$ est appelée **la correction** de la grammaire : tout mot produit par la grammaire vérifie la propriété attendue.
- 2 la preuve de $L \subseteq L(G)$ est appelée **la complétude** de la grammaire : tout mot vérifiant la propriété attendue peut être produit par la grammaire.

Preuve de correction

$L(G) \subseteq L$: le but est de montrer que tout mot w produit par la grammaire ($S \Rightarrow^* w$), vérifie P (est tel que $P(w)$ est vrai).

- La preuve se fait par induction sur la longueur des dérivations : \Rightarrow^n
- Demande généralement de caractériser les langages intermédiaires $L(A)$ associés à chaque non-terminal :

$$L_A = \{w \mid w \in V_T^* \wedge P_A(w)\}$$

On va donc prouver, pour tout $A \in V_N$ et tout $w \in V_T^*$:

$$(A \Rightarrow^n w) \Rightarrow P_A(w)$$

Avec l'hypothèse d'induction, pour tout $A \in V_N$:

$$\forall k < n . (A \Rightarrow^k w) \Rightarrow P_A(w)$$

Preuve de Complétude

$L \subseteq L(G)$: le but est de montrer que tout mot vérifiant P (tout mot w tel que $P(w)$ est vrai) peut être produit par la grammaire ($S \Rightarrow^* w$).

- La preuve se fait généralement par induction sur une mesure associée à w (sa longueur, le nombre d'occurrences d'un certain symbole...), l'ordre choisi dépendant du prédicat P .
- On sera généralement amené à montrer qu'on sait produire les éléments des langages intermédiaires $L(A)$, pour tout $A \in V_N$.

On va donc prouver, pour tout $A \in V_N$ et tout $w \in V_{T^*}$:

$$(P_A(w) \wedge |w| = n) \Rightarrow (A \Rightarrow^* w)$$

Avec l'hypothèse d'induction, pour tout $A \in V_N$:

$$\forall \alpha . (P_A(\alpha) \wedge |\alpha| < n) \Rightarrow (A \Rightarrow^* \alpha)$$

Exemple Poly (1)

- (1) $S \rightarrow aSb$
- (2) $S \rightarrow bSa$
- (3) $S \rightarrow SS$
- (4) $S \rightarrow \epsilon$

On veut montrer:

$$L(G) = L$$

avec

$$L = \{w \in \{a, b\}^* : |w|_a = |w|_b\}$$

Correction

On va prouver $\forall w . ((S \Longrightarrow^n w) \Rightarrow (w \in L))$ par induction sur n .
Hypothèse :

$$\forall \alpha . \forall k . ((k < n \wedge S \Longrightarrow^k \alpha) \Rightarrow (\alpha \in L))$$

- $n = 1$
 - ① $S \Longrightarrow^1 \epsilon$:
on a bien $|\epsilon|_a = |\epsilon|_b = 0$
- $n > 1 : S \Longrightarrow^n w$
 - ① $S \Longrightarrow^1 SS \Longrightarrow^{n-1} w$: Par le théorème de décomposition il existe w_1 et w_2 tels que $w = w_1 w_2$ et $S \Longrightarrow^{n_1} w_1$ et $S \Longrightarrow^{n_2} w_2$ et $n_1 + n_2 = n - 1$. On a $n_1 < n$ et $n_2 < n$ et donc $|w_1|_a = |w_1|_b$ et $|w_2|_a = |w_2|_b$. On en déduit $|w_1 w_2|_a = |w_1 w_2|_b$ et donc $w \in L$.
 - ② $S \Longrightarrow^1 aSb \Longrightarrow^{n-1} w : \dots$
 - ③ $S \Longrightarrow^1 bSa \Longrightarrow^{n-1} w : \dots$

Complétude

On va prouver $\forall w . ((w \in L) \Rightarrow (S \Longrightarrow^* w))$ par induction sur $n = |w|$.
Hypothèse :

$$\forall \alpha . ((|\alpha| < n \wedge \alpha \in L) \Rightarrow (S \Longrightarrow^* \alpha))$$

- $n = 0$, i.e $w = \epsilon$. On a bien $S \Longrightarrow^* w$ par la règle $S \rightarrow \epsilon$.
- $|w| > 0$. On considère les 4 cas suivants :
 - ① $w = aub$
 - ② $w = bua$
 - ③ $w = aua$
 - ④ $w = bub$

qui couvre tous les cas de mots w de L tel que $|w| > 0$.

Exemple (suite 2)

Cas 2 : on va prouver que w a un préfixe propre (différent de ϵ et de w) qui est dans L . On aura donc $w = w_1 w_2$ avec $w_1 \in L$ et $w_2 \in L$ et $|w_1| < |w|$ et $|w_2| < |w|$. On peut donc construire w_1 et w_2 à partir de S ($S \Rightarrow^* w_1$ et $S \Rightarrow^* w_2$). On peut donc construire w par la règle $S \rightarrow SS$.

Comme $w = aua$ et $w \in L$ w a un préfixe propre ayant plus de b que de a . Soit x le plus petit de ces préfixes ($|x|_b > |x|_a$).

Il s'écrit ayb car w commence par a et que si x ne finit pas par b ce n'est pas le plus petit préfixe ayant plus de b . On a alors $|ay|_a = |x|_a$ et $|ay|_b = |x|_b - 1$.

On ne peut pas avoir $|x|_b - 1 > |x|_a$ sinon ay est un préfixe plus petit que x qui vérifie $|ay|_b > |ay|_a$. On a donc : $|x|_b - 1 = |x|_a$ et donc ay est dans L .

Exemple plus complexe

L : nombre pair de a

$$(1) \quad P \rightarrow bP$$

$$(2) \quad P \rightarrow aI$$

$$(3) \quad P \rightarrow \epsilon$$

$$(4) \quad I \rightarrow bI$$

$$(5) \quad I \rightarrow aP$$

\Rightarrow Ici il faut faire les preuves à la fois sur P et I .

$$\begin{array}{l} S \rightarrow AS \mid \epsilon \\ A \rightarrow aSb \end{array}$$

Pour cela on montre les propriétés suivantes :

- Donc un préfixe propre de $L(A)$ s'écrit av avec v préfixe d'un mot de $L(S)$ et on a $|av|_a > |v|_b$. Donc $av \notin L(A)$.

< 36 / 36 >