

# Feuille de TD n.9 de IPD 2022-2023, Ensimag 2A IF

H. Guiol

**Exercice 1.** Soit  $B$  un mouvement brownien sur  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ . On considère le processus  $X$  défini par  $X_t = \mu(t^2 - 2t) + B_t$  pour tous  $t \geq 0$ . Définissez une probabilité  $\mathbb{Q}$  sous laquelle  $X$  est un MBS.

**Exercice 2. Martingale exponentielle.**

Soit  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction déterministe mesurable telle que  $\int_0^t h^2(s) ds < +\infty$  pour tout  $t \geq 0$ .

1. Montrer que

$$\mathbb{E} \left[ e^{\int_0^t h(s) dB_s} \right] = e^{\frac{1}{2} \int_0^t h^2(s) ds}.$$

2. Calculer

$$\mathbb{E} \left[ e^{\int_0^t h(u) dB_u} \middle| \mathcal{F}_s \right]$$

pour  $s \leq t$ .

3. En combinant les deux questions précédentes, en déduire que le processus  $M$  défini par

$$M_t = \exp \left( \int_0^t h(s) dB_s - \frac{1}{2} \int_0^t h^2(s) ds \right),$$

pour  $t \leq T$ , est une martingale.

4. Montrer que  $M_t$  est un processus d'Itô et donner sa décomposition.

5. On pose

$$M_t^{-1} = \exp \left( - \int_0^t h(s) dB_s + \frac{1}{2} \int_0^t h^2(s) ds \right),$$

donner la décomposition d'Itô de  $M^{-1}$ . Calculer sa moyenne. Est-ce une martingale?

**Exercice 3. Processus d'Itô.**

Soit  $B$  un mouvement brownien. Donner la décomposition d'Itô (si elle existe) des processus suivants

(a)  $X_t = X_0 e^{(r-\sigma^2/2)t+\sigma B_t}$  pour  $r > 0$  et  $\sigma \in \mathbb{R}$ .

(b)  $X_t = X_0 e^{-at} + \int_0^t e^{-a(t-s)} dB_s$  pour  $a \in \mathbb{R}$ .

(c)  $X_t = \frac{B_t}{1+t}$ .

(d)  $X_t = B_t - tB_1$  pour  $t \in [0, 1]$ .

(e)  $X_t = B_t^2 - B_t W_t + W_t^2$  où  $W$  est un MBS indépendant de  $B$ .