الغصة

الغصة :هي انسداد مجرى الهواء بجسم غريب أو قطعة طعام، مما يؤدي لتوقف التنفس و فقدان الوعي.

الأسباب المؤدية للغصة:

١-محاولة بلع قطع كبيرة من الطعام دون مضغها جيدا

٢-شرب المواد الكحولية والمواد المخدرة قبل الأكل أو أثنائه "المواد الكحولية تخدر وتضعف العضلات المساعدة على البلع"

٣-استعمال أطقم أسنان صناعية، فالأسنان الصناعية تجعل من الصعب الإحساس بحجم اللقم أثناء المضغ والبلع.

٤-التكلم بانفعال أو الضحك أثناء الأكل بسرعة.

٥-المشي أو اللعب أو الركض مع وجود أشياء داخل الفم.

أنواع الغصة:

١-انسداد مجرى الهواء الجزئي.

عندما يعاني المصاب من انسداد مجرى الهواء الجزئي فإنه يستطيع أن يسعل بقوة في محاولة لإزالة الجسم الذي يسد مجرى الهواء و قد يستطيع الكلام. كما أن تنفسه يكون بصوت عالٍ ويشبه الصفير، وقد يمسك المصاب عنقه دلالة على وجود جسم غريب يسد مجرى الهواء، في هذه الحالة لا تتدخل وشجع المصاب على الاستمرار في السعال. إذا استمر السعال اتصل بقسم الطوارئ.

٢-انسداد مجرى الهواء الكلي:

قد يتحول انسداد مجرى الهواء الجزئي إلى انسداد كلي لمجرى الهواء، وفي هذه الحالة لا يستطيع المصاب الكلام أو التنفس أو السعال. في بعض الأحيان قد يسعل المصاب سعالا ضعيفا وغير فعال، وقد يصدر عن تنفسه أصوات حادة، في هذه الحالة أطلب من أحد المتواجدين الاتصال بقسم الطوارئ وابدأ فورا بتقديم الإسعاف الأولي.

الإسعاف الأولي:

أولا-إذا كان المصاب واعيا:

اسأله هل أنت غاص ؟ فإذا كان يعاني من الغصة ابدأ فورا بتقديم الإسعاف الأولي وأجل المصاب ينحني للأمام ثم اضغط أربع ضغطات بقبضة يدك تحت الصدر وفوق السرة على أن يكون اتجاه الضغط إلى أعلى في اتجاه الصدر.استمر في ضغطات البطن بنفس الطريقة حتى يتحرك الجسم الغريب ويلقى به من الفم أو يبدأ المصاب في السعال.عندئذ أوقف الضغطات وراقبه فقط .

ثانيا-إذا كان فاقداً للوعي:

حاول فتح مجرى الهواء وافحص التنفس فإن انعدم التنفس أعطه تنفسا اصطناعيا فإذا وصل الهواء إلى الرئتين (يعلو الصدر وينخفض) أعطه نفختان سريعتان ثم أفحص النبض و التنفس. أما إذا لم يصل الهواء إلى الرئتين اضغط أربع ضغطات على البطن و كرر العملية حتى يفتح

مجرى الهواء وتخرج القطعة العالقة، ثم أعطه تنفسا اصطناعيا أو إنعاش كامل للقلب والرئتين .إن لزم الأمر

حالات خاصة:

في بعض الحالات قد لا تستطيع لف ذراعيك حول بطن المصاب وذلك قد يكون بسبب سمنة زائدة عند المصاب أو كون المصاب أمراءه حاملا فيكون الضغط على الصدر بالشكل التالي:

١-خلف المصاب ولف ذراعك تحت إبطيه وحول صدره

٢-ضع قبضتك من جهة الإبهام على وسط عظم صدر المصاب (عظمة القص)

٣-أمسك قبضتك بيدك الأخرى.

٤-اضغط على الصدر بشدة أربع مرات إلى أن يفتح مجرى الهواء.

ثالثا-إذا كنت بمفردك وأصبت بغصة:

أصبت بغصة ولا يوجد حولك من يساعدك فإنك تستطيع إجراء الضغطات البطنية لنفسك كمايلي:

ضع قبضة يدك من جهة الابهام على وسط البطن فوق السرة بقليل وتحت الطرف السفلي لعظمة الصدر.

أمسك قبضة يدك بيدك الأخرى وأعط ضغطات سريعة.

تستطيع كذلك الانحناء للأمام وضغط بطنك على حافة جسم ثابت مثل ظهر كرسي أو غيره.



رابعا-إذا كان المصاب طفلا رضيعا:



الربو الشعبي

هو مرض صدري مزمن يصيب الشعب الهوائية في الرئتين حيث تضيق فيه المجاري التي تحمل الهواء من وإلى الرئة وبالتالي يصعب التنفس. مجاري الهواء في الشخص المصاب بالربو تكون شديدة الحساسية لعوامل معينة تسمى المهيجات وعند إثارتها بهذه المهيجات تلتهب مجاري الهواء وتنتفخ ويزيد إفرازها للمخاط وتنقبض عضلاتها ويؤدي ذلك إلى إعاقة التدفق العادي للهواء، وهذا ما يسمى بنوبة الربو.

أعراض مصاب الربو:

ضيق و صعوبة في التنفس و تعثر في الكلام.
الشعور بالقلق و الخوف.
تعذر الكلام.
ازرقاق و خاصة الوجه.
ظهور عرق.
هيجان و سعال شديد.
أحيانا بخروج قشع مخاطي من انف المريض.
الزفير أطول من الشهيق مع صعوبة أثناء الزفير.
حدوث امتلاء في الأوردة العنقوية.
يكون صوت الزفير مسموعا مع سماع خرخرة قصبية أثناء الزفير.
تشترك جميع العضلات التنفسية بعملية التنفس.
سرعة في النبض.
حدوث ارتفاع في التوتر الشرياني.

الإسعاف الأولي لمرضى الربو

١-التخفيف عن المصاب وتهدئته والتحدث معه.
٢-جلوس المصاب مع مد رجليه و استناد الجزء العلوي من الجسم على يديه خلف جسمه.
٣-خلع الملابس الضيقة لتسهيل عملية التنفس.
٤-Ventolin يعطى المصاب بخاخ.
٥-إعطائه أكسجين .
٦-إعطائه سوائل على الدوام.
٧-فحص الحالة العامة للمريض و مراقبة تنفسه و نبضه و ضغطه بشكل مستمر.
٨-ينقل المصاب إلى المستشفى.