



النهايات والمشتقات

مفتاح الإجابات

حساب النهايات بالتعويض المباشر

1 أوجد $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - 4x + 1)$

$$3(4) - 8 + 1 = 12 - 8 + 1 = 5.$$

2 أوجد $\lim_{x \rightarrow -1} (x^3 + 2x - 5)$

$$(-1)^3 + 2(-1) - 5 = -1 - 2 - 5 = -8.$$

3 أوجد $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x + 7}{x + 3}$

$$\frac{5(0) + 7}{0 + 3} = \frac{7}{3}.$$

4 أوجد $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{x + 13}$

$$\sqrt{3 + 13} = \sqrt{16} = 4.$$

حساب النهايات بالتحليل الصورة 00

5 أوجد $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$

$$\frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = x + 3 \rightarrow 6.$$

6 أوجد $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 5x + 6}{x + 2}$

$$\frac{(x + 2)(x + 3)}{x + 2} = x + 3 \rightarrow 1.$$

7 أوجد $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4}$

$$\frac{(x - 4)(x + 4)}{x - 4} = x + 4 \rightarrow 8.$$

8 أوجد $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2}$

$$\frac{(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)(x - 2)} = \frac{x + 1}{x - 2} \rightarrow \frac{2}{-1} = -2.$$

النهايات عند اللانهاية

9 أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x}{x^2 - 5}$

الدرجتان متساويتان، إذن النهاية هي نسبة المعاملين الرئيسيين: 3.

10 أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 7}{x^2 + 1}$.

درجة المقام أعلى، إذن النهاية تساوي 0.

11 أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 - 2}{x^3 + 4x}$.

الدرجتان متساويتان، إذن النهاية هي نسبة المعاملين الرئيسيين: 5.

النهايات من جهة واحدة

12 دالة معرفة بـ $f(x) = x + 1$ عندما $x < 2$ ، و $f(x) = 2x - 1$ عندما $x \geq 2$. أوجد $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$.

باستخدام القاعدة الأولى: $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2 + 1 = 3$.

13 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$.

باستخدام القاعدة الثانية: $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2(2) - 1 = 3$.

14 باستخدام نفس الدالة المجزأة، هل $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ موجودة؟ اذكر قيمتها.

نعم كلتا النهايتين من الجهتين تساوي 3، إذن $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$.

قاعدة القوة

15 أوجد مشتقة $f(x) = x^5$.

$f'(x) = 5x^4$.

16 أوجد مشتقة $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7$.

$f'(x) = 12x^3 - 4x$.

17 أوجد مشتقة $f(x) = \sqrt{x}$.

$f(x) = x^{1/2}$ ، إذن $f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

18 أوجد مشتقة $f(x) = \frac{1}{x^2}$.

$f(x) = x^{-2}$ ، إذن $f'(x) = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$.

قاعدة الضرب

19 أوجد مشتقة $f(x) = x^2(3x + 1)$ باستخدام قاعدة الضرب.

$$f'(x) = (2x)(3x + 1) + x^2(3) = 6x^2 + 2x + 3x^2 = 9x^2 + 2x.$$

20 أوجد مشتقة $f(x) = (x + 2)(x - 5)$ باستخدام قاعدة الضرب.

$$f'(x) = (1)(x - 5) + (x + 2)(1) = x - 5 + x + 2 = 2x - 3.$$

21 أوجد مشتقة $f(x) = (2x - 1)(x^2 + 3)$ باستخدام قاعدة الضرب.

$$f'(x) = (2)(x^2 + 3) + (2x - 1)(2x) = 2x^2 + 6 + 4x^2 - 2x = 6x^2 - 2x + 6.$$

قاعدة السلسلة

22 أوجد مشتقة $f(x) = (3x + 1)^4$.

$$f'(x) = 4(3x + 1)^3(3) = 12(3x + 1)^3.$$

23 أوجد مشتقة $f(x) = (x^2 - 5)^3$.

$$f'(x) = 3(x^2 - 5)^2(2x) = 6x(x^2 - 5)^2.$$

24 أوجد مشتقة $f(x) = \sqrt{4x + 9}$.

$$f(x) = (4x + 9)^{1/2}, \text{ إذن } f'(x) = \frac{1}{2}(4x + 9)^{-1/2}(4) = \frac{2}{\sqrt{4x + 9}}.$$

25 أوجد مشتقة $f(x) = (5 - 2x)^6$.

$$f'(x) = 6(5 - 2x)^5(-2) = -12(5 - 2x)^5.$$

مشتقات الدوال المثلثية والأسية

26 أوجد مشتقة $f(x) = \sin x + \cos x$.

$$f'(x) = \cos x - \sin x.$$

27 أوجد مشتقة $f(x) = 3\sin x$.

$$f'(x) = 3\cos x.$$

28 أوجد مشتقة $f(x) = e^x + x^2$.

$$f'(x) = e^x + 2x.$$

خطوط المماس

29 أوجد ميل خط المماس لـ $f(x) = x^2$ عند $x = 3$.

$$f'(x) = 2x, \text{ إذن } f'(3) = 6.$$

30 أوجد معادلة خط المماس لـ $f(x) = x^2$ عند $x = 2$.

$$f(2) = 4, f'(2) = 4. y - 4 = 4(x - 2) \Rightarrow y = 4x - 4.$$

31 الشكل التالي يمثل منحنى $f(x) = x^2 - 2x$. أوجد معادلة خط المماس عند $x = 3$ النقطة المحددة.

$$f(3) = 9 - 6 = 3. f'(x) = 2x - 2, \text{ إذن } f'(3) = 4. y - 3 = 4(x - 3) \Rightarrow y = 4x - 9.$$

32 أوجد قيمة قيم x التي يكون عندها خط المماس لـ $f(x) = x^3 - 3x$ أفقياً.

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1.$$

التزايد والتناقص والمشتقة الثانية

33 لتكن $f(x) = x^2 - 4x + 1$. أوجد $f'(x)$ وحدد الفترة التي تكون فيها f متزايدة.

$$f'(x) = 2x - 4. \text{ تكون متزايدة عندما } f'(x) > 0, \text{ أي } x > 2.$$

34 لتكن $f(x) = -x^2 + 6x$. حدد الفترة التي تكون فيها f متناقصة.

$$f'(x) = -2x + 6. \text{ تكون متناقصة عندما } f'(x) < 0, \text{ أي } -2x + 6 < 0 \Rightarrow x > 3.$$

35 أوجد المشتقة الثانية لـ $f(x) = x^4 - 2x^2$.

$$f'(x) = 4x^3 - 4x, \text{ إذن } f''(x) = 12x^2 - 4.$$

مسائل لفظية: معدلات التغير

36 هذا السؤال يتكون من جزأين. ارتفاع كرة قُذفت للأعلى يُعطى بـ $h(t) = -5t^2 + 20t + 2$ بالمتري، و t بالثانية.

$$\text{أ أوجد دالة السرعة } h'(t). h'(t) = -10t + 20.$$

ثانية، واذكر ما إذا كانت الكرة صاعدة أو هابطة. م، وهي موجبة، إذن الكرة صاعدة $h'(1) = -10(1) + 20 = 10$

ب أوجد السرعة عند $t = 1$

37 هذا السؤال يتكون من جزأين. تكلفة شركة لإنتاج x قطعة تُعطى بـ $C(x) = 0.01x^2 + 5x + 200$ بالدولار.

أ أوجد دالة التكلفة الحدية $C'(x)$. $C'(x) = 0.02x + 5$.

وهي تقريباً تكلفة إنتاج قطعة إضافية بعد القطعة رقم 100 $C'(100) = 0.02(100) + 5 = 2 + 5 = 7$

ب أوجد التكلفة الحدية عند $x = 100$ قطعة، وفسّر معناها. دولارات

اختيار من متعدد إيجاد النهايات بالتعويض المباشر

38 أوجد $\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 5x + 3)$.

أ. 12

ب. -6

ج. 18

د. 6

$$2(9) - 5(3) + 3 = 18 - 15 + 3 = 6.$$

39 أوجد $\lim_{x \rightarrow -2} (x^3 - 3x + 4)$.

أ. 10

ب. -2

ج. 2

د. -10

$$(-2)^3 - 3(-2) + 4 = -8 + 6 + 4 = 2.$$

40 أوجد $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x + 9}{x + 5}$.

أ. $\frac{9}{5}$

ب. $\frac{13}{6}$

ج. $\frac{13}{5}$

د. $\frac{4}{5}$

$$\frac{4(1) + 9}{1 + 5} = \frac{13}{6}.$$

41 أوجد $\lim_{x \rightarrow 6} \sqrt{x + 10}$.

أ. 4

ب. 8

ج. $\sqrt{16}$

د. 16

$$\sqrt{6 + 10} = \sqrt{16} = 4.$$

42 أوجد $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 3x}{2x + 1}$.

أ. $\frac{4}{7}$

ب. $\frac{16}{9}$

ج. $\frac{4}{8}$

د. $\frac{4}{9}$

$$\frac{16 - 12}{9} = \frac{4}{9}.$$

اختيار من متعدد إيجاد النهايات بالتحليل الصورة 00

43 أوجد $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4}$

أ. 16

ب. 0

ج. 8

د. 4

$$\frac{(x-4)(x+4)}{x-4} \rightarrow x+4=8.$$

44 أوجد $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + 7x + 12}{x + 3}$

أ. 7

ب. 4

ج. -1

د. 1

$$\frac{(x+3)(x+4)}{x+3} \rightarrow x+4=1.$$

45 أوجد $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x - 5}$

أ. 0

ب. 5

ج. 10

د. 25

$$\frac{(x-5)(x+5)}{x-5} \rightarrow x+5=10.$$

46 أوجد $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 5x + 6}$

أ. -1

ب. $\frac{4}{3}$

ج. -4

د. 4

$$\frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x-3)} \rightarrow \frac{x+2}{x-3} = \frac{4}{-1} = -4.$$

47 أوجد $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 3x + 2}$

أ. -2

ب. 2

ج. -1

د. $-\frac{1}{2}$

$$\frac{(x-1)(x+1)}{(x+1)(x+2)} \rightarrow \frac{x-1}{x+2} = \frac{-2}{1} = -2.$$

اختيار من متعدد النهايات عند اللانهاية

48 أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 + 3x}{2x^2 - 7}$

أ. 2

ب. 0

ج. $\frac{3}{7}$

د. 4

نفس الدرجة: نسبة المعاملين الرئيسيين $= \frac{4}{2} = 2$.

49 أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + 5}{x^2 + 2}$.

أ. 3

ب. $\frac{5}{2}$

ج. ∞

د. 0

درجة المقام أعلى: النهاية = 0 .

50 أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^3 - 1}{x^3 + 3x}$.

أ. 0

ب. 1

ج. 7

د. -1

نفس الدرجة: نسبة المعاملين الرئيسيين $= \frac{7}{1} = 7$.

51 أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 1}{5x^3 - 4}$.

أ. ∞

ب. $\frac{2}{5}$

ج. 0

د. 5

درجة المقام أعلى: النهاية = 0 .

اختيار من متعدد النهايات من جهة واحدة

52 دالة معرفة بـ $f(x) = x + 2$ لـ $x < 3$ و $f(x) = 3x - 4$ لـ $x \geq 3$. أوجد $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$.

أ. 3

ب. 4

ج. 9

د. 5

باستخدام $x < 3: f(x) \rightarrow 3 + 2 = 5$.

53 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$.

أ. 3

ب. 4

ج. 5

د. 9

باستخدام $x \geq 3: f(x) \rightarrow 3(3) - 4 = 5$.

54 باستخدام نفس الدالة المجزأة، هل توجد $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ ؟ اذكر قيمتها.

أ. نعم، تساوي 9

ب. لا، غير موجودة

ج. نعم، تساوي 5

د. نعم، تساوي 4

بما أن النهايتين من اليسار واليمين تساويان 5، فإن النهاية الثنائية الاتجاه موجودة وتساوي 5.

55 دالة معرفة بـ $f(x) = 2x$ لـ $x \leq 1$ و $f(x) = x + 3$ لـ $x > 1$ أوجد $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$.

أ. 1

ب. 2

ج. 3

د. 4

باستخدام $f(1) = 2$ لـ $x \leq 1$.

56 باستخدام نفس الدالة المجزأة، أوجد $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ ، وحدد هل توجد $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

أ. ؛ غير موجودة 4

ب. ؛ موجودة 4

ج. ؛ موجودة 2

د. ؛ غير موجودة 2

اليمين $4 = 1 + 3$. بما أن النهاية من اليسار 2 تختلف عن اليمين 4 ، فإن النهاية الثنائية الاتجاه غير موجودة.
النهاية من

اختيار من متعدد قاعدة القوة

57 اشتق $f(x) = x^7$.

أ. x^6

ب. $7x^8$

ج. $6x^7$

د. $7x^6$

قاعدة القوة: $7x^6 = x^{7-1}$.

58 اشتق $f(x) = 4x^5 - 3x^3 + 2x$.

أ. $4x^4 - 3x^2 + 2$

ب. $20x^4 - 3x^2 + 2$

ج. $20x^4 - 9x^2$

د. $20x^4 - 9x^2 + 2$

اشتق كل حد: $20x^4 - 9x^2 + 2$.

59 اشتق $f(x) = \sqrt{x}$.

أ. $\frac{1}{2}\sqrt{x}$

ب. $\frac{1}{\sqrt{x}}$

ج. $2\sqrt{x}$

د. $\frac{1}{2\sqrt{x}}$

$f(x) = x^{1/2} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

60 اشتق $f(x) = \frac{1}{x^3}$.

أ. $-\frac{3}{x^2}$

ب. $-\frac{3}{x^4}$

ج. $\frac{3}{x^4}$

د. $-\frac{1}{3x^4}$

$f(x) = x^{-3} \Rightarrow f'(x) = -3x^{-4} = -\frac{3}{x^4}$.

61 اشتق $f(x) = 6x^2 - 4x + 9$

أ. $6x - 4$

ب. $12x + 9$

ج. $12x - 4x$

د. $12x - 4$

اشتق كل حد: $12x - 4$.

اختيار من متعدد قاعدة الضرب

62 اشتق $f(x) = x^3(2x + 5)$ باستخدام قاعدة الضرب.

أ. $8x^3 + 15x^2$

ب. $6x^2 + 5$

ج. $8x^3 + 5x^2$

د. $2x^3 + 15x^2$

$$f'(x) = 3x^2(2x + 5) + x^3(2) = 6x^3 + 15x^2 + 2x^3 = 8x^3 + 15x^2.$$

63 اشتق $f(x) = (x + 3)(x - 7)$ باستخدام قاعدة الضرب.

أ. $x - 4$

ب. $2x - 4$

ج. $2x - 10$

د. $2x + 4$

$$f'(x) = (x - 7) + (x + 3) = 2x - 4.$$

64 اشتق $f(x) = (3x - 2)(x^2 + 4)$ باستخدام قاعدة الضرب.

أ. $6x^2 - 4x + 12$

ب. $3x^2 - 4x + 12$

ج. $9x^2 + 12$

د. $9x^2 - 4x + 12$

$$f'(x) = 3(x^2 + 4) + (3x - 2)(2x) = 3x^2 + 12 + 6x^2 - 4x = 9x^2 - 4x + 12.$$

65 اشتق $f(x) = (x^2 + 1)(x^2 - 1)$ باستخدام قاعدة الضرب.

أ. $4x^3$

ب. $4x$

ج. $2x^3$

د. $4x^3 - 2x$

$$f'(x) = 2x(x^2 - 1) + (x^2 + 1)(2x) = 2x^3 - 2x + 2x^3 + 2x = 4x^3.$$

66 اشتق $f(x) = x^2(x^3 - 4)$ باستخدام قاعدة الضرب.

أ. $5x^4 - 4$

ب. $3x^4 - 8x$

ج. $5x^4 - 8x$

د. $5x^4 - 8$

$$f'(x) = 2x(x^3 - 4) + x^2(3x^2) = 2x^4 - 8x + 3x^4 = 5x^4 - 8x.$$

اختيار من متعدد قاعدة السلسلة

67 اشتق $f(x) = (2x + 3)^5$

أ. $5(2x + 3)^4$

ب. $2(2x + 3)^4$

ج. $10(2x + 3)^5$

د. $10(2x + 3)^4$

$$f'(x) = 5(2x + 3)^4 \cdot 2 = 10(2x + 3)^4.$$

68 اشتق $f(x) = (x^2 - 3)^4$

أ. $8x(x^2 - 3)^3$

ب. $4(x^2 - 3)^3$

ج. $4x(x^2 - 3)^3$

د. $8x(x^2 - 3)^4$

$$f'(x) = 4(x^2 - 3)^3 \cdot 2x = 8x(x^2 - 3)^3.$$

69 اشتق $f(x) = \sqrt{5x + 1}$

أ. $\frac{1}{2\sqrt{5x + 1}}$

ب. $\frac{5}{2\sqrt{5x + 1}}$

ج. $5\sqrt{5x + 1}$

د. $\frac{5}{\sqrt{5x + 1}}$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{5x + 1}} \cdot 5 = \frac{5}{2\sqrt{5x + 1}}.$$

70 اشتق $f(x) = (4 - 3x)^5$

أ. $-15(4 - 3x)^4$

ب. $-5(4 - 3x)^4$

ج. $-3(4 - 3x)^4$

د. $15(4 - 3x)^4$

$$f'(x) = 5(4 - 3x)^4 \cdot (-3) = -15(4 - 3x)^4.$$

71 اشتق $f(x) = (x^3 + 2)^2$

أ. $6x^2(x^3 + 2)$

ب. $6x^2(x^3 + 2)^2$

ج. $3x^2(x^3 + 2)$

د. $2(x^3 + 2)$

$$f'(x) = 2(x^3 + 2) \cdot 3x^2 = 6x^2(x^3 + 2).$$

اختيار من متعدد مشتقات الدوال المثلثية والأسية

72 اشتق $f(x) = \cos x - \sin x$

أ. $\sin x + \cos x$

ب. $-\sin x - \cos x$

ج. $\sin x - \cos x$

د. $-\sin x + \cos x$

$$\frac{d}{dx}[\cos x] = -\sin x, \frac{d}{dx}[-\sin x] = -\cos x.$$

73 اشتق $f(x) = 5\cos x$.

أ. $5\sin x$

ب. $-5\cos x$

ج. $5\cos x$

د. $-5\sin x$

$$\frac{d}{dx}[5\cos x] = -5\sin x.$$

74 اشتق $f(x) = e^x - x^3$.

أ. $e^x - 3x$

ب. $e^x - x^2$

ج. $xe^{x-1} - 3x^2$

د. $e^x - 3x^2$

$$\frac{d}{dx}[e^x] = e^x, \frac{d}{dx}[-x^3] = -3x^2.$$

75 اشتق $f(x) = 2e^x + \sin x$.

أ. $2e^x + \cos x$

ب. $2e^x + \sin x$

ج. $e^x + \cos x$

د. $2e^x - \cos x$

$$\frac{d}{dx}[2e^x] = 2e^x, \frac{d}{dx}[\sin x] = \cos x.$$

اختيار من متعدد خطوط المماس

76 أوجد ميل خط المماس لـ $f(x) = x^2$ عند $x = 4$.

أ. 4

ب. 2

ج. 16

د. 8

$$f'(x) = 2x; f'(4) = 8.$$

77 أوجد معادلة خط المماس لـ $f(x) = x^2$ عند $x = 3$.

أ. $y = 9x - 6$

ب. $y = 6x + 9$

ج. $y = 3x - 9$

د. $y = 6x - 9$

$$f(3) = 9, f'(3) = 6: y - 9 = 6(x - 3) \Rightarrow y = 6x - 9.$$

78 يوضح الرسم البياني $f(x) = x^2 - 2x$ ، مع تحديد النقطة عند $x = 3$. أوجد معادلة خط المماس هناك.

أ. $y = 3x - 9$

ب. $y = 4x - 3$

ج. $y = 4x + 9$

د. $y = 4x - 9$

$$f(3) = 3, f'(3) = 4: y - 3 = 4(x - 3) \Rightarrow y = 4x - 9.$$

79 أوجد قيم x التي يكون عندها المماس لـ $f(x) = x^3 - 12x$ أفقياً.

أ. $x = 0$

ب. فقط $x = 2$

ج. $x = -4$ و $x = 4$

د. $x = -2$ و $x = 2$

$$f'(x) = 3x^2 - 12 = 0 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2.$$

80 يوضح الرسم البياني $f(x) = x^2$ وخط مماسه عند $x = 2$. أوجد ميل خط المماس بقراءة الرسم البياني.

أ. 4

ب. 2

ج. 1

د. 8

يرتفع خط المماس 4 لكل 1 أفقياً.

اختيار من متعدد التزايد والتناقص والمشتقة الثانية

81 لـ $f(x) = x^2 - 6x + 3$ ، أوجد $f'(x)$ وحدد الفترة التي تكون فيها f متزايدة.

أ. $x < 3$ ؛ متزايدة لـ $f'(x) = 2x - 6$

ب. $x > 3$ ؛ متزايدة لـ $f'(x) = 2x - 6$

ج. $x > 3$ ؛ متزايدة لـ $f'(x) = 2x$

د. $x > 6$ ؛ متزايدة لـ $f'(x) = 2x - 6$

$$f'(x) = 2x - 6 > 0 \Rightarrow x > 3.$$

82 لـ $f(x) = -x^2 + 8x$ ، حدد الفترة التي تكون فيها f متناقصة.

أ. $x < 4$

ب. $x > 8$

ج. $x > 4$

د. $x < 8$

$$f'(x) = -2x + 8 < 0 \Rightarrow x > 4.$$

83 أوجد المشتقة الثانية لـ $f(x) = x^5 - 3x^3$.

أ. $20x^2 - 18x$

ب. $20x^3 - 18x$

ج. $20x^3 - 9x$

د. $5x^4 - 9x^2$

$$f'(x) = 5x^4 - 9x^2; f''(x) = 20x^3 - 18x.$$

84 أوجد المشتقة الثانية لـ $f(x) = x^4 + 2x^2$.

أ. $12x^2$

ب. $4x^3 + 4x$

ج. $12x^2 + 4$

د. $12x^2 + 4x$

$$f'(x) = 4x^3 + 4x; f''(x) = 12x^2 + 4.$$

اختيار من متعدد مسائل لفظية: معدلات التغير

85 ارتفاع كرة قُذفت للأعلى معطى بـ $h(t) = -5t^2 + 30t + 3$ بالمتر. أوجد سرعة الكرة عند $t = 2$ ثانية.

أ. 10

ب. -10

ج. 30

د. 20

$$h'(t) = -10t + 30; h'(2) = 10.$$

86 تكلفة إنتاج شركة لـ x قطعة هي $C(x) = 0.02x^2 + 8x + 150$ بالدولار. أوجد التكلفة الحدية عند $x = 100$.

أ. 8 دولارات

ب. 4 دولارات

ج. 20 دولاراً

د. 12 دولاراً

$$C'(x) = 0.04x + 8; C'(100) = 12.$$

87 كرة قُذفت للأعلى معطى بـ $h(t) = -5t^2 + 30t + 3$ بالمتر. أوجد الزمن الذي تصل عنده الكرة إلى أقصى ارتفاع.

أ. $t = 3$

ب. $t = 5$

ج. $t = 6$

د. $t = 2$

$$h'(t) = -10t + 30 = 0 \Rightarrow t = 3.$$

اختيار من متعدد سهل

88 أوجد $\lim_{x \rightarrow -5} (-3x^2 - 5x + 4)$.

أ. -49

ب. -43

ج. 46

د. -46

$$-3(-5)^2 + 25 + 4 = -46.$$

89 أوجد $\lim_{x \rightarrow -4} (x^2 - x - 2)$.

أ. 18

ب. 21

ج. -18

د. 15

$$(-4)^2 + 4 - 2 = 18.$$

90 أوجد $\lim_{x \rightarrow 0} (-2x^2 + x - 2)$.

أ. 1

ب. -2

ج. 2

د. -5

$$-2(0)^2 - 2 = -2.$$

91 أوجد $\lim_{x \rightarrow 4} (3x^2 - 7x - 5)$.

أ. 15

ب. 18

ج. 12

د. -15

$$3(4)^2 - 28 - 5 = 15.$$

92 أوجد $\lim_{x \rightarrow -1} (2x^2 + 8x - 9)$.

أ. -18

ب. 15

ج. -12

د. -15

$$2(-1)^2 - 8 - 9 = -15.$$

93 أوجد مشتقة $f(x) = x^5$.

أ. x^5

ب. $5x^4$

ج. $6x^4$

د. $5x^5$

$$f'(x) = 5x^4.$$

94 أوجد مشتقة $f(x) = -2x^3$.

أ. $-5x^2$

ب. $-2x^3$

ج. $-6x^3$

د. $-6x^2$

$f'(x) = -6x^2$.

95 أوجد مشتقة $f(x) = -x^3$.

أ. $-3x^2$

ب. $-x^3$

ج. $-3x^3$

د. $-2x^2$

$f'(x) = -3x^2$.

96 أوجد مشتقة $f(x) = 4x^3$.

أ. $13x^2$

ب. $12x^3$

ج. $4x^3$

د. $12x^2$

$f'(x) = 12x^2$.

97 أوجد مشتقة $f(x) = x^4 - 2x$.

أ. $5x^3 - 2$

ب. $4x^3 - 2$

ج. $4x^4 - 2$

د. $x^4 - 2$

$f'(x) = 4x^3 - 2$.

98 أوجد مشتقة $f(x) = 4\sin x$.

أ. $4\sin x$

ب. $-4\cos x$

ج. $4\cos x$

د. $5\cos x$

$f'(x) = 4\cos x$.

99 أوجد مشتقة $f(x) = \sin x + 3x^3$.

أ. $\cos x + 10x^2$

ب. $\cos x + 9x^2$

ج. $\cos x + 3x^3$

د. $\sin x + 9$

$f'(x) = \cos x + 9x^2$.

100 أوجد مشتقة $f(x) = \sin x + 2x^2$.

أ. $\cos x + 4x$

ب. $\cos x + 2x^2$

ج. $\cos x + 5x$

د. $\sin x + 4$

$f'(x) = \cos x + 4x$.

101 أوجد مشتقة $f(x) = \sin x$.

أ. $\cos x$

ب. $-\cos x$

ج. $\sin x$

د. $-\sin x$

$f'(x) = \cos x$.

102 أوجد مشتقة $f(x) = 3\cos x$.

أ. $-3\sin x$

ب. $3\cos x$

ج. $3\sin x$

د. $4 - \sin x$

$f'(x) = -3\sin x$.

اختيار من متعدد متوسط

103 أوجد $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^2 + 9x + 20}{x + 4}$

أ. 1

ب. 3

ج. 4

د. -1

$$\frac{(x+4)(x+5)}{x+4} = x+5 \rightarrow 1.$$

104 أوجد $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 4x - 5}{x + 1}$

أ. -8

ب. -4

ج. 6

د. -6

$$\frac{(x+1)(x-5)}{x+1} = x-5 \rightarrow -6.$$

105 أوجد $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 + x - 30}{x - 5}$

أ. 11

ب. 13

ج. -11

د. 9

$$\frac{(x-5)(x+6)}{x-5} = x+6 \rightarrow 11.$$

106 أوجد $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 2x - 3}{x + 1}$

أ. 4

ب. -4

ج. -6

د. -2

$$\frac{(x+1)(x-3)}{x+1} = x-3 \rightarrow -4.$$

107 أوجد $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 8x + 15}{x - 5}$

أ. -2

ب. 2

ج. 6

د. 4

$$\frac{(x-5)(x-3)}{x-5} = x-3 \rightarrow 2.$$

108 أوجد مشتقة $f(x) = (-2x + 1)(x + 2)$ باستخدام قاعدة الضرب.

أ. $4x - 3$

ب. $-4x - 3$

ج. $-4x - 1$

د. $-4x + 3$

$$f'(x) = (-2)(x+2) + (-2x+1)(1) = -2x-4-2x+1 = -4x-3.$$

109 أوجد مشتقة $f(x) = (3x - 6)(3x - 2)$ باستخدام قاعدة الضرب.

أ. $18x + 24$

ب. $18x - 24$

ج. $-18x - 24$

د. $18x - 22$

$$f'(x) = (3)(3x - 2) + (3x - 6)(3) = 9x - 6 + 9x - 18 = 18x - 24.$$

110 أوجد مشتقة $f(x) = (-3x - 2)(-x + 5)$ باستخدام قاعدة الضرب.

أ. $6x - 13$

ب. $6x + 13$

ج. $-6x - 13$

د. $6x - 11$

$$f'(x) = (-3)(-x + 5) + (-3x - 2)(-1) = 3x - 15 + 3x + 2 = 6x - 13.$$

111 أوجد مشتقة $f(x) = (3x + 6)(-2x - 6)$ باستخدام قاعدة الضرب.

أ. $-12x - 30$

ب. $-12x + 30$

ج. $-12x - 28$

د. $12x - 30$

$$f'(x) = (3)(-2x - 6) + (3x + 6)(-2) = -6x - 18 - 6x - 12 = -12x - 30.$$

112 أوجد مشتقة $f(x) = (3x - 5)(-2x - 1)$ باستخدام قاعدة الضرب.

أ. $-12x + 9$

ب. $-12x - 7$

ج. $12x + 7$

د. $-12x + 7$

$$f'(x) = (3)(-2x - 1) + (3x - 5)(-2) = -6x - 3 - 6x + 10 = -12x + 7.$$

113 أوجد مشتقة $f(x) = (-3x + 4)^6$.

أ. $-18(-3x + 4)^5$

ب. $6(-3x + 4)^5$

ج. $-21(-3x + 4)^5$

د. $-18(-3x + 4)^6$

$$f'(x) = 6(-3x + 4)^5(-3) = -18(-3x + 4)^5.$$

114 أوجد مشتقة $f(x) = (-3x)^4$.

أ. $4(-3x)^3$

ب. $-12(-3x)^3$

ج. $-12(-3x)^4$

د. $-15(-3x)^3$

$$f'(x) = 4(-3x)^3(-3) = -12(-3x)^3.$$

115 أوجد مشتقة $f(x) = (-3x - 4)^5$.

أ. $-18(-3x - 4)^4$

ب. $-15(-3x - 4)^5$

ج. $-15(-3x - 4)^4$

د. $5(-3x - 4)^4$

$$f'(x) = 5(-3x - 4)^4(-3) = -15(-3x - 4)^4.$$

116 أوجد مشتقة $f(x) = (3x)^3$.

أ. $12(3x)^2$

ب. $9(3x)^3$

ج. $9(3x)^2$

د. $3(3x)^2$

$$f'(x) = 3(3x)^2(3) = 9(3x)^2.$$

117 أوجد مشتقة $f(x) = (3x + 1)^5$.

أ. $18(3x + 1)^4$

ب. $15(3x + 1)^5$

ج. $15(3x + 1)^4$

د. $5(3x + 1)^4$

$$f'(x) = 5(3x + 1)^4(3) = 15(3x + 1)^4.$$

اختيار من متعدد صعب

118 أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x + 1}{x^2 + 9}$.

أ. 9

ب. 4

ج. 0

د. 1

درجة المقام أعلى، إذن النهاية تساوي 0.

119 أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 5x}{x^2 - 5}$.

أ. 0

ب. 4

ج. 3

د. $\frac{1}{3}$

الدرجتان متساويتان، إذن النهاية هي نسبة المعاملين الرئيسيين: 3.

120 أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 + 8x}{3x^2 - 8}$.

أ. 0

ب. $\frac{7}{3}$

ج. $\frac{3}{4}$

د. $\frac{4}{3}$

الدرجتان متساويتان، إذن النهاية هي نسبة المعاملين الرئيسيين: $\frac{4}{3}$.

121 أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x - 7}{x^2}$.

أ. 1

ب. 0

ج. 8

د. 5

درجة المقام أعلى، إذن النهاية تساوي 0.

122 أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 - 8x}{2x^2 - 8}$.

أ. 2

ب. $\frac{1}{2}$

ج. 3

د. 0

الدرجتان متساويتان، إذن النهاية هي نسبة المعاملين الرئيسيين: 2.

123 أوجد معادلة خط المماس لـ $f(x) = -3x^2 - 4x - 4$ عند $x = 1$.

أ. $y = 10x - 1$

ب. $y = -10x + 2$

ج. $y = -10x + 1$

د. $y = -10x - 1$

$f(1) = -11, f'(1) = -10. y - (-11) = -10(x - 1) \Rightarrow y = -10x - 1.$

124 أوجد معادلة خط المماس لـ $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$ عند $x = -3$.

أ. $y = 9x - 19$

ب. $y = -9x + 19$

ج. $y = -9x - 16$

د. $y = -9x - 19$

$$f(-3) = 8, f'(-3) = -9. y - 8 = -9(x - (-3)) \Rightarrow y = -9x - 19.$$

125 أوجد معادلة خط المماس لـ $f(x) = -3x^2 + 5x + 1$ عند $x = 1$.

أ. $y = -x - 4$

ب. $y = -x + 7$

ج. $y = x + 4$

د. $y = -x + 4$

$$f(1) = 3, f'(1) = -1. y - 3 = -1(x - 1) \Rightarrow y = -x + 4.$$

126 أوجد معادلة خط المماس لـ $f(x) = -x^2 - 3x + 2$ عند $x = 2$.

أ. $y = 7x + 6$

ب. $y = -7x - 6$

ج. $y = -7x + 9$

د. $y = -7x + 6$

$$f(2) = -8, f'(2) = -7. y - (-8) = -7(x - 2) \Rightarrow y = -7x + 6.$$

127 أوجد معادلة خط المماس لـ $f(x) = -2x^2 - 4x - 1$ عند $x = -2$.

أ. $y = -4x + 7$

ب. $y = 4x - 7$

ج. $y = 4x + 7$

د. $y = 4x + 10$

$f(-2) = -1, f'(-2) = 4. y - (-1) = 4(x - (-2)) \Rightarrow y = 4x + 7.$

128 بالنسبة لـ $f(x) = 2x^2 + 8x - 4$ ، أوجد الفترة التي تكون فيها f متناقصة.

أ. $x < -2$

ب. $x > -2$

ج. $x < 0$

د. $x > 0$

$f'(x) = 4x + 8$. عندما $f'(x) < 0$ ، أي $x < -2$.

129 بالنسبة لـ $f(x) = -x^2 - 3$ ، أوجد الفترة التي تكون فيها f متزايدة.

أ. $x < 0$

ب. $x > 2$

ج. $x < 2$

د. $x > 0$

$f'(x) = -2x$. عندما $f'(x) > 0$ ، أي $x < 0$.

130 بالنسبة لـ $f(x) = x^2 + 4x + 9$ ، أوجد الفترة التي تكون فيها f متناقصة.

أ. $x > 0$

ب. $x < -2$

ج. $x > -2$

د. $x < 0$

$f'(x) = 2x + 4$. عندما $f'(x) < 0$ ، أي $x < -2$.

131 بالنسبة لـ $f(x) = -2x^2 - 4x - 5$ ، أوجد الفترة التي تكون فيها f متزايدة.

أ. $x > -1$

ب. $x < -1$

ج. $x < 1$

د. $x > 1$

$f'(x) = -4x - 4$. عندما $f'(x) > 0$ ، أي $x < -1$.

132 أوجد المشتقة الثانية لـ $f(x) = -2x^4 - 5x^2$.

أ. $-22x^2 - 10$

ب. $24x^2 - 10$

ج. $-24x^2 - 10$

د. $-24x^2 + 10$

$f'(x) = -8x^3 - 10x$, $f''(x) = -24x^2 - 10$.