



الدوال الأسية واللوغاريتمية

مفتاح الإجابات

حساب المقادير الأسية

1 أوجد قيمة 2^5 .

$$2^5 = 32.$$

2 أوجد قيمة 3^{-2} .

$$3^{-2} = \frac{1}{9}.$$

3 أوجد قيمة $16^{1/2}$.

$$16^{1/2} = 4.$$

4 أوجد قيمة $27^{2/3}$.

$$27^{2/3} = (27^{1/3})^2 = 3^2 = 9.$$

حساب اللوغاريتمات

5 أوجد قيمة $\log_2 32$.

$$\text{بما أن } 2^5 = 32, \text{ فإن } \log_2 32 = 5.$$

6 أوجد قيمة $\log_3 81$.

$$\text{بما أن } 3^4 = 81, \text{ فإن } \log_3 81 = 4.$$

7 أوجد قيمة $\log_5 1$.

$$\log_5 1 = 0.$$

8 أوجد قيمة $\log_{10} 0.01$.

$$\text{بما أن } 10^{-2} = 0.01, \text{ فإن } \log_{10} 0.01 = -2.$$

قوانين اللوغاريتمات: الضرب والقسمة

9 اكتب $\log_2 (8x)$ على صورة مجموع لوغاريتمين.

$$\log_2 (8x) = \log_2 8 + \log_2 x = 3 + \log_2 x.$$

10 اكتب $\log_3 \left(\frac{x}{9}\right)$ على صورة فرق لوغاريتمين.

$$\log_3 \left(\frac{x}{9}\right) = \log_3 x - \log_3 9 = \log_3 x - 2.$$

11 اجمع $\log_5 5 + \log_5 25$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

$$\log_5 (5 \times 25) = \log_5 125 = 3 \text{ بما أن } 5^3 = 125.$$

12 اجمع $\log_2 24 - \log_2 3$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

$$\log_2 \left(\frac{24}{3}\right) = \log_2 8 = 3.$$

قوانين اللوغاريتمات: قاعدة القوة

13 اكتب $\log(x^5)$ باستخدام قاعدة القوة.

$$\log(x^5) = 5\log x.$$

14 أوجد قيمة $\log_2 (4^3)$ باستخدام قاعدة القوة.

$$\log_2 (4^3) = 3\log_2 4 = 3(2) = 6.$$

15 اكتب $2\log_3 x + \log_3 y$ على صورة لوغاريتم واحد.

$$2\log_3 x + \log_3 y = \log_3 (x^2 y).$$

توسيع وتكثيف المقادير اللوغاريتمية

16 وسّع $\log \left(\frac{x^3 y}{z^2}\right)$ بالكامل.

$$3\log x + \log y - 2\log z.$$

17 كَتِّف $3\ln x - 2\ln y$ في لوغاريتم واحد.

$$\ln \left(\frac{x^3}{y^2}\right).$$

18 وسّع $\log_2 (\sqrt{x} \cdot y^3)$ بالكامل.

$$\sqrt{x} = x^{1/2}, \text{ إذن } \frac{1}{2}\log_2 x + 3\log_2 y.$$

حل المعادلات الأسية بأساسين متساويين

19 حل المعادلة $2^x = 32$.

$32 = 2^5$ ، إذن $x = 5$.

20 حل المعادلة $3^{x+1} = 81$.

$81 = 3^4$ ، إذن $x + 1 = 4 \Rightarrow x = 3$.

21 حل المعادلة $5^{2x} = 125$.

$125 = 5^3$ ، إذن $2x = 3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$.

حل المعادلات الأسية باستخدام اللوغاريتمات

22 حل المعادلة $2^x = 10$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

$x = \frac{\log 10}{\log 2} \approx \frac{1}{0.301} \approx 3.322$.

23 حل المعادلة $5^x = 40$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

$x = \frac{\log 40}{\log 5} \approx \frac{1.602}{0.699} \approx 2.292$.

24 حل المعادلة $3^{2x} = 50$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

$2x = \frac{\log 50}{\log 3} \approx \frac{1.699}{0.477} \approx 3.561$ ، إذن $x \approx 1.781$.

25 حل المعادلة $e^x = 15$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

$x = \ln 15 \approx 2.708$.

حل المعادلات اللوغاريتمية

26 حل المعادلة $\log_2(x) = 5$.

$x = 2^5 = 32$.

27 حل المعادلة $\log_3(x - 1) = 2$.

$x - 1 = 3^2 = 9 \Rightarrow x = 10$.

28 حل المعادلة $\log(x) + \log(x - 3) = 1$.

إذن $x = -2$ نرفض $\log[x(x - 3)] = 1 \Rightarrow x(x - 3) = 10 \Rightarrow x^2 - 3x - 10 = 0 \Rightarrow (x - 5)(x + 2) = 0$.
 $x = 5$ اللوغاريتم غير معرف؛

29 حل المعادلة $\log_2 (x + 3) + \log_2 (x - 1) = 5$

$\log_2 [(x + 3)(x - 1)] = 5 \Rightarrow (x + 3)(x - 1) = 32 \Rightarrow x^2 + 2x - 35 = 0 \Rightarrow (x + 7)(x - 5) = 0$. نرفض $x = -7$
 $x = 5$. ؛ إذن $x - 1 < 0$ يجعل

اللوغاريتم الطبيعي والعدد

30 أوجد قيمة $\ln(e^3)$.

$\ln(e^3) = 3$.

31 أوجد قيمة $\ln(1)$.

$\ln(1) = 0$.

32 حل المعادلة $\ln(x) = 2$ لإيجاد x بدلالة e .

$x = e^2$.

نماذج النمو والتحلل الأسّي

33 يُمثّل عدد سكان بلدة بالدالة $P(t) = 5000e^{0.03t}$ ، حيث t بالسنوات. أوجد $P(10)$ لأقرب عدد صحيح.

$P(10) = 5000e^{0.3} = 5000(1.34986) \approx 6749$.

34 تتحلل مادة مشعة وفق $A(t) = 200e^{-0.05t}$ بالجرام. أوجد $A(20)$ لأقرب منزلة عشرية واحدة.

$A(20) = 200e^{-1} = 200(0.36788) \approx 73.6$ جراماً.

35 حدد ما إذا كانت $N(t) = 50e^{0.02t}$ تمثل نمواً أو تحللاً، وبرر إجابتك.

نمو معامل الأس 0.02 موجب، إذن N تتزايد مع تزايد t .

مسائل لفظية: النماذج الأسية في سياقات تطبيقية

36 هذا السؤال يتكون من جزأين. استثمار قيمته 2000 دولار ينمو وفق $A(t) = 2000e^{0.04t}$ ، حيث t بالسنوات.

أ أوجد قيمة الاستثمار بعد 5 سنوات لأقرب دولار. دولاراً $A(5) = 2000e^{0.2} = 2000(1.2214) \approx 2443$

لأقرب منزلة عشرية واحدة باستخدام $\ln 2 \approx 0.693$. سنة $2 = e^{0.04t} \Rightarrow 0.04t = \ln 2 \approx 0.693 \Rightarrow t \approx 17.3$

ب أوجد عدد السنوات اللازمة لمضاعفة الاستثمار

37 وفق $T(t) = 20 + 60e^{-0.1t}$ بالدرجة المئوية، حيث t عدد الدقائق بعد التحضير و 20 هي درجة حرارة الغرفة. هذا السؤال يتكون من جزأين. يبرد كوب قهوة

منزلة عشرية واحدة باستخدام $e^{-1.5} \approx 0.2231$. $T(15) = 20 + 60e^{-1.5} = 20 + 60(0.2231) \approx 33.4$. أ أوجد درجة الحرارة بعد 15 دقيقة لأقرب

35 = 20 + 60e^{-0.1t} ⇒ e^{-0.1t} = 0.25 ⇒ -0.1t = -ln 4 ≈ -1.386 ⇒ t ≈ 13.9 دقيقة. ln 4 ≈ 1.386 ب أوجد عدد الدقائق اللازمة لتخفض درجة الحرارة إلى 35 لأقرب منزلة عشرية واحدة باستخدام

اختيار من متعدد تقييم المقادير الأسية

38 أوجد 3^4 .

أ. 81

ب. 243

ج. 12

د. 64

$3^4 = 81$.

39 أوجد 4^{-2} .

أ. $-\frac{1}{16}$

ب. $\frac{1}{16}$

ج. $\frac{1}{8}$

د. 16

$4^{-2} = \frac{1}{4^2} = \frac{1}{16}$.

40 أوجد $25^{1/2}$.

أ. 5

ب. 50

ج. 12.5

د. 625

$$25^{1/2} = \sqrt{25} = 5.$$

41 أوجد $8^{2/3}$.

أ. 5.33

ب. 4

ج. 2

د. 16

$$8^{2/3} = (8^{1/3})^2 = 2^2 = 4.$$

42 أوجد 2^{-3} .

أ. -8

ب. $\frac{1}{6}$

ج. 8

د. $\frac{1}{8}$

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}.$$

43 أوجد $32^{3/5}$.

أ. 2

ب. 16

ج. 8

د. 32

$$32^{3/5} = (32^{1/5})^3 = 2^3 = 8.$$

اختيار من متعدد تقييم اللوغاريتمات

44 أوجد $\log_3 27$.

أ. 3

ب. 1

ج. 27

د. 9

$$3^3 = 27.$$

45 أوجد $\log_2 64$.

أ. 32

ب. 8

ج. 5

د. 6

$$2^6 = 64.$$

46 أوجد $\log_7 1$.

أ. 1

ب. غير معرّف

ج. 7

د. 0

$$7^0 = 1.$$

47 أوجد $\log_{10} 0.001$.

أ. 0.001

ب. -3

ج. -2

د. 3

$$10^{-3} = 0.001.$$

48 أوجد $\log_4 16$.

أ. 4

ب. 8

ج. 2

د. 16

$$4^2 = 16.$$

49 أوجد $\log_5 125$.

أ. 5

ب. 3

ج. 1

د. 25

$5^3 = 125$.

اختيار من متعدد قوانين اللوغاريتمات: الضرب والقسمة

50 اكتب $\log_3 (9x)$ كمجموع لوغاريتمات.

أ. $2 + \log_3 x$

ب. $2\log_3 x$

ج. $9 + \log_3 x$

د. فقط $\log_3 9 + \log_3 x$

$\log_3 (9x) = \log_3 9 + \log_3 x = 2 + \log_3 x$.

51 اكتب $\log_5 \left(\frac{x}{25} \right)$ كفرق لوغاريتمات.

أ. $\log_5 x - 25$

ب. $2 - \log_5 x$

ج. $\log_5 x - 2$

د. $\frac{\log_5 x}{2}$

$\log_5 \left(\frac{x}{25} \right) = \log_5 x - \log_5 25 = \log_5 x - 2$.

52 اجمع $\log_2 4 + \log_2 8$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

أ. 32

ب. 5

ج. 12

د. 2

$$\log_2 (4 \times 8) = \log_2 32 = 5.$$

53 اجمع $\log_3 54 - \log_3 2$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

أ. 27

ب. 3

ج. 26

د. 52

$$\log_3 (54 \div 2) = \log_3 27 = 3.$$

اختيار من متعدد قوانين اللوغاريتمات: قاعدة القوة

54 اكتب $\log(x^7)$ باستخدام قاعدة القوة.

أ. $7\log x$

ب. $x^7\log x$

ج. دون تغيير $\log x^7$

د. $\log(7x)$

$$\text{قاعدة القوة: } \log(x^n) = n\log x.$$

55 أوجد $\log_3 (9^2)$ باستخدام قاعدة القوة.

أ. 18

ب. 81

ج. 2

د. 4

$$2\log_3 9 = 2(2) = 4.$$

56 اكتب $3\log_2 x + \log_2 y$ كلوغاريتم واحد.

أ. $3\log_2 (xy)$

ب. $\log_2 (x^3 + y)$

ج. $\log_2 (x^3 y)$

د. $\log_2 (3xy)$

$$3\log_2 x = \log_2 (x^3) \text{ بالدمج مع } \log_2 y: \log_2 (x^3 y).$$

57 اكتب $4\log x - \log y$ كلوغاريتم واحد.

أ. $\log \left(\frac{x^4}{y} \right)$

ب. $\log(4x - y)$

ج. $4\log \left(\frac{x}{y} \right)$

د. $\log \left(\frac{4x}{y} \right)$

$$4\log x = \log(x^4) \text{ بالدمج } \therefore \log \left(\frac{x^4}{y} \right).$$

اختيار من متعدد فك وتكثيف المقادير اللوغاريتمية

58 افك $\log\left(\frac{x^2y}{z^3}\right)$ بالكامل.

أ. $2\log x + \log y - 3\log z$

ب. $2\log x - \log y - 3\log z$

ج. دون تغيير $\log x^2 + \log y - \log z^3$

د. $2\log x + \log y + 3\log z$

بتطبيق قاعدتي القسمة والقوة: $2\log x + \log y - 3\log z$.

59 كتّف $2\ln x - 3\ln y$ في لوغاريتم واحد.

أ. $\ln\left(\frac{x^2}{y^3}\right)$

ب. $\ln\left(\frac{x^2}{y}\right) - 3$

ج. $\ln\left(\frac{x^3}{y^2}\right)$

د. $\ln(x^2 - y^3)$

$2\ln x = \ln(x^2)$, $3\ln y = \ln(y^3)$: $\ln\left(\frac{x^2}{y^3}\right)$.

60 افك $\log_2(\sqrt{x} \cdot y^4)$ بالكامل.

أ. $\frac{1}{2}\log_2 x + 4\log_2 y$

ب. دون تغيير $\frac{1}{2}\log_2 x + \log_2 y^4$

ج. $2\log_2 x + 4\log_2 y$

د. $\frac{1}{4}\log_2 x + 2\log_2 y$

$\sqrt{x} = x^{1/2}$: $\frac{1}{2}\log_2 x + 4\log_2 y$.

61 كُتِّفَ $\frac{1}{2}\log x + 2\log y$ في لوغاريتم واحد.

أ. $\log(x \cdot y^2)$

ب. $\log\left(\frac{\sqrt{x}}{y^2}\right)$

ج. $\log(\sqrt{x} \cdot y^2)$

د. $\log(2\sqrt{x} \cdot y)$

$\frac{1}{2}\log x = \log \sqrt{x}$ بالدمج $\therefore \log(\sqrt{x} \cdot y^2)$.

اختيار من متعدد حل المعادلات الأسية بمطابقة الأساسات

62 حل $2^x = 64$

أ. $x = 8$

ب. $x = 6$

ج. $x = 32$

د. $x = 5$

$2^6 = 64$.

63 حل $3^{x+2} = 27$

أ. $x = 9$

ب. $x = 1$

ج. $x = 5$

د. $x = 3$

$3^{x+2} = 3^3 \Rightarrow x + 2 = 3 \Rightarrow x = 1$.

64 حل $5^{3x} = 125$

أ. $x = \frac{1}{3}$

ب. $x = 41.67$

ج. $x = 3$

د. $x = 1$

$$5^{3x} = 5^3 \Rightarrow 3x = 3 \Rightarrow x = 1.$$

65 حل $4^x = \frac{1}{16}$

أ. $x = 4$

ب. $x = -4$

ج. $x = -2$

د. $x = 2$

$$4^x = 4^{-2} \Rightarrow x = -2.$$

66 حل $2^{2x-1} = 32$

أ. $x = 3$

ب. $x = 2.5$

ج. $x = 6$

د. $x = 5.5$

$$2^{2x-1} = 2^5 \Rightarrow 2x - 1 = 5 \Rightarrow x = 3.$$

اختيار من متعدد حل المعادلات الأسية باستخدام اللوغاريتمات

67 حل $2^x = 12$ لـ x ، مقرباً لثلاث منازل عشرية.

أ. 3.585

ب. 3.170

ج. 4.000

د. 2.485

$$x = \frac{\ln 12}{\ln 2} \approx 3.585.$$

68 حل $7^x = 50$ لـ x ، مقرباً لثلاث منازل عشرية.

أ. 7.143

ب. 2.010

ج. 3.000

د. 1.505

$$x = \frac{\ln 50}{\ln 7} \approx 2.010.$$

69 حل $4^{2x} = 90$ لـ x ، مقرباً لثلاث منازل عشرية.

أ. 6.492

ب. 3.246

ج. 1.623

د. 0.811

$$2x = \frac{\ln 90}{\ln 4} \approx 3.246 \Rightarrow x \approx 1.623.$$

70 حل $e^x = 25$ لـ x ، مقرباً لثلاث منازل عشرية.

أ. 25.000

ب. 2.303

ج. 3.219

د. 12.500

$$x = \ln 25 \approx 3.219.$$

اختيار من متعدد حل المعادلات اللوغاريتمية

71 حل $\log_3(x) = 4$.

أ. $x = 7$

ب. $x = 12$

ج. $x = 64$

د. $x = 81$

$$3^4 = 81.$$

72 حل $\log_2(x - 1) = 3$.

أ. $x = 6$

ب. $x = 9$

ج. $x = 7$

د. $x = 8$

$$x - 1 = 2^3 = 8 \Rightarrow x = 9.$$

73 حل $\log(x) + \log(x - 3) = 1$

أ. $x = -2$

ب. $x = 5$

ج. $x = 10$

د. $x = 13$

يُبقى اللوغاريتمين معرفين $x = 5$ ؛ فقط $\log(x(x - 3)) = 1 \Rightarrow x^2 - 3x - 10 = 0 \Rightarrow (x - 5)(x + 2) = 0$

74 حل $\log_2(x + 2) + \log_2(x - 2) = 5$

أ. $x = 6$

ب. $x = -6$

ج. $x = 34$

د. $x = 18$

يُبقى اللوغاريتمين معرفين $x = 6$ ؛ فقط $(x + 2)(x - 2) = 2^5 = 32 \Rightarrow x^2 - 4 = 32 \Rightarrow x^2 = 36$

اختيار من متعدد اللوغاريتمات الطبيعية والعدد

75 أوجد $\ln(e^5)$

أ. 0

ب. e^5

ج. 1

د. 5

$\ln(e^x) = x$.

76 أوجد $\ln\left(\frac{1}{e}\right)$.

أ. 1

ب. e

ج. -1

د. 0

$$\ln(e^{-1}) = -1.$$

77 حل $\ln(x) = 3$ لـ x بدلالة e .

أ. $x = e^{1/3}$

ب. $x = 3$

ج. $x = e^3$

د. $x = 3e$

$$\ln(x) = 3 \Rightarrow x = e^3.$$

78 أوجد $e^{\ln 7}$.

أ. 7

ب. $\ln 7$

ج. 1

د. e^7

$$e^{\ln x} = x.$$

اختيار من متعدد نماذج النمو والتناقص الأسّي

79 يُمثّل عدد سكان بلدة بالدالة $P(t) = 8,000e^{0.025t}$ ، حيث t بالسنوات. أوجد $P(15)$ ، مقرباً لأقرب عدد صحيح.

أ. 8,300

ب. 11,000

ج. 11,640

د. 12,000

$$P(15) = 8,000e^{0.375} \approx 11,640.$$

80 تتحلل مادة مشعة وفق $A(t) = 150e^{-0.04t}$ بالغرام. أوجد $A(25)$ ، مقرباً لمنزلة عشرية واحدة.

أ. 60.7

ب. 50.0

ج. 75.0

د. 55.2

$$A(25) = 150e^{-1} \approx 55.2 \text{ غ.}$$

81 حدد ما إذا كانت $N(t) = 80e^{-0.015t}$ تمثّل نمواً أم تناقصاً.

أ. تناقص

ب. نمو

ج. لا هذا ولا ذاك

د. لا يمكن تحديد ذلك

معامل الأس سالب: تناقص.

82 حدد ما إذا كانت $M(t) = 30e^{0.01t}$ تمثل نمواً أم تناقصاً.

أ. تناقص

ب. نمو

ج. لا يمكن تحديد ذلك

د. لا هذا ولا ذاك

معامل الأس موجب: نمو.

83 يوضح الرسم البياني دالة أسية. بناءً على الرسم البياني، هل يمثل نمواً أم تناقصاً؟

أ. لا يمكن تحديد ذلك

ب. لا هذا ولا ذاك

ج. تناقص

د. نمو

يرتفع المنحنى مع زيادة x : نمو.

اختيار من متعدد مسائل لفظية: النماذج الأسية في سياقها

84 دولار وفق $A(t) = 3,000e^{0.05t}$ دولاراً، حيث t بالسنوات. أوجد قيمة الاستثمار بعد 8 سنوات، مقرباً لأقرب دولار. ينمو استثمار قدره 3,000

أ. 4,200

ب. 4,800

ج. 4,475

د. 3,400

دولاراً $A(8) = 3,000e^{0.4} \approx 4,475$

85 وفق $T(t) = 22 + 70e^{-0.08t}$ م، حيث t بالدقائق. أوجد درجة الحرارة بعد 15 دقيقة، مقرباً لمنزلة عشرية واحدة. يبرد كوب قهوة

أ. م50.0

ب. م43.1

ج. م38.5

د. م22.0

$$T(15) = 22 + 70e^{-1.2} \approx 43.1.$$

86 يتضاعف عدد بكتيريا كل 3 ساعات، بدءاً من 500. باستخدام $P(t) = 500 \cdot 2^{t/3}$ ، أوجد العدد بعد 9 ساعات.

أ. 4,000

ب. 2,000

ج. 8,000

د. 1,500

$$P(9) = 500 \times 2^3 = 4,000.$$

87 سيارة وفق $V(t) = 25,000(0.85)^t$ دولاراً، حيث t بالسنوات. أوجد قيمة السيارة بعد 5 سنوات، مقرباً لأقرب دولار. تنخفض قيمة

أ. 11,093

ب. 12,750

ج. 9,500

د. 10,625

$$V(5) = 25,000(0.85)^5 \approx 11,093 \text{ دولاراً.}$$

اختيار من متعدد سهل

88 أوجد قيمة 5^{-3} .

أ. $\frac{1}{125}$

ب. $-\frac{1}{125}$

ج. 125

د. $\frac{1}{127}$

$$5^{-3} = \frac{1}{125}.$$

89 أوجد قيمة $4^{\frac{1}{2}}$.

أ. 4

ب. 5

ج. 2

د. 6

$$4^{\frac{1}{2}} = 2.$$

90 أوجد قيمة 5^{-2} .

أ. 25

ب. $\frac{1}{27}$

ج. $-\frac{1}{25}$

د. $\frac{1}{25}$

$$5^{-2} = \frac{1}{25}.$$

91 أوجد قيمة 5^2 .

أ. 27

ب. 10

ج. 23

د. 25

$$5^2 = 25.$$

92 أوجد قيمة 3^{-2} .

أ. $\frac{1}{11}$

ب. $-\frac{1}{9}$

ج. $\frac{1}{9}$

د. 9

$$3^{-2} = \frac{1}{9}.$$

93 أوجد قيمة $\log_2 4$.

أ. 3

ب. 1

ج. 2

د. 4

بما أن $2^2 = 4$ ، فإن $\log_2 4 = 2$.

94 أوجد قيمة $\log_4 1$.

أ. 0

ب. 4

ج. -1

د. 1

$$\log_4 1 = 0.$$

95 أوجد قيمة $\log_{10} 0.01$.

أ. 2

ب. -2

ج. -3

د. -1

$$\log_{10} 0.01 = -2 \text{، فإن } 10^{-2} = 0.01$$

96 أوجد قيمة $\log_{10} 0.1$.

أ. -2

ب. -1

ج. -3

د. 1

$$\log_{10} 0.1 = -1 \text{، فإن } 10^{-1} = 0.1$$

97 أوجد قيمة $\log_5 625$.

أ. 625

ب. 3

ج. 5

د. 4

بما أن $5^4 = 625$ ، فإن $\log_5 625 = 4$.

98 حل المعادلة $4^x = 256$.

أ. 4

ب. 3

ج. 6

د. 5

$256 = 4^4$ ، $x = 4$.

99 حل المعادلة $3^{x+3} = 81$.

أ. 4

ب. 1

ج. 2

د. 0

$81 = 3^4$ ، $x + 3 = 4 \Rightarrow x = 1$.

100 حل المعادلة $4^{x+3} = 64$.

أ. 1

ب. -1

ج. 0

د. 3

$$64 = 4^3, \quad x + 3 = 3 \Rightarrow x = 0.$$

101 حل المعادلة $5^x = 125$.

أ. 5

ب. 3

ج. 2

د. 4

$$125 = 5^3, \quad x = 3.$$

102 حل المعادلة $4^{x-3} = 16$.

أ. 5

ب. 6

ج. 2

د. 4

$$16 = 4^2, \quad x - 3 = 2 \Rightarrow x = 5.$$

اختيار من متعدد متوسط

103 اجمع $\log_2 2 + \log_2 2$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

أ. 3

ب. 1

ج. 4

د. 2

$$2^2 = 4. \text{ بما أن } \log_2 (2 \times 2) = \log_2 4 = 2$$

104 اجمع $\log_5 125 + \log_5 125$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

أ. 7

ب. 5

ج. 15625

د. 6

$$5^6 = 15625. \text{ بما أن } \log_5 (125 \times 125) = \log_5 15625 = 6$$

105 اجمع $\log_5 125 - \log_5 25$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

أ. 3

ب. 5

ج. 1

د. 2

$$\log_5 \left(\frac{125}{25} \right) = \log_5 5 = 1.$$

106 اجمع $\log_5 5 + \log_5 25$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

أ. 125

ب. 2

ج. 3

د. 4

$$\log_5 (5 \times 25) = \log_5 125 = 3 \text{ بما أن } 5^3 = 125.$$

107 اجمع $\log_5 125 + \log_5 25$ في لوغاريتم واحد وأوجد قيمته.

أ. 5

ب. 6

ج. 3125

د. 4

$$\log_5 (125 \times 25) = \log_5 3125 = 5 \text{ بما أن } 5^5 = 3125.$$

108 أوجد قيمة $\log_2 (8^2)$ باستخدام قاعدة القوة.

أ. 6

ب. 8

ج. 5

د. 4

$$\log_2 (8^2) = 2\log_2 8 = 2(3) = 6.$$

109 أوجد قيمة $\log_2 (4^4)$ باستخدام قاعدة القوة.

أ. 6

ب. 8

ج. 12

د. 4

$$\log_2 (4^4) = 4\log_2 4 = 4(2) = 8.$$

110 أوجد قيمة $\log_3 (9^4)$ باستخدام قاعدة القوة.

أ. 4

ب. 8

ج. 12

د. 6

$$\log_3 (9^4) = 4\log_3 9 = 4(2) = 8.$$

111 أوجد قيمة $\log_3 (27^3)$ باستخدام قاعدة القوة.

أ. 12

ب. 9

ج. 11

د. 6

$$\log_3 (27^3) = 3\log_3 27 = 3(3) = 9.$$

112 أوجد قيمة $\log_3 (27^2)$ باستخدام قاعدة القوة.

أ. 5

ب. 4

ج. 8

د. 6

$$\log_3 (27^2) = 2\log_3 27 = 2(3) = 6.$$

113 حل المعادلة $\log_5 (x - 2) = 4$.

أ. 629

ب. 630

ج. 627

د. 625

$$x - 2 = 5^4 = 625 \Rightarrow x = 627.$$

114 حل المعادلة $\log_4 (x - 1) = 4$.

أ. 257

ب. 255

ج. 256

د. 259

$$x - 1 = 4^4 = 256 \Rightarrow x = 257.$$

115 حل المعادلة $\log_5(x) = 3$.

أ. 123

ب. 128

ج. 125

د. 127

$$x = 5^3 = 125.$$

116 حل المعادلة $\log_2(x - 1) = 3$.

أ. 9

ب. 8

ج. 7

د. 11

$$x - 1 = 2^3 = 8 \Rightarrow x = 9.$$

117 حل المعادلة $\log_4(x - 2) = 2$.

أ. 21

ب. 18

ج. 16

د. 20

$$x - 2 = 4^2 = 16 \Rightarrow x = 18.$$

اختيار من متعدد صعب

118 حل المعادلة $3^x = 80$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

أ. 4.090

ب. 3.890

ج. 3.990

د. 1.903

$$x = \frac{\log 80}{\log 3} \approx \frac{1.903}{0.477} \approx 3.990.$$

119 حل المعادلة $2^x = 20$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

أ. 4.222

ب. 4.422

ج. 4.322

د. 1.301

$$x = \frac{\log 20}{\log 2} \approx \frac{1.301}{0.301} \approx 4.322.$$

120 حل المعادلة $5^x = 50$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

أ. 2.531

ب. 2.331

ج. 2.431

د. 1.699

$$x = \frac{\log 50}{\log 5} \approx \frac{1.699}{0.699} \approx 2.431.$$

121 حل المعادلة $3^x = 50$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

أ. 3.662

ب. 1.699

ج. 3.562

د. 3.462

$$x = \frac{\log 50}{\log 3} \approx \frac{1.699}{0.477} \approx 3.562.$$

122 حل المعادلة $2^x = 70$ لإيجاد x لأقرب ثلاث منازل عشرية.

أ. 1.845

ب. 6.130

ج. 6.030

د. 6.230

$$x = \frac{\log 70}{\log 2} \approx \frac{1.845}{0.301} \approx 6.130.$$

123 حل المعادلة $\ln(x) = 3$ لإيجاد x بدلالة e .

أ. e^3

ب. $3e$

ج. e^4

د. e^2

$x = e^3$.

124 أوجد قيمة $\ln(e^6)$.

أ. 5

ب. 7

ج. 6

د. e^6

$$\ln(e^6) = 6.$$

125 أوجد قيمة $\ln(e^4)$.

أ. 3

ب. 5

ج. 4

د. e^4

$$\ln(e^4) = 4.$$

126 أوجد قيمة $\ln(e^3)$.

أ. 2

ب. 3

ج. 4

د. e^3

$$\ln(e^3) = 3.$$

127 أوجد قيمة $\ln(e^2)$.

أ. 1

ب. e^2

ج. 2

د. 3

$$\ln(e^2) = 2.$$

128 كمية موصوفة بالنموذج $N(t) = 500e^{-0.1t}$. أوجد $N(5)$ لأقرب منزلة عشرية واحدة.

أ. 273.0

ب. 500

ج. 303.3

د. 333.6

$$N(5) = 500e^{-0.5} = 500(0.60653) \approx 303.3.$$

129 كمية موصوفة بالنموذج $N(t) = 200e^{0.1t}$. أوجد $N(5)$ لأقرب منزلة عشرية واحدة.

أ. 296.7

ب. 200

ج. 362.7

د. 329.7

$$N(5) = 200e^{0.5} = 200(1.64872) \approx 329.7.$$

130 كمية موصوفة بالنموذج $N(t) = 5000e^{0.1t}$. أوجد $N(5)$ لأقرب عدد صحيح.

أ. 8244

ب. 5000

ج. 9068.4

د. 7419.6

$$N(5) = 5000e^{0.5} = 5000(1.64872) \approx 8244.$$

131 كمية موصوفة بالنموذج $N(t) = 1000e^{-0.1t}$. أوجد $N(5)$ لأقرب منزلة عشرية واحدة.

أ. 545.9

ب. 606.5

ج. 667.1

د. 1000

$$N(5) = 1000e^{-0.5} = 1000(0.60653) \approx 606.5.$$

132 كمية موصوفة بالنموذج $N(t) = 500e^{0.1t}$. أوجد $N(5)$ لأقرب منزلة عشرية واحدة.

أ. 824.4

ب. 742.0

ج. 500

د. 906.8

$$N(5) = 500e^{0.5} = 500(1.64872) \approx 824.4.$$