

# MEM155 - Métodos Matemáticos II

Mohit Karnani

Universidad de Chile

Otoño, 2016

# Curso

Control 1

Control 2

Control 3

Control 4

Examen

# Control 1

## Control 1

Módulo 2  
Módulo 3  
Módulo 4  
Módulo 5  
Módulo 6  
Módulo 7  
Módulo 8  
Módulo 9  
Módulo 10

► Volver al Inicio

# MÓDULO 2

► [Volver al Inicio de la Sección](#)

# Definición de Incrementos

## Definición 1

Sean  $x_1$  y  $x_2$  un primer y segundo valor de una variable  $x$ . Entonces el *incremento* de  $x$  es  $\Delta x = x_2 - x_1$ , esto es, el *cambio en el valor* de  $x$ .

## Definición 2

Sea  $y$  una variable dependiente de  $x$  tal que  $y = f(x)$ , donde  $f$  está definida para los valores de  $x$  entre  $x_1$  y  $x_2$  y además se cumple que  $y_1 = f(x_1)$  e  $y_2 = f(x_2)$ . Entonces el incremento de  $y$  es  $\Delta y = y_2 - y_1 = f(x_2) - f(x_1)$ , esto es, el cambio en el valor de  $y = f(x)$ .

# Ejemplo: Cantidad Demandada

## Ejemplo 1

Considere que la cantidad de cereal que demanda una familia a la semana depende del precio de venta de éste. Así,  $q(p) = 1000p^{-1}$ , donde  $q$  son los kilos de cereal demandados y  $p$  es el precio en pesos. Si el precio de venta pasa de 500 a 1000 pesos, ¿cuál es el incremento en la demanda?

## Solución 1

Utilizando la Definición 2, tenemos que

$$\begin{aligned}\Delta q &= q_2 - q_1 \\ &= 1000p_2^{-1} - 1000p_1^{-1} \\ &= 1000 \cdot 1000^{-1} - 1000 \cdot 500^{-1} \\ &= 1 - 2 = -1.\end{aligned}$$

Por lo tanto, el incremento en la cantidad demandada es de  $-1$  (se demanda un kilo menos).

# Gráfico: Cantidad Demandada

Figura 1: Incremento en precio y cantidad demandada



# Reordenando Términos

Notar que de la Definición 1 se desprende que  $x_2 = x_1 + \Delta x$ . Reemplazando esto en la Definición 2 y considerando que  $x_1$  puede ser cualquier valor de  $x$  se obtiene

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x). \quad (1)$$

La ecuación (1) puede ser útil para determinar el cambio en una variable dependiente  $y$  cuando la variable independiente  $x$  sufre un incremento de  $\Delta x$ , estando inicialmente en una situación descrita por el par  $(x, y)$ .

## Propuesto 1

Considere la función  $y = f(x) = x^3$ . Determine  $\Delta y$  dado cualquier  $x$  inicial y cualquier incremento  $\Delta x$ .



# Tasa de Cambio Promedio

## Definición 3

La tasa (o razón) de cambio promedio de una función  $y = f(x)$  definida en el intervalo  $[x, x + \Delta x]$  corresponde al incremento generado en  $y$  sobre el incremento en  $x$ , es decir,

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}. \quad (2)$$


Esto equivale a *cuánto cambia en promedio la función* por cada una de las  $\Delta x$  unidades incrementadas. Esta tasa también es llamada cociente de la diferencia.

Notar que la ecuación (2) corresponde a la *pendiente de una recta* que pasa por los puntos  $(x, f(x))$  y  $(x + \Delta x, f(x + \Delta x))$ , o bien, por los puntos  $(x, y)$  y  $(x + \Delta x, y + \Delta y)$ .

# Interpretación Gráfica

La tasa de cambio promedio de la Definición 3 equivale a la *pendiente de la recta secante* que pasa por los puntos  $(x,y)$  y  $(x + \Delta x, y + \Delta y)$ . A continuación un ejemplo gráfico:

Figura 2: Tasa de cambio como pendiente de una secante



# Tasa de una Función Cuadrática

## Ejemplo 2

Obtenga la tasa de cambio promedio de la función  $f(x) = x^2$  en el intervalo  $[x, x + \Delta x]$ .

## Solución 2

Utilizando la Definición 3 tenemos

$$\begin{aligned}\frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{(x + \Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} \\ &= \frac{2x\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = 2x + \Delta x.\end{aligned}$$

Notar que este resultado puede ser muy útil para dibujar funciones cuadráticas a mano alzada (de manera bastante precisa). (*Why?*)

## Propuesto 2


La recta secante que representa la tasa de cambio anterior es  $y = x + 2$ . Determine el intervalo sobre el que se obtuvo la tasa.

# Análisis Marginal Discreto

Por ahora no hemos impuesto restricciones sobre la magnitud (el tamaño) de  $\Delta x$ . Sin embargo, es interesante notar qué ocurre cuando esta magnitud es *arbitrariamente pequeña* (marginal).

Por ejemplo, si una función es creciente en un intervalo, es de esperar que su tasa de cambio promedio sea positiva en él.

Figura 3: Tasa de cambio en un intervalo



## Análisis Marginal Discreto (cont.)

Sin embargo, si ampliamos  $\Delta x$  de modo que el intervalo no sea siempre creciente, la conclusión sobre el signo de la tasa de cambio promedio *no se mantiene necesariamente*.

Figura 4: Tasa de cambio en otro intervalo



# Acercamientos Arbitrarios

A pesar de que al rededor de  $\bar{x}$  la función  $f(x)$  es creciente, se necesita un  $\Delta x$  *pequeño* para poder capturar esto en la tasa de cambio promedio.

## Ejemplo 3

Suponga que  $f(x) = -x^2 + 6x + 7$  y que  $\bar{x} = 1$ . Obtenga las tasas de cambio promedio para  $\Delta x \in \{2; 1; 0,5; 0,1; 0,01; 0,0001\}$ .

## Solución 3

La tasa de cambio es  $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{-2x\Delta x - \Delta x^2 + 6\Delta x}{\Delta x} = -2x - \Delta x + 6$ .

Evaluando los distintos valores de  $\Delta x$  con  $x = \bar{x} = 1$  tenemos:

**Cuadro 1:** Tasa de cambio ante intervalos menores

$\Delta x$	2	1	0,5	0,1	0,01	0,0001
Tasa	2	3	3,5	3,9	3,99	3,9999

Así, vemos que la tasa de cambio promedio *tiende* a 4...

# MÓDULO 3

► [Volver al Inicio de la Sección](#)

# Tender a Algo

## Definición 4

Una variable  $x$  *tiende* a un valor  $k$  cuando  $x$  toma una sucesión de valores que se acercan de manera arbitraria a dicho valor, sin que  $x$  tome el valor  $k$ . Cuando  $x$  se aproxima de esta manera a  $k$ , entonces podemos denotar la situación por  $x \rightarrow k$  ( $x$  *tiende a*  $k$ ).

## Definición 5

Si la (sub)sucesión de valores que toma  $x$  es mayor que el valor  $k$ , entonces diremos que  $x$  *tiende por la derecha* a  $k$ , y lo denotamos por  $x \rightarrow k^+$ . Si los valores están por debajo, diremos que  $x$  *tiende por la izquierda* a  $k$  y lo denotamos por  $x \rightarrow k^-$ .

COMENTARIO: De manera similar, cuando una variable  $x$  tiende a un valor  $k$ , puede hacer que una función  $f(x)$  tienda a algún valor  $L$ . Una primera (y apresurada) intuición nos diría que si  $x \rightarrow k$ , entonces  $f(x) \rightarrow f(k) = L$ . **¡Esto no es necesariamente cierto!**



# Ejemplos de Sucesiones

## Ejemplo 4

Suponga que  $x, y$  y  $z$  son tres variables que toman las siguientes sucesiones de valores  $\forall n \in \mathbb{N}$ :

$$x_n = \frac{(-1)^n}{n} + 1,$$

$$y_n = \frac{(-1)^{2n}}{2n} + 1 \text{ y}$$

$$z_n = \frac{(-1)^{2n-1}}{2n-1} + 1.$$

Dado lo anterior,  $x_n \rightarrow 1$ ,  $y_n \rightarrow 1^+$  y  $z_n \rightarrow 1^-$ . Comente.

## Solución 4

Verdadero. A medida que aumenta  $n$ ,  $x_n$  se acerca arbitrariamente a 1, al igual que  $y_n$  y  $z_n$ . Sin embargo, la primera sucesión toma valores tanto por sobre como por debajo de 1, mientras que las últimas dos, que son subsucesiones de la primera, toman valores sólo por sobre 1 o sólo por debajo de 1, respectivamente.

# Definición de Vecindad

## Definición 6

Una vecindad o entorno de un punto  $k \in \mathbb{R}$  es un intervalo en torno a  $k$  con semiamplitud  $\delta$ , o bien, es el intervalo  $(k - \delta, k + \delta)$ , con  $\delta > 0$ . Así, cualquier  $x$  *suficientemente cerca* de  $k$  está en su vecindad si  $|x - k| < \delta$ <sup>1</sup>.

Figura 5: Vecindad de  $k$



Notar que, bajo la Definición 6, para que  $x \rightarrow k$ , es necesario que  $x$  tome valores en la vecindad de  $k$  para cualquier  $\delta > 0$  (por pequeño que sea). Dicho de otro modo, si  $x \rightarrow k$ , entonces  $|x_n - k| < \delta$  para una cantidad infinita de valores de  $n$ .

---

<sup>1</sup>Se habla de la vecindad o entorno reducido de  $k$  a la vecindad que no incorpora al elemento  $k$ , es decir, a todos los  $x \neq k$  tal que  $|x - k| < \delta$ .

# Definición de Límite

## Definición 7

(*Épsilon-Delta*) Sea  $f(x)$  una función definida para todos los  $x$  en la vecindad de  $k$ , excepto posiblemente  $k$  (esto es, en la vecindad reducida). El límite de  $f(x)$  cuando  $x \rightarrow k$  es  $L$  si y sólo si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |x - k| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon,$$

esto es, si la distancia entre  $f(x)$  y  $L$  se puede hacer tan pequeña como se desee dejando a  $x$  suficientemente cerca de  $k$ .

Esto se denota

$$\lim_{x \rightarrow k} f(x) = L,$$

o bien

$$f(x) \rightarrow L \text{ cuando } x \rightarrow k.$$

# Gráfico: Definición de Límite

Figura 6: Intuición Gráfica de la Definición Épsilon-Delta



# Ejemplo: Límite por Definición

## Ejemplo 5

Demuestre que el límite de  $f(x) = 3x + 5$  cuando  $x \rightarrow 1$  es 8.

## Solución 5

Si  $\lim_{x \rightarrow 1} 3x + 5 = 8$ , entonces, por la Definición 7 se cumple que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |x - 1| < \delta \implies |3x + 5 - 8| < \varepsilon.$$

Luego, basta encontrar un  $\delta$  que satisfaga la Definición 7 ante cualquier  $\varepsilon$  (en efecto,  $\delta$  será función de  $\varepsilon$ ).

Notamos que  $|3x + 5 - 8| = |3x - 3| = 3|x - 1| < \varepsilon$ .

Pero lo anterior equivale a indicar que  $|x - 1| < \frac{\varepsilon}{3}$ . Es decir, ante cualquier  $\varepsilon$ , podemos definir un  $\delta = \frac{\varepsilon}{3}$  tal que se cumpla la definición para el límite indicado. □

## Propuesto 3

Demuestre que el límite de  $f(x) = x^2$  cuando  $x \rightarrow 5$  es 25.

# Existencia de un Límite

## Definición 8

El límite de  $f(x)$  cuando  $x \rightarrow k$  es  $L$  si y sólo si los límites por la derecha y por la izquierda (con  $x \rightarrow k^+$  y  $x \rightarrow k^-$ , respectivamente) son ambos iguales a  $L$ <sup>2</sup>. En símbolos:

$$\lim_{x \rightarrow k} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow k^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = L.$$

Lo anterior se cumple para todo polinomio y el límite corresponde a la función evaluada en  $x = k$ . Sin embargo, hay casos donde no se cumple...

---

<sup>2</sup>Esta definición aplica sólo cuando es posible obtener los límites laterales, es decir, cuando se trabaja sobre el dominio de la función. Un ejemplo donde no aplica esta definición es  $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x}$ : si bien el límite por la derecha es 0, el límite por la izquierda no existe ( $x$  no puede ser negativo). A pesar de lo anterior, el límite es 0, pues sólo se considera el límite definido en el dominio de la función, es decir, el límite por la derecha.

# Encontrar un Límite por Reemplazo

## Ejemplo 6

Considere la función  $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ . Encuentre  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ .

## Solución 6

En este caso, no se puede evaluar directamente en  $x = 2$ , pues tendríamos algo de la forma  $f(2) = 0/0$ . Sin embargo, en este tipo de situaciones se puede realizar una simplificación conveniente:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} x + 2.$$

Esta última simplificación se puede hacer porque, como bien dice la Definición 4,  $x$  no toma el valor 2 y por ende  $x - 2 \neq 0$ . Como este término es no nulo, es *legal* simplificar.

Por último, como  $x + 2$  es un polinomio de primer grado, su límite existe y corresponde a dicha función evaluada en  $x = 2$ .

Por lo tanto,  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} x + 2 = 4$ .

# Sobre las Funciones Simplificables

¿Es cierto que las funciones  $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$  y  $g(x) = x + 2$  son equivalentes? ¡NO!

Las funciones tienen dominios diferentes, pues  $\text{Dom } f(x) = \mathbb{R} - \{2\}$ , mientras que  $\text{Dom } g(x) = \mathbb{R}$ . Luego,  $\nexists f(2)$ , a pesar de que  $g(2) = 4$ .

Figura 7: Gráficos de  $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$  y  $g(x) = x + 2$



(a)  $f(x)$



(b)  $g(x)$



# Ejemplo: Límite que No Existe

## Ejemplo 7

Encuentre, caso exista, el siguiente límite:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ . En caso de que no exista, justifique su respuesta.

## Solución 7

Tal como en el Ejemplo 6, en este caso no podemos evaluar directamente la función en  $x = 0$ , pues tendríamos algo de la forma  $0/0$ . Sin embargo, en esta ocasión tampoco es trivial simplificar la expresión, pues el valor del numerador va a depender de si  $x$  es negativo o no negativo.


Recordar que el valor absoluto se define como  $|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$ .

En efecto, el límite por la izquierda es  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$ , mientras que por la derecha es  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1$ .

Como los límites laterales son distintos, el límite no existe.

# Gráfico: Límite que No Existe

Figura 9: Gráfico de  $y = \frac{|x|}{x}$



# MÓDULO 4

► [Volver al Inicio de la Sección](#)

# Propiedades de los Límites

## Proposición 1

*Sea  $c$  una constante cualquiera. Entonces, el límite de dicha constante cuando  $x$  tiende a  $k$  es la misma constante:*

$$\lim_{x \rightarrow k} c = c.$$

## Proposición 2

*Sea  $b$  una constante cualquiera y  $f(x)$  una función cuyo límite existe cuando  $x \rightarrow k$ . Entonces, el límite de dicha función ponderada por  $b$  cuando  $x$  tiende a  $k$  es  $b$  por el límite de la función:*

$$\lim_{x \rightarrow k} bf(x) = b \lim_{x \rightarrow k} f(x).$$

# Propiedades de los Límites (cont.)

## Proposición 3

*Sea  $n$  un entero positivo. Entonces, el límite de  $x$  elevado a  $n$  cuando  $x$  tiende a  $k$  es  $k$  elevado a  $n$ :*

$$\lim_{x \rightarrow k} x^n = k^n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

## Proposición 4

*Sean  $f(x)$  y  $g(x)$  dos funciones cuyos límites existen cuando  $x \rightarrow k$ . Entonces, el límite de la suma (o resta) de ambas funciones cuando  $x$  tiende a  $k$  es la suma (o resta) de los límites individuales de las funciones:*

$$\lim_{x \rightarrow k} f(x) \pm g(x) = \lim_{x \rightarrow k} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow k} g(x).$$

## Propuesto 4

Utilizando las Proposiciones 1, 2, 3 y 4, demuestre que el límite de cualquier polinomio  $P(x)$  cuando  $x \rightarrow k$  equivale a  $P(k)$ .

# Propiedades de los Límites (cont.)

## Proposición 5

*Sean  $f(x)$  y  $g(x)$  dos funciones cuyos límites existen cuando  $x \rightarrow k$ . Entonces, el límite del producto de ambas funciones cuando  $x$  tiende a  $k$  es el producto de los límites individuales de las funciones:*

$$\lim_{x \rightarrow k} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow k} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow k} g(x).$$

## Proposición 6

*Sean  $f(x)$  y  $g(x)$  dos funciones cuyos límites existen cuando  $x \rightarrow k$ . Entonces, el límite del cociente de ambas funciones cuando  $x$  tiende a  $k$  es el cociente de los límites individuales de las funciones, siempre y cuando el límite del denominador sea distinto de 0:*

$$\lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow k} f(x)}{\lim_{x \rightarrow k} g(x)}, \quad \text{si } \lim_{x \rightarrow k} g(x) \neq 0.$$

# Propiedades de los Límites (cont.)

## Proposición 7

*Sean  $f(x)$  y  $g(x)$  dos funciones cuyos límites existen cuando  $x \rightarrow k$ . Entonces, el límite de una función elevada a la otra cuando  $x$  tiende a  $k$  es el límite de la primera elevado al límite de la segunda, siempre y cuando la base sea positiva:*

$$\lim_{x \rightarrow k} f(x)^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow k} f(x)^{\lim_{x \rightarrow k} g(x)}, \quad \text{si } f(x) > 0.$$

Notar que de lo anterior se obtiene  $\lim_{x \rightarrow k} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow k} f(x)} \forall n \in \mathbb{N}$ .

## Proposición 8

*Sea  $a$  una constante positiva y  $f(x)$  una función cuyo límite existe cuando  $x \rightarrow k$ . Entonces, el límite del logaritmo con base  $a$  de la función cuando  $x$  tiende a  $k$  es el logaritmo con base  $a$  del límite de la función, siempre y cuando la función sea positiva:*

$$\lim_{x \rightarrow k} \log_a f(x) = \log_a \lim_{x \rightarrow k} f(x), \quad \text{si } f(x) > 0.$$

# Ejemplo

## Ejemplo 8

Obtenga el límite de  $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$  cuando  $x \rightarrow 0$ .

## Solución 8

En efecto, no podemos evaluar directamente  $x = 0$ , pues tendríamos algo de la forma  $0/0$ . Sin embargo, podemos utilizar un *1 conveniente*...

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+1}+1}{\sqrt{x+1}+1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1-1}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+1}+1}.\end{aligned}$$

Finalmente, podemos simplemente evaluar en  $x = 0$  para obtener como resultado  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} = \frac{1}{2}$ .



# Más Ejemplos

## Ejemplo 9

Obtenga  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+3} - \frac{1}{3}}{x}$ .

## Solución 9

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+3} - \frac{1}{3}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3-x-3}{3(x+3)}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{3(x+3)} = -\frac{1}{9}.$$

## Ejemplo 10

Sea  $f(x) = \begin{cases} ax^2 & \text{si } x < 2 \\ ax+b & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$ . ¿Qué relación deben satisfacer  $a$  y  $b$  para que exista  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ ?

## Solución 10

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \iff 4a = 2a + b \iff a = \frac{b}{2}.$$

# MÓDULO 5

► [Volver al Inicio de la Sección](#)

# Cambio de Variable

En la Definición 7 vimos que  $\lim_{x \rightarrow k} f(x) = L$  es lo mismo que  $f(x) \rightarrow L$  cuando  $x \rightarrow k$ .

Ahora bien, podríamos considerar a  $f(x)$  como una variable de la cual depende la función  $g$ .

Luego, podemos plantear la posible existencia de  $\lim_{f(x) \rightarrow L} g(f(x)) = M$ , o

bien,  $g(f(x)) \rightarrow M$  cuando  $f(x) \rightarrow L$ .

Combinando las ideas anteriores tenemos

$$[x \rightarrow k \Rightarrow f(x) \rightarrow L] \wedge [f(x) \rightarrow L \Rightarrow g(f(x)) \rightarrow M] \Rightarrow [x \rightarrow k \Rightarrow g(f(x)) \rightarrow M].$$

## Ejemplo 11

Obtenga  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\frac{\sqrt{x+1}-1}{x} + 2,5} - \frac{1}{3} \right) \div \left( \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} - 0,5 \right).$

## Solución 11

Usando las Soluciones 8 y 9 tenemos que el límite es  $-\frac{1}{9}$ .

# Número $e$ como Límite

## Proposición 9

*El número  $e \approx 2,718281828459\dots$  (número de Euler o constante de Napier) se puede definir de la siguiente manera:*

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e \quad \left( = {}^3 \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{x} \right)^x \right)$$

A este límite, junto con los de las Proposiciones 10 y 11, los llamaremos *límites especiales*<sup>4</sup>.

## Propuesto 5

Verifique esto evaluando la función  $f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}}$  para valores de  $x$  arbitrariamente cercanos a 0.

---

<sup>3</sup>Próximamente le daremos énfasis a los límites cuando  $x$  tiende al infinito.

<sup>4</sup>Hay otros límites especiales que no abarcaremos en este curso.

# Límites Especiales

## Proposición 10

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

## Demostración.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln e = 1.$$



# Límites Especiales (cont.)

## Proposición 11

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x) - 1}{x} = 1$$

### Demostración.

Sea  $\exp(x) - 1 = y$ , de modo que  $x \rightarrow 0 \implies y \rightarrow 0$ . A partir de esto podemos despejar  $x = \ln(1+y)$ . Por lo tanto, utilizando el cambio de variable, el límite es equivalente a

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x) - 1}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\ln(1+y)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\ln(1+y)}{y}} = 1.$$



# Ejercicios: Límites Especiales

## Propuesto 6

Demuestre que,  $\forall a > 0$ ,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a.$$

**Hint:** Proceda de manera análoga a la demostración de la Proposición 11.

## Propuesto 7

Demuestre que,  $\forall a > 0$ ,

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + ax)^{\frac{1}{x}} = \exp(a).$$

**Hint:** Utilice un 1 conveniente en el exponente y luego aplique la Proposición 9.

# Ejercicios: Límites Especiales (cont.)

## Propuesto 8

Demuestre que,  $\forall a > 0$ ,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+ax)}{x} = a.$$

**Hint:** Proceda de manera análoga a la demostración de la Proposición 10 y utilice el resultado del Propuesto 7.

## Propuesto 9

Demuestre que,  $\forall a > 0$ ,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{x} = a.$$

**Hint:** Utilice un 1 conveniente en el exponente y aplique la Proposición 9. Luego, utilice otro 1 conveniente sobre su resultado para finalmente aplicar la Proposición 11 con un cambio de variable.



# MÓDULO 6

► [Volver al Inicio de la Sección](#)

# Límites al Infinito

Hasta ahora hemos revisado cómo se comporta una función  $f(x)$  a medida que  $x$  tiende a algún valor constante  $k$ .


Sin embargo, en ocasiones nos puede interesar qué ocurre con la función cuando  $x$  crece (o decrece) indeterminadamente, es decir, qué le pasa a  $f(x)$  cuando  $x \rightarrow \infty$  (o  $x \rightarrow -\infty$ ).

## Ejemplo 12

Grafique  $f(x) = \frac{1}{x}$  en el primer cuadrante y obtenga  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ .

## Solución 12

Figura 10: Límite hacia el infinito



A medida que  $x$  se vuelve arbitrariamente grande, la función se acerca cada vez más a 0...

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

## Límites al Infinito (cont.)

Al igual que en los casos anteriores, es importante notar que no nos interesa “evaluar  $x$  en infinito” (de hecho, esto es conceptualmente imposible), sino que queremos saber cómo se comporta la función cuando  $x$  “se aproxima” al infinito, ya sea positivo o negativo.

### Ejemplo 13

Obtenga  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{x+1}$ .

### Solución 13

Notamos que no tiene sentido hablar de “evaluar  $x$  en menos infinito”, pues tendríamos un resultado de la forma  $\infty/\infty$ .

Sin embargo, podemos reescribir el límite como

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x/x}{x/x + 1/x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{1 + 1/x},$$

donde esto lo podemos hacer porque “no evaluamos  $x$  en infinito”.

Por último, notamos que el segundo término en el denominador

tiende a 0 (al igual que en el Ejemplo 12).  $\therefore \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{x+1} = 2$ .

# Convergencia v.s. Divergencia

converger (Del lat. convergĕre):

1. intr. Dicho de dos o más líneas: Tender a unirse en un punto.
2. intr. Coincidir en la misma posición ante algo controvertido.
3. intr. Mat. Dicho de una sucesión: Aproximarse a un límite.
4. intr. Med. Confluir distintos impulsos sensoriales en una sola neurona, como en la actividad motora.

divergir (Del lat. divergĕre):

1. intr. Dicho de dos o más líneas o superficies: Irse apartando sucesivamente unas de otras.
2. intr. Discordar, discrepar.

*Real Academia Española © Todos los derechos reservados*

Hasta ahora sólo hemos trabajado con límites convergentes, es decir, funciones que se acercan a un valor dado cuando la variable tiende a algún punto. Sin embargo, esto no tiene por qué ser siempre así...

# Límites Infinitos

## Ejemplo 14

Similar al Ejemplo 12, grafique  $f(x) = \frac{1}{x}$  en el primer cuadrante y obtenga  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ .

## Solución 14

Figura 11: Límite infinito



En efecto, a medida que  $x$  se acerca a 0 por la derecha, el valor de  $\frac{1}{x}$  se vuelve arbitrariamente grande, esto es, tiende a infinito positivo...

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

En este caso se dice que  $f(x)$  *diverge* cuando  $x \rightarrow 0^+$ .

# Divergencia en el Infinito

Además de divergir cuando  $x$  tiende a algún valor particular, puede darse que una función diverja cuando  $x$  tienda a  $+\infty$  o  $-\infty$ .

## Ejemplo 15

Sea  $f(x) = \frac{x^3 - 2x^2 + 3x - 4}{5x^2 - 6x + 7}$ . Obtenga  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ .

## Solución 15

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3/x^2 - 2x^2/x^2 + 3x/x^2 - 4/x^2}{5x^2/x^2 - 6x/x^2 + 7/x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 2}{5} = \infty$$

## Propuesto 10

Grafique cualquier polinomio y observe qué ocurre cuando  $x \rightarrow +\infty$  o cuando  $x \rightarrow -\infty$ .

## Propuesto 11

Repita lo anterior con el logaritmo de cualquier polinomio positivo.

## Propuesto 12

Ahora con la raíz de cualquier polinomio positivo.

# Convergencia en el Infinito

Tal como vimos en el Ejemplo 12, pueden existir distintas funciones que convergen cuando  $x$  tiende a infinito positivo o negativo.

## Ejemplo 16

En macroeconomía se habla de la idea de “convergencia en crecimiento” (crecimiento en el PIB), que básicamente indica que en el largo plazo, todos los países tienden a crecer a la misma tasa<sup>5</sup> (y la brecha entre sus productos será menor). Suponga que el crecimiento de cualquier economía depende de su nivel de producto  $Y$  de la forma  $f(Y) = \frac{1}{2\sqrt{Y}}$ . ¿Por qué se justificaría esta hipótesis de convergencia en crecimiento?

## Solución 16

Porque a medida que el nivel del producto crece, el crecimiento de este producto es cada vez menor. En el límite, un país con un PIB arbitrariamente grande simplemente no crecerá, de modo que los países más pequeños, que sí tienen crecimiento positivo, lo van a alcanzar, esto es, van a converger.

<sup>5</sup>Más adelante veremos cómo calcular estas tasas de crecimiento.

## Cambio de Variable (cont.)

Utilizando límites infinitos y en el infinito se pueden hacer cambios de variables muy útiles.

En la Proposición 9, indicamos que  $\lim_{y \rightarrow 0} (1+y)^{\frac{1}{y}} = e$ . Con un cambio de variable se puede obtener una versión alternativa de este límite...

### Proposición 12

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

### Demostración.

Sea  $x = \frac{1}{y}$ , de modo que  $y \rightarrow 0^+ \implies x \rightarrow \infty$ . Reemplazando esto en la

Proposición 9 se obtiene  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ . □


### Propuesto 13

Mostrar que lo anterior también se cumple cuando  $x \rightarrow -\infty$ .



# Gráficos: Límites Especiales

Figura 12: Proposición 9




# Gráficos: Límites Especiales

Figura 13: Proposición 10



# Gráficos: Límites Especiales

Figura 14: Proposición 11



# Gráficos: Límites Especiales

Figura 15: Proposición 12



# Aplicación: Interés Compuesto

## Ejemplo 17

Suponga que se le ofrece un proyecto de inversión que paga una tasa anual igual a  $r$ . Se le permite capitalizar de manera compuesta esta inversión  $n$  veces (las que usted quiera), de modo que en cada uno de los  $n$  períodos se obtiene una rentabilidad de  $r/n$ . Uno podría pensar que al aumentar  $n$  indefinidamente se pueden obtener ganancias arbitrariamente grandes, pues el interés compuesto se capitalizaría de manera exponencial. Sin embargo, la institución que le ofrece esta inversión no está preocupada por que haga tender  $n$  a infinito. ¿Por qué?

## Solución 17

No le preocupa porque  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n$  converge...

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n/r}\right)^{rn/r} = e^r.$$

# Asíntotas Horizontales

## Definición 9

$y = L$  es una *asíntota horizontal* de  $f(x)$  si se cumple que  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$   
o bien  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ .

Figura 16: Asíntota horizontal



## Asíntotas Horizontales (cont.)

Estas asíntotas horizontales pueden ser múltiples (dos):

Figura 17: Múltiples asíntotas horizontales



*¿Por qué no pueden ser más de dos?*

# Ejemplo: Asíntotas Horizontales

## Ejemplo 18

Obtenga las asíntotas horizontales de la función  $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}$ .  
Grafique.

## Solución 18

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$  y  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$  (*¿por qué?*), por lo que las asíntotas son  $y_1 = 1$  e  $y_2 = -1$ . El gráfico es equivalente al de la Figura 17.



# Asíntotas Verticales

## Definición 10

$x = k$  es una *asíntota vertical* de  $f(x)$  si se cumple que  $\lim_{x \rightarrow k} f(x) = \infty$  o bien  $\lim_{x \rightarrow k} f(x) = -\infty$ .

Figura 18: Asíntota vertical



## Asíntotas Verticales (cont.)

Estas asíntotas verticales también pueden ser múltiples (dos o más):

Figura 19: Múltiples asíntotas verticales



# Ejemplo: Asíntotas Verticales

## Ejemplo 19

Obtenga todas las asíntotas de la función  $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4}$ . Grafique.

## Solución 19

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ , por lo que  $y = 1$  es la única asíntota horizontal. Por último, la función diverge cuando  $x \rightarrow 2$  y cuando  $x \rightarrow -2$ , por lo que  $x_1 = 2$  y  $x_2 = -2$  son ambas asíntotas verticales.

Figura 20: Asíntotas verticales y horizontales



# MÓDULO 7

► [Volver al Inicio de la Sección](#)

# Sin Levantar el Lápiz

Anteriormente comentamos la existencia de funciones que “se pueden dibujar sin levantar el lápiz”.

Una de las ventajas de estas funciones es que el cálculo de cualquier límite en su dominio se podía obtener simplemente reemplazando el argumento de la función por el valor hacia el cual tiende la variable independiente en el límite que se desea calcular.

Dicho de otro modo, en estas funciones se cumple que

$$\lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k).$$

# Definición de Continuidad

## Definición 11

Una función  $f(x)$  se dice *continua* en  $x = k$  si se cumple que  $k \in \text{Dom } f$  (i.e. la función está definida en  $k$ ) y además

$$\lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k).$$

## Definición 12

Una función  $f(x)$  se dice continua en el intervalo  $[a, b]$  si es continua en cualquier  $k \in [a, b]$ .


Las funciones continuas son justamente aquellas que “se pueden dibujar sin levantar el lápiz”, esto es, son funciones que no tienen “hoyos” ni “saltos”.

Otra forma de interpretarlas es como funciones en las cuales *pequeños cambios en el argumento generan pequeños cambios en el valor de la función*.

Una función que no cumple esto se dice *discontinua*.


# Gráfico: Continuidad

Figura 21: Funciones Continuas en  $\mathbb{R}$



# Gráfico: Discontinuidad

Figura 22: Funciones Discontinuas en  $\mathbb{R}$





# Propiedades de Funciones Continuas

## Proposición 13

*La suma o resta de dos funciones continuas es también una función continua. Esto es, si  $f$  y  $g$  son continuas, entonces  $f \pm g$  también es continua.*

## Proposición 14

*El producto de dos funciones continuas es también una función continua. Esto es, si  $f$  y  $g$  son continuas, entonces  $f \cdot g$  también es continua.*

## Proposición 15

*El cociente entre dos funciones continuas es también una función continua si la función divisora es no nula. Esto es, si  $f$  y  $g$  son continuas, entonces  $\frac{f}{g}$  también es continua si  $g \neq 0$ .*

# Funciones Continuas

Hay funciones “típicas” que son continuas en su dominio.

- Constantes:  $f(x) = c$ .
- Polinomios:  $f(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$ .
- Raíces:  $f(x) = \sqrt[n]{x}$ .
- Logaritmos:  $f(x) = \log_a x$ .
- Exponenciales:  $f(x) = a^x$ .

Juntando esto con la Proposición 16 podemos determinar fácilmente cómo son la mayoría de las funciones continuas:

## Proposición 16

*Sean  $f: X \rightarrow Y$  y  $g: Y \rightarrow Z$  dos funciones continuas. Entonces  $g \circ f$  también es una función continua. Esto es, la composición de funciones continuas también es una función continua **siempre y cuando los dominios y codominios sean compatibles.***

# Ejemplo: Composición de Continuas

## Ejemplo 20


Sea  $f(x)$  un polinomio y sea  $g(x) = \ln x$  una función logarítmica. Entonces  $f(g(x))$  es continua en el dominio de  $g$ , pero  $g(f(x))$  no es continua en el dominio de  $f$ . Comente.

## Solución 20

Incierto. En efecto, tanto  $f$  como  $g$  son funciones continuas en sus dominios, donde el dominio de  $f$  es  $\mathbb{R}$  y el de  $g$  es  $\mathbb{R}_{++}$ . La primera afirmación del comente es verdadera, pues como  $g$  toma valores en los reales, siempre se puede componer  $g$  en  $f$  y obtener una función continua por la Proposición 16. Sin embargo, la segunda afirmación se cumple si y sólo si el recorrido de  $f$  no es siempre positivo. En caso de que el recorrido de  $f$  sea siempre positivo (e.g.  $f(x) = x^2 + x + 1$ ) no se cumple la afirmación, pues  $g(f(x))$  sí sería continua en el dominio de  $f$ .


# Gráfico: Composición de Continuas

Figura 23: Composición Compatible de Funciones Continuas



# Gráfico: Composición de Continuas

Figura 24: Composición Incompatible de Funciones Continuas



# Violaciones de Continuidad

En el Ejemplo 14 vimos que si  $f(x) = \frac{1}{x}$ , entonces  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$  y comentamos que  $f(x)$  no estaba definida en  $x = 0$ . Luego,  $f(x)$  de ninguna manera puede ser continua en  $x = 0$ , pues sus límites laterales son distintos (i.e.  $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ).

Sin embargo, pueden existir funciones que tengan un límite bien definido en un punto y aun así no sean continuas.

Este es el caso del Ejemplo 6, donde  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$ . Sin embargo,  $x = 2$  no es parte del dominio de la función. Por lo tanto,  $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$  no es continua en  $x = 2$ . Esto también se aprecia en la Figura 7.

# Aplicación: Costos de Ajuste

## Ejemplo 21

Una firma tiene un stock de capital  $K_t$  en el periodo  $t$ . Si desea alcanzar un stock  $K_{t+1}$  en el periodo  $t+1$ , entonces debe invertir  $I_t = K_{t+1} - K_t$ . Sin embargo, si  $K_{t+1} \neq K_t$ , esto es, si  $I_t \neq 0$ , entonces debe pagar un costo fijo de ajuste de  $c$  unidades monetarias (por ejemplo, porque tiene que pagar un costo de transporte). Si  $I_t = 0$ , entonces el costo de ajustarse es cero. ¿Es la función de costos de ajuste continua en todo su dominio?

## Solución 21

No lo es. Sea  $f(I_t) = \begin{cases} 0 & \text{si } I_t = 0 \\ c & \text{si } I_t \neq 0 \end{cases}$  la función de costos de ajuste. A pesar de que  $\lim_{I_t \rightarrow 0} f(I_t) = c$ ,  $f(0) = 0 \neq c$ , por lo que la función no es continua en  $I_t = 0$ .

# Aplicación: Impuestos Continuos

## Propuesto 14

Para calcular el Impuesto Global Complementario, se toma la renta anual (3) de cada individuo en UTA (unidades tributarias anuales), se pondera por el factor (4) que corresponde según su tramo de ingreso (2) y luego se rebaja (resta) el monto correspondiente (5). En el Cuadro 2 (extraído del SII) se muestra la escala, donde falta el factor que corresponde al tramo 3.

**Cuadro 2:** Escala de tasas del Impuesto Global Complementario

VIGENCIA -1	N° DE TRAMOS -2	RENTA IMPONIBLE ANUAL DESDE HASTA -3	FACTOR -4	CANTIDAD A REBAJAR (SIN CRÉDITO DEL 10% DE 1 UTA, DEROGADO) -5
RIGE A CONTAR DEL AÑO TRIBUTARIO 2014	1	0,0 UTA a 13,5 UTA	Exento	.-
	2	13,5 " a 30 "	4%	0,54 UTA
	3	30 " a 50 "		1,74 "
	4	50 " a 70 "	13,5%	4,49 "
	5	70 " a 90 "	23%	11,14 "
	6	90 " a 120 "	30,4%	17,80 "
	7	120 " a 150 "	35,5%	23,92 "
	8	150 " y MAS	40%	30,67 "

NOTA: Para convertir la tabla a pesos (\$) basta con multiplicar los valores anotados en las columnas (3) y (5) por el valor de la UTA del mes respectivo.

Calcule el parámetro del tramo 3, para que la función sea continua (*why?*) con el tramo anterior (2) y el siguiente (4). Justifique.



# Ejercicio Avanzado

## Propuesto 15

Encuentre los valores de  $a$  y  $b$  para los cuales  $f(x)$  es continua en  $\mathbb{R}$ .

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\exp(x) - 1}{\ln(1+x)} & \text{si } x > 0 \\ \frac{a}{b} & \text{si } x = 0 \\ \frac{1}{-ax + b} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

¿Qué ocurre si la función se redefine de la siguiente manera?

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\exp(x) - 1}{\ln(1+x)} & \text{si } x > 0 \\ \frac{a}{b} & \text{si } x = 0 \\ \frac{1}{ax + b} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

# Proposiciones Adicionales

## Proposición 17

*Sea  $f$  continua en un punto  $k$  con  $f(k) \neq 0$ . Entonces existe una vecindad de radio  $\delta$  (ver Definición 6) en torno a  $k$  tal que  $\forall x \in (k - \delta, k + \delta)$ , el signo de  $f(x)$  es igual al de  $f(k)$ , esto es,  $f(x)f(k) > 0$ .*

La Proposición 17 se conoce como “Conservación Local del Signo”.

## Proposición 18

*Sea  $f$  continua en el intervalo  $[a, b]$ , con  $f(a)f(b) < 0$ , esto es, con signos contrarios al evaluar en ambos extremos. Entonces existe al menos un  $c \in (a, b)$  tal que  $f(c) = 0$ .*

La Proposición 18 se conoce como “Teorema de Bolzano”<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup>Este (potente) resultado lo utilizaremos más adelante.

# MÓDULO 8

► [Volver al Inicio de la Sección](#)

# Recordatorio: Tasas de Cambio

En la Definición 3, particularmente en la ecuación (2) planteamos que una tasa de cambio promedio para una función  $f$  en el intervalo  $[x, x + \Delta]$  es

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$


Además, en la Figura 2 vimos que esta tasa de cambio promedio puede ser interpretada como la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos  $(x, f(x))$  y  $(x + \Delta, f(x + \Delta))$ .

Sin embargo, en las Figuras 3 y 4 vimos cómo al utilizar intervalos muy amplios podíamos dejar de capturar, por ejemplo, si la función es creciente o decreciente al rededor de algún valor  $x$ .

En efecto, sería interesante saber *qué pasa con la tasa de cambio promedio cuando el intervalo se hace arbitrariamente pequeño.*

# Tasas en Intervalos Pequeños

Figura 25: Tasa de Cambio Promedio en Distintos Intervalos



# Límite de la Tasa de Cambio

Considerar un intervalo arbitrariamente pequeño a la hora de calcular una tasa de cambio promedio es lo mismo que calcular

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

Cuando la amplitud del intervalo tiende a cero, se deja de llamar tasa (o razón) de cambio promedio y se utiliza el concepto de *tasa (o razón) de cambio instantánea*.

A diferencia de una tasa de cambio promedio, la tasa de cambio instantánea no corresponde a la pendiente de una recta secante, sino que equivale a la *pendiente de la recta tangente* a la función  $f(x)$  en el punto  $(x, f(x))$ .

Para acortar esto último, se suele afirmar que la tasa de cambio instantánea equivale a la *pendiente de la función  $f(x)$*  en  $x$  (en vez de hablar de la pendiente de la recta tangente).

# Definición de Derivada

TODO lo de la diapositiva anterior lo vamos a condensar en una única definición...

## Definición 13

La derivada de una función  $y = f(x)$  es

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x},$$

siempre y cuando dicho límite exista.

Importante:

- ¡  $\frac{\Delta y}{\Delta x} \neq \frac{dy}{dx}$  !
- La notación de Leibniz ( $dy/dx$ ) es sólo eso... notación.
- $\frac{dy}{dx} = y' = f'(x) = \frac{df(x)}{dx} = \frac{df}{dx}(x) = \frac{df}{dx} = D_x f(x) = D_x f = Df(x) = Df.$
- La derivada de una función, es otra función (caso exista).
- Por lo tanto, la derivada se puede evaluar en distintos puntos.

# Álgebra: Derivada de una Cuadrática

## Ejemplo 22

Obtenga la derivada de la función  $f(x) = (x - 1)^2$  utilizando la definición de derivada (Definición 13).

## Solución 22


Utilizando la Definición 13, tenemos que

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x - 1)^2 - (x - 1)^2}{\Delta x} \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x^2 + (\Delta x)^2 + 1 + 2x\Delta x - 2x - 2\Delta - x^2 + 2x - 1}{\Delta x} \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^2 + 2x\Delta x - 2\Delta}{\Delta x} \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x + 2x - 2 \\&= 2x - 2.\end{aligned}$$



# Gráfico: Derivada de una Cuadrática

Figura 26: Derivada de una Función Cuadrática



# ¿Continuidad Implica Derivabilidad?

*Si una función es continua en un punto, ¿es derivable en ese punto?*

**¡NO!**


Contraejemplo:  $f(x) = |x|$

## Propuesto 16

Analice la continuidad y derivabilidad de la función  $f(x) = |x|$  en todo su dominio (ponga atención en  $x = 0$ ).

# Gráfico: Función Continua No Derivable

Figura 27: Función No Derivable



# ¿Continuidad Implica Derivabilidad?

Al revés: Si una función es derivable en un punto, ¿es continua en ese punto?

¡SÍ!

## Proposición 19

Sea  $f(x)$  una función derivable en  $x = k$ . Entonces,  $f(x)$  es continua en  $x = k$ .

### Demostración.

$$PD: \exists f'(k) \implies \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k) \iff \lim_{x \rightarrow k} f(x) - f(k) = 0.$$

$$\text{En efecto, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) - f(k) = \lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x) - f(k)}{x - k} \cdot (x - k).$$

Sea  $h = x - k$ , de modo que  $x \rightarrow k \implies h \rightarrow 0$ .

Luego, se tiene que el límite es equivalente a  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(k+h) - f(k)}{h} \cdot (h)$ .

¡Pero el límite de la fracción corresponde a  $f'(k)$ ! Como esta derivada existe (por hipótesis), el límite del producto es el producto de los límites, esto es,  $f'(k) \cdot 0 = 0$ . □

# MÓDULO 9

► [Volver al Inicio de la Sección](#)

# Derivadas Típicas

## Propuesto 17

Obtenga la derivada de  $f(x) = x^n$  para cualquier  $n \in \mathbb{R}$  usando la Definición 13.

## Propuesto 18

Obtenga la derivada de  $f(x) = e^x$  usando la Definición 13.

## Propuesto 19

Obtenga la derivada de  $f(x) = \ln(x)$  usando la Definición 13.

# Control 2

## Control 2

Módulo 11

Módulo 12

Módulo 13

Módulo 14

► [Volver al Inicio](#)

# Control 3

## Control 3

Módulo 15

Módulo 16

Módulo 17

Módulo 18

Módulo 19

► [Volver al Inicio](#)



# Control 4

## Control 4

Módulo 20

Módulo 21

Módulo 22

Módulo 23

Módulo 24

Módulo 25

► [Volver al Inicio](#)

# Examen

## Examen

Módulo 26

Módulo 27

Módulo 28

► [Volver al Inicio](#)

# MEM155 - Métodos Matemáticos II

Mohit Karnani

Universidad de Chile

Otoño, 2016