

# MEM155 - Métodos Matemáticos II

Mohit Karnani

Universidad de Chile

Otoño, 2016

# Curso

Unidad 1

Unidad 2

Unidad 3

Unidad 4

Unidad 5

# Unidad 1

## Unidad 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Módulo 6

Módulo 7

► [Volver al Inicio](#)

# MÓDULO 2

► [Volver al Inicio de la Sección](#)

# Definición de Incrementos

## Definición 1

Sean  $x_1$  y  $x_2$  un primer y segundo valor de una variable  $x$ . Entonces el *incremento* de  $x$  es  $\Delta x = x_2 - x_1$ , esto es, el *cambio en el valor* de  $x$ .

## Definición 2

Sea  $y$  una variable dependiente de  $x$  tal que  $y = f(x)$ , donde  $f$  está definida para los valores de  $x$  entre  $x_1$  y  $x_2$  y además se cumple que  $y_1 = f(x_1)$  e  $y_2 = f(x_2)$ . Entonces el incremento de  $y$  es  $\Delta y = y_2 - y_1 = f(x_2) - f(x_1)$ , esto es, el cambio en el valor de  $y = f(x)$ .

# Ejemplo: Cantidad Demandada

## Ejemplo 1

Considere que la cantidad de cereal que demanda una familia a la semana depende del precio de venta de éste. Así,  $q(p) = 1000p^{-1}$ , donde  $q$  son los kilos de cereal demandados y  $p$  es el precio en pesos. Si el precio de venta pasa de 500 a 1000 pesos, ¿cuál es el incremento en la demanda?

# Ejemplo: Cantidad Demandada

## Ejemplo 1

Considere que la cantidad de cereal que demanda una familia a la semana depende del precio de venta de éste. Así,  $q(p) = 1000p^{-1}$ , donde  $q$  son los kilos de cereal demandados y  $p$  es el precio en pesos. Si el precio de venta pasa de 500 a 1000 pesos, ¿cuál es el incremento en la demanda?

## Solución 1

Utilizando la Definición 2, tenemos que

$$\begin{aligned}\Delta q &= q_2 - q_1 \\ &= 1000p_2^{-1} - 1000p_1^{-1} \\ &= 1000 \cdot 1000^{-1} - 1000 \cdot 500^{-1} \\ &= 1 - 2 = -1.\end{aligned}$$

Por lo tanto, el incremento en la cantidad demandada es de  $-1$  (se demanda un kilo menos).

# Gráfico: Cantidad Demandada


Figura 1: Incremento en precio y cantidad demandada





# Gráfico: Cantidad Demandada

Figura 1: Incremento en precio y cantidad demandada



# Gráfico: Cantidad Demandada

Figura 1: Incremento en precio y cantidad demandada



# Reordenando Términos

Notar que de la Definición 1 se desprende que  $x_2 = x_1 + \Delta x$ . Reemplazando esto en la Definición 2 y considerando que  $x_1$  puede ser cualquier valor de  $x$  se obtiene

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x). \quad (1)$$

La ecuación (1) puede ser útil para determinar el cambio en una variable dependiente  $y$  cuando la variable independiente  $x$  sufre un incremento de  $\Delta x$ , estando inicialmente en una situación descrita por el par  $(x, y)$ .

## Propuesto 1

Considere la función  $y = f(x) = x^3$ . Determine  $\Delta y$  dado cualquier  $x$  inicial y cualquier incremento  $\Delta x$ .

# Tasa de Cambio Promedio

## Definición 3

La tasa (o razón) de cambio promedio de una función  $y = f(x)$  definida en el intervalo  $[x, x + \Delta x]$  corresponde al incremento generado en  $y$  sobre el incremento en  $x$ , es decir,

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}. \quad (2)$$

Esto equivale a *cuánto cambia en promedio la función* por cada una de las  $\Delta x$  unidades incrementadas. Esta tasa también es llamada cociente de la diferencia.

Notar que la ecuación (2) corresponde a la *pendiente de una recta* que pasa por los puntos  $(x, f(x))$  y  $(x + \Delta x, f(x + \Delta x))$ , o bien, por los puntos  $(x, y)$  y  $(x + \Delta x, y + \Delta y)$ .

# Interpretación Gráfica

La tasa de cambio promedio de la Definición 3 equivale a la *pendiente de la recta secante* que pasa por los puntos  $(x,y)$  y  $(x + \Delta x, y + \Delta y)$ . A continuación un ejemplo gráfico:


Figura 2: Tasa de cambio como pendiente de una secante



# Interpretación Gráfica

La tasa de cambio promedio de la Definición 3 equivale a la *pendiente de la recta secante* que pasa por los puntos  $(x,y)$  y  $(x + \Delta x, y + \Delta y)$ . A continuación un ejemplo gráfico:


Figura 2: Tasa de cambio como pendiente de una secante



# Interpretación Gráfica

La tasa de cambio promedio de la Definición 3 equivale a la *pendiente de la recta secante* que pasa por los puntos  $(x,y)$  y  $(x + \Delta x, y + \Delta y)$ . A continuación un ejemplo gráfico:


Figura 2: Tasa de cambio como pendiente de una secante



# Interpretación Gráfica

La tasa de cambio promedio de la Definición 3 equivale a la *pendiente de la recta secante* que pasa por los puntos  $(x,y)$  y  $(x + \Delta x, y + \Delta y)$ . A continuación un ejemplo gráfico:

Figura 2: Tasa de cambio como pendiente de una secante





# Tasa de una Función Cuadrática

## Ejemplo 2

Obtenga la tasa de cambio promedio de la función  $f(x) = x^2$  en el intervalo  $[x, x + \Delta x]$ .

# Tasa de una Función Cuadrática

## Ejemplo 2

Obtenga la tasa de cambio promedio de la función  $f(x) = x^2$  en el intervalo  $[x, x + \Delta x]$ .

## Solución 2

Utilizando la Definición 3 tenemos

$$\begin{aligned}\frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{(x + \Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} \\ &= \frac{2x\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = 2x + \Delta x.\end{aligned}$$

Notar que este resultado puede ser muy útil para dibujar funciones cuadráticas a mano alzada (de manera bastante precisa). (*Why?*)

# Tasa de una Función Cuadrática

## Ejemplo 2

Obtenga la tasa de cambio promedio de la función  $f(x) = x^2$  en el intervalo  $[x, x + \Delta x]$ .

## Solución 2

Utilizando la Definición 3 tenemos

$$\begin{aligned}\frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{(x + \Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} \\ &= \frac{2x\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = 2x + \Delta x.\end{aligned}$$

Notar que este resultado puede ser muy útil para dibujar funciones cuadráticas a mano alzada (de manera bastante precisa). (*Why?*)

## Propuesto 2

La recta secante que representa la tasa de cambio anterior es  $y = x + 2$ . Determine el intervalo sobre el que se obtuvo la tasa.

# Análisis Marginal Discreto

Por ahora no hemos impuesto restricciones sobre la magnitud (el tamaño) de  $\Delta x$ . Sin embargo, es interesante notar qué ocurre cuando esta magnitud es *arbitrariamente pequeña* (marginal).

Por ejemplo, si una función es creciente en un intervalo, es de esperar que su tasa de cambio promedio sea positiva en él.

Figura 3: Tasa de cambio en un intervalo



## Análisis Marginal Discreto (cont.)

Sin embargo, si ampliamos  $\Delta x$  de modo que el intervalo no sea siempre creciente, la conclusión sobre el signo de la tasa de cambio promedio *no se mantiene necesariamente*.

Figura 4: Tasa de cambio en otro intervalo



# Acercamientos Arbitrarios

A pesar de que al rededor de  $\bar{x}$  la función  $f(x)$  es creciente, se necesita un  $\Delta x$  *pequeño* para poder capturar esto en la tasa de cambio promedio.

## Ejemplo 3

Suponga que  $f(x) = -x^2 + 6x + 7$  y que  $\bar{x} = 1$ . Obtenga las tasas de cambio promedio para  $\Delta x \in \{2; 1; 0,5; 0,1; 0,01; 0,0001\}$ .

# Acercamientos Arbitrarios

A pesar de que al rededor de  $\bar{x}$  la función  $f(x)$  es creciente, se necesita un  $\Delta x$  *pequeño* para poder capturar esto en la tasa de cambio promedio.

## Ejemplo 3

Suponga que  $f(x) = -x^2 + 6x + 7$  y que  $\bar{x} = 1$ . Obtenga las tasas de cambio promedio para  $\Delta x \in \{2; 1; 0,5; 0,1; 0,01; 0,0001\}$ .

## Solución 3

La tasa de cambio es  $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{-2x\Delta x - \Delta x^2 + 6\Delta x}{\Delta x} = -2x - \Delta x + 6$ .

Evaluando los distintos valores de  $\Delta x$  con  $x = \bar{x} = 1$  tenemos:

**Tabla 1:** Tasa de cambio ante intervalos menores

$\Delta x$	2	1	0,5	0,1	0,01	0,0001
Tasa	2	3	3,5	3,9	3,99	3,9999

Así, vemos que la tasa de cambio promedio *tiende* a 4...

# MÓDULO 3

► [Volver al Inicio de la Sección](#)



# Tender a Algo

## Definición 4

Una variable  $x$  *tiende* a un valor  $k$  cuando  $x$  toma una sucesión de valores que se acercan de manera arbitraria a dicho valor, sin que  $x$  tome el valor  $k$ . Cuando  $x$  se aproxima de esta manera a  $k$ , entonces podemos denotar la situación por  $x \rightarrow k$  ( $x$  *tiende a*  $k$ ).

## Definición 5

Si la (sub)sucesión de valores que toma  $x$  es mayor que el valor  $k$ , entonces diremos que  $x$  *tiende por la derecha* a  $k$ , y lo denotamos por  $x \rightarrow k^+$ . Si los valores están por debajo, diremos que  $x$  *tiende por la izquierda* a  $k$  y lo denotamos por  $x \rightarrow k^-$ .

COMENTARIO: De manera similar, cuando una variable  $x$  tiende a un valor  $k$ , puede hacer que una función  $f(x)$  tienda a algún valor  $L$ . Una primera (y apresurada) intuición nos diría que si  $x \rightarrow k$ , entonces  $f(x) \rightarrow f(k) = L$ . **¡Esto no es necesariamente cierto!**

# Ejemplos de Sucesiones

## Ejemplo 4

Suponga que  $x, y$  y  $z$  son tres variables que toman las siguientes sucesiones de valores  $\forall n \in \mathbb{N}$ :

$$x_n = \frac{(-1)^n}{n} + 1,$$

$$y_n = \frac{(-1)^{2n}}{2n} + 1 \text{ y}$$

$$z_n = \frac{(-1)^{2n-1}}{2n-1} + 1.$$

# Ejemplos de Sucesiones

## Ejemplo 4

Suponga que  $x, y$  y  $z$  son tres variables que toman las siguientes sucesiones de valores  $\forall n \in \mathbb{N}$ :

$$x_n = \frac{(-1)^n}{n} + 1,$$

$$y_n = \frac{(-1)^{2n}}{2n} + 1 \text{ y}$$

$$z_n = \frac{(-1)^{2n-1}}{2n-1} + 1.$$

Dado lo anterior,  $x_n \rightarrow 1$ ,  $y_n \rightarrow 1^+$  y  $z_n \rightarrow 1^-$ . Comente.

# Ejemplos de Sucesiones

## Ejemplo 4

Suponga que  $x, y$  y  $z$  son tres variables que toman las siguientes sucesiones de valores  $\forall n \in \mathbb{N}$ :

$$x_n = \frac{(-1)^n}{n} + 1,$$

$$y_n = \frac{(-1)^{2n}}{2n} + 1 \text{ y}$$

$$z_n = \frac{(-1)^{2n-1}}{2n-1} + 1.$$

Dado lo anterior,  $x_n \rightarrow 1$ ,  $y_n \rightarrow 1^+$  y  $z_n \rightarrow 1^-$ . Comente.

## Solución 4

Verdadero. A medida que aumenta  $n$ ,  $x_n$  se acerca arbitrariamente a 1, al igual que  $y_n$  y  $z_n$ . Sin embargo, la primera sucesión toma valores tanto por sobre como por debajo de 1, mientras que las últimas dos, que son subsucesiones de la primera, toman valores sólo por sobre 1 o sólo por debajo de 1, respectivamente.

# Definición de Vecindad

## Definición 6

Una vecindad o entorno de un punto  $k \in \mathbb{R}$  es un intervalo en torno a  $k$  con semiamplitud  $\delta$ , o bien, es el intervalo  $(k - \delta, k + \delta)$ , con  $\delta > 0$ . Así, cualquier  $x$  *suficientemente cerca* de  $k$  está en su vecindad si  $|x - k| < \delta$ <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Se habla de la vecindad o entorno reducido de  $k$  a la vecindad que no incorpora al elemento  $k$ , es decir, a todos los  $x \neq k$  tal que  $|x - k| < \delta$ .

# Definición de Vecindad

## Definición 6

Una vecindad o entorno de un punto  $k \in \mathbb{R}$  es un intervalo en torno a  $k$  con semiamplitud  $\delta$ , o bien, es el intervalo  $(k - \delta, k + \delta)$ , con  $\delta > 0$ . Así, cualquier  $x$  *suficientemente cerca* de  $k$  está en su vecindad si  $|x - k| < \delta$ <sup>1</sup>.

Figura 5: Vecindad de  $k$



---

<sup>1</sup>Se habla de la vecindad o entorno reducido de  $k$  a la vecindad que no incorpora al elemento  $k$ , es decir, a todos los  $x \neq k$  tal que  $|x - k| < \delta$ .

# Definición de Vecindad

## Definición 6

Una vecindad o entorno de un punto  $k \in \mathbb{R}$  es un intervalo en torno a  $k$  con semiamplitud  $\delta$ , o bien, es el intervalo  $(k - \delta, k + \delta)$ , con  $\delta > 0$ . Así, cualquier  $x$  *suficientemente cerca* de  $k$  está en su vecindad si  $|x - k| < \delta$ <sup>1</sup>.

Figura 5: Vecindad de  $k$



Notar que, bajo la Definición 6, para que  $x \rightarrow k$ , es necesario que  $x$  tome valores en la vecindad de  $k$  para cualquier  $\delta > 0$  (por pequeño que sea). Dicho de otro modo, si  $x \rightarrow k$ , entonces  $|x_n - k| < \delta$  para una cantidad infinita de valores de  $n$ .

---

<sup>1</sup>Se habla de la vecindad o entorno reducido de  $k$  a la vecindad que no incorpora al elemento  $k$ , es decir, a todos los  $x \neq k$  tal que  $|x - k| < \delta$ .

# Definición de Límite

## Definición 7

(*Épsilon-Delta*) Sea  $f(x)$  una función definida para todos los  $x$  en la vecindad de  $k$ , excepto posiblemente  $k$  (esto es, en la vecindad reducida). El límite de  $f(x)$  cuando  $x \rightarrow k$  es  $L$  si y sólo si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |x - k| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon,$$

esto es, si la distancia entre  $f(x)$  y  $L$  se puede hacer tan pequeña como se desee dejando a  $x$  suficientemente cerca de  $k$ .



# Definición de Límite

## Definición 7

(*Épsilon-Delta*) Sea  $f(x)$  una función definida para todos los  $x$  en la vecindad de  $k$ , excepto posiblemente  $k$  (esto es, en la vecindad reducida). El límite de  $f(x)$  cuando  $x \rightarrow k$  es  $L$  si y sólo si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |x - k| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon,$$

esto es, si la distancia entre  $f(x)$  y  $L$  se puede hacer tan pequeña como se desee dejando a  $x$  suficientemente cerca de  $k$ .

Esto se denota

$$\lim_{x \rightarrow k} f(x) = L,$$

o bien

$$f(x) \rightarrow L \text{ cuando } x \rightarrow k.$$


# Gráfico: Definición de Límite

Figura 6: Intuición Gráfica de la Definición Épsilon-Delta



# Gráfico: Definición de Límite

Figura 6: Intuición Gráfica de la Definición Épsilon-Delta



# Gráfico: Definición de Límite

Figura 6: Intuición Gráfica de la Definición Épsilon-Delta



# Ejemplo: Límite por Definición

## Ejemplo 5

Demuestre que el límite de  $f(x) = 3x + 5$  cuando  $x \rightarrow 1$  es 8.

# Ejemplo: Límite por Definición

## Ejemplo 5

Demuestre que el límite de  $f(x) = 3x + 5$  cuando  $x \rightarrow 1$  es 8.

## Solución 5

Si  $\lim_{x \rightarrow 1} 3x + 5 = 8$ , entonces, por la Definición 7 se cumple que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |x - 1| < \delta \implies |3x + 5 - 8| < \varepsilon.$$

Luego, basta encontrar un  $\delta$  que satisfaga la Definición 7 ante cualquier  $\varepsilon$  (en efecto,  $\delta$  será función de  $\varepsilon$ ).

# Ejemplo: Límite por Definición

## Ejemplo 5

Demuestre que el límite de  $f(x) = 3x + 5$  cuando  $x \rightarrow 1$  es 8.

## Solución 5

Si  $\lim_{x \rightarrow 1} 3x + 5 = 8$ , entonces, por la Definición 7 se cumple que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |x - 1| < \delta \implies |3x + 5 - 8| < \varepsilon.$$

Luego, basta encontrar un  $\delta$  que satisfaga la Definición 7 ante cualquier  $\varepsilon$  (en efecto,  $\delta$  será función de  $\varepsilon$ ).

Notamos que  $|3x + 5 - 8| = |3x - 3|$

# Ejemplo: Límite por Definición

## Ejemplo 5

Demuestre que el límite de  $f(x) = 3x + 5$  cuando  $x \rightarrow 1$  es 8.

## Solución 5

Si  $\lim_{x \rightarrow 1} 3x + 5 = 8$ , entonces, por la Definición 7 se cumple que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |x - 1| < \delta \implies |3x + 5 - 8| < \varepsilon.$$

Luego, basta encontrar un  $\delta$  que satisfaga la Definición 7 ante cualquier  $\varepsilon$  (en efecto,  $\delta$  será función de  $\varepsilon$ ).

Notamos que  $|3x + 5 - 8| = |3x - 3| = 3|x - 1|$



# Ejemplo: Límite por Definición

## Ejemplo 5

Demuestre que el límite de  $f(x) = 3x + 5$  cuando  $x \rightarrow 1$  es 8.

## Solución 5

Si  $\lim_{x \rightarrow 1} 3x + 5 = 8$ , entonces, por la Definición 7 se cumple que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |x - 1| < \delta \implies |3x + 5 - 8| < \varepsilon.$$

Luego, basta encontrar un  $\delta$  que satisfaga la Definición 7 ante cualquier  $\varepsilon$  (en efecto,  $\delta$  será función de  $\varepsilon$ ).

Notamos que  $|3x + 5 - 8| = |3x - 3| = 3|x - 1| < \varepsilon$ .

# Ejemplo: Límite por Definición

## Ejemplo 5

Demuestre que el límite de  $f(x) = 3x + 5$  cuando  $x \rightarrow 1$  es 8.

## Solución 5

Si  $\lim_{x \rightarrow 1} 3x + 5 = 8$ , entonces, por la Definición 7 se cumple que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |x - 1| < \delta \implies |3x + 5 - 8| < \varepsilon.$$

Luego, basta encontrar un  $\delta$  que satisfaga la Definición 7 ante cualquier  $\varepsilon$  (en efecto,  $\delta$  será función de  $\varepsilon$ ).

Notamos que  $|3x + 5 - 8| = |3x - 3| = 3|x - 1| < \varepsilon$ .

Pero lo anterior equivale a indicar que  $|x - 1| < \frac{\varepsilon}{3}$ . Es decir, ante cualquier  $\varepsilon$ , podemos definir un  $\delta = \frac{\varepsilon}{3}$  tal que se cumpla la definición para el límite indicado. □

# Ejemplo: Límite por Definición

## Ejemplo 5

Demuestre que el límite de  $f(x) = 3x + 5$  cuando  $x \rightarrow 1$  es 8.

## Solución 5

Si  $\lim_{x \rightarrow 1} 3x + 5 = 8$ , entonces, por la Definición 7 se cumple que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |x - 1| < \delta \implies |3x + 5 - 8| < \varepsilon.$$

Luego, basta encontrar un  $\delta$  que satisfaga la Definición 7 ante cualquier  $\varepsilon$  (en efecto,  $\delta$  será función de  $\varepsilon$ ).

Notamos que  $|3x + 5 - 8| = |3x - 3| = 3|x - 1| < \varepsilon$ .

Pero lo anterior equivale a indicar que  $|x - 1| < \frac{\varepsilon}{3}$ . Es decir, ante cualquier  $\varepsilon$ , podemos definir un  $\delta = \frac{\varepsilon}{3}$  tal que se cumpla la definición para el límite indicado. □

## Propuesto 3

Demuestre que el límite de  $f(x) = x^2$  cuando  $x \rightarrow 5$  es 25.

# Existencia de un Límite

## Definición 8

El límite de  $f(x)$  cuando  $x \rightarrow k$  es  $L$  si y sólo si los límites por la derecha y por la izquierda (con  $x \rightarrow k^+$  y  $x \rightarrow k^-$ , respectivamente) son ambos iguales a  $L^2$ .

---

<sup>2</sup>Esta definición aplica sólo cuando es posible obtener los límites laterales, es decir, cuando se trabaja sobre el dominio de la función. Un ejemplo donde no aplica esta definición es  $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x}$ : si bien el límite por la derecha es 0, el límite por la izquierda no existe ( $x$  no puede ser negativo). A pesar de lo anterior, el límite es 0, pues sólo se considera el límite definido en el dominio de la función, es decir, el límite por la derecha.

# Existencia de un Límite

## Definición 8

El límite de  $f(x)$  cuando  $x \rightarrow k$  es  $L$  si y sólo si los límites por la derecha y por la izquierda (con  $x \rightarrow k^+$  y  $x \rightarrow k^-$ , respectivamente) son ambos iguales a  $L$ <sup>2</sup>. En símbolos:

$$\lim_{x \rightarrow k} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow k^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = L.$$

---

<sup>2</sup>Esta definición aplica sólo cuando es posible obtener los límites laterales, es decir, cuando se trabaja sobre el dominio de la función. Un ejemplo donde no aplica esta definición es  $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x}$ : si bien el límite por la derecha es 0, el límite por la izquierda no existe ( $x$  no puede ser negativo). A pesar de lo anterior, el límite es 0, pues sólo se considera el límite definido en el dominio de la función, es decir, el límite por la derecha.

# Existencia de un Límite

## Definición 8

El límite de  $f(x)$  cuando  $x \rightarrow k$  es  $L$  si y sólo si los límites por la derecha y por la izquierda (con  $x \rightarrow k^+$  y  $x \rightarrow k^-$ , respectivamente) son ambos iguales a  $L$ <sup>2</sup>. En símbolos:

$$\lim_{x \rightarrow k} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow k^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = L.$$

Lo anterior se cumple para todo polinomio y el límite corresponde a la función evaluada en  $x = k$ . Sin embargo, hay casos donde no se cumple...

---

<sup>2</sup>Esta definición aplica sólo cuando es posible obtener los límites laterales, es decir, cuando se trabaja sobre el dominio de la función. Un ejemplo donde no aplica esta definición es  $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x}$ : si bien el límite por la derecha es 0, el límite por la izquierda no existe ( $x$  no puede ser negativo). A pesar de lo anterior, el límite es 0, pues sólo se considera el límite definido en el dominio de la función, es decir, el límite por la derecha.

# Encontrar un Límite por Reemplazo

## Ejemplo 6

Considere la función  $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ . Encuentre  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ .

# Encontrar un Límite por Reemplazo

## Ejemplo 6

Considere la función  $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ . Encuentre  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ .

## Solución 6

En este caso, no se puede evaluar directamente en  $x = 2$ , pues tendríamos algo de la forma  $f(2) = 0/0$ . Sin embargo, en este tipo de situaciones se puede realizar una simplificación conveniente:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} =$$



# Encontrar un Límite por Reemplazo

## Ejemplo 6

Considere la función  $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ . Encuentre  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ .

## Solución 6

En este caso, no se puede evaluar directamente en  $x = 2$ , pues tendríamos algo de la forma  $f(2) = 0/0$ . Sin embargo, en este tipo de situaciones se puede realizar una simplificación conveniente:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} =$$

# Encontrar un Límite por Reemplazo

## Ejemplo 6

Considere la función  $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ . Encuentre  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ .

## Solución 6

En este caso, no se puede evaluar directamente en  $x = 2$ , pues tendríamos algo de la forma  $f(2) = 0/0$ . Sin embargo, en este tipo de situaciones se puede realizar una simplificación conveniente:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} x + 2.$$

Esta última simplificación se puede hacer porque, como bien dice la Definición 4,  $x$  no toma el valor 2 y por ende  $x - 2 \neq 0$ . Como este término es no nulo, es *legal* simplificar.

# Encontrar un Límite por Reemplazo

## Ejemplo 6

Considere la función  $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ . Encuentre  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ .

## Solución 6

En este caso, no se puede evaluar directamente en  $x = 2$ , pues tendríamos algo de la forma  $f(2) = 0/0$ . Sin embargo, en este tipo de situaciones se puede realizar una simplificación conveniente:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} x + 2.$$

Esta última simplificación se puede hacer porque, como bien dice la Definición 4,  $x$  no toma el valor 2 y por ende  $x - 2 \neq 0$ . Como este término es no nulo, es *legal* simplificar.

Por último, como  $x + 2$  es un polinomio de primer grado, su límite existe y corresponde a dicha función evaluada en  $x = 2$ .

# Encontrar un Límite por Reemplazo

## Ejemplo 6

Considere la función  $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ . Encuentre  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ .

## Solución 6

En este caso, no se puede evaluar directamente en  $x = 2$ , pues tendríamos algo de la forma  $f(2) = 0/0$ . Sin embargo, en este tipo de situaciones se puede realizar una simplificación conveniente:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} x + 2.$$

Esta última simplificación se puede hacer porque, como bien dice la Definición 4,  $x$  no toma el valor 2 y por ende  $x - 2 \neq 0$ . Como este término es no nulo, es *legal* simplificar.

Por último, como  $x + 2$  es un polinomio de primer grado, su límite existe y corresponde a dicha función evaluada en  $x = 2$ .

Por lo tanto,  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} x + 2 = 4$ .

# Sobre las Funciones Simplificables

¿Es cierto que las funciones  $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$  y  $g(x) = x + 2$  son equivalentes?

# Sobre las Funciones Simplificables

¿Es cierto que las funciones  $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$  y  $g(x) = x + 2$  son equivalentes? ¡NO!

# Sobre las Funciones Simplificables

¿Es cierto que las funciones  $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$  y  $g(x) = x + 2$  son equivalentes? **¡NO!**


Las funciones tienen dominios diferentes, pues  $\text{Dom } f(x) = \mathbb{R} - \{2\}$ , mientras que  $\text{Dom } g(x) = \mathbb{R}$ . Luego,  $\nexists f(2)$ , a pesar de que  $g(2) = 4$ .

# Sobre las Funciones Simplificables


¿Es cierto que las funciones  $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$  y  $g(x) = x + 2$  son equivalentes? ¡NO!

Las funciones tienen dominios diferentes, pues  $\text{Dom } f(x) = \mathbb{R} - \{2\}$ , mientras que  $\text{Dom } g(x) = \mathbb{R}$ . Luego,  $\nexists f(2)$ , a pesar de que  $g(2) = 4$ .

Figura 7: Gráficos de  $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$  y  $g(x) = x + 2$



(a)  $f(x)$



(b)  $g(x)$



# Ejemplo: Límite que No Existe

## Ejemplo 7

Encuentre, caso exista, el siguiente límite:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ . En caso de que no exista, justifique su respuesta.

# Ejemplo: Límite que No Existe

## Ejemplo 7

Encuentre, caso exista, el siguiente límite:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ . En caso de que no exista, justifique su respuesta.

## Solución 7

Tal como en el Ejemplo 6, en este caso no podemos evaluar directamente la función en  $x = 0$ , pues tendríamos algo de la forma  $0/0$ . Sin embargo, en esta ocasión tampoco es trivial simplificar la expresión, pues el valor del numerador va a depender de si  $x$  es negativo o no negativo.

# Ejemplo: Límite que No Existe

## Ejemplo 7

Encuentre, caso exista, el siguiente límite:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ . En caso de que no exista, justifique su respuesta.

## Solución 7

Tal como en el Ejemplo 6, en este caso no podemos evaluar directamente la función en  $x = 0$ , pues tendríamos algo de la forma  $0/0$ . Sin embargo, en esta ocasión tampoco es trivial simplificar la expresión, pues el valor del numerador va a depender de si  $x$  es negativo o no negativo.

Recordar que el valor absoluto se define como  $|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$ .

# Ejemplo: Límite que No Existe

## Ejemplo 7

Encuentre, caso exista, el siguiente límite:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ . En caso de que no exista, justifique su respuesta.

## Solución 7

Tal como en el Ejemplo 6, en este caso no podemos evaluar directamente la función en  $x = 0$ , pues tendríamos algo de la forma  $0/0$ . Sin embargo, en esta ocasión tampoco es trivial simplificar la expresión, pues el valor del numerador va a depender de si  $x$  es negativo o no negativo.

Recordar que el valor absoluto se define como  $|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$ .

En efecto, el límite por la izquierda es  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$ , mientras que por la derecha es  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1$ .

# Ejemplo: Límite que No Existe

## Ejemplo 7

Encuentre, caso exista, el siguiente límite:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ . En caso de que no exista, justifique su respuesta.

## Solución 7

Tal como en el Ejemplo 6, en este caso no podemos evaluar directamente la función en  $x = 0$ , pues tendríamos algo de la forma  $0/0$ . Sin embargo, en esta ocasión tampoco es trivial simplificar la expresión, pues el valor del numerador va a depender de si  $x$  es negativo o no negativo.


Recordar que el valor absoluto se define como  $|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$ .

En efecto, el límite por la izquierda es  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$ , mientras que por la derecha es  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1$ .

Como los límites laterales son distintos, el límite no existe.

# Gráfico: Límite que No Existe

Figura 9: Gráfico de  $y = \frac{|x|}{x}$



# MÓDULO 4

► [Volver al Inicio de la Sección](#)

# Propiedades de los Límites

## Proposición 1

*Sea  $c$  una constante cualquiera. Entonces, el límite de dicha constante cuando  $x$  tiende a  $k$  es la misma constante:*

$$\lim_{x \rightarrow k} c = c.$$



# Propiedades de los Límites

## Proposición 1

*Sea  $c$  una constante cualquiera. Entonces, el límite de dicha constante cuando  $x$  tiende a  $k$  es la misma constante:*

$$\lim_{x \rightarrow k} c = c.$$

## Proposición 2

*Sea  $b$  una constante cualquiera y  $f(x)$  una función cuyo límite existe cuando  $x \rightarrow k$ . Entonces, el límite de dicha función ponderada por  $b$  cuando  $x$  tiende a  $k$  es  $b$  por el límite de la función:*

$$\lim_{x \rightarrow k} bf(x) = b \lim_{x \rightarrow k} f(x).$$

# Propiedades de los Límites (cont.)

## Proposición 3

*Sea  $n$  un entero positivo. Entonces, el límite de  $x$  elevado a  $n$  cuando  $x$  tiende a  $k$  es  $k$  elevado a  $n$ :*

$$\lim_{x \rightarrow k} x^n = k^n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

# Propiedades de los Límites (cont.)

## Proposición 3

*Sea  $n$  un entero positivo. Entonces, el límite de  $x$  elevado a  $n$  cuando  $x$  tiende a  $k$  es  $k$  elevado a  $n$ :*

$$\lim_{x \rightarrow k} x^n = k^n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

## Proposición 4

*Sean  $f(x)$  y  $g(x)$  dos funciones cuyos límites existen cuando  $x \rightarrow k$ . Entonces, el límite de la suma (o resta) de ambas funciones cuando  $x$  tiende a  $k$  es la suma (o resta) de los límites individuales de las funciones:*

$$\lim_{x \rightarrow k} f(x) \pm g(x) = \lim_{x \rightarrow k} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow k} g(x).$$

# Propiedades de los Límites (cont.)

## Proposición 3

*Sea  $n$  un entero positivo. Entonces, el límite de  $x$  elevado a  $n$  cuando  $x$  tiende a  $k$  es  $k$  elevado a  $n$ :*

$$\lim_{x \rightarrow k} x^n = k^n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

## Proposición 4

*Sean  $f(x)$  y  $g(x)$  dos funciones cuyos límites existen cuando  $x \rightarrow k$ . Entonces, el límite de la suma (o resta) de ambas funciones cuando  $x$  tiende a  $k$  es la suma (o resta) de los límites individuales de las funciones:*

$$\lim_{x \rightarrow k} f(x) \pm g(x) = \lim_{x \rightarrow k} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow k} g(x).$$

## Propuesto 4

Utilizando las Proposiciones 1, 2, 3 y 4, demuestre que el límite de cualquier polinomio  $P(x)$  cuando  $x \rightarrow k$  equivale a  $P(k)$ .

# Propiedades de los Límites (cont.)

## Proposición 5

*Sean  $f(x)$  y  $g(x)$  dos funciones cuyos límites existen cuando  $x \rightarrow k$ . Entonces, el límite del producto de ambas funciones cuando  $x$  tiende a  $k$  es el producto de los límites individuales de las funciones:*

$$\lim_{x \rightarrow k} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow k} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow k} g(x).$$

# Propiedades de los Límites (cont.)

## Proposición 5

Sean  $f(x)$  y  $g(x)$  dos funciones cuyos límites existen cuando  $x \rightarrow k$ . Entonces, el límite del producto de ambas funciones cuando  $x$  tiende a  $k$  es el producto de los límites individuales de las funciones:

$$\lim_{x \rightarrow k} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow k} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow k} g(x).$$

## Proposición 6

Sean  $f(x)$  y  $g(x)$  dos funciones cuyos límites existen cuando  $x \rightarrow k$ . Entonces, el límite del cociente de ambas funciones cuando  $x$  tiende a  $k$  es el cociente de los límites individuales de las funciones, siempre y cuando el límite del denominador sea distinto de 0:

$$\lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow k} f(x)}{\lim_{x \rightarrow k} g(x)}, \quad \text{si } \lim_{x \rightarrow k} g(x) \neq 0.$$

# Propiedades de los Límites (cont.”)

## Proposición 7

*Sean  $f(x)$  y  $g(x)$  dos funciones cuyos límites existen cuando  $x \rightarrow k$ . Entonces, el límite de una función elevada a la otra cuando  $x$  tiende a  $k$  es el límite de la primera elevado al límite de la segunda, siempre y cuando la base sea positiva:*

$$\lim_{x \rightarrow k} f(x)^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow k} f(x)^{\lim_{x \rightarrow k} g(x)}, \quad \text{si } f(x) > 0.$$

# Propiedades de los Límites (cont.)

## Proposición 7

*Sean  $f(x)$  y  $g(x)$  dos funciones cuyos límites existen cuando  $x \rightarrow k$ . Entonces, el límite de una función elevada a la otra cuando  $x$  tiende a  $k$  es el límite de la primera elevado al límite de la segunda, siempre y cuando la base sea positiva:*

$$\lim_{x \rightarrow k} f(x)^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow k} f(x)^{\lim_{x \rightarrow k} g(x)}, \quad \text{si } f(x) > 0.$$

Notar que de lo anterior se obtiene  $\lim_{x \rightarrow k} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow k} f(x)} \forall n \in \mathbb{N}$ .

## Proposición 8

*Sea  $a$  una constante positiva y  $f(x)$  una función cuyo límite existe cuando  $x \rightarrow k$ . Entonces, el límite del logaritmo con base  $a$  de la función cuando  $x$  tiende a  $k$  es el logaritmo con base  $a$  del límite de la función, siempre y cuando la función sea positiva:*

$$\lim_{x \rightarrow k} \log_a f(x) = \log_a \lim_{x \rightarrow k} f(x), \quad \text{si } f(x) > 0.$$



# Ejemplo

## Ejemplo 8

Obtenga el límite de  $f(x) = \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$  cuando  $x \rightarrow 0$ .

# Ejemplo

## Ejemplo 8

Obtenga el límite de  $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$  cuando  $x \rightarrow 0$ .

## Solución 8

En efecto, no podemos evaluar directamente  $x = 0$ , pues tendríamos algo de la forma  $0/0$ . Sin embargo, podemos utilizar un *1 conveniente...*

# Ejemplo

## Ejemplo 8

Obtenga el límite de  $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$  cuando  $x \rightarrow 0$ .

## Solución 8

En efecto, no podemos evaluar directamente  $x = 0$ , pues tendríamos algo de la forma  $0/0$ . Sin embargo, podemos utilizar un *1 conveniente*...

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+1}+1}{\sqrt{x+1}+1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1-1}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+1}+1}.\end{aligned}$$

Finalmente, podemos simplemente evaluar en  $x = 0$  para obtener como resultado  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} = \frac{1}{2}$ .

# Más Ejemplos

## Ejemplo 9

Obtenga  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+3} - \frac{1}{3}}{x}$ .

## Más Ejemplos

### Ejemplo 9

Obtenga  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+3} - \frac{1}{3}}{x}$ .

### Solución 9

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+3} - \frac{1}{3}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3-x-3}{3(x+3)}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{3(x+3)} = -\frac{1}{9}.$$

## Más Ejemplos

### Ejemplo 9

Obtenga  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+3} - \frac{1}{3}}{x}$ .

### Solución 9

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+3} - \frac{1}{3}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3-x-3}{3(x+3)}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{3(x+3)} = -\frac{1}{9}.$$

### Ejemplo 10

Sea  $f(x) = \begin{cases} ax^2 & \text{si } x < 2 \\ ax+b & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$ . ¿Qué relación deben satisfacer  $a$  y  $b$  para que exista  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ ?

# Más Ejemplos

## Ejemplo 9

Obtenga  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+3} - \frac{1}{3}}{x}$ .

## Solución 9

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+3} - \frac{1}{3}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3-x-3}{3(x+3)}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{3(x+3)} = -\frac{1}{9}.$$

## Ejemplo 10

Sea  $f(x) = \begin{cases} ax^2 & \text{si } x < 2 \\ ax+b & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$ . ¿Qué relación deben satisfacer  $a$  y  $b$  para que exista  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ ?

## Solución 10

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \iff 4a = 2a + b \iff a = \frac{b}{2}.$$

# MÓDULO 5

► [Volver al Inicio de la Sección](#)



# Cambio de Variable

En la Definición 7 vimos que  $\lim_{x \rightarrow k} f(x) = L$  es lo mismo que  $f(x) \rightarrow L$  cuando  $x \rightarrow k$ .

## Cambio de Variable

En la Definición 7 vimos que  $\lim_{x \rightarrow k} f(x) = L$  es lo mismo que  $f(x) \rightarrow L$  cuando  $x \rightarrow k$ .

Ahora bien, podríamos considerar a  $f(x)$  como una variable de la cual depende la función  $g$ .

## Cambio de Variable

En la Definición 7 vimos que  $\lim_{x \rightarrow k} f(x) = L$  es lo mismo que  $f(x) \rightarrow L$  cuando  $x \rightarrow k$ .

Ahora bien, podríamos considerar a  $f(x)$  como una variable de la cual depende la función  $g$ .

Luego, podemos plantear la posible existencia de  $\lim_{f(x) \rightarrow L} g(f(x)) = M$ , o bien,  $g(f(x)) \rightarrow M$  cuando  $f(x) \rightarrow L$ .

## Cambio de Variable

En la Definición 7 vimos que  $\lim_{x \rightarrow k} f(x) = L$  es lo mismo que  $f(x) \rightarrow L$  cuando  $x \rightarrow k$ .

Ahora bien, podríamos considerar a  $f(x)$  como una variable de la cual depende la función  $g$ .

Luego, podemos plantear la posible existencia de  $\lim_{f(x) \rightarrow L} g(f(x)) = M$ , o

bien,  $g(f(x)) \rightarrow M$  cuando  $f(x) \rightarrow L$ .

Combinando las ideas anteriores tenemos

$$[x \rightarrow k \implies f(x) \rightarrow L] \wedge [f(x) \rightarrow L \implies g(f(x)) \rightarrow M] \implies [x \rightarrow k \implies g(f(x)) \rightarrow M].$$

# Cambio de Variable

En la Definición 7 vimos que  $\lim_{x \rightarrow k} f(x) = L$  es lo mismo que  $f(x) \rightarrow L$  cuando  $x \rightarrow k$ .

Ahora bien, podríamos considerar a  $f(x)$  como una variable de la cual depende la función  $g$ .

Luego, podemos plantear la posible existencia de  $\lim_{f(x) \rightarrow L} g(f(x)) = M$ , o

bien,  $g(f(x)) \rightarrow M$  cuando  $f(x) \rightarrow L$ .

Combinando las ideas anteriores tenemos

$$[x \rightarrow k \Rightarrow f(x) \rightarrow L] \wedge [f(x) \rightarrow L \Rightarrow g(f(x)) \rightarrow M] \Rightarrow [x \rightarrow k \Rightarrow g(f(x)) \rightarrow M].$$

## Ejemplo 11

Obtenga  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\frac{\sqrt{x+1}-1}{x} + 2,5} - \frac{1}{3} \right) \div \left( \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} - 0,5 \right).$

# Cambio de Variable

En la Definición 7 vimos que  $\lim_{x \rightarrow k} f(x) = L$  es lo mismo que  $f(x) \rightarrow L$  cuando  $x \rightarrow k$ .

Ahora bien, podríamos considerar a  $f(x)$  como una variable de la cual depende la función  $g$ .

Luego, podemos plantear la posible existencia de  $\lim_{f(x) \rightarrow L} g(f(x)) = M$ , o

bien,  $g(f(x)) \rightarrow M$  cuando  $f(x) \rightarrow L$ .

Combinando las ideas anteriores tenemos

$$[x \rightarrow k \Rightarrow f(x) \rightarrow L] \wedge [f(x) \rightarrow L \Rightarrow g(f(x)) \rightarrow M] \Rightarrow [x \rightarrow k \Rightarrow g(f(x)) \rightarrow M].$$

## Ejemplo 11

Obtenga  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\frac{\sqrt{x+1}-1}{x} + 2,5} - \frac{1}{3} \right) \div \left( \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} - 0,5 \right).$

## Solución 11

Usando las Soluciones 8 y 9 tenemos que el límite es  $-\frac{1}{9}$ .

# Número $e$ como Límite

## Proposición 9

*El número  $e \approx 2,718281828459\dots$  (número de Euler o constante de Napier) se puede definir de la siguiente manera:*

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e \quad \left( = {}^3 \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{x} \right)^x \right)$$

---

<sup>3</sup>Próximamente le daremos énfasis a los límites cuando  $x$  tiende al infinito.

<sup>4</sup>Hay otros límites especiales que no abarcaremos en este curso.

# Número $e$ como Límite

## Proposición 9

*El número  $e \approx 2,718281828459\dots$  (número de Euler o constante de Napier) se puede definir de la siguiente manera:*

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e \quad \left( = {}^3 \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{x} \right)^x \right)$$

A este límite, junto con los de las Proposiciones 10 y 11, los llamaremos *límites especiales*<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup>Próximamente le daremos énfasis a los límites cuando  $x$  tiende al infinito.

<sup>4</sup>Hay otros límites especiales que no abarcaremos en este curso.



# Número $e$ como Límite

## Proposición 9

*El número  $e \approx 2,718281828459\dots$  (número de Euler o constante de Napier) se puede definir de la siguiente manera:*

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e \quad \left( = {}^3 \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{x} \right)^x \right)$$

A este límite, junto con los de las Proposiciones 10 y 11, los llamaremos *límites especiales*<sup>4</sup>.

## Propuesto 5

Verifique esto evaluando la función  $f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}}$  para valores de  $x$  arbitrariamente cercanos a 0.

---

<sup>3</sup>Próximamente le daremos énfasis a los límites cuando  $x$  tiende al infinito.

<sup>4</sup>Hay otros límites especiales que no abarcaremos en este curso.

# Límites Especiales

## Proposición 10

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

# Límites Especiales

## Proposición 10

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

## Demostración.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln e = 1.$$



# Límites Especiales (cont.)

## Proposición 11

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x) - 1}{x} = 1$$

# Límites Especiales (cont.)

## Proposición 11

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x) - 1}{x} = 1$$

### Demostración.

Sea  $\exp(x) - 1 = y$ , de modo que  $x \rightarrow 0 \implies y \rightarrow 0$ . A partir de esto podemos despejar  $x = \ln(1 + y)$ . Por lo tanto, utilizando el cambio de variable, el límite es equivalente a

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x) - 1}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\ln(1 + y)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\ln(1 + y)}{y}} = 1.$$



# Ejercicios: Límites Especiales

## Propuesto 6

Demuestre que,  $\forall a > 0$ ,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a.$$

**Hint:** Proceda de manera análoga a la demostración de la Proposición 11.

## Propuesto 7

Demuestre que,  $\forall a > 0$ ,

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + ax)^{\frac{1}{x}} = \exp(a).$$

**Hint:** Utilice un 1 conveniente en el exponente y luego aplique la Proposición 9.

# Ejercicios: Límites Especiales (cont.)

## Propuesto 8

Demuestre que,  $\forall a > 0$ ,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+ax)}{x} = a.$$

**Hint:** Proceda de manera análoga a la demostración de la Proposición 10 y utilice el resultado del Propuesto 7.

## Propuesto 9

Demuestre que,  $\forall a > 0$ ,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{x} = a.$$

**Hint:** Utilice un 1 conveniente en el exponente y aplique la Proposición 9. Luego, utilice otro 1 conveniente sobre su resultado para finalmente aplicar la Proposición 11 con un cambio de variable.

# MÓDULO 6

► [Volver al Inicio de la Sección](#)



# Límites al Infinito

Hasta ahora hemos revisado cómo se comporta una función  $f(x)$  a medida que  $x$  tiende a algún valor constante  $k$ .

# Límites al Infinito

Hasta ahora hemos revisado cómo se comporta una función  $f(x)$  a medida que  $x$  tiende a algún valor constante  $k$ .

Sin embargo, en ocasiones nos puede interesar qué ocurre con la función cuando  $x$  crece (o decrece) indeterminadamente, es decir, qué le pasa a  $f(x)$  cuando  $x \rightarrow \infty$  (o  $x \rightarrow -\infty$ ).

# Límites al Infinito

Hasta ahora hemos revisado cómo se comporta una función  $f(x)$  a medida que  $x$  tiende a algún valor constante  $k$ .

Sin embargo, en ocasiones nos puede interesar qué ocurre con la función cuando  $x$  crece (o decrece) indeterminadamente, es decir, qué le pasa a  $f(x)$  cuando  $x \rightarrow \infty$  (o  $x \rightarrow -\infty$ ).

## Ejemplo 12

Grafique  $f(x) = \frac{1}{x}$  en el primer cuadrante y obtenga  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ .

# Límites al Infinito

Hasta ahora hemos revisado cómo se comporta una función  $f(x)$  a medida que  $x$  tiende a algún valor constante  $k$ .

Sin embargo, en ocasiones nos puede interesar qué ocurre con la función cuando  $x$  crece (o decrece) indeterminadamente, es decir, qué le pasa a  $f(x)$  cuando  $x \rightarrow \infty$  (o  $x \rightarrow -\infty$ ).

## Ejemplo 12

Grafique  $f(x) = \frac{1}{x}$  en el primer cuadrante y obtenga  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ .

## Solución 12

Figura 10: Límite hacia el infinito



# Límites al Infinito

Hasta ahora hemos revisado cómo se comporta una función  $f(x)$  a medida que  $x$  tiende a algún valor constante  $k$ .


Sin embargo, en ocasiones nos puede interesar qué ocurre con la función cuando  $x$  crece (o decrece) indeterminadamente, es decir, qué le pasa a  $f(x)$  cuando  $x \rightarrow \infty$  (o  $x \rightarrow -\infty$ ).

## Ejemplo 12

Grafique  $f(x) = \frac{1}{x}$  en el primer cuadrante y obtenga  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ .

## Solución 12

Figura 10: Límite hacia el infinito



A medida que  $x$  se vuelve arbitrariamente grande, la función se acerca cada vez más a 0...

# Límites al Infinito

Hasta ahora hemos revisado cómo se comporta una función  $f(x)$  a medida que  $x$  tiende a algún valor constante  $k$ .


Sin embargo, en ocasiones nos puede interesar qué ocurre con la función cuando  $x$  crece (o decrece) indeterminadamente, es decir, qué le pasa a  $f(x)$  cuando  $x \rightarrow \infty$  (o  $x \rightarrow -\infty$ ).

## Ejemplo 12

Grafique  $f(x) = \frac{1}{x}$  en el primer cuadrante y obtenga  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ .

## Solución 12

Figura 10: Límite hacia el infinito



A medida que  $x$  se vuelve arbitrariamente grande, la función se acerca cada vez más a 0...

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

## Límites al Infinito (cont.)

Al igual que en los casos anteriores, es importante notar que no nos interesa “evaluar  $x$  en infinito” (de hecho, esto es conceptualmente imposible), sino que queremos saber cómo se comporta la función cuando  $x$  “se aproxima” al infinito, ya sea positivo o negativo.

## Límites al Infinito (cont.)

Al igual que en los casos anteriores, es importante notar que no nos interesa “evaluar  $x$  en infinito” (de hecho, esto es conceptualmente imposible), sino que queremos saber cómo se comporta la función cuando  $x$  “se aproxima” al infinito, ya sea positivo o negativo.

### Ejemplo 13

Obtenga  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{x+1}$ .



## Límites al Infinito (cont.)

Al igual que en los casos anteriores, es importante notar que no nos interesa “evaluar  $x$  en infinito” (de hecho, esto es conceptualmente imposible), sino que queremos saber cómo se comporta la función cuando  $x$  “se aproxima” al infinito, ya sea positivo o negativo.

### Ejemplo 13

Obtenga  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{x+1}$ .

### Solución 13

Notamos que no tiene sentido hablar de “evaluar  $x$  en menos infinito”, pues tendríamos un resultado de la forma  $\infty/\infty$ .

## Límites al Infinito (cont.)

Al igual que en los casos anteriores, es importante notar que no nos interesa “evaluar  $x$  en infinito” (de hecho, esto es conceptualmente imposible), sino que queremos saber cómo se comporta la función cuando  $x$  “se aproxima” al infinito, ya sea positivo o negativo.

### Ejemplo 13

Obtenga  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{x+1}$ .

### Solución 13

Notamos que no tiene sentido hablar de “evaluar  $x$  en menos infinito”, pues tendríamos un resultado de la forma  $\infty/\infty$ .

Sin embargo, podemos reescribir el límite como

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x/x}{x/x + 1/x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{1 + 1/x},$$

## Límites al Infinito (cont.)

Al igual que en los casos anteriores, es importante notar que no nos interesa “evaluar  $x$  en infinito” (de hecho, esto es conceptualmente imposible), sino que queremos saber cómo se comporta la función cuando  $x$  “se aproxima” al infinito, ya sea positivo o negativo.

### Ejemplo 13

Obtenga  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{x+1}$ .

### Solución 13

Notamos que no tiene sentido hablar de “evaluar  $x$  en menos infinito”, pues tendríamos un resultado de la forma  $\infty/\infty$ .

Sin embargo, podemos reescribir el límite como

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x/x}{x/x + 1/x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{1 + 1/x},$$

donde esto lo podemos hacer porque “no evaluamos  $x$  en infinito”.

## Límites al Infinito (cont.)

Al igual que en los casos anteriores, es importante notar que no nos interesa “evaluar  $x$  en infinito” (de hecho, esto es conceptualmente imposible), sino que queremos saber cómo se comporta la función cuando  $x$  “se aproxima” al infinito, ya sea positivo o negativo.

### Ejemplo 13

Obtenga  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{x+1}$ .

### Solución 13

Notamos que no tiene sentido hablar de “evaluar  $x$  en menos infinito”, pues tendríamos un resultado de la forma  $\infty/\infty$ .

Sin embargo, podemos reescribir el límite como

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x/x}{x/x + 1/x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{1 + 1/x},$$

donde esto lo podemos hacer porque “no evaluamos  $x$  en infinito”. Por último, notamos que el segundo término en el denominador tiende a 0 (al igual que en el Ejemplo 12).

## Límites al Infinito (cont.)

Al igual que en los casos anteriores, es importante notar que no nos interesa “evaluar  $x$  en infinito” (de hecho, esto es conceptualmente imposible), sino que queremos saber cómo se comporta la función cuando  $x$  “se aproxima” al infinito, ya sea positivo o negativo.

### Ejemplo 13

Obtenga  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{x+1}$ .

### Solución 13

Notamos que no tiene sentido hablar de “evaluar  $x$  en menos infinito”, pues tendríamos un resultado de la forma  $\infty/\infty$ .

Sin embargo, podemos reescribir el límite como

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x/x}{x/x + 1/x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{1 + 1/x},$$

donde esto lo podemos hacer porque “no evaluamos  $x$  en infinito”.

Por último, notamos que el segundo término en el denominador

tiende a 0 (al igual que en el Ejemplo 12).  $\therefore \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{x+1} = 2$ .

# Convergencia v.s. Divergencia

converger (Del lat. convergĕre):

1. intr. Dicho de dos o más líneas: Tender a unirse en un punto.
2. intr. Coincidir en la misma posición ante algo controvertido.
3. intr. Mat. Dicho de una sucesión: Aproximarse a un límite.
4. intr. Med. Confluir distintos impulsos sensoriales en una sola neurona, como en la actividad motora.

# Convergencia v.s. Divergencia

converger (Del lat. convergĕre):

1. intr. Dicho de dos o más líneas: Tender a unirse en un punto.
2. intr. Coincidir en la misma posición ante algo controvertido.
3. intr. Mat. Dicho de una sucesión: Aproximarse a un límite.
4. intr. Med. Confluir distintos impulsos sensoriales en una sola neurona, como en la actividad motora.

divergir (Del lat. divergĕre):

1. intr. Dicho de dos o más líneas o superficies: Irse apartando sucesivamente unas de otras.
2. intr. Discordar, discrepar.

# Convergencia v.s. Divergencia

converger (Del lat. converġere):

1. intr. Dicho de dos o más líneas: Tender a unirse en un punto.
2. intr. Coincidir en la misma posición ante algo controvertido.
3. intr. Mat. Dicho de una sucesión: Aproximarse a un límite.
4. intr. Med. Confluir distintos impulsos sensoriales en una sola neurona, como en la actividad motora.

divergir (Del lat. diverġere):

1. intr. Dicho de dos o más líneas o superficies: Irse apartando sucesivamente unas de otras.
2. intr. Discordar, discrepar.

*Real Academia Española © Todos los derechos reservados*



# Convergencia v.s. Divergencia

converger (Del lat. convergĕre):

1. intr. Dicho de dos o más líneas: Tender a unirse en un punto.
2. intr. Coincidir en la misma posición ante algo controvertido.
3. intr. Mat. Dicho de una sucesión: Aproximarse a un límite.
4. intr. Med. Confluir distintos impulsos sensoriales en una sola neurona, como en la actividad motora.

divergir (Del lat. divergĕre):

1. intr. Dicho de dos o más líneas o superficies: Irse apartando sucesivamente unas de otras.
2. intr. Discordar, discrepar.

*Real Academia Española © Todos los derechos reservados*

Hasta ahora sólo hemos trabajado con límites convergentes, es decir, funciones que se acercan a un valor dado cuando la variable tiende a algún punto.

# Convergencia v.s. Divergencia

converger (Del lat. convergĕre):

1. intr. Dicho de dos o más líneas: Tender a unirse en un punto.
2. intr. Coincidir en la misma posición ante algo controvertido.
3. intr. Mat. Dicho de una sucesión: Aproximarse a un límite.
4. intr. Med. Confluir distintos impulsos sensoriales en una sola neurona, como en la actividad motora.

divergir (Del lat. divergĕre):

1. intr. Dicho de dos o más líneas o superficies: Irse apartando sucesivamente unas de otras.
2. intr. Discordar, discrepar.

*Real Academia Española © Todos los derechos reservados*

Hasta ahora sólo hemos trabajado con límites convergentes, es decir, funciones que se acercan a un valor dado cuando la variable tiende a algún punto. Sin embargo, esto no tiene por qué ser siempre así...

# Límites Infinitos

## Ejemplo 14

Similar al Ejemplo 12, grafique  $f(x) = \frac{1}{x}$  en el primer cuadrante y obtenga  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ .

## Solución 14

Figura 11: Límite infinito



# Límites Infinitos

## Ejemplo 14

Similar al Ejemplo 12, grafique  $f(x) = \frac{1}{x}$  en el primer cuadrante y obtenga  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ .

## Solución 14

Figura 11: Límite infinito



En efecto, a medida que  $x$  se acerca a 0 por la derecha, el valor de  $\frac{1}{x}$  se vuelve arbitrariamente grande, esto es, tiende a infinito positivo...

# Límites Infinitos

## Ejemplo 14

Similar al Ejemplo 12, grafique  $f(x) = \frac{1}{x}$  en el primer cuadrante y obtenga  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ .

## Solución 14

Figura 11: Límite infinito



En efecto, a medida que  $x$  se acerca a 0 por la derecha, el valor de  $\frac{1}{x}$  se vuelve arbitrariamente grande, esto es, tiende a infinito positivo...

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$


# Límites Infinitos

## Ejemplo 14

Similar al Ejemplo 12, grafique  $f(x) = \frac{1}{x}$  en el primer cuadrante y obtenga  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ .

## Solución 14

Figura 11: Límite infinito



En efecto, a medida que  $x$  se acerca a 0 por la derecha, el valor de  $\frac{1}{x}$  se vuelve arbitrariamente grande, esto es, tiende a infinito positivo...

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

En este caso se dice que  $f(x)$  *diverge* cuando  $x \rightarrow 0^+$ .

# Divergencia en el Infinito

Además de divergir cuando  $x$  tiende a algún valor particular, puede darse que una función diverja cuando  $x$  tienda a  $+\infty$  o  $-\infty$ .

## Divergencia en el Infinito

Además de divergir cuando  $x$  tiende a algún valor particular, puede darse que una función diverja cuando  $x$  tienda a  $+\infty$  o  $-\infty$ .

### Ejemplo 15

Sea  $f(x) = \frac{x^3 - 2x^2 + 3x - 4}{5x^2 - 6x + 7}$ . Obtenga  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ .



# Divergencia en el Infinito

Además de divergir cuando  $x$  tiende a algún valor particular, puede darse que una función diverja cuando  $x$  tienda a  $+\infty$  o  $-\infty$ .

## Ejemplo 15

Sea  $f(x) = \frac{x^3 - 2x^2 + 3x - 4}{5x^2 - 6x + 7}$ . Obtenga  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ .

## Solución 15

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3/x^2 - 2x^2/x^2 + 3x/x^2 - 4/x^2}{5x^2/x^2 - 6x/x^2 + 7/x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 2}{5} = \infty$$

# Divergencia en el Infinito

Además de divergir cuando  $x$  tiende a algún valor particular, puede darse que una función diverja cuando  $x$  tienda a  $+\infty$  o  $-\infty$ .

## Ejemplo 15

Sea  $f(x) = \frac{x^3 - 2x^2 + 3x - 4}{5x^2 - 6x + 7}$ . Obtenga  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ .

## Solución 15

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3/x^2 - 2x^2/x^2 + 3x/x^2 - 4/x^2}{5x^2/x^2 - 6x/x^2 + 7/x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 2}{5} = \infty$$

## Propuesto 10

Grafique cualquier polinomio y observe qué ocurre cuando  $x \rightarrow +\infty$  o cuando  $x \rightarrow -\infty$ .

# Divergencia en el Infinito

Además de divergir cuando  $x$  tiende a algún valor particular, puede darse que una función diverja cuando  $x$  tienda a  $+\infty$  o  $-\infty$ .

## Ejemplo 15

Sea  $f(x) = \frac{x^3 - 2x^2 + 3x - 4}{5x^2 - 6x + 7}$ . Obtenga  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ .

## Solución 15

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3/x^2 - 2x^2/x^2 + 3x/x^2 - 4/x^2}{5x^2/x^2 - 6x/x^2 + 7/x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 2}{5} = \infty$$

## Propuesto 10

Grafique cualquier polinomio y observe qué ocurre cuando  $x \rightarrow +\infty$  o cuando  $x \rightarrow -\infty$ .

## Propuesto 11

Repita lo anterior con el logaritmo de cualquier polinomio positivo.

# Divergencia en el Infinito

Además de divergir cuando  $x$  tiende a algún valor particular, puede darse que una función diverja cuando  $x$  tienda a  $+\infty$  o  $-\infty$ .

## Ejemplo 15

Sea  $f(x) = \frac{x^3 - 2x^2 + 3x - 4}{5x^2 - 6x + 7}$ . Obtenga  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ .

## Solución 15

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3/x^2 - 2x^2/x^2 + 3x/x^2 - 4/x^2}{5x^2/x^2 - 6x/x^2 + 7/x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 2}{5} = \infty$$

## Propuesto 10

Grafique cualquier polinomio y observe qué ocurre cuando  $x \rightarrow +\infty$  o cuando  $x \rightarrow -\infty$ .

## Propuesto 11

Repita lo anterior con el logaritmo de cualquier polinomio positivo.

## Propuesto 12

Ahora con la raíz de cualquier polinomio positivo.

# Convergencia en el Infinito

Tal como vimos en el Ejemplo 12, pueden existir distintas funciones que convergen cuando  $x$  tiende a infinito positivo o negativo.

---

<sup>5</sup>Más adelante veremos cómo calcular estas tasas de crecimiento.

# Convergencia en el Infinito

Tal como vimos en el Ejemplo 12, pueden existir distintas funciones que convergen cuando  $x$  tiende a infinito positivo o negativo.

## Ejemplo 16

En macroeconomía se habla de la idea de “convergencia en crecimiento” (crecimiento en el PIB), que básicamente indica que en el largo plazo, todos los países tienden a crecer a la misma tasa<sup>5</sup> (y la brecha entre sus productos será menor). Suponga que el crecimiento de cualquier economía depende de su nivel de producto  $Y$  de la forma  $f(Y) = \frac{1}{2\sqrt{Y}}$ . ¿Por qué se justificaría esta hipótesis de convergencia en crecimiento?

---

<sup>5</sup>Más adelante veremos cómo calcular estas tasas de crecimiento.

# Convergencia en el Infinito

Tal como vimos en el Ejemplo 12, pueden existir distintas funciones que convergen cuando  $x$  tiende a infinito positivo o negativo.

## Ejemplo 16

En macroeconomía se habla de la idea de “convergencia en crecimiento” (crecimiento en el PIB), que básicamente indica que en el largo plazo, todos los países tienden a crecer a la misma tasa<sup>5</sup> (y la brecha entre sus productos será menor). Suponga que el crecimiento de cualquier economía depende de su nivel de producto  $Y$  de la forma  $f(Y) = \frac{1}{2\sqrt{Y}}$ . ¿Por qué se justificaría esta hipótesis de convergencia en crecimiento?

## Solución 16

Porque a medida que el nivel del producto crece, el crecimiento de este producto es cada vez menor. En el límite, un país con un PIB arbitrariamente grande simplemente no crecerá, de modo que los países más pequeños, que sí tienen crecimiento positivo, lo van a alcanzar, esto es, van a converger.

<sup>5</sup>Más adelante veremos cómo calcular estas tasas de crecimiento.

## **Cambio de Variable (cont.)**

Utilizando límites infinitos y en el infinito se pueden hacer cambios de variables muy útiles.



## Cambio de Variable (cont.)

Utilizando límites infinitos y en el infinito se pueden hacer cambios de variables muy útiles.

En la Proposición 9, indicamos que  $\lim_{y \rightarrow 0} (1+y)^{\frac{1}{y}} = e$ .

## Cambio de Variable (cont.)

Utilizando límites infinitos y en el infinito se pueden hacer cambios de variables muy útiles.

En la Proposición 9, indicamos que  $\lim_{y \rightarrow 0} (1+y)^{\frac{1}{y}} = e$ . Con un cambio de variable se puede obtener una versión alternativa de este límite...

## Cambio de Variable (cont.)

Utilizando límites infinitos y en el infinito se pueden hacer cambios de variables muy útiles.

En la Proposición 9, indicamos que  $\lim_{y \rightarrow 0} (1+y)^{\frac{1}{y}} = e$ . Con un cambio de variable se puede obtener una versión alternativa de este límite...

### Proposición 12

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

## Cambio de Variable (cont.)

Utilizando límites infinitos y en el infinito se pueden hacer cambios de variables muy útiles.

En la Proposición 9, indicamos que  $\lim_{y \rightarrow 0} (1+y)^{\frac{1}{y}} = e$ . Con un cambio de variable se puede obtener una versión alternativa de este límite...

### Proposición 12

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

### Demostración.

Sea  $x = \frac{1}{y}$ , de modo que  $y \rightarrow 0^+ \implies x \rightarrow \infty$ .

## Cambio de Variable (cont.)

Utilizando límites infinitos y en el infinito se pueden hacer cambios de variables muy útiles.

En la Proposición 9, indicamos que  $\lim_{y \rightarrow 0} (1+y)^{\frac{1}{y}} = e$ . Con un cambio de variable se puede obtener una versión alternativa de este límite...

### Proposición 12

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

### Demostración.

Sea  $x = \frac{1}{y}$ , de modo que  $y \rightarrow 0^+ \implies x \rightarrow \infty$ . Reemplazando esto en la


Proposición 9 se obtiene  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ . □

### Propuesto 13

Mostrar que lo anterior también se cumple cuando  $x \rightarrow -\infty$ .

# Gráficos: Límites Especiales

Figura 12: Proposición 9




# Gráficos: Límites Especiales

Figura 13: Proposición 10



# Gráficos: Límites Especiales

Figura 14: Proposición 11





# Gráficos: Límites Especiales

Figura 15: Proposición 12



# Aplicación: Interés Compuesto

## Ejemplo 17

Suponga que se le ofrece un proyecto de inversión que paga una tasa anual igual a  $r$ . Se le permite capitalizar de manera compuesta esta inversión  $n$  veces (las que usted quiera), de modo que en cada uno de los  $n$  períodos se obtiene una rentabilidad de  $r/n$ . Uno podría pensar que al aumentar  $n$  indefinidamente se pueden obtener ganancias arbitrariamente grandes, pues el interés compuesto se capitalizaría de manera exponencial. Sin embargo, la institución que le ofrece esta inversión no está preocupada por que haga tender  $n$  a infinito. *¿Por qué?*

# Aplicación: Interés Compuesto

## Ejemplo 17

Suponga que se le ofrece un proyecto de inversión que paga una tasa anual igual a  $r$ . Se le permite capitalizar de manera compuesta esta inversión  $n$  veces (las que usted quiera), de modo que en cada uno de los  $n$  períodos se obtiene una rentabilidad de  $r/n$ . Uno podría pensar que al aumentar  $n$  indefinidamente se pueden obtener ganancias arbitrariamente grandes, pues el interés compuesto se capitalizaría de manera exponencial. Sin embargo, la institución que le ofrece esta inversión no está preocupada por que haga tender  $n$  a infinito. *¿Por qué?*

## Solución 17

No le preocupa porque  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n$  converge...

# Aplicación: Interés Compuesto

## Ejemplo 17

Suponga que se le ofrece un proyecto de inversión que paga una tasa anual igual a  $r$ . Se le permite capitalizar de manera compuesta esta inversión  $n$  veces (las que usted quiera), de modo que en cada uno de los  $n$  períodos se obtiene una rentabilidad de  $r/n$ . Uno podría pensar que al aumentar  $n$  indefinidamente se pueden obtener ganancias arbitrariamente grandes, pues el interés compuesto se capitalizaría de manera exponencial. Sin embargo, la institución que le ofrece esta inversión no está preocupada por que haga tender  $n$  a infinito. *¿Por qué?*

## Solución 17

No le preocupa porque  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n$  converge...

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n/r}\right)^{rn/r} = e^r.$$

# Asíntotas Horizontales

## Definición 9

$y = L$  es una *asíntota horizontal* de  $f(x)$  si se cumple que  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$   
o bien  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ .

# Asíntotas Horizontales

## Definición 9

$y = L$  es una *asíntota horizontal* de  $f(x)$  si se cumple que  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$   
o bien  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ .

Figura 16: Asíntota horizontal



## **Asíntotas Horizontales (cont.)**

Estas asíntotas horizontales pueden ser múltiples (dos):

## Asíntotas Horizontales (cont.)

Estas asíntotas horizontales pueden ser múltiples (dos):

Figura 17: Múltiples asíntotas horizontales



*¿Por qué no pueden ser más de dos?*



# Ejemplo: Asíntotas Horizontales

## Ejemplo 18

Obtenga las asíntotas horizontales de la función  $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}$ .  
Grafique.

# Ejemplo: Asíntotas Horizontales

## Ejemplo 18

Obtenga las asíntotas horizontales de la función  $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}$ .  
Grafique.

## Solución 18

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$  y  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$  (*¿por qué?*), por lo que las asíntotas son  $y_1 = 1$  e  $y_2 = -1$ . El gráfico es equivalente al de la Figura 17.

# Asíntotas Verticales

## Definición 10

$x = k$  es una *asíntota vertical* de  $f(x)$  si se cumple que  $\lim_{x \rightarrow k} f(x) = \infty$  o bien  $\lim_{x \rightarrow k} f(x) = -\infty$ .

# Asíntotas Verticales

## Definición 10

$x = k$  es una *asíntota vertical* de  $f(x)$  si se cumple que  $\lim_{x \rightarrow k} f(x) = \infty$  o bien  $\lim_{x \rightarrow k} f(x) = -\infty$ .

Figura 18: Asíntota vertical



## **Asíntotas Verticales (cont.)**

Estas asíntotas verticales también pueden ser múltiples (dos o más):

## Asíntotas Verticales (cont.)

Estas asíntotas verticales también pueden ser múltiples (dos o más):

Figura 19: Múltiples asíntotas verticales



# Ejemplo: Asíntotas Verticales

## Ejemplo 19

Obtenga todas las asíntotas de la función  $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4}$ . Grafique.

## Ejemplo: Asíntotas Verticales

### Ejemplo 19

Obtenga todas las asíntotas de la función  $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4}$ . Grafique.

### Solución 19

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ , por lo que  $y = 1$  es la única asíntota horizontal. Por último, la función diverge cuando  $x \rightarrow 2$  y cuando  $x \rightarrow -2$ , por lo que  $x_1 = 2$  y  $x_2 = -2$  son ambas asíntotas verticales.



# Ejemplo: Asíntotas Verticales


## Ejemplo 19

Obtenga todas las asíntotas de la función  $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4}$ . Grafique.

## Solución 19

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ , por lo que  $y = 1$  es la única asíntota horizontal. Por último, la función diverge cuando  $x \rightarrow 2$  y cuando  $x \rightarrow -2$ , por lo que  $x_1 = 2$  y  $x_2 = -2$  son ambas asíntotas verticales.

Figura 20: Asíntotas verticales y horizontales



# Asíntotas Oblicuas

## Definición 11


$g(x) = mx + n$  es una *asíntota oblicua* de  $f(x)$  si se cumple que  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - g(x) = 0$  o bien  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - g(x) = 0$ .

# Asíntotas Oblicuas

## Definición 11

$g(x) = mx + n$  es una *asíntota oblicua* de  $f(x)$  si se cumple que  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - g(x) = 0$  o bien  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - g(x) = 0$ .

Figura 21: Asíntota oblicua



## **Asíntotas Oblicuas (cont.)**

Estas asíntotas oblicuas pueden ser múltiples (dos):

## Asíntotas Oblicuas (cont.)

Estas asíntotas oblicuas pueden ser múltiples (dos):

Figura 22: Múltiples asíntotas oblicuas



## Asíntotas Oblicuas (cont.)

Estas asíntotas oblicuas pueden ser múltiples (dos):

Figura 22: Múltiples asíntotas oblicuas



*¿Por qué no pueden ser más de dos?*

# Álgebra: Asíntotas Oblicuas

En base a la Definición 11, sabemos que se debe cumplir que si  $g(x)$  es la asíntota oblicua de  $f(x)$ , entonces  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - g(x) = 0$ .

# Álgebra: Asíntotas Oblicuas

En base a la Definición 11, sabemos que se debe cumplir que si  $g(x)$  es la asíntota oblicua de  $f(x)$ , entonces  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - g(x) = 0$ .

Luego, si la asíntota existe, se cumple que  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} - \frac{g(x)}{x} = 0$ .



# Álgebra: Asíntotas Oblicuas

En base a la Definición 11, sabemos que se debe cumplir que si  $g(x)$  es la asíntota oblicua de  $f(x)$ , entonces  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - g(x) = 0$ .

Luego, si la asíntota existe, se cumple que  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} - \frac{g(x)}{x} = 0$ .

Pero sabemos que  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{mx + n}{x} = m$ .

# Álgebra: Asíntotas Oblicuas

En base a la Definición 11, sabemos que se debe cumplir que si  $g(x)$  es la asíntota oblicua de  $f(x)$ , entonces  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - g(x) = 0$ .

Luego, si la asíntota existe, se cumple que  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} - \frac{g(x)}{x} = 0$ .

Pero sabemos que  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{mx + n}{x} = m$ .

Por lo tanto,  $\boxed{\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = m}$ , siempre que la asíntota exista.

# Álgebra: Asíntotas Oblicuas

En base a la Definición 11, sabemos que se debe cumplir que si  $g(x)$  es la asíntota oblicua de  $f(x)$ , entonces  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - g(x) = 0$ .

Luego, si la asíntota existe, se cumple que  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} - \frac{g(x)}{x} = 0$ .

Pero sabemos que  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{mx + n}{x} = m$ .

Por lo tanto,  $\boxed{\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = m}$ , siempre que la asíntota exista.

Finalmente, tras computar  $m$  sabemos que  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} - (mx + n) = 0$

$$\iff \boxed{n = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} - mx}.$$

# Álgebra: Asíntotas Oblicuas

En base a la Definición 11, sabemos que se debe cumplir que si  $g(x)$  es la asíntota oblicua de  $f(x)$ , entonces  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - g(x) = 0$ .

Luego, si la asíntota existe, se cumple que  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} - \frac{g(x)}{x} = 0$ .

Pero sabemos que  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{mx + n}{x} = m$ .

Por lo tanto,  $\boxed{\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = m}$ , siempre que la asíntota exista.

Finalmente, tras computar  $m$  sabemos que  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} - (mx + n) = 0$

$$\iff \boxed{n = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} - mx}.$$

Con  $m$  y  $n$  computados podemos determinar  $g(x)$ .

# Ejemplo: Asíntotas Oblicuas

## Ejemplo 20

Obtenga la asíntota oblicua de la función  $f(x) = \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x + 2x^2}{x}$ .

# Ejemplo: Asíntotas Oblicuas

## Ejemplo 20

Obtenga la asíntota oblicua de la función  $f(x) = \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x + 2x^2}{x}$ .

## Solución 20

Sea  $g(x) = mx + n$  la asíntota oblicua.

# Ejemplo: Asíntotas Oblicuas

## Ejemplo 20

Obtenga la asíntota oblicua de la función  $f(x) = \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x + 2x^2}{x}$ .

## Solución 20

Sea  $g(x) = mx + n$  la asíntota oblicua.

Notamos que  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$ , de modo que  $m = 2$ .

# Ejemplo: Asíntotas Oblicuas

## Ejemplo 20

Obtenga la asíntota oblicua de la función  $f(x) = \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x + 2x^2}{x}$ .

## Solución 20

Sea  $g(x) = mx + n$  la asíntota oblicua.

Notamos que  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$ , de modo que  $m = 2$ .

Por último,  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - 2x = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - x = 0$ , por lo que  $n = 0$ .



# Ejemplo: Asíntotas Oblicuas

## Ejemplo 20

Obtenga la asíntota oblicua de la función  $f(x) = \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x + 2x^2}{x}$ .

## Solución 20

Sea  $g(x) = mx + n$  la asíntota oblicua.

Notamos que  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$ , de modo que  $m = 2$ .

Por último,  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - 2x = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - x = 0$ , por lo que  $n = 0$ .

Así,  $g(x) = 2x$  es la asíntota oblicua.

# MÓDULO 7

► [Volver al Inicio de la Sección](#)

# Sin Levantar el Lápiz

Anteriormente comentamos la existencia de funciones que “se pueden dibujar sin levantar el lápiz”.

# Sin Levantar el Lápiz

Anteriormente comentamos la existencia de funciones que “se pueden dibujar sin levantar el lápiz”.

Una de las ventajas de estas funciones es que el cálculo de cualquier límite en su dominio se podía obtener simplemente reemplazando el argumento de la función por el valor hacia el cual tiende la variable independiente en el límite que se desea calcular.

# Sin Levantar el Lápiz

Anteriormente comentamos la existencia de funciones que “se pueden dibujar sin levantar el lápiz”.

Una de las ventajas de estas funciones es que el cálculo de cualquier límite en su dominio se podía obtener simplemente reemplazando el argumento de la función por el valor hacia el cual tiende la variable independiente en el límite que se desea calcular.

Dicho de otro modo, en estas funciones se cumple que

$$\lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k).$$

# Definición de Continuidad

## Definición 12

Una función  $f(x)$  se dice *continua* en  $x = k$  si se cumple que  $k \in \text{Dom } f$  (i.e. la función está definida en  $k$ ) y además

$$\lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k).$$

# Definición de Continuidad

## Definición 12

Una función  $f(x)$  se dice *continua* en  $x = k$  si se cumple que  $k \in \text{Dom } f$  (i.e. la función está definida en  $k$ ) y además

$$\lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k).$$

## Definición 13

Una función  $f(x)$  se dice continua en el intervalo  $[a, b]$  si es continua en cualquier  $k \in [a, b]$ .

# Definición de Continuidad

## Definición 12

Una función  $f(x)$  se dice *continua* en  $x = k$  si se cumple que  $k \in \text{Dom } f$  (i.e. la función está definida en  $k$ ) y además

$$\lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k).$$

## Definición 13

Una función  $f(x)$  se dice continua en el intervalo  $[a, b]$  si es continua en cualquier  $k \in [a, b]$ .

Las funciones continuas son justamente aquellas que “se pueden dibujar sin levantar el lápiz”, esto es, son funciones que no tienen “hoyos” ni “saltos”.



# Definición de Continuidad

## Definición 12

Una función  $f(x)$  se dice *continua* en  $x = k$  si se cumple que  $k \in \text{Dom } f$  (i.e. la función está definida en  $k$ ) y además

$$\lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k).$$

## Definición 13

Una función  $f(x)$  se dice continua en el intervalo  $[a, b]$  si es continua en cualquier  $k \in [a, b]$ .

Las funciones continuas son justamente aquellas que “se pueden dibujar sin levantar el lápiz”, esto es, son funciones que no tienen “hoyos” ni “saltos”.

Otra forma de interpretarlas es como funciones en las cuales *pequeños cambios en el argumento generan pequeños cambios en el valor de la función*.

# Definición de Continuidad

## Definición 12

Una función  $f(x)$  se dice *continua* en  $x = k$  si se cumple que  $k \in \text{Dom } f$  (i.e. la función está definida en  $k$ ) y además

$$\lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k).$$

## Definición 13

Una función  $f(x)$  se dice continua en el intervalo  $[a, b]$  si es continua en cualquier  $k \in [a, b]$ .

Las funciones continuas son justamente aquellas que “se pueden dibujar sin levantar el lápiz”, esto es, son funciones que no tienen “hoyos” ni “saltos”.

Otra forma de interpretarlas es como funciones en las cuales *pequeños cambios en el argumento generan pequeños cambios en el valor de la función*.

Una función que no cumple esto se dice *discontinua*.


# Gráfico: Continuidad

Figura 23: Funciones Continuas en  $\mathbb{R}$




# Gráfico: Continuidad

Figura 23: Funciones Continuas en  $\mathbb{R}$



# Gráfico: Continuidad

Figura 23: Funciones Continuas en  $\mathbb{R}$




# Gráfico: Continuidad

Figura 23: Funciones Continuas en  $\mathbb{R}$




# Gráfico: Discontinuidad

Figura 24: Funciones Discontinuas en  $\mathbb{R}$



# Gráfico: Discontinuidad

Figura 24: Funciones Discontinuas en  $\mathbb{R}$





# Gráfico: Discontinuidad

Figura 24: Funciones Discontinuas en  $\mathbb{R}$



# Gráfico: Discontinuidad

Figura 24: Funciones Discontinuas en  $\mathbb{R}$



# Propiedades de Funciones Continuas

## Proposición 13

*La suma o resta de dos funciones continuas es también una función continua. Esto es, si  $f$  y  $g$  son continuas, entonces  $f \pm g$  también es continua.*

# Propiedades de Funciones Continuas

## Proposición 13

*La suma o resta de dos funciones continuas es también una función continua. Esto es, si  $f$  y  $g$  son continuas, entonces  $f \pm g$  también es continua.*

## Proposición 14

*El producto de dos funciones continuas es también una función continua. Esto es, si  $f$  y  $g$  son continuas, entonces  $f \cdot g$  también es continua.*

# Propiedades de Funciones Continuas

## Proposición 13

*La suma o resta de dos funciones continuas es también una función continua. Esto es, si  $f$  y  $g$  son continuas, entonces  $f \pm g$  también es continua.*

## Proposición 14

*El producto de dos funciones continuas es también una función continua. Esto es, si  $f$  y  $g$  son continuas, entonces  $f \cdot g$  también es continua.*

## Proposición 15

*El cociente entre dos funciones continuas es también una función continua si la función divisora es no nula. Esto es, si  $f$  y  $g$  son continuas, entonces  $\frac{f}{g}$  también es continua si  $g \neq 0$ .*

# Funciones Continuas

Hay funciones “típicas” que son continuas en su dominio.

# Funciones Continuas

Hay funciones “típicas” que son continuas en su dominio.

- Constantes:  $f(x) = c$ .

# Funciones Continuas

Hay funciones “típicas” que son continuas en su dominio.

- Constantes:  $f(x) = c$ .
- Polinomios:  $f(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$ .



# Funciones Continuas

Hay funciones “típicas” que son continuas en su dominio.

- Constantes:  $f(x) = c$ .
- Polinomios:  $f(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$ .
- Raíces:  $f(x) = \sqrt[n]{x}$ .

# Funciones Continuas

Hay funciones “típicas” que son continuas en su dominio.

- Constantes:  $f(x) = c$ .
- Polinomios:  $f(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$ .
- Raíces:  $f(x) = \sqrt[n]{x}$ .
- Logaritmos:  $f(x) = \log_a x$ .

# Funciones Continuas

Hay funciones “típicas” que son continuas en su dominio.

- Constantes:  $f(x) = c$ .
- Polinomios:  $f(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$ .
- Raíces:  $f(x) = \sqrt[n]{x}$ .
- Logaritmos:  $f(x) = \log_a x$ .
- Exponenciales:  $f(x) = a^x$ .

# Funciones Continuas

Hay funciones “típicas” que son continuas en su dominio.

- Constantes:  $f(x) = c$ .
- Polinomios:  $f(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$ .
- Raíces:  $f(x) = \sqrt[n]{x}$ .
- Logaritmos:  $f(x) = \log_a x$ .
- Exponenciales:  $f(x) = a^x$ .

# Funciones Continuas

Hay funciones “típicas” que son continuas en su dominio.

- Constantes:  $f(x) = c$ .
- Polinomios:  $f(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$ .
- Raíces:  $f(x) = \sqrt[n]{x}$ .
- Logaritmos:  $f(x) = \log_a x$ .
- Exponenciales:  $f(x) = a^x$ .

Juntando esto con la Proposición 16 podemos determinar fácilmente cómo son la mayoría de las funciones continuas:

## Proposición 16

*Sean  $f: X \rightarrow Y$  y  $g: Y \rightarrow Z$  dos funciones continuas. Entonces  $g \circ f$  también es una función continua.*

# Funciones Continuas

Hay funciones “típicas” que son continuas en su dominio.

- Constantes:  $f(x) = c$ .
- Polinomios:  $f(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$ .
- Raíces:  $f(x) = \sqrt[n]{x}$ .
- Logaritmos:  $f(x) = \log_a x$ .
- Exponenciales:  $f(x) = a^x$ .

Juntando esto con la Proposición 16 podemos determinar fácilmente cómo son la mayoría de las funciones continuas:

## Proposición 16

*Sean  $f: X \rightarrow Y$  y  $g: Y \rightarrow Z$  dos funciones continuas. Entonces  $g \circ f$  también es una función continua. Esto es, la composición de funciones continuas también es una función continua **siempre y cuando los dominios y codominios sean compatibles.***

# Ejemplo: Composición de Continuas

## Ejemplo 21

Sea  $f(x)$  un polinomio y sea  $g(x) = \ln x$  una función logarítmica. Entonces  $f(g(x))$  es continua en el dominio de  $g$ , pero  $g(f(x))$  no es continua en el dominio de  $f$ . Comente.

# Ejemplo: Composición de Continuas

## Ejemplo 21

Sea  $f(x)$  un polinomio y sea  $g(x) = \ln x$  una función logarítmica. Entonces  $f(g(x))$  es continua en el dominio de  $g$ , pero  $g(f(x))$  no es continua en el dominio de  $f$ . Comente.

## Solución 21

Incierto.



# Ejemplo: Composición de Continuas

## Ejemplo 21

Sea  $f(x)$  un polinomio y sea  $g(x) = \ln x$  una función logarítmica. Entonces  $f(g(x))$  es continua en el dominio de  $g$ , pero  $g(f(x))$  no es continua en el dominio de  $f$ . Comente.

## Solución 21

Incierto. En efecto, tanto  $f$  como  $g$  son funciones continuas en sus dominios, donde el dominio de  $f$  es  $\mathbb{R}$  y el de  $g$  es  $\mathbb{R}_{++}$ .

# Ejemplo: Composición de Continuas

## Ejemplo 21

Sea  $f(x)$  un polinomio y sea  $g(x) = \ln x$  una función logarítmica. Entonces  $f(g(x))$  es continua en el dominio de  $g$ , pero  $g(f(x))$  no es continua en el dominio de  $f$ . Comente.

## Solución 21

Incierto. En efecto, tanto  $f$  como  $g$  son funciones continuas en sus dominios, donde el dominio de  $f$  es  $\mathbb{R}$  y el de  $g$  es  $\mathbb{R}_{++}$ . La primera afirmación del comente es verdadera, pues como  $g$  toma valores en los reales, siempre se puede componer  $g$  en  $f$  y obtener una función continua por la Proposición 16.

# Ejemplo: Composición de Continuas

## Ejemplo 21

Sea  $f(x)$  un polinomio y sea  $g(x) = \ln x$  una función logarítmica. Entonces  $f(g(x))$  es continua en el dominio de  $g$ , pero  $g(f(x))$  no es continua en el dominio de  $f$ . Comente.

## Solución 21

Incierto. En efecto, tanto  $f$  como  $g$  son funciones continuas en sus dominios, donde el dominio de  $f$  es  $\mathbb{R}$  y el de  $g$  es  $\mathbb{R}_{++}$ . La primera afirmación del comente es verdadera, pues como  $g$  toma valores en los reales, siempre se puede componer  $g$  en  $f$  y obtener una función continua por la Proposición 16. Sin embargo, la segunda afirmación se cumple si y sólo si el recorrido de  $f$  no es siempre positivo.

# Ejemplo: Composición de Continuas

## Ejemplo 21

Sea  $f(x)$  un polinomio y sea  $g(x) = \ln x$  una función logarítmica. Entonces  $f(g(x))$  es continua en el dominio de  $g$ , pero  $g(f(x))$  no es continua en el dominio de  $f$ . Comente.

## Solución 21

Incierto. En efecto, tanto  $f$  como  $g$  son funciones continuas en sus dominios, donde el dominio de  $f$  es  $\mathbb{R}$  y el de  $g$  es  $\mathbb{R}_{++}$ . La primera afirmación del comentario es verdadera, pues como  $g$  toma valores en los reales, siempre se puede componer  $g$  en  $f$  y obtener una función continua por la Proposición 16. Sin embargo, la segunda afirmación se cumple si y sólo si el recorrido de  $f$  no es siempre positivo. En caso de que el recorrido de  $f$  sea siempre positivo (e.g.  $f(x) = x^2 + x + 1$ ) no se cumple la afirmación, pues  $g(f(x))$  sí sería continua en el dominio de  $f$ .


# Gráfico: Composición de Continuas

Figura 25: Composición Compatible de Funciones Continuas




# Gráfico: Composición de Continuas

Figura 25: Composición Compatible de Funciones Continuas



# Gráfico: Composición de Continuas

Figura 25: Composición Compatible de Funciones Continuas



# Gráfico: Composición de Continuas


Figura 25: Composición Compatible de Funciones Continuas





# Gráfico: Composición de Continuas

Figura 26: Composición Incompatible de Funciones Continuas




# Gráfico: Composición de Continuas

Figura 26: Composición Incompatible de Funciones Continuas




# Gráfico: Composición de Continuas

Figura 26: Composición Incompatible de Funciones Continuas



# Gráfico: Composición de Continuas

Figura 26: Composición Incompatible de Funciones Continuas



# Violaciones de Continuidad

En el Ejemplo 14 vimos que si  $f(x) = \frac{1}{x}$ , entonces  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$  y comentamos que  $f(x)$  no estaba definida en  $x = 0$ . Luego,  $f(x)$  de ninguna manera puede ser continua en  $x = 0$ , pues sus límites laterales son distintos (i.e.  $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ).

# Violaciones de Continuidad

En el Ejemplo 14 vimos que si  $f(x) = \frac{1}{x}$ , entonces  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$  y comentamos que  $f(x)$  no estaba definida en  $x = 0$ . Luego,  $f(x)$  de ninguna manera puede ser continua en  $x = 0$ , pues sus límites laterales son distintos (i.e.  $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ).

Sin embargo, pueden existir funciones que tengan un límite bien definido en un punto y aun así no sean continuas.

# Violaciones de Continuidad

En el Ejemplo 14 vimos que si  $f(x) = \frac{1}{x}$ , entonces  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$  y comentamos que  $f(x)$  no estaba definida en  $x = 0$ . Luego,  $f(x)$  de ninguna manera puede ser continua en  $x = 0$ , pues sus límites laterales son distintos (i.e.  $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ).

Sin embargo, pueden existir funciones que tengan un límite bien definido en un punto y aun así no sean continuas.

Este es el caso del Ejemplo 6, donde  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$ .

# Violaciones de Continuidad

En el Ejemplo 14 vimos que si  $f(x) = \frac{1}{x}$ , entonces  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$  y comentamos que  $f(x)$  no estaba definida en  $x = 0$ . Luego,  $f(x)$  de ninguna manera puede ser continua en  $x = 0$ , pues sus límites laterales son distintos (i.e.  $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ).

Sin embargo, pueden existir funciones que tengan un límite bien definido en un punto y aun así no sean continuas.

Este es el caso del Ejemplo 6, donde  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$ . Sin embargo,

$x = 2$  no es parte del dominio de la función.



# Violaciones de Continuidad

En el Ejemplo 14 vimos que si  $f(x) = \frac{1}{x}$ , entonces  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$  y comentamos que  $f(x)$  no estaba definida en  $x = 0$ . Luego,  $f(x)$  de ninguna manera puede ser continua en  $x = 0$ , pues sus límites laterales son distintos (i.e.  $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ).

Sin embargo, pueden existir funciones que tengan un límite bien definido en un punto y aun así no sean continuas.

Este es el caso del Ejemplo 6, donde  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$ . Sin embargo,  $x = 2$  no es parte del dominio de la función. Por lo tanto,  $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$  no es continua en  $x = 2$ .

# Violaciones de Continuidad

En el Ejemplo 14 vimos que si  $f(x) = \frac{1}{x}$ , entonces  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$  y comentamos que  $f(x)$  no estaba definida en  $x = 0$ . Luego,  $f(x)$  de ninguna manera puede ser continua en  $x = 0$ , pues sus límites laterales son distintos (i.e.  $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ).

Sin embargo, pueden existir funciones que tengan un límite bien definido en un punto y aun así no sean continuas.

Este es el caso del Ejemplo 6, donde  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$ . Sin embargo,  $x = 2$  no es parte del dominio de la función. Por lo tanto,  $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$  no es continua en  $x = 2$ . Esto también se aprecia en la Figura 7.

# Aplicación: Costos de Ajuste

## Ejemplo 22

Una firma tiene un stock de capital  $K_t$  en el periodo  $t$ . Si desea alcanzar un stock  $K_{t+1}$  en el periodo  $t+1$ , entonces debe invertir  $I_t = K_{t+1} - K_t$ . Sin embargo, si  $K_{t+1} \neq K_t$ , esto es, si  $I_t \neq 0$ , entonces debe pagar un costo fijo de ajuste de  $c$  unidades monetarias (por ejemplo, porque tiene que pagar un costo de transporte). Si  $I_t = 0$ , entonces el costo de ajustarse es cero. ¿Es la función de costos de ajuste continua en todo su dominio?

# Aplicación: Costos de Ajuste

## Ejemplo 22

Una firma tiene un stock de capital  $K_t$  en el periodo  $t$ . Si desea alcanzar un stock  $K_{t+1}$  en el periodo  $t+1$ , entonces debe invertir  $I_t = K_{t+1} - K_t$ . Sin embargo, si  $K_{t+1} \neq K_t$ , esto es, si  $I_t \neq 0$ , entonces debe pagar un costo fijo de ajuste de  $c$  unidades monetarias (por ejemplo, porque tiene que pagar un costo de transporte). Si  $I_t = 0$ , entonces el costo de ajustarse es cero. ¿Es la función de costos de ajuste continua en todo su dominio?

## Solución 22

No lo es.

# Aplicación: Costos de Ajuste

## Ejemplo 22

Una firma tiene un stock de capital  $K_t$  en el periodo  $t$ . Si desea alcanzar un stock  $K_{t+1}$  en el periodo  $t+1$ , entonces debe invertir  $I_t = K_{t+1} - K_t$ . Sin embargo, si  $K_{t+1} \neq K_t$ , esto es, si  $I_t \neq 0$ , entonces debe pagar un costo fijo de ajuste de  $c$  unidades monetarias (por ejemplo, porque tiene que pagar un costo de transporte). Si  $I_t = 0$ , entonces el costo de ajustarse es cero. ¿Es la función de costos de ajuste continua en todo su dominio?

## Solución 22

No lo es. Sea  $f(I_t) = \begin{cases} 0 & \text{si } I_t = 0 \\ c & \text{si } I_t \neq 0 \end{cases}$  la función de costos de ajuste.

# Aplicación: Costos de Ajuste

## Ejemplo 22

Una firma tiene un stock de capital  $K_t$  en el periodo  $t$ . Si desea alcanzar un stock  $K_{t+1}$  en el periodo  $t+1$ , entonces debe invertir  $I_t = K_{t+1} - K_t$ . Sin embargo, si  $K_{t+1} \neq K_t$ , esto es, si  $I_t \neq 0$ , entonces debe pagar un costo fijo de ajuste de  $c$  unidades monetarias (por ejemplo, porque tiene que pagar un costo de transporte). Si  $I_t = 0$ , entonces el costo de ajustarse es cero. ¿Es la función de costos de ajuste continua en todo su dominio?

## Solución 22

No lo es. Sea  $f(I_t) = \begin{cases} 0 & \text{si } I_t = 0 \\ c & \text{si } I_t \neq 0 \end{cases}$  la función de costos de ajuste. A pesar de que  $\lim_{I_t \rightarrow 0} f(I_t) = c$ ,  $f(0) = 0 \neq c$ , por lo que la función no es continua en  $I_t = 0$ .

# Aplicación: Impuestos Continuos

## Propuesto 14

Para calcular el Impuesto Global Complementario, se toma la renta anual (3) de cada individuo en UTA (unidades tributarias anuales), se pondera por el factor (4) que corresponde según su tramo de ingreso (2) y luego se rebaja (resta) el monto correspondiente (5). En la Tabla 2 (extraído del SII) se muestra la escala, donde falta el factor que corresponde al tramo 3.

**Tabla 2:** Escala de tasas del Impuesto Global Complementario

VIGENCIA -1	N° DE TRAMOS -2	RENTA IMPONIBLE ANUAL DESDE HASTA -3	FACTOR -4	CANTIDAD A REBAJAR (SIN CRÉDITO DEL 10% DE 1 UTA, DEROGADO) -5
RIGE A CONTAR DEL AÑO TRIBUTARIO 2014	1	0,0 UTA a 13,5 UTA	Exento	.-
	2	13,5 " a 30 "	4%	0,54 UTA
	3	30 " a 50 "		1,74 "
	4	50 " a 70 "	13,5%	4,49 "
	5	70 " a 90 "	23%	11,14 "
	6	90 " a 120 "	30,4%	17,80 "
	7	120 " a 150 "	35,5%	23,92 "
	8	150 " y MAS	40%	30,67 "

NOTA: Para convertir la tabla a pesos (\$) basta con multiplicar los valores anotados en las columnas (3) y (5) por el valor de la UTA del mes respectivo.

Calcule el parámetro del tramo 3, para que la función sea continua (*why?*) con el tramo anterior (2) y el siguiente (4). Justifique.

# Ejercicio Avanzado

## Propuesto 15

Encuentre los valores de  $a$  y  $b$  para los cuales  $f(x)$  es continua en  $\mathbb{R}$ .

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\exp(x) - 1}{\ln(1+x)} & \text{si } x > 0 \\ \frac{a}{b} & \text{si } x = 0 \\ \frac{1}{-ax + b} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

¿Qué ocurre si la función se redefine de la siguiente manera?

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\exp(x) - 1}{\ln(1+x)} & \text{si } x > 0 \\ \frac{a}{b} & \text{si } x = 0 \\ \frac{1}{ax + b} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$



# Continuidad Reparable

## Definición 14

Una función  $f(x)$  discontinua en  $x = k$  se dice reparable si y sólo si se cumple que  $\lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} f(x)$ . Esto es, si la discontinuidad se originó porque  $f(k) \neq \lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} f(x)$ .

# Continuidad Reparable

## Definición 14

Una función  $f(x)$  discontinua en  $x = k$  se dice reparable si y sólo si se cumple que  $\lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} f(x)$ . Esto es, si la discontinuidad se originó porque  $f(k) \neq \lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} f(x)$ .

Para reparar la función, basta con imponer que  $f(k) = \lim_{x \rightarrow k} f(x)$ .

# Continuidad Reparable

## Definición 14

Una función  $f(x)$  discontinua en  $x = k$  se dice reparable si y sólo si se cumple que  $\lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} f(x)$ . Esto es, si la discontinuidad se originó porque  $f(k) \neq \lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} f(x)$ .

Para reparar la función, basta con imponer que  $f(k) = \lim_{x \rightarrow k} f(x)$ .

## Ejemplo 23

Muestre que la función  $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$  tiene una discontinuidad reparable (apóyese en la Figura 7), pero que la discontinuidad de  $g(x) = \frac{|x|}{x}$  no es reparable (apóyese en la Figura 9).

# Continuidad Reparable

## Definición 14

Una función  $f(x)$  discontinua en  $x = k$  se dice reparable si y sólo si se cumple que  $\lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} f(x)$ . Esto es, si la discontinuidad se originó porque  $f(k) \neq \lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} f(x)$ .

Para reparar la función, basta con imponer que  $f(k) = \lim_{x \rightarrow k} f(x)$ .

## Ejemplo 23

Muestre que la función  $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$  tiene una discontinuidad reparable (apóyese en la Figura 7), pero que la discontinuidad de  $g(x) = \frac{|x|}{x}$  no es reparable (apóyese en la Figura 9).

## Solución 23

Notamos que  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 4$ , por lo que la función reparada

$$\text{es } f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{si } x \neq 2 \\ 4 & \text{si } x = 2 \end{cases}.$$

# Continuidad Reparable

## Definición 14

Una función  $f(x)$  discontinua en  $x = k$  se dice reparable si y sólo si se cumple que  $\lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} f(x)$ . Esto es, si la discontinuidad se originó porque  $f(k) \neq \lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} f(x)$ .

Para reparar la función, basta con imponer que  $f(k) = \lim_{x \rightarrow k} f(x)$ .

## Ejemplo 23

Muestre que la función  $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$  tiene una discontinuidad reparable (apóyese en la Figura 7), pero que la discontinuidad de  $g(x) = \frac{|x|}{x}$  no es reparable (apóyese en la Figura 9).

## Solución 23

Notamos que  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 4$ , por lo que la función reparada

es  $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{si } x \neq 2 \\ 4 & \text{si } x = 2 \end{cases}$ . Por otro lado,  $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = -1$ , distinto a

$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 1$ , por lo que la discontinuidad no es reparable.

# Proposiciones Adicionales

## Proposición 17

*Sea  $f$  continua en un punto  $k$  con  $f(k) \neq 0$ . Entonces existe una vecindad de radio  $\delta$  (ver Definición 6) en torno a  $k$  tal que  $\forall x \in (k - \delta, k + \delta)$ , el signo de  $f(x)$  es igual al de  $f(k)$ , esto es,  $f(x)f(k) > 0$ .*

---

<sup>6</sup>Este (potente) resultado lo utilizaremos más adelante.

# Proposiciones Adicionales

## Proposición 17

*Sea  $f$  continua en un punto  $k$  con  $f(k) \neq 0$ . Entonces existe una vecindad de radio  $\delta$  (ver Definición 6) en torno a  $k$  tal que  $\forall x \in (k - \delta, k + \delta)$ , el signo de  $f(x)$  es igual al de  $f(k)$ , esto es,  $f(x)f(k) > 0$ .*

La Proposición 17 se conoce como “Conservación Local del Signo”.

---

<sup>6</sup>Este (potente) resultado lo utilizaremos más adelante.

# Proposiciones Adicionales

## Proposición 17

*Sea  $f$  continua en un punto  $k$  con  $f(k) \neq 0$ . Entonces existe una vecindad de radio  $\delta$  (ver Definición 6) en torno a  $k$  tal que  $\forall x \in (k - \delta, k + \delta)$ , el signo de  $f(x)$  es igual al de  $f(k)$ , esto es,  $f(x)f(k) > 0$ .*

La Proposición 17 se conoce como “Conservación Local del Signo”.

## Proposición 18

*Sea  $f$  continua en el intervalo  $[a, b]$ , con  $f(a)f(b) < 0$ , esto es, con signos contrarios al evaluar en ambos extremos. Entonces existe al menos un  $c \in (a, b)$  tal que  $f(c) = 0$ .*

---

<sup>6</sup>Este (potente) resultado lo utilizaremos más adelante.



# Proposiciones Adicionales

## Proposición 17

*Sea  $f$  continua en un punto  $k$  con  $f(k) \neq 0$ . Entonces existe una vecindad de radio  $\delta$  (ver Definición 6) en torno a  $k$  tal que  $\forall x \in (k - \delta, k + \delta)$ , el signo de  $f(x)$  es igual al de  $f(k)$ , esto es,  $f(x)f(k) > 0$ .*

La Proposición 17 se conoce como “Conservación Local del Signo”.

## Proposición 18

*Sea  $f$  continua en el intervalo  $[a, b]$ , con  $f(a)f(b) < 0$ , esto es, con signos contrarios al evaluar en ambos extremos. Entonces existe al menos un  $c \in (a, b)$  tal que  $f(c) = 0$ .*

La Proposición 18 se conoce como “Teorema de Bolzano”<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup>Este (potente) resultado lo utilizaremos más adelante.

# Unidad 2

## Unidad 2

Módulo 8

Módulo 9

Módulo 10

Módulo 11

Módulo 12

Módulo 13

Módulo 14

► [Volver al Inicio](#)

# MÓDULO 8

► [Volver al Inicio de la Sección](#)

# Recordatorio: Tasas de Cambio

En la Definición 3, particularmente en la ecuación (2) planteamos que una tasa de cambio promedio para una función  $f$  en el intervalo  $[x, x + \Delta]$  es

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

# Recordatorio: Tasas de Cambio

En la Definición 3, particularmente en la ecuación (2) planteamos que una tasa de cambio promedio para una función  $f$  en el intervalo  $[x, x + \Delta]$  es

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

Además, en la Figura 2 vimos que esta tasa de cambio promedio puede ser interpretada como la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos  $(x, f(x))$  y  $(x + \Delta, f(x + \Delta))$ .

# Recordatorio: Tasas de Cambio

En la Definición 3, particularmente en la ecuación (2) planteamos que una tasa de cambio promedio para una función  $f$  en el intervalo  $[x, x + \Delta]$  es

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

Además, en la Figura 2 vimos que esta tasa de cambio promedio puede ser interpretada como la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos  $(x, f(x))$  y  $(x + \Delta, f(x + \Delta))$ .

Sin embargo, en las Figuras 3 y 4 vimos cómo al utilizar intervalos muy amplios podíamos dejar de capturar, por ejemplo, si la función es creciente o decreciente al rededor de algún valor  $x$ .

# Recordatorio: Tasas de Cambio

En la Definición 3, particularmente en la ecuación (2) planteamos que una tasa de cambio promedio para una función  $f$  en el intervalo  $[x, x + \Delta]$  es

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$


Además, en la Figura 2 vimos que esta tasa de cambio promedio puede ser interpretada como la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos  $(x, f(x))$  y  $(x + \Delta, f(x + \Delta))$ .

Sin embargo, en las Figuras 3 y 4 vimos cómo al utilizar intervalos muy amplios podíamos dejar de capturar, por ejemplo, si la función es creciente o decreciente al rededor de algún valor  $x$ .

En efecto, sería interesante saber *qué pasa con la tasa de cambio promedio cuando el intervalo se hace arbitrariamente pequeño.*

# Tasas en Intervalos Pequeños


Figura 27: Tasa de Cambio Promedio en Distintos Intervalos






# Tasas en Intervalos Pequeños

Figura 27: Tasa de Cambio Promedio en Distintos Intervalos




# Tasas en Intervalos Pequeños

Figura 27: Tasa de Cambio Promedio en Distintos Intervalos




# Tasas en Intervalos Pequeños

Figura 27: Tasa de Cambio Promedio en Distintos Intervalos



# Tasas en Intervalos Pequeños

Figura 27: Tasa de Cambio Promedio en Distintos Intervalos



# Límite de la Tasa de Cambio

Considerar un intervalo arbitrariamente pequeño a la hora de calcular una tasa de cambio promedio es lo mismo que calcular

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

# Límite de la Tasa de Cambio

Considerar un intervalo arbitrariamente pequeño a la hora de calcular una tasa de cambio promedio es lo mismo que calcular

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

Cuando la amplitud del intervalo tiende a cero, se deja de llamar tasa (o razón) de cambio promedio y se utiliza el concepto de *tasa (o razón) de cambio instantánea*.

# Límite de la Tasa de Cambio

Considerar un intervalo arbitrariamente pequeño a la hora de calcular una tasa de cambio promedio es lo mismo que calcular

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

Cuando la amplitud del intervalo tiende a cero, se deja de llamar tasa (o razón) de cambio promedio y se utiliza el concepto de *tasa (o razón) de cambio instantánea*.

A diferencia de una tasa de cambio promedio, la tasa de cambio instantánea no corresponde a la pendiente de una recta secante, sino que equivale a la *pendiente de la recta tangente* a la función  $f(x)$  en el punto  $(x, f(x))$ .

# Límite de la Tasa de Cambio

Considerar un intervalo arbitrariamente pequeño a la hora de calcular una tasa de cambio promedio es lo mismo que calcular

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

Cuando la amplitud del intervalo tiende a cero, se deja de llamar tasa (o razón) de cambio promedio y se utiliza el concepto de *tasa (o razón) de cambio instantánea*.

A diferencia de una tasa de cambio promedio, la tasa de cambio instantánea no corresponde a la pendiente de una recta secante, sino que equivale a la *pendiente de la recta tangente* a la función  $f(x)$  en el punto  $(x, f(x))$ .

Para acortar esto último, se suele afirmar que la tasa de cambio instantánea equivale a la *pendiente de la función  $f(x)$*  en  $x$  (en vez de hablar de la pendiente de la recta tangente).



# Definición de Derivada

TODO lo de la diapositiva anterior lo vamos a condensar en una única definición...

# Definición de Derivada

TODO lo de la diapositiva anterior lo vamos a condensar en una única definición...

## Definición 15

La derivada de una función  $y = f(x)$  es

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x},$$

siempre y cuando dicho límite exista.

# Definición de Derivada

TODO lo de la diapositiva anterior lo vamos a condensar en una única definición...

## Definición 15

La derivada de una función  $y = f(x)$  es

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x},$$

siempre y cuando dicho límite exista.

Importante:

# Definición de Derivada

TODO lo de la diapositiva anterior lo vamos a condensar en una única definición...

## Definición 15

La derivada de una función  $y = f(x)$  es

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x},$$

siempre y cuando dicho límite exista.

Importante:

- ¡  $\frac{\Delta y}{\Delta x} \neq \frac{dy}{dx}$  !

# Definición de Derivada

TODO lo de la diapositiva anterior lo vamos a condensar en una única definición...

## Definición 15

La derivada de una función  $y = f(x)$  es

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x},$$

siempre y cuando dicho límite exista.

Importante:

- ¡  $\frac{\Delta y}{\Delta x} \neq \frac{dy}{dx}$  !
- La notación de Leibniz ( $dy/dx$ ) es sólo eso... notación.

# Definición de Derivada

TODO lo de la diapositiva anterior lo vamos a condensar en una única definición...

## Definición 15

La derivada de una función  $y = f(x)$  es

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x},$$

siempre y cuando dicho límite exista.

Importante:

- ¡  $\frac{\Delta y}{\Delta x} \neq \frac{dy}{dx}$  !
- La notación de Leibniz ( $dy/dx$ ) es sólo eso... notación.
- $\frac{dy}{dx} = y' = f'(x) = \frac{df(x)}{dx} = \frac{df}{dx}(x) = \frac{df}{dx} = D_x f(x) = D_x f = Df(x) = Df.$

# Definición de Derivada

TODO lo de la diapositiva anterior lo vamos a condensar en una única definición...

## Definición 15

La derivada de una función  $y = f(x)$  es

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x},$$

siempre y cuando dicho límite exista.

Importante:

- ¡  $\frac{\Delta y}{\Delta x} \neq \frac{dy}{dx}$  !
- La notación de Leibniz ( $dy/dx$ ) es sólo eso... notación.
- $\frac{dy}{dx} = y' = f'(x) = \frac{df(x)}{dx} = \frac{df}{dx}(x) = \frac{df}{dx} = D_x f(x) = D_x f = Df(x) = Df.$
- La derivada de una función, es otra función (caso exista).

# Definición de Derivada

TODO lo de la diapositiva anterior lo vamos a condensar en una única definición...

## Definición 15

La derivada de una función  $y = f(x)$  es

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x},$$

siempre y cuando dicho límite exista.

Importante:

- ¡  $\frac{\Delta y}{\Delta x} \neq \frac{dy}{dx}$  !
- La notación de Leibniz ( $dy/dx$ ) es sólo eso... notación.
- $\frac{dy}{dx} = y' = f'(x) = \frac{df(x)}{dx} = \frac{df}{dx}(x) = \frac{df}{dx} = D_x f(x) = D_x f = Df(x) = Df.$
- La derivada de una función, es otra función (caso exista).
- Por lo tanto, la derivada se puede evaluar en distintos puntos.



# Álgebra: Derivada de una Cuadrática

## Ejemplo 24

Obtenga la derivada de la función  $f(x) = (x - 1)^2$  utilizando la definición de derivada (Definición 15).

# Álgebra: Derivada de una Cuadrática

## Ejemplo 24

Obtenga la derivada de la función  $f(x) = (x - 1)^2$  utilizando la definición de derivada (Definición 15).


## Solución 24

Utilizando la Definición 15, tenemos que

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x - 1)^2 - (x - 1)^2}{\Delta x} \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x^2 + (\Delta x)^2 + 1 + 2x\Delta x - 2x - 2\Delta - x^2 + 2x - 1}{\Delta x} \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^2 + 2x\Delta x - 2\Delta}{\Delta x} \\&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x + 2x - 2 \\&= 2x - 2.\end{aligned}$$


# Gráfico: Derivada de una Cuadrática

Figura 28: Derivada de una Función Cuadrática




# Gráfico: Derivada de una Cuadrática

Figura 28: Derivada de una Función Cuadrática




# Gráfico: Derivada de una Cuadrática

Figura 28: Derivada de una Función Cuadrática




# Gráfico: Derivada de una Cuadrática

Figura 28: Derivada de una Función Cuadrática



# Gráfico: Derivada de una Cuadrática

Figura 28: Derivada de una Función Cuadrática



# Gráfico: Derivada de una Cuadrática

Figura 28: Derivada de una Función Cuadrática





# ¿Continuidad Implica Derivabilidad?

*Si una función es continua en un punto, ¿es derivable en ese punto?*

# ¿Continuidad Implica Derivabilidad?

*Si una función es continua en un punto, ¿es derivable en ese punto?*

**¡NO!**

# ¿Continuidad Implica Derivabilidad?

*Si una función es continua en un punto, ¿es derivable en ese punto?*

**¡NO!**

Contraejemplo:  $f(x) = |x|$

## Propuesto 16

Analice la continuidad y derivabilidad de la función  $f(x) = |x|$  en todo su dominio (ponga atención en  $x = 0$ ).

# Gráfico: Función Continua No Derivable

Figura 29: Función No Derivable



# Gráfico: Función Continua No Derivable

Figura 29: Función No Derivable




# Gráfico: Función Continua No Derivable

Figura 29: Función No Derivable



# Gráfico: Función Continua No Derivable

Figura 29: Función No Derivable



# Gráfico: Función Continua No Derivable

Figura 29: Función No Derivable





# Gráfico: Función Continua No Derivable

Figura 29: Función No Derivable



# ¿Continuidad Implica Derivabilidad?

Al revés: *Si una función es derivable en un punto, ¿es continua en ese punto?*

# ¿Continuidad Implica Derivabilidad?

Al revés: *Si una función es derivable en un punto, ¿es continua en ese punto?*

**¡SÍ!**

# ¿Continuidad Implica Derivabilidad?

Al revés: *Si una función es derivable en un punto, ¿es continua en ese punto?*

**¡SÍ!**

## Proposición 19

*Sea  $f(x)$  una función derivable en  $x = k$ . Entonces,  $f(x)$  es continua en  $x = k$ .*

# ¿Continuidad Implica Derivabilidad?

Al revés: Si una función es derivable en un punto, ¿es continua en ese punto?

¡SÍ!

## Proposición 19

Sea  $f(x)$  una función derivable en  $x = k$ . Entonces,  $f(x)$  es continua en  $x = k$ .

## Demostración.

$$PD: \exists f'(k) \implies \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

# ¿Continuidad Implica Derivabilidad?

Al revés: Si una función es derivable en un punto, ¿es continua en ese punto?

¡SÍ!

## Proposición 19

Sea  $f(x)$  una función derivable en  $x = k$ . Entonces,  $f(x)$  es continua en  $x = k$ .

## Demostración.

$$PD: \exists f'(k) \implies \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k) \iff \lim_{x \rightarrow k} f(x) - f(k) = 0.$$

# ¿Continuidad Implica Derivabilidad?

Al revés: Si una función es derivable en un punto, ¿es continua en ese punto?

¡SÍ!

## Proposición 19

Sea  $f(x)$  una función derivable en  $x = k$ . Entonces,  $f(x)$  es continua en  $x = k$ .

### Demostración.

$$PD: \exists f'(k) \implies \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k) \iff \lim_{x \rightarrow k} f(x) - f(k) = 0.$$

$$\text{En efecto, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) - f(k) = \lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x) - f(k)}{x - k} \cdot (x - k).$$

# ¿Continuidad Implica Derivabilidad?

Al revés: Si una función es derivable en un punto, ¿es continua en ese punto?

¡SÍ!

## Proposición 19

Sea  $f(x)$  una función derivable en  $x = k$ . Entonces,  $f(x)$  es continua en  $x = k$ .

### Demostración.

$$PD: \exists f'(k) \implies \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k) \iff \lim_{x \rightarrow k} f(x) - f(k) = 0.$$

$$\text{En efecto, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) - f(k) = \lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x) - f(k)}{x - k} \cdot (x - k).$$

Sea  $h = x - k$ , de modo que  $x \rightarrow k \implies h \rightarrow 0$ .



# ¿Continuidad Implica Derivabilidad?

Al revés: Si una función es derivable en un punto, ¿es continua en ese punto?

¡SÍ!

## Proposición 19

Sea  $f(x)$  una función derivable en  $x = k$ . Entonces,  $f(x)$  es continua en  $x = k$ .

### Demostración.

$$PD: \exists f'(k) \implies \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k) \iff \lim_{x \rightarrow k} f(x) - f(k) = 0.$$

$$\text{En efecto, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) - f(k) = \lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x) - f(k)}{x - k} \cdot (x - k).$$

Sea  $h = x - k$ , de modo que  $x \rightarrow k \implies h \rightarrow 0$ .

Luego, se tiene que el límite es equivalente a  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(k+h) - f(k)}{h} \cdot (h)$ .

# ¿Continuidad Implica Derivabilidad?

Al revés: Si una función es derivable en un punto, ¿es continua en ese punto?

¡SÍ!

## Proposición 19

Sea  $f(x)$  una función derivable en  $x = k$ . Entonces,  $f(x)$  es continua en  $x = k$ .

### Demostración.

$$PD: \exists f'(k) \implies \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k) \iff \lim_{x \rightarrow k} f(x) - f(k) = 0.$$

$$\text{En efecto, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) - f(k) = \lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x) - f(k)}{x - k} \cdot (x - k).$$

Sea  $h = x - k$ , de modo que  $x \rightarrow k \implies h \rightarrow 0$ .

Luego, se tiene que el límite es equivalente a  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(k+h) - f(k)}{h} \cdot (h)$ .

¡Pero el límite de la fracción corresponde a  $f'(k)$ !

# ¿Continuidad Implica Derivabilidad?

Al revés: Si una función es derivable en un punto, ¿es continua en ese punto?

¡SÍ!

## Proposición 19

Sea  $f(x)$  una función derivable en  $x = k$ . Entonces,  $f(x)$  es continua en  $x = k$ .

### Demostración.

$$PD: \exists f'(k) \implies \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k) \iff \lim_{x \rightarrow k} f(x) - f(k) = 0.$$

$$\text{En efecto, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) - f(k) = \lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x) - f(k)}{x - k} \cdot (x - k).$$

Sea  $h = x - k$ , de modo que  $x \rightarrow k \implies h \rightarrow 0$ .

Luego, se tiene que el límite es equivalente a  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(k+h) - f(k)}{h} \cdot (h)$ .

¡Pero el límite de la fracción corresponde a  $f'(k)$ ! Como esta derivada existe (por hipótesis), el límite del producto es el producto de los límites,

# ¿Continuidad Implica Derivabilidad?

Al revés: Si una función es derivable en un punto, ¿es continua en ese punto?

¡SÍ!

## Proposición 19

Sea  $f(x)$  una función derivable en  $x = k$ . Entonces,  $f(x)$  es continua en  $x = k$ .

### Demostración.

$$PD: \exists f'(k) \implies \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k) \iff \lim_{x \rightarrow k} f(x) - f(k) = 0.$$

$$\text{En efecto, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) - f(k) = \lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x) - f(k)}{x - k} \cdot (x - k).$$

Sea  $h = x - k$ , de modo que  $x \rightarrow k \implies h \rightarrow 0$ .

Luego, se tiene que el límite es equivalente a  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(k+h) - f(k)}{h} \cdot (h)$ .

¡Pero el límite de la fracción corresponde a  $f'(k)$ ! Como esta derivada existe (por hipótesis), el límite del producto es el producto de los límites, esto es,  $f'(k) \cdot 0 = 0$ . □

# MÓDULO 9

► [Volver al Inicio de la Sección](#)

# Derivadas Típicas

## Proposición 20

*La derivada de  $f(x) = x^n$  para cualquier  $n \in \mathbb{R}$  es  $f'(x) = nx^{n-1}$ .*

# Derivadas Típicas

## Proposición 20

*La derivada de  $f(x) = x^n$  para cualquier  $n \in \mathbb{R}$  es  $f'(x) = nx^{n-1}$ .*

## Demostración.

*Utilizando la Definición 15 tenemos que, si existe, la derivada de  $f(x)$  es*

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}.$$

# Derivadas Típicas

## Proposición 20

La derivada de  $f(x) = x^n$  para cualquier  $n \in \mathbb{R}$  es  $f'(x) = nx^{n-1}$ .

## Demostración.

Utilizando la Definición 15 tenemos que, si existe, la derivada de  $f(x)$  es

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}.$$

Por el Binomio de Newton, sabemos que  $(x+h)^n = \sum_{k=0}^n C_k^n x^{n-k} h^k$  para cualquier  $n \in \mathbb{N}$ .



# Derivadas Típicas

## Proposición 20

La derivada de  $f(x) = x^n$  para cualquier  $n \in \mathbb{R}$  es  $f'(x) = nx^{n-1}$ .

## Demostración.

Utilizando la Definición 15 tenemos que, si existe, la derivada de  $f(x)$  es

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}.$$

Por el Binomio de Newton, sabemos que  $(x+h)^n = \sum_{k=0}^n C_k^n x^{n-k} h^k$  para cualquier  $n \in \mathbb{N}$ . Luego, el límite es

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^n + nx^{n-1}h + \dots + nxh^{n-1} + h^n - x^n}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} nx^{n-1} + h(\dots) = nx^{n-1}. \end{aligned}$$

# Derivadas Típicas

## Proposición 20

La derivada de  $f(x) = x^n$  para cualquier  $n \in \mathbb{R}$  es  $f'(x) = nx^{n-1}$ .

## Demostración.

Utilizando la Definición 15 tenemos que, si existe, la derivada de  $f(x)$  es

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}.$$

Por el Binomio de Newton, sabemos que  $(x+h)^n = \sum_{k=0}^n C_k^n x^{n-k} h^k$  para cualquier  $n \in \mathbb{N}$ . Luego, el límite es

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^n + nx^{n-1}h + \dots + nxh^{n-1} + h^n - x^n}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} nx^{n-1} + h(\dots) = nx^{n-1}. \end{aligned}$$

Acto de fe: esto se cumple en todos los  $\mathbb{R}$ .



# Derivadas Típicas

## Proposición 20

La derivada de  $f(x) = x^n$  para cualquier  $n \in \mathbb{R}$  es  $f'(x) = nx^{n-1}$ .

## Demostración.

Utilizando la Definición 15 tenemos que, si existe, la derivada de  $f(x)$  es

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}.$$

Por el Binomio de Newton, sabemos que  $(x+h)^n = \sum_{k=0}^n C_k^n x^{n-k} h^k$  para cualquier  $n \in \mathbb{N}$ . Luego, el límite es

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^n + nx^{n-1}h + \dots + nxh^{n-1} + h^n - x^n}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} nx^{n-1} + h(\dots) = nx^{n-1}. \end{aligned}$$

Acto de fe: esto se cumple en todos los  $\mathbb{R}$ .



¿Qué ocurre cuando  $n = 0$ ?

# Derivadas Típicas

## Proposición 20

La derivada de  $f(x) = x^n$  para cualquier  $n \in \mathbb{R}$  es  $f'(x) = nx^{n-1}$ .

## Demostración.

Utilizando la Definición 15 tenemos que, si existe, la derivada de  $f(x)$  es

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}.$$

Por el Binomio de Newton, sabemos que  $(x+h)^n = \sum_{k=0}^n C_k^n x^{n-k} h^k$  para cualquier  $n \in \mathbb{N}$ . Luego, el límite es

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^n + nx^{n-1}h + \dots + nxh^{n-1} + h^n - x^n}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} nx^{n-1} + h(\dots) = nx^{n-1}. \end{aligned}$$

Acto de fe: esto se cumple en todos los  $\mathbb{R}$ .



¿Qué ocurre cuando  $n = 0$ ? ¿y cuando  $n = 0,5$ ?

## Derivadas Típicas (cont.)

### Proposición 21

*La derivada de  $f(x) = e^x$  es  $f'(x) = e^x$ .*

## Derivadas Típicas (cont.)

### Proposición 21

*La derivada de  $f(x) = e^x$  es  $f'(x) = e^x$ .*

### Demostración.

*Utilizando la Definición 15 tenemos que, si existe, la derivada de  $f(x)$  es*

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\exp(x+h) - \exp(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \exp(x) \frac{\exp(h) - 1}{h}.$$

## Derivadas Típicas (cont.)

### Proposición 21

*La derivada de  $f(x) = e^x$  es  $f'(x) = e^x$ .*

### Demostración.

*Utilizando la Definición 15 tenemos que, si existe, la derivada de  $f(x)$  es*

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\exp(x+h) - \exp(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \exp(x) \frac{\exp(h) - 1}{h}.$$

*El primer término del límite (el factor común) es invariante en  $h$ , de modo que puede “salir como constante”. El resto es un límite conocido (Proposición 11)...*

## Derivadas Típicas (cont.)

### Proposición 21

*La derivada de  $f(x) = e^x$  es  $f'(x) = e^x$ .*

### Demostración.

*Utilizando la Definición 15 tenemos que, si existe, la derivada de  $f(x)$  es*

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\exp(x+h) - \exp(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \exp(x) \frac{\exp(h) - 1}{h}.$$

*El primer término del límite (el factor común) es invariante en  $h$ , de modo que puede “salir como constante”. El resto es un límite conocido (Proposición 11)...*

*Por lo tanto,  $f'(x) = e^x$ .*





## Derivadas Típicas (cont.)

### Proposición 22

*La derivada de  $f(x) = \ln(x)$  es  $f'(x) = \frac{1}{x}$ .*

## Derivadas Típicas (cont.)

### Proposición 22

La derivada de  $f(x) = \ln(x)$  es  $f'(x) = \frac{1}{x}$ .

### Demostración.

Utilizando la Definición 15 tenemos que, si existe, la derivada de  $f(x)$  es

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{h}{x}\right)}{h}.$$

## Derivadas Típicas (cont.)

### Proposición 22

La derivada de  $f(x) = \ln(x)$  es  $f'(x) = \frac{1}{x}$ .

### Demostración.

Utilizando la Definición 15 tenemos que, si existe, la derivada de  $f(x)$  es

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{h}{x}\right)}{h}.$$

Notamos que podemos reescribir la expresión dentro del límite

$$\text{como } \frac{\ln\left(1 + \frac{h}{x}\right)}{h} = \ln\left(1 + \frac{h}{x}\right)^{\frac{1}{h}} = \ln\left(1 + \frac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h} \cdot \frac{1}{x}}.$$

## Derivadas Típicas (cont.)

### Proposición 22

La derivada de  $f(x) = \ln(x)$  es  $f'(x) = \frac{1}{x}$ .

### Demostración.

Utilizando la Definición 15 tenemos que, si existe, la derivada de  $f(x)$  es

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{h}{x}\right)}{h}.$$

Notamos que podemos reescribir la expresión dentro del límite

como  $\frac{\ln\left(1 + \frac{h}{x}\right)}{h} = \ln\left(1 + \frac{h}{x}\right)^{\frac{1}{h}} = \ln\left(1 + \frac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h} \cdot \frac{1}{x}}$ . Así, tenemos un límite conocido (Proposición 9) “elevado a una constante” y con un logaritmo aplicado...

## Derivadas Típicas (cont.)

### Proposición 22

La derivada de  $f(x) = \ln(x)$  es  $f'(x) = \frac{1}{x}$ .

### Demostración.

Utilizando la Definición 15 tenemos que, si existe, la derivada de  $f(x)$  es

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{h}{x}\right)}{h}.$$

Notamos que podemos reescribir la expresión dentro del límite

como  $\frac{\ln\left(1 + \frac{h}{x}\right)}{h} = \ln\left(1 + \frac{h}{x}\right)^{\frac{1}{h}} = \ln\left(1 + \frac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h} \cdot \frac{1}{x}}$ . Así, tenemos un límite conocido (Proposición 9) “elevado a una constante” y con un logaritmo aplicado...

Por lo tanto,  $f'(x) = \frac{1}{x}$ .



# Propuestos: Derivadas Típicas

Sea  $a \in \mathbb{R}$ .

## Propuesto 17

Encuentre la derivada de  $f(x) = ax^n$ .

## Propuesto 18

Encuentre la derivada de  $f(x) = e^{ax}$ .

## Propuesto 19

Encuentre la derivada de  $f(x) = \log_a x$ , con  $0 < a \neq 1$ .

## Propuesto 20

Encuentre la derivada de  $f(x) = \sqrt[a]{x}$ , con  $a \in \mathbb{N}$ .

# Intuición: Aproximación Afín

Sabemos que  $(e^x)' = e^x$ , esto es, la pendiente de esta función exponencial en cualquier punto corresponde simplemente al valor que toma la función en dicho punto.

---

<sup>7</sup>Más adelante veremos en detalle cómo podemos aproximar una función usando derivadas.

## Intuición: Aproximación Afín

Sabemos que  $(e^x)' = e^x$ , esto es, la pendiente de esta función exponencial en cualquier punto corresponde simplemente al valor que toma la función en dicho punto. En efecto, la recta tangente a esta función cuando  $x = 0$  será  $x + 1$ , esto es,  $e^x$  y  $x + 1$  *se comportan parecido* cuando  $x$  está en una vecindad de 0<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup>Más adelante veremos en detalle cómo podemos aproximar una función usando derivadas.



# Intuición: Aproximación Afín

Sabemos que  $(e^x)' = e^x$ , esto es, la pendiente de esta función exponencial en cualquier punto corresponde simplemente al valor que toma la función en dicho punto. En efecto, la recta tangente a esta función cuando  $x = 0$  será  $x + 1$ , esto es,  $e^x$  y  $x + 1$  *se comportan parecido* cuando  $x$  está en una vecindad de  $0$ <sup>7</sup>.

Note que podemos hacer un ejercicio similar con cualquier función, no solo con esta exponencial.

---

<sup>7</sup>Más adelante veremos en detalle cómo podemos aproximar una función usando derivadas.

# Intuición: Aproximación Afín

Sabemos que  $(e^x)' = e^x$ , esto es, la pendiente de esta función exponencial en cualquier punto corresponde simplemente al valor que toma la función en dicho punto. En efecto, la recta tangente a esta función cuando  $x = 0$  será  $x + 1$ , esto es,  $e^x$  y  $x + 1$  *se comportan parecido* cuando  $x$  está en una vecindad de 0<sup>7</sup>.

Note que podemos hacer un ejercicio similar con cualquier función, no solo con esta exponencial. En efecto, la recta tangente a  $\ln x$  en  $x_0$  es  $\frac{x - x_0}{x_0} + \ln x_0$ .

---

<sup>7</sup>Más adelante veremos en detalle cómo podemos aproximar una función usando derivadas.

# Intuición: Aproximación Afín

Sabemos que  $(e^x)' = e^x$ , esto es, la pendiente de esta función exponencial en cualquier punto corresponde simplemente al valor que toma la función en dicho punto. En efecto, la recta tangente a esta función cuando  $x = 0$  será  $x + 1$ , esto es,  $e^x$  y  $x + 1$  *se comportan parecido* cuando  $x$  está en una vecindad de 0<sup>7</sup>.


Note que podemos hacer un ejercicio similar con cualquier función, no solo con esta exponencial. En efecto, la recta tangente a  $\ln x$  en  $x_0$  es  $\frac{x - x_0}{x_0} + \ln x_0$ . Si  $x_0 = 1$ , esta es simplemente  $x - 1$ .

---

<sup>7</sup>Más adelante veremos en detalle cómo podemos aproximar una función usando derivadas.


# Gráfico: Aproximación Afín

Figura 30: Aproximación de  $e^x$  y  $\ln x$




# Gráfico: Aproximación Afín

Figura 30: Aproximación de  $e^x$  y  $\ln x$




# Gráfico: Aproximación Afín

Figura 30: Aproximación de  $e^x$  y  $\ln x$



# Gráfico: Aproximación Afín

Figura 30: Aproximación de  $e^x$  y  $\ln x$



# Álgebra: Aproximación Afín

Las aproximaciones afines que observamos anteriormente claramente “lo hacen mejor” cuando  $x \rightarrow x_0 \dots$



# Álgebra: Aproximación Afín

Las aproximaciones afines que observamos anteriormente claramente “lo hacen mejor” cuando  $x \rightarrow x_0$ ...

En efecto, tomando la definición de derivada  $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ , podemos definir  $h = x - x_0$ , de modo que  $h \rightarrow 0 \implies x \rightarrow x_0$ .

# Álgebra: Aproximación Afín

Las aproximaciones afines que observamos anteriormente claramente “lo hacen mejor” cuando  $x \rightarrow x_0$ ...

En efecto, tomando la definición de derivada  $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ , podemos definir  $h = x - x_0$ , de modo que  $h \rightarrow 0 \implies x \rightarrow x_0$ .

La derivada ahora es  $f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x+x-x_0) - f(x)}{x-x_0}$ .

# Álgebra: Aproximación Afín

Las aproximaciones afines que observamos anteriormente claramente “lo hacen mejor” cuando  $x \rightarrow x_0$ ...

En efecto, tomando la definición de derivada  $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ , podemos definir  $h = x - x_0$ , de modo que  $h \rightarrow 0 \implies x \rightarrow x_0$ .

La derivada ahora es  $f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x+x-x_0) - f(x)}{x-x_0}$ .

Olvidémonos (informalmente) del límite, pero tengamos en mente que  $x$  se acerca mucho a  $x_0$ . Así, despejamos  $f(x) \approx f'(x_0)(x-x_0) + f(x_0)$ .

# Álgebra: Aproximación Afín

Las aproximaciones afines que observamos anteriormente claramente “lo hacen mejor” cuando  $x \rightarrow x_0$ ...

En efecto, tomando la definición de derivada  $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ , podemos definir  $h = x - x_0$ , de modo que  $h \rightarrow 0 \implies x \rightarrow x_0$ .

La derivada ahora es  $f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x+x-x_0) - f(x)}{x-x_0}$ .

Olvidémonos (informalmente) del límite, pero tengamos en mente que  $x$  se acerca mucho a  $x_0$ . Así, despejamos  $f(x) \approx f'(x_0)(x-x_0) + f(x_0)$ . Esto es exactamente lo mismo que calcular la ecuación de la recta con pendiente  $f'(x_0)$  que pasa por el punto  $(x_0, f(x_0))$ .

# Álgebra: Aproximación Afín

Las aproximaciones afines que observamos anteriormente claramente “lo hacen mejor” cuando  $x \rightarrow x_0$ ...

En efecto, tomando la definición de derivada  $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ , podemos definir  $h = x - x_0$ , de modo que  $h \rightarrow 0 \implies x \rightarrow x_0$ .

La derivada ahora es  $f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x+x-x_0) - f(x)}{x-x_0}$ .

Olvidémonos (informalmente) del límite, pero tengamos en mente que  $x$  se acerca mucho a  $x_0$ . Así, despejamos  $f(x) \approx f'(x_0)(x-x_0) + f(x_0)$ . Esto es exactamente lo mismo que calcular la ecuación de la recta con pendiente  $f'(x_0)$  que pasa por el punto  $(x_0, f(x_0))$ .

## Definición 16

Si es que existe, la recta  $g(x) = f'(x_0)(x-x_0) + f(x_0)$  es la *mejor aproximación afín* de la función  $f(x)$  en torno a  $x = x_0$ .

# Ejemplo: Aproximación Afín

## Ejemplo 25

Obtenga la ecuación de la recta tangente a la función  $f(x) = \sqrt{x}$  cuando  $x = 4$ .

# Ejemplo: Aproximación Afín

## Ejemplo 25

Obtenga la ecuación de la recta tangente a la función  $f(x) = \sqrt{x}$  cuando  $x = 4$ .

## Solución 25

La derivada de la función es  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ .

# Ejemplo: Aproximación Afín

## Ejemplo 25

Obtenga la ecuación de la recta tangente a la función  $f(x) = \sqrt{x}$  cuando  $x = 4$ .

## Solución 25

La derivada de la función es  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ .

Luego,  $f'(4) = \frac{1}{4}$ .



# Ejemplo: Aproximación Afín

## Ejemplo 25

Obtenga la ecuación de la recta tangente a la función  $f(x) = \sqrt{x}$  cuando  $x = 4$ .

## Solución 25

La derivada de la función es  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ .

Luego,  $f'(4) = \frac{1}{4}$ .

Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente es

$$g(x) = \frac{(x-4)}{4} + 2 = \frac{x}{4} + 1.$$

# Propiedades de las Derivadas

## Proposición 23

*Sea  $f(x)$  una función derivable y  $a \in \mathbb{R}$ . Entonces la derivada de la función ponderada equivale a la ponderada de la función derivada. Esto es,  $[a \cdot f(x)]' = a \cdot f'(x)$ .*

# Propiedades de las Derivadas

## Proposición 23

*Sea  $f(x)$  una función derivable y  $a \in \mathbb{R}$ . Entonces la derivada de la función ponderada equivale a la ponderada de la función derivada. Esto es,  $[a \cdot f(x)]' = a \cdot f'(x)$ .*

## Proposición 24

*Sean  $f(x)$  y  $g(x)$  dos funciones derivables. Entonces la derivada de la suma (o resta) de ambas funciones equivale a la suma (o resta) de las derivadas de las funciones. Esto es,  $[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$ .*

# Propiedades de las Derivadas

## Proposición 23

*Sea  $f(x)$  una función derivable y  $a \in \mathbb{R}$ . Entonces la derivada de la función ponderada equivale a la ponderada de la función derivada. Esto es,  $[a \cdot f(x)]' = a \cdot f'(x)$ .*

## Proposición 24

*Sean  $f(x)$  y  $g(x)$  dos funciones derivables. Entonces la derivada de la suma (o resta) de ambas funciones equivale a la suma (o resta) de las derivadas de las funciones. Esto es,  $[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$ .*

## Proposición 25

*Sean  $f(x)$  y  $g(x)$  dos funciones derivables. Entonces la derivada del producto de ambas funciones es  $[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$ .*

# Propiedades de las Derivadas

## Proposición 23

Sea  $f(x)$  una función derivable y  $a \in \mathbb{R}$ . Entonces la derivada de la función ponderada equivale a la ponderada de la función derivada. Esto es,  $[a \cdot f(x)]' = a \cdot f'(x)$ .

## Proposición 24

Sean  $f(x)$  y  $g(x)$  dos funciones derivables. Entonces la derivada de la suma (o resta) de ambas funciones equivale a la suma (o resta) de las derivadas de las funciones. Esto es,  $[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$ .

## Proposición 25

Sean  $f(x)$  y  $g(x)$  dos funciones derivables. Entonces la derivada del producto de ambas funciones es  $[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$ .

## Proposición 26

Sean  $f(x)$  y  $g(x)$  dos funciones derivables. Entonces la derivada del cociente entre ambas funciones es  $\left[ \frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$ .

# Ejercitación: Derivadas

## Propuesto 21

Obtenga las derivadas de las siguientes funciones:

1.  $f(x) = \frac{mx+n}{\exp(x)}$ , con  $m, n \in \mathbb{R}$ .

# Ejercitación: Derivadas

## Propuesto 21

Obtenga las derivadas de las siguientes funciones:

1.  $f(x) = \frac{mx+n}{\exp(x)}$ , con  $m, n \in \mathbb{R}$ .
2.  $g(x) = x \exp(x) \ln x$ .

# Ejercitación: Derivadas

## Propuesto 21

Obtenga las derivadas de las siguientes funciones:

1.  $f(x) = \frac{mx+n}{\exp(x)}$ , con  $m, n \in \mathbb{R}$ .
2.  $g(x) = x \exp(x) \ln x$ .
3.  $h(t) = \frac{Y(t)}{N(t)}$ , donde  $Y(t)$  y  $N(t)$  son funciones positivas, crecientes y derivables que dependen de  $t$ .



# Ejercitación: Derivadas

## Propuesto 21

Obtenga las derivadas de las siguientes funciones:

1.  $f(x) = \frac{mx+n}{\exp(x)}$ , con  $m, n \in \mathbb{R}$ .
2.  $g(x) = x \exp(x) \ln x$ .
3.  $h(t) = \frac{Y(t)}{N(t)}$ , donde  $Y(t)$  y  $N(t)$  son funciones positivas, crecientes y derivables que dependen de  $t$ .

# Ejercitación: Derivadas

## Propuesto 21

Obtenga las derivadas de las siguientes funciones:

1.  $f(x) = \frac{mx + n}{\exp(x)}$ , con  $m, n \in \mathbb{R}$ .
2.  $g(x) = x \exp(x) \ln x$ .
3.  $h(t) = \frac{Y(t)}{N(t)}$ , donde  $Y(t)$  y  $N(t)$  son funciones positivas, crecientes y derivables que dependen de  $t$ .

*Aplicación: Imagine que  $h(t)$  es el PIB per cápita de un país (o las ventas por trabajador, productividad media de una central de sistemas de información, errores contables sobre estados de resultado, etc.) en el periodo  $t$ . ¿Qué puede concluir?*

# MÓDULO 10

► [Volver al Inicio de la Sección](#)

# Derivada de una Función Compuesta

## Proposición 27

*Si  $y = f(z)$  y  $z = g(x)$ , siendo ambas funciones diferenciables, entonces la derivada de  $y$  respecto a  $x$  es*

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \cdot \frac{dz}{dx}.$$

# Derivada de una Función Compuesta

## Proposición 27

*Si  $y = f(z)$  y  $z = g(x)$ , siendo ambas funciones diferenciables, entonces la derivada de  $y$  respecto a  $x$  es*

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \cdot \frac{dz}{dx}.$$

*Esto se llama la **regla de la cadena**.*

# Derivada de una Función Compuesta

## Proposición 27

Si  $y = f(z)$  y  $z = g(x)$ , siendo ambas funciones diferenciables, entonces la derivada de  $y$  respecto a  $x$  es

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \cdot \frac{dz}{dx}.$$

Esto se llama la **regla de la cadena**.

## Demostración.

Prueba informal:

$$(f \circ g)'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h}$$

# Derivada de una Función Compuesta

## Proposición 27

Si  $y = f(z)$  y  $z = g(x)$ , siendo ambas funciones diferenciables, entonces la derivada de  $y$  respecto a  $x$  es

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \cdot \frac{dz}{dx}.$$

Esto se llama la **regla de la cadena**.

## Demostración.

Prueba informal:

$$(f \circ g)'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h}$$

$$\Rightarrow (f \circ g)'(x) \cdot \frac{1}{g'(x)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} \cdot \frac{h}{g(x+h) - g(x)}$$

# Derivada de una Función Compuesta

## Proposición 27

Si  $y = f(z)$  y  $z = g(x)$ , siendo ambas funciones diferenciables, entonces la derivada de  $y$  respecto a  $x$  es

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \cdot \frac{dz}{dx}.$$

Esto se llama la **regla de la cadena**.

## Demostración.

Prueba informal:

$$\begin{aligned}(f \circ g)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} \\ \Rightarrow (f \circ g)'(x) \cdot \frac{1}{g'(x)} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} \cdot \frac{h}{g(x+h) - g(x)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{g(x+h) - g(x)} = f'(g(x)).\end{aligned}$$





# Ejercicios: Regla de la Cadena

## Propuesto 22

Derive  $f(x) = [u(x)]^n$ , donde  $u$  es diferenciable y  $n \in \mathbb{R}$ .

# Ejercicios: Regla de la Cadena

## Propuesto 22

Derive  $f(x) = [u(x)]^n$ , donde  $u$  es diferenciable y  $n \in \mathbb{R}$ .

## Propuesto 23

Derive  $g(x) = \exp[u(x)]$ , donde  $u$  es diferenciable.

# Ejercicios: Regla de la Cadena

## Propuesto 22

Derive  $f(x) = [u(x)]^n$ , donde  $u$  es diferenciable y  $n \in \mathbb{R}$ .

## Propuesto 23

Derive  $g(x) = \exp[u(x)]$ , donde  $u$  es diferenciable.

## Propuesto 24

Derive  $h(x) = \ln[u(x)]$ , donde  $u$  es diferenciable.

# Ejercicios: Regla de la Cadena

## Propuesto 22

Derive  $f(x) = [u(x)]^n$ , donde  $u$  es diferenciable y  $n \in \mathbb{R}$ .

## Propuesto 23

Derive  $g(x) = \exp[u(x)]$ , donde  $u$  es diferenciable.

## Propuesto 24

Derive  $h(x) = \ln[u(x)]$ , donde  $u$  es diferenciable.

## Propuesto 25

Derive  $i(x) = \sqrt{u(x)}$ , donde  $u$  es diferenciable.

# Ejercicios: Regla de la Cadena

## Propuesto 22

Derive  $f(x) = [u(x)]^n$ , donde  $u$  es diferenciable y  $n \in \mathbb{R}$ .

## Propuesto 23

Derive  $g(x) = \exp[u(x)]$ , donde  $u$  es diferenciable.

## Propuesto 24

Derive  $h(x) = \ln[u(x)]$ , donde  $u$  es diferenciable.

## Propuesto 25

Derive  $i(x) = \sqrt{u(x)}$ , donde  $u$  es diferenciable.

## Propuesto 26

Demuestre la regla de la derivada de un cociente (Proposición 26) utilizando la regla de la derivada de un producto (Proposición 25) y la regla de la cadena (Proposición 27).

# Ejercicios: Regla de la Cadena

## Propuesto 22

Derive  $f(x) = [u(x)]^n$ , donde  $u$  es diferenciable y  $n \in \mathbb{R}$ .

## Propuesto 23

Derive  $g(x) = \exp[u(x)]$ , donde  $u$  es diferenciable.

## Propuesto 24

Derive  $h(x) = \ln[u(x)]$ , donde  $u$  es diferenciable.

## Propuesto 25

Derive  $i(x) = \sqrt{u(x)}$ , donde  $u$  es diferenciable.

## Propuesto 26

Demuestre la regla de la derivada de un cociente (Proposición 26) utilizando la regla de la derivada de un producto (Proposición 25) y la regla de la cadena (Proposición 27).

## Propuesto 27

Aplicación: Demuestre que la elasticidad-precio de la demanda es simplemente  $\frac{d \ln Q}{d \ln P}$ .

# Derivada de una Derivada

Vimos que la derivada de una función es otra función...

# Derivada de una Derivada

Vimos que la derivada de una función es otra función...  
Luego, *¿podrá esta nueva función ser derivable?*



# Derivada de una Derivada

Vimos que la derivada de una función es otra función...

Luego, *¿podrá esta nueva función ser derivable?* En general, **sí**.

# Derivada de una Derivada

Vimos que la derivada de una función es otra función...

Luego, *¿podrá esta nueva función ser derivable?* En general, **sí**.

Si derivamos la derivada de una función  $f(x)$ , llamaremos al resultado, caso exista, la **segunda derivada** de  $f(x)$  y la denotaremos por

$f''(x)$  o  $\frac{d^2f}{dx^2}(x)$  (ojo con la notación).

# Derivada de una Derivada

Vimos que la derivada de una función es otra función...

Luego, *¿podrá esta nueva función ser derivable?* En general, **sí**.

Si derivamos la derivada de una función  $f(x)$ , llamaremos al resultado, caso exista, la **segunda derivada** de  $f(x)$  y la denotaremos por

$f''(x)$  o  $\frac{d^2f}{dx^2}(x)$  (ojo con la notación).

Similarmente, existe la posibilidad de computar una tercera derivada, o una cuarta, o una  $n$ -ésima.

# Derivada de una Derivada

Vimos que la derivada de una función es otra función...

Luego, *¿podrá esta nueva función ser derivable?* En general, **sí**.

Si derivamos la derivada de una función  $f(x)$ , llamaremos al resultado, caso exista, la **segunda derivada** de  $f(x)$  y la denotaremos por

$f''(x)$  o  $\frac{d^2f}{dx^2}(x)$  (ojo con la notación).

Similarmente, existe la posibilidad de computar una tercera derivada, o una cuarta, o una  $n$ -ésima.

Así, a las derivadas de orden mayor a uno (dos, tres, cuatro, etc.) se les llaman **derivadas de orden superior**.

# Derivada de una Derivada

Vimos que la derivada de una función es otra función...

Luego, *¿podrá esta nueva función ser derivable?* En general, **sí**.

Si derivamos la derivada de una función  $f(x)$ , llamaremos al resultado, caso exista, la **segunda derivada** de  $f(x)$  y la denotaremos por

$f''(x)$  o  $\frac{d^2f}{dx^2}(x)$  (ojo con la notación).

Similarmente, existe la posibilidad de computar una tercera derivada, o una cuarta, o una  $n$ -ésima.

Así, a las derivadas de orden mayor a uno (dos, tres, cuatro, etc.) se les llaman **derivadas de orden superior**.

## Ejemplo 26

Obtenga la segunda derivada de la función  $f(x) = \exp(ax)$ , con  $a \in \mathbb{R}$ .

# Derivada de una Derivada

Vimos que la derivada de una función es otra función...

Luego, *¿podrá esta nueva función ser derivable?* En general, **sí**.

Si derivamos la derivada de una función  $f(x)$ , llamaremos al resultado, caso exista, la **segunda derivada** de  $f(x)$  y la denotaremos por

$f''(x)$  o  $\frac{d^2f}{dx^2}(x)$  (ojo con la notación).

Similarmente, existe la posibilidad de computar una tercera derivada, o una cuarta, o una  $n$ -ésima.

Así, a las derivadas de orden mayor a uno (dos, tres, cuatro, etc.) se les llaman **derivadas de orden superior**.

## Ejemplo 26

Obtenga la segunda derivada de la función  $f(x) = \exp(ax)$ , con  $a \in \mathbb{R}$ .

## Solución 26

La segunda derivada de una función es simplemente la derivada de la derivada de la función.

# Derivada de una Derivada

Vimos que la derivada de una función es otra función...

Luego, *¿podrá esta nueva función ser derivable?* En general, **sí**.

Si derivamos la derivada de una función  $f(x)$ , llamaremos al resultado, caso exista, la **segunda derivada** de  $f(x)$  y la denotaremos por

$f''(x)$  o  $\frac{d^2f}{dx^2}(x)$  (ojo con la notación).

Similarmente, existe la posibilidad de computar una tercera derivada, o una cuarta, o una  $n$ -ésima.

Así, a las derivadas de orden mayor a uno (dos, tres, cuatro, etc.) se les llaman **derivadas de orden superior**.

## Ejemplo 26

Obtenga la segunda derivada de la función  $f(x) = \exp(ax)$ , con  $a \in \mathbb{R}$ .

## Solución 26

La segunda derivada de una función es simplemente la derivada de la derivada de la función. En este caso tenemos que

$$f''(x) = a \exp(ax).$$

# Derivada de una Derivada

Vimos que la derivada de una función es otra función...

Luego, *¿podrá esta nueva función ser derivable?* En general, **sí**.

Si derivamos la derivada de una función  $f(x)$ , llamaremos al resultado, caso exista, la **segunda derivada** de  $f(x)$  y la denotaremos por

$f''(x)$  o  $\frac{d^2f}{dx^2}(x)$  (ojo con la notación).

Similarmente, existe la posibilidad de computar una tercera derivada, o una cuarta, o una  $n$ -ésima.

Así, a las derivadas de orden mayor a uno (dos, tres, cuatro, etc.) se les llaman **derivadas de orden superior**.

## Ejemplo 26

Obtenga la segunda derivada de la función  $f(x) = \exp(ax)$ , con  $a \in \mathbb{R}$ .

## Solución 26

La segunda derivada de una función es simplemente la derivada de la derivada de la función. En este caso tenemos que  $f'(x) = a \exp(ax)$ . Luego, la segunda derivada es  $f''(x) = a^2 \exp(ax)$ .



# Ejercicios: Derivadas de Orden Superior

## Propuesto 28

Obtenga la  $n$ -ésima derivada de la función anterior ( $f(x) = \exp(ax)$ ).

# Ejercicios: Derivadas de Orden Superior

## Propuesto 28

Obtenga la  $n$ -ésima derivada de la función anterior ( $f(x) = \exp(ax)$ ).  
Repita el ejercicio con la función  $g(x) = \ln x$ .

# Ejercicios: Derivadas de Orden Superior

## Propuesto 28

Obtenga la  $n$ -ésima derivada de la función anterior ( $f(x) = \exp(ax)$ ). Repita el ejercicio con la función  $g(x) = \ln x$ .

## Propuesto 29

*¿Se le ocurre alguna función que no sea infinitamente derivable?*

# Ejercicios: Derivadas de Orden Superior

## Propuesto 28

Obtenga la  $n$ -ésima derivada de la función anterior ( $f(x) = \exp(ax)$ ). Repita el ejercicio con la función  $g(x) = \ln x$ .

## Propuesto 29

*¿Se le ocurre alguna función que no sea infinitamente derivable?*  
Esto es, alguna función que tras alguna cantidad finita de derivadas de como resultado otra función que no es derivable en todo su dominio.

# Regla de la Función Inversa

## Proposición 28

*Sea  $y = g(x)$  una función, cuya inversa es  $f$ , de modo que  $f(y) = x$ . Si ambas funciones son derivables, entonces*

$$f'(y) = \frac{1}{g'(f(y))}.$$

## Demostración.

*Como  $f$  y  $g$  son inversas entre sí, se da que  $f(g(x)) = x$ .*

# Regla de la Función Inversa

## Proposición 28

*Sea  $y = g(x)$  una función, cuya inversa es  $f$ , de modo que  $f(y) = x$ . Si ambas funciones son derivables, entonces*

$$f'(y) = \frac{1}{g'(f(y))}.$$

## Demostración.

*Como  $f$  y  $g$  son inversas entre sí, se da que  $f(g(x)) = x$ .*

*Podemos derivar esto (why?) para obtener  $f'(g(x))g'(x) = 1$ .*

# Regla de la Función Inversa

## Proposición 28

*Sea  $y = g(x)$  una función, cuya inversa es  $f$ , de modo que  $f(y) = x$ . Si ambas funciones son derivables, entonces*

$$f'(y) = \frac{1}{g'(f(y))}.$$

## Demostración.

*Como  $f$  y  $g$  son inversas entre sí, se da que  $f(g(x)) = x$ .*

*Podemos derivar esto (why?) para obtener  $f'(g(x))g'(x) = 1$ .*

*Pero lo anterior implica que  $f'(g(x)) = \frac{1}{g'(x)}$ , que es equivalente a lo que queremos demostrar.*



# Regla de la Función Inversa

## Proposición 28

*Sea  $y = g(x)$  una función, cuya inversa es  $f$ , de modo que  $f(y) = x$ . Si ambas funciones son derivables, entonces*

$$f'(y) = \frac{1}{g'(f(y))}.$$

## Demostración.

*Como  $f$  y  $g$  son inversas entre sí, se da que  $f(g(x)) = x$ .*

*Podemos derivar esto (why?) para obtener  $f'(g(x))g'(x) = 1$ .*

*Pero lo anterior implica que  $f'(g(x)) = \frac{1}{g'(x)}$ , que es equivalente a lo que queremos demostrar.*



## Propuesto 30

*Demuestre que  $(x^2)' = 2x$  utilizando la regla de la función inversa. Acote el dominio a los  $x > 0$ .*



# Dependencia Implícita

Hasta ahora hemos trabajado con variables dependientes que dependen *explícitamente* de una variable independiente, i.e.  $y = f(x)$ .


# Dependencia Implícita

Hasta ahora hemos trabajado con variables dependientes que dependen *explícitamente* de una variable independiente, i.e.  $y = f(x)$ . Sin embargo, podríamos estar interesados en trabajar con variables dependientes que dependen de manera implícita de otra variable.

# Dependencia Implícita

Hasta ahora hemos trabajado con variables dependientes que dependen *explícitamente* de una variable independiente, i.e.  $y = f(x)$ . Sin embargo, podríamos estar interesados en trabajar con variables dependientes que dependen de manera implícita de otra variable. Por ejemplo, tomemos la relación definida por  $x^2 + y^2 = 4$  con  $y > 0$ . En esta ecuación,  $y$  depende *implícitamente* de  $x$ .

Figura 31: Gráfico de  $x^2 + y^2 = 4$  (con  $y > 0$ )



# Derivación Implícita

Siguiendo con el mismo ejemplo, podemos estar interesados en calcular la derivada de esta función.

## Derivación Implícita

Siguiendo con el mismo ejemplo, podemos estar interesados en calcular la derivada de esta función.

Una forma de hacer esto es *despejando*  $y$  para que dependa explícitamente de  $x$  y calcular la derivada como en cualquier otro caso, obteniendo como resultado  $\frac{-x}{\sqrt{4-x^2}}$ .

## Derivación Implícita

Siguiendo con el mismo ejemplo, podemos estar interesados en calcular la derivada de esta función.

Una forma de hacer esto es *despejando*  $y$  para que dependa explícitamente de  $x$  y calcular la derivada como en cualquier otro caso, obteniendo como resultado  $\frac{-x}{\sqrt{4-x^2}}$ . Sin embargo, despejar la varia-

ble dependiente no es siempre tan trivial, por lo que puede ser más cómodo **derivar implícitamente**.

# Derivación Implícita

Siguiendo con el mismo ejemplo, podemos estar interesados en calcular la derivada de esta función.

Una forma de hacer esto es *despejando*  $y$  para que dependa explícitamente de  $x$  y calcular la derivada como en cualquier otro caso, obteniendo como resultado  $\frac{-x}{\sqrt{4-x^2}}$ . Sin embargo, despejar la varia-

ble dependiente no es siempre tan trivial, por lo que puede ser más cómodo **derivar implícitamente**.

## Ejemplo 27

Derive implícitamente  $x^2 + y^2 = 4$  respecto a  $x$ .

## Solución 27

Utilizando la regla de la cadena y las derivadas conocidas tenemos que la derivada es  $2x + 2y \cdot y' = 0$ .

# Derivación Implícita

Siguiendo con el mismo ejemplo, podemos estar interesados en calcular la derivada de esta función.

Una forma de hacer esto es *despejando*  $y$  para que dependa explícitamente de  $x$  y calcular la derivada como en cualquier otro caso, obteniendo como resultado  $\frac{-x}{\sqrt{4-x^2}}$ . Sin embargo, despejar la varia-

ble dependiente no es siempre tan trivial, por lo que puede ser más cómodo **derivar implícitamente**.

## Ejemplo 27

Derive implícitamente  $x^2 + y^2 = 4$  respecto a  $x$ .

## Solución 27

Utilizando la regla de la cadena y las derivadas conocidas tenemos que la derivada es  $2x + 2y \cdot y' = 0$ . Notar como al derivar el término  $y^2$  respecto a  $x$  se aplica la regla de la cadena, pues  $y$  depende de  $x$ .



# Derivación Implícita

Siguiendo con el mismo ejemplo, podemos estar interesados en calcular la derivada de esta función.

Una forma de hacer esto es *despejando*  $y$  para que dependa explícitamente de  $x$  y calcular la derivada como en cualquier otro caso, obteniendo como resultado  $\frac{-x}{\sqrt{4-x^2}}$ . Sin embargo, despejar la varia-

ble dependiente no es siempre tan trivial, por lo que puede ser más cómodo **derivar implícitamente**.

## Ejemplo 27

Derive implícitamente  $x^2 + y^2 = 4$  respecto a  $x$ .

## Solución 27

Utilizando la regla de la cadena y las derivadas conocidas tenemos que la derivada es  $2x + 2y \cdot y' = 0$ . Notar como al derivar el término  $y^2$  respecto a  $x$  se aplica la regla de la cadena, pues  $y$  depende de  $x$ . Por lo tanto, al despejar  $y'$  tenemos  $y' = -\frac{x}{y}$ .

# Derivación Implícita

Siguiendo con el mismo ejemplo, podemos estar interesados en calcular la derivada de esta función.

Una forma de hacer esto es *despejando*  $y$  para que dependa explícitamente de  $x$  y calcular la derivada como en cualquier otro caso, obteniendo como resultado  $\frac{-x}{\sqrt{4-x^2}}$ . Sin embargo, despejar la varia-

ble dependiente no es siempre tan trivial, por lo que puede ser más cómodo **derivar implícitamente**.

## Ejemplo 27

Derive implícitamente  $x^2 + y^2 = 4$  respecto a  $x$ .

## Solución 27

Utilizando la regla de la cadena y las derivadas conocidas tenemos que la derivada es  $2x + 2y \cdot y' = 0$ . Notar como al derivar el término  $y^2$  respecto a  $x$  se aplica la regla de la cadena, pues  $y$  depende de  $x$ . Por lo tanto, al despejar  $y'$  tenemos  $y' = -\frac{x}{y}$ .

*¿Podemos dejar el resultado dependiendo de  $y$ ?*

# Derivación Implícita

Siguiendo con el mismo ejemplo, podemos estar interesados en calcular la derivada de esta función.

Una forma de hacer esto es *despejando*  $y$  para que dependa explícitamente de  $x$  y calcular la derivada como en cualquier otro caso, obteniendo como resultado  $\frac{-x}{\sqrt{4-x^2}}$ . Sin embargo, despejar la varia-

ble dependiente no es siempre tan trivial, por lo que puede ser más cómodo **derivar implícitamente**.

## Ejemplo 27

Derive implícitamente  $x^2 + y^2 = 4$  respecto a  $x$ .

## Solución 27

Utilizando la regla de la cadena y las derivadas conocidas tenemos que la derivada es  $2x + 2y \cdot y' = 0$ . Notar como al derivar el término  $y^2$  respecto a  $x$  se aplica la regla de la cadena, pues  $y$  depende de  $x$ . Por lo tanto, al despejar  $y'$  tenemos  $y' = -\frac{x}{y}$ .

*¿Podemos dejar el resultado dependiendo de  $y$ ? ¿Son equivalentes los resultados de la derivación implícita y la derivación explícita?*

# Ejercicios: Derivación Implícita

## Propuesto 31

Derive implícitamente  $\ln y + x^2 = 8x$ .

# Ejercicios: Derivación Implícita

## Propuesto 31

Derive implícitamente  $\ln y + x^2 = 8x$ .

## Propuesto 32

Obtenga la derivada de  $x^x$  utilizando derivación implícita.

**HINT:** Puede ser útil partir el ejercicio aplicando un logaritmo sobre una relación.

# Ejercicios: Derivación Implícita

## Propuesto 31

Derive implícitamente  $\ln y + x^2 = 8x$ .

## Propuesto 32

Obtenga la derivada de  $x^x$  utilizando derivación implícita.

**HINT:** Puede ser útil partir el ejercicio aplicando un logaritmo sobre una relación.

## Propuesto 33

Obtenga implícitamente la segunda derivada de  $y$  del Ejemplo 27.

# MÓDULO 11

► [Volver al Inicio de la Sección](#)

# Aproximaciones a una Función

Anteriormente vimos que a partir de la definición de derivada podemos obtener una expresión para la *mejor aproximación afín* a una función al rededor de un punto...



# Aproximaciones a una Función

Anteriormente vimos que a partir de la definición de derivada podemos obtener una expresión para la *mejor aproximación afín* a una función al rededor de un punto...

En general, cuando nos enfrentamos a una función derivable, tenemos la opción de *realizar una aproximación polinómica* a esta (en efecto, la aproximación afín es un caso particular).

# Aproximaciones a una Función

Anteriormente vimos que a partir de la definición de derivada podemos obtener una expresión para la *mejor aproximación afín* a una función al rededor de un punto...

En general, cuando nos enfrentamos a una función derivable, tenemos la opción de *realizar una aproximación polinómica* a esta (en efecto, la aproximación afín es un caso particular).

Así, teniendo una función diferenciable  $f(x)$ , un punto  $x_0$  al rededor del cual haremos la aproximación y un grado  $n$  para el polinomio que queramos, podemos establecer una función polinómica de grado  $n$  que *se parece mucho* a  $f$  en torno a  $x_0$ .

# Aproximaciones a una Función

Anteriormente vimos que a partir de la definición de derivada podemos obtener una expresión para la *mejor aproximación afín* a una función al rededor de un punto...


En general, cuando nos enfrentamos a una función derivable, tenemos la opción de *realizar una aproximación polinómica* a esta (en efecto, la aproximación afín es un caso particular).

Así, teniendo una función diferenciable  $f(x)$ , un punto  $x_0$  al rededor del cual haremos la aproximación y un grado  $n$  para el polinomio que queramos, podemos establecer una función polinómica de grado  $n$  que *se parece mucho* a  $f$  en torno a  $x_0$ .

A estas funciones polinómicas que se aproximan a otra función las llamaremos *Series (o Aproximaciones o Expansiones o Polinomios) de Taylor*.


# Gráfico: Aproximaciones a una Función

Figura 32: Aproximaciones a  $\sqrt{x}$  en torno a 1




# Gráfico: Aproximaciones a una Función

Figura 32: Aproximaciones a  $\sqrt{x}$  en torno a 1




# Gráfico: Aproximaciones a una Función

Figura 32: Aproximaciones a  $\sqrt{x}$  en torno a 1




# Gráfico: Aproximaciones a una Función

Figura 32: Aproximaciones a  $\sqrt{x}$  en torno a 1



# Gráfico: Aproximaciones a una Función

Figura 32: Aproximaciones a  $\sqrt{x}$  en torno a 1





# Aproximación de Taylor

## Definición 17

Una Aproximación de Taylor de grado  $n$  en torno a  $x_0$  es un polinomio tal que si se aproxima la función  $f(x)$  se cumple que

$$f(x) \approx f(x_0) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0) (x - x_0)^k.$$

# Aproximación de Taylor

## Definición 17

Una Aproximación de Taylor de grado  $n$  en torno a  $x_0$  es un polinomio tal que si se aproxima la función  $f(x)$  se cumple que

$$f(x) \approx f(x_0) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0) (x - x_0)^k.$$

Así, una aproximación de primer grado es  $f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ ,

# Aproximación de Taylor

## Definición 17

Una Aproximación de Taylor de grado  $n$  en torno a  $x_0$  es un polinomio tal que si se aproxima la función  $f(x)$  se cumple que

$$f(x) \approx f(x_0) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0) (x - x_0)^k.$$

Así, una aproximación de primer grado es  $f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ , una de segundo grado se parece a  $f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2$ ,

# Aproximación de Taylor

## Definición 17

Una Aproximación de Taylor de grado  $n$  en torno a  $x_0$  es un polinomio tal que si se aproxima la función  $f(x)$  se cumple que

$$f(x) \approx f(x_0) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0) (x - x_0)^k.$$

Así, una aproximación de primer grado es  $f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ , una de segundo grado se parece a  $f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2$ , una de tercer grado sería  $f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2 + \frac{1}{6}f'''(x_0)(x - x_0)^3$ , etc.

# Errores de Aproximación

Claramente, una aproximación no tiene por qué ser exacta, pues perfectamente puede existir un *error de aproximación*.

# Errores de Aproximación

Claramente, una aproximación no tiene por qué ser exacta, pues perfectamente puede existir un *error de aproximación*.

Este error va a corresponder a la diferencia entre la función verdadera y el polinomio que la aproxima.

# Errores de Aproximación

Claramente, una aproximación no tiene por qué ser exacta, pues perfectamente puede existir un *error de aproximación*.

Este error va a corresponder a la diferencia entre la función verdadera y el polinomio que la aproxima.

Si denotamos este error por  $\varepsilon_x$ , entonces tenemos que

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0) (x - x_0)^k + \varepsilon_x.$$

# Errores de Aproximación

Claramente, una aproximación no tiene por qué ser exacta, pues perfectamente puede existir un *error de aproximación*.

Este error va a corresponder a la diferencia entre la función verdadera y el polinomio que la aproxima.

Si denotamos este error por  $\varepsilon_x$ , entonces tenemos que

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x - x_0)^k + \varepsilon_x.$$

*¿Qué pasa si se evalúa la función  $f(x)$  en  $x = x_0$ ?*



# Errores de Aproximación

Claramente, una aproximación no tiene por qué ser exacta, pues perfectamente puede existir un *error de aproximación*.

Este error va a corresponder a la diferencia entre la función verdadera y el polinomio que la aproxima.

Si denotamos este error por  $\varepsilon_x$ , entonces tenemos que

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x - x_0)^k + \varepsilon_x.$$

*¿Qué pasa si se evalúa la función  $f(x)$  en  $x = x_0$ ?*

*¿Qué pasa si la función  $f(x)$  es un polinomio?*

# Errores de Aproximación

Claramente, una aproximación no tiene por qué ser exacta, pues perfectamente puede existir un *error de aproximación*.

Este error va a corresponder a la diferencia entre la función verdadera y el polinomio que la aproxima.

Si denotamos este error por  $\varepsilon_x$ , entonces tenemos que

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x-x_0)^k + \varepsilon_x.$$

*¿Qué pasa si se evalúa la función  $f(x)$  en  $x = x_0$ ?*

*¿Qué pasa si la función  $f(x)$  es un polinomio?*

*¿Para qué nos podría servir esto?*

# Aplicación: Aproximando Irracionales

## Ejemplo 28

Aproxime el valor de  $e^{0,1}$  con un Polinomio de Taylor de segundo orden.

**HINT:** Piense que  $f(x) = e^x$  y elija algún valor conveniente de  $x_0$ .

# Aplicación: Aproximando Irracionales

## Ejemplo 28

Aproxime el valor de  $e^{0,1}$  con un Polinomio de Taylor de segundo orden.

**HINT:** Piense que  $f(x) = e^x$  y elija algún valor conveniente de  $x_0$ .

## Solución 28

Partimos eligiendo  $x_0 = 0$  por dos razones:

# Aplicación: Aproximando Irracionales

## Ejemplo 28

Aproxime el valor de  $e^{0,1}$  con un Polinomio de Taylor de segundo orden.

**HINT:** Piense que  $f(x) = e^x$  y elija algún valor conveniente de  $x_0$ .

## Solución 28

Partimos eligiendo  $x_0 = 0$  por dos razones:

1. conocemos el valor de  $f(x_0)$  y

# Aplicación: Aproximando Irracionales

## Ejemplo 28

Aproxime el valor de  $e^{0,1}$  con un Polinomio de Taylor de segundo orden.

**HINT:** Piense que  $f(x) = e^x$  y elija algún valor conveniente de  $x_0$ .

## Solución 28

Partimos eligiendo  $x_0 = 0$  por dos razones:

1. conocemos el valor de  $f(x_0)$  y
2. es un valor cercano a  $x = 0,1$ .

# Aplicación: Aproximando Irracionales

## Ejemplo 28

Aproxime el valor de  $e^{0,1}$  con un Polinomio de Taylor de segundo orden.

**HINT:** Piense que  $f(x) = e^x$  y elija algún valor conveniente de  $x_0$ .

## Solución 28

Partimos eligiendo  $x_0 = 0$  por dos razones:

1. conocemos el valor de  $f(x_0)$  y
2. es un valor cercano a  $x = 0,1$ .

# Aplicación: Aproximando Irracionales

## Ejemplo 28

Aproxime el valor de  $e^{0,1}$  con un Polinomio de Taylor de segundo orden.

**HINT:** Piense que  $f(x) = e^x$  y elija algún valor conveniente de  $x_0$ .

## Solución 28

Partimos eligiendo  $x_0 = 0$  por dos razones:

1. conocemos el valor de  $f(x_0)$  y
2. es un valor cercano a  $x = 0,1$ .

Luego, calculamos las primeras dos derivadas de la función (por tratarse de una aproximación de segundo orden):



# Aplicación: Aproximando Irracionales

## Ejemplo 28

Aproxime el valor de  $e^{0,1}$  con un Polinomio de Taylor de segundo orden.

**HINT:** Piense que  $f(x) = e^x$  y elija algún valor conveniente de  $x_0$ .

## Solución 28

Partimos eligiendo  $x_0 = 0$  por dos razones:

1. conocemos el valor de  $f(x_0)$  y
2. es un valor cercano a  $x = 0,1$ .

Luego, calculamos las primeras dos derivadas de la función (por tratarse de una aproximación de segundo orden):  $f'(x) = f''(x) = e^x$ .

# Aplicación: Aproximando Irracionales

## Ejemplo 28

Aproxime el valor de  $e^{0,1}$  con un Polinomio de Taylor de segundo orden.

**HINT:** Piense que  $f(x) = e^x$  y elija algún valor conveniente de  $x_0$ .

## Solución 28

Partimos eligiendo  $x_0 = 0$  por dos razones:

1. conocemos el valor de  $f(x_0)$  y
2. es un valor cercano a  $x = 0,1$ .

Luego, calculamos las primeras dos derivadas de la función (por tratarse de una aproximación de segundo orden):  $f'(x) = f''(x) = e^x$ . Por último, sólo debemos reemplazar lo que tenemos en la expresión de una Aproximación de Taylor de segundo grado:

# Aplicación: Aproximando Irracionales

## Ejemplo 28

Aproxime el valor de  $e^{0,1}$  con un Polinomio de Taylor de segundo orden.

**HINT:** Piense que  $f(x) = e^x$  y elija algún valor conveniente de  $x_0$ .

## Solución 28

Partimos eligiendo  $x_0 = 0$  por dos razones:

1. conocemos el valor de  $f(x_0)$  y
2. es un valor cercano a  $x = 0,1$ .

Luego, calculamos las primeras dos derivadas de la función (por tratarse de una aproximación de segundo orden):  $f'(x) = f''(x) = e^x$ . Por último, sólo debemos reemplazar lo que tenemos en la expresión de una Aproximación de Taylor de segundo grado:

$$f(x) \approx f(0) + f'(0)(x-0) + \frac{1}{2}f''(0)(x-0)^2$$

$$\Rightarrow f(0,1) \approx 1 + 1 \cdot 0,1 + \frac{1}{2}0,1^2 = 1,105 \approx 1,10517091808.$$

# Series de Maclaurin

## Definición 18

Una Serie de Maclaurin es una Serie de Taylor en torno a  $x_0 = 0$ .

# Series de Maclaurin

## Definición 18

Una Serie de Maclaurin es una Serie de Taylor en torno a  $x_0 = 0$ .

## Propuesto 34

Obtenga la Serie de Maclaurin de grado 2 de la función  $f(x) = (1-x)^{-1}$ . ¿Cómo sería la serie de grado  $n$ ?

## Propuesto 35

Obtenga la Serie de Maclaurin de grado 2 de la función  $g(x) = e^x$ . ¿Cómo sería la serie de grado  $n$ ?

# Aplicación: Interés Compuesto

## Propuesto 36

¿Por qué cuando en Chile se calcula la inflación anual a partir de las inflaciones mensuales, la gente suele simplemente sumarlas en vez de utilizar una fórmula tipo “interés compuesto”? Puede hacerse la misma pregunta con un depósito a plazo.

**HINT:** Suponga que la tasa es constante.

# Regla de L'Hôpital

Muchas veces nos vamos a enfrentar a límites cuyo resultado al evaluar directamente es de la forma  $0/0$  o  $\infty/\infty$ .

# Regla de L'Hôpital

Muchas veces nos vamos a enfrentar a límites cuyo resultado al evaluar directamente es de la forma  $0/0$  o  $\infty/\infty$ .

En estas situaciones podemos aplicar la regla de L'Hôpital, que básicamente indica que

$$\lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow k} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$



# Teorema de Rolle

## Proposición 29

*Sea  $f$  una función continua en  $[a,b]$  y derivable en  $(a,b)$  tal que  $f(a) = f(b)$ . Entonces, existe al menos un  $c \in (a,b)$  tal que  $f'(c) = 0$ .*

## Demostración.

*Prueba informal: Suponga que  $f$  no es una función constante (si lo fuera, su derivada siempre sería 0).*

# Teorema de Rolle

## Proposición 29

*Sea  $f$  una función continua en  $[a,b]$  y derivable en  $(a,b)$  tal que  $f(a) = f(b)$ . Entonces, existe al menos un  $c \in (a,b)$  tal que  $f'(c) = 0$ .*

## Demostración.

*Prueba informal: Suponga que  $f$  no es una función constante (si lo fuera, su derivada siempre sería 0).*

*Luego, existe algún valor máximo mayor que  $f(a) = f(b)$  o algún valor mínimo menor que  $f(a) = f(b)$  en el intervalo  $(a,b)$ .*

# Teorema de Rolle

## Proposición 29

*Sea  $f$  una función continua en  $[a, b]$  y derivable en  $(a, b)$  tal que  $f(a) = f(b)$ . Entonces, existe al menos un  $c \in (a, b)$  tal que  $f'(c) = 0$ .*

## Demostración.

*Prueba informal: Suponga que  $f$  no es una función constante (si lo fuera, su derivada siempre sería 0).*

*Luego, existe algún valor máximo mayor que  $f(a) = f(b)$  o algún valor mínimo menor que  $f(a) = f(b)$  en el intervalo  $(a, b)$ .*

*Pero como  $f$  es continua, la derivada a la izquierda de un máximo debe ser no negativa y a la derecha del máximo debe ser no negativa. La única forma de que se alcance el máximo es que en ese punto la derivada sea 0 (ver Figura 33).*

# Teorema de Rolle

## Proposición 29

*Sea  $f$  una función continua en  $[a, b]$  y derivable en  $(a, b)$  tal que  $f(a) = f(b)$ . Entonces, existe al menos un  $c \in (a, b)$  tal que  $f'(c) = 0$ .*

## Demostración.

*Prueba informal: Suponga que  $f$  no es una función constante (si lo fuera, su derivada siempre sería 0).*

*Luego, existe algún valor máximo mayor que  $f(a) = f(b)$  o algún valor mínimo menor que  $f(a) = f(b)$  en el intervalo  $(a, b)$ .*

*Pero como  $f$  es continua, la derivada a la izquierda de un máximo debe ser no negativa y a la derecha del máximo debe ser no negativa. La única forma de que se alcance el máximo es que en ese punto la derivada sea 0 (ver Figura 33). La explicación es análoga para el caso de un valor mínimo.*

# Teorema de Rolle

## Proposición 29

*Sea  $f$  una función continua en  $[a, b]$  y derivable en  $(a, b)$  tal que  $f(a) = f(b)$ . Entonces, existe al menos un  $c \in (a, b)$  tal que  $f'(c) = 0$ .*

## Demostración.

*Prueba informal: Suponga que  $f$  no es una función constante (si lo fuera, su derivada siempre sería 0).*

*Luego, existe algún valor máximo mayor que  $f(a) = f(b)$  o algún valor mínimo menor que  $f(a) = f(b)$  en el intervalo  $(a, b)$ .*


*Pero como  $f$  es continua, la derivada a la izquierda de un máximo debe ser no negativa y a la derecha del máximo debe ser no negativa. La única forma de que se alcance el máximo es que en ese punto la derivada sea 0 (ver Figura 33). La explicación es análoga para el caso de un valor mínimo.*

*Esto se puede justificar más formalmente utilizando la Proposición 18.*




# Gráfico: Teorema de Rolle

Figura 33: Teorema de Rolle



# Gráfico: Teorema de Rolle

Figura 33: Teorema de Rolle



# Teorema del Valor Medio

Es una generalización del Teorema de Rolle...



# Teorema del Valor Medio

Es una generalización del Teorema de Rolle...

## Proposición 30

*Sea  $f$  una función continua en  $[a, b]$  y derivable en  $(a, b)$ . Entonces, existe al menos un  $c \in (a, b)$  tal que  $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ .*

## Demostración.

*La ecuación de la recta que pasa entre los puntos  $(a, f(a))$  y  $(b, f(b))$  es  $y = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$  (ver Figura 34).*

# Teorema del Valor Medio

Es una generalización del Teorema de Rolle...

## Proposición 30

*Sea  $f$  una función continua en  $[a,b]$  y derivable en  $(a,b)$ . Entonces, existe al menos un  $c \in (a,b)$  tal que  $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ .*

## Demostración.

*La ecuación de la recta que pasa entre los puntos  $(a, f(a))$  y  $(b, f(b))$  es  $y = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$  (ver Figura 34).*

*Sea  $g(x) = f(x) - y$ , de modo que esta función es continua en  $[a,b]$  y derivable en  $(a,b)$ .*

# Teorema del Valor Medio

Es una generalización del Teorema de Rolle...

## Proposición 30

*Sea  $f$  una función continua en  $[a, b]$  y derivable en  $(a, b)$ . Entonces, existe al menos un  $c \in (a, b)$  tal que  $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ .*

## Demostración.

*La ecuación de la recta que pasa entre los puntos  $(a, f(a))$  y  $(b, f(b))$  es*

$$y = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a) \text{ (ver Figura 34).}$$

*Sea  $g(x) = f(x) - y$ , de modo que esta función es continua en  $[a, b]$  y derivable en  $(a, b)$ .*

*Luego, notamos que  $g(a) = g(b)$ , por lo que, por la Proposición 29, debe existir algún  $c \in (a, b)$  tal que  $g'(c) = 0$ .*

# Teorema del Valor Medio

Es una generalización del Teorema de Rolle...

## Proposición 30

Sea  $f$  una función continua en  $[a,b]$  y derivable en  $(a,b)$ . Entonces, existe al menos un  $c \in (a,b)$  tal que  $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ .

## Demostración.

La ecuación de la recta que pasa entre los puntos  $(a,f(a))$  y  $(b,f(b))$  es  $y = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + f(a)$  (ver Figura 34).

Sea  $g(x) = f(x) - y$ , de modo que esta función es continua en  $[a,b]$  y derivable en  $(a,b)$ .

Luego, notamos que  $g(a) = g(b)$ , por lo que, por la Proposición 29, debe existir algún  $c \in (a,b)$  tal que  $g'(c) = 0$ .


Pero  $g'(c) = f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0$ , por lo que necesariamente

$$f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$




# Gráfico: Teorema del Valor Medio

Figura 34: Teorema de Rolle




# Gráfico: Teorema del Valor Medio

Figura 34: Teorema de Rolle



# Gráfico: Teorema del Valor Medio

Figura 34: Teorema de Rolle



# Aplicación: Teorema del Valor Medio


## Ejemplo 29

El PIB chileno era de 77 mil millones de dólares en 2003, mientras que en 2013 era de 277 mil millones de dólares.

Considerando que el PIB es una función continua en el tiempo, es imposible que

hayamos tenido una tasa de crecimiento instantánea de 20 mil millones de dólares, pues eso superaría nuestro máximo crecimiento histórico de un 12,3%. Comente.

Figura 35: PIB de Chile





# Aplicación: Teorema del Valor Medio

## Ejemplo 29

El PIB chileno era de 77 mil millones de dólares en 2003, mientras que en 2013 era de 277 mil millones de dólares.

Considerando que el PIB es una función continua en el tiempo, es imposible que


hayamos tenido una tasa de crecimiento instantánea de 20 mil millones de dólares, pues eso superaría nuestro máximo crecimiento histórico de un 12,3%. Comente.

## Solución 29

Falso. En algún momento el crecimiento instantáneo fue de

$$\frac{277 - 77}{10} = 20 \text{ mil millones de dólares.}$$

Figura 35: PIB de Chile



# MÓDULO 12

► [Volver al Inicio de la Sección](#)

# Comportamientos Locales

Anteriormente discutimos cómo podíamos inferir ciertas propiedades de una función utilizando incrementos (ver Figura 3).

# Comportamientos Locales

Anteriormente discutimos cómo podíamos inferir ciertas propiedades de una función utilizando incrementos (ver Figura 3). Sin embargo, también vimos que estas propiedades se distorsionan cuando utilizamos intervalos muy amplios (Figura 4).

# Comportamientos Locales

Anteriormente discutimos cómo podíamos inferir ciertas propiedades de una función utilizando incrementos (ver Figura 3).

Sin embargo, también vimos que estas propiedades se distorsionan cuando utilizamos intervalos muy amplios (Figura 4).

Por último, comentamos que cuando utilizábamos derivadas, i.e. intervalos arbitrariamente pequeños, podíamos estar seguros de que estábamos capturando el correcto comportamiento de la función en un punto (Figura 27).

# Comportamientos Locales

Anteriormente discutimos cómo podíamos inferir ciertas propiedades de una función utilizando incrementos (ver Figura 3).

Sin embargo, también vimos que estas propiedades se distorsionan cuando utilizamos intervalos muy amplios (Figura 4).

Por último, comentamos que cuando utilizábamos derivadas, i.e. intervalos arbitrariamente pequeños, podíamos estar seguros de que estábamos capturando el correcto comportamiento de la función en un punto (Figura 27).

Particularmente, nos vamos a preocupar de estudiar dos comportamientos locales muy importantes de las funciones: *crecimiento* y *concavidad*.

# Comportamientos Locales

Anteriormente discutimos cómo podíamos inferir ciertas propiedades de una función utilizando incrementos (ver Figura 3).

Sin embargo, también vimos que estas propiedades se distorsionan cuando utilizamos intervalos muy amplios (Figura 4).

Por último, comentamos que cuando utilizábamos derivadas, i.e. intervalos arbitrariamente pequeños, podíamos estar seguros de que estábamos capturando el correcto comportamiento de la función en un punto (Figura 27).

Particularmente, nos vamos a preocupar de estudiar dos comportamientos locales muy importantes de las funciones: *crecimiento* y *concavidad*.

En base a estas propiedades locales, podremos eventualmente inferir propiedades globales.

# Crecimiento y Decrecimiento Local

## Definición 19

Una función derivable  $f(x)$  es **creciente** en  $x = k$  si y sólo si  $f'(k) \geq 0$ .



# Crecimiento y Decrecimiento Local

## Definición 19

Una función derivable  $f(x)$  es **creciente** en  $x = k$  si y sólo si  $f'(k) \geq 0$ .

## Definición 20

Una función derivable  $f(x)$  es **decreciente** en  $x = k$  si y sólo si  $f'(k) \leq 0$ .

# Crecimiento y Decrecimiento Local

## Definición 19

Una función derivable  $f(x)$  es **creciente** en  $x = k$  si y sólo si  $f'(k) \geq 0$ .

## Definición 20

Una función derivable  $f(x)$  es **decreciente** en  $x = k$  si y sólo si  $f'(k) \leq 0$ .

## Definición 21

Una función derivable  $f(x)$  es **estrictamente creciente** en  $x = k$  si y sólo si  $f'(k) > 0$ .

# Crecimiento y Decrecimiento Local

## Definición 19

Una función derivable  $f(x)$  es **creciente** en  $x = k$  si y sólo si  $f'(k) \geq 0$ .

## Definición 20

Una función derivable  $f(x)$  es **decreciente** en  $x = k$  si y sólo si  $f'(k) \leq 0$ .

## Definición 21

Una función derivable  $f(x)$  es **estrictamente creciente** en  $x = k$  si y sólo si  $f'(k) > 0$ .

## Definición 22

Una función derivable  $f(x)$  es **estrictamente decreciente** en  $x = k$  si y sólo si  $f'(k) < 0$ .

# Crecimiento y Decrecimiento Local

## Definición 19

Una función derivable  $f(x)$  es **creciente** en  $x = k$  si y sólo si  $f'(k) \geq 0$ .

## Definición 20

Una función derivable  $f(x)$  es **decreciente** en  $x = k$  si y sólo si  $f'(k) \leq 0$ .

## Definición 21

Una función derivable  $f(x)$  es **estrictamente creciente** en  $x = k$  si y sólo si  $f'(k) > 0$ .

## Definición 22

Una función derivable  $f(x)$  es **estrictamente decreciente** en  $x = k$  si y sólo si  $f'(k) < 0$ .

Esto implica que toda función derivable permea el crecimiento o el decrecimiento de la recta tangente a ella en cada punto.

# Ejemplo: Crecimiento y Decrecimiento

## Ejemplo 30

Determine si la función  $f(x) = x(x - 1)(x - 2)$  es creciente o decreciente en los puntos  $x = -1$ ,  $x = 1$  y  $x = 3$ .

# Ejemplo: Crecimiento y Decrecimiento

## Ejemplo 30

Determine si la función  $f(x) = x(x - 1)(x - 2)$  es creciente o decreciente en los puntos  $x = -1$ ,  $x = 1$  y  $x = 3$ .

## Solución 30

Derivamos la función para obtener  $f'(x) = 3x^2 - 6x + 2$ .

# Ejemplo: Crecimiento y Decrecimiento

## Ejemplo 30

Determine si la función  $f(x) = x(x - 1)(x - 2)$  es creciente o decreciente en los puntos  $x = -1$ ,  $x = 1$  y  $x = 3$ .

## Solución 30

Derivamos la función para obtener  $f'(x) = 3x^2 - 6x + 2$ .

Luego, evaluamos en los puntos pedidos, obteniendo  $f'(-1) = 11$ ,  $f'(1) = -1$  y  $f'(3) = 11$ .

# Ejemplo: Crecimiento y Decrecimiento

## Ejemplo 30

Determine si la función  $f(x) = x(x-1)(x-2)$  es creciente o decreciente en los puntos  $x = -1$ ,  $x = 1$  y  $x = 3$ .

## Solución 30

Derivamos la función para obtener  $f'(x) = 3x^2 - 6x + 2$ .


Luego, evaluamos en los puntos pedidos, obteniendo  $f'(-1) = 11$ ,  $f'(1) = -1$  y  $f'(3) = 11$ .

Por lo tanto,  $f$  es creciente en  $-1$ , decreciente en  $1$  y creciente en  $3$ .




# Gráfico: Crecimiento y Decrecimiento

Figura 36: Crecimiento y Decrecimiento




# Gráfico: Crecimiento y Decrecimiento

Figura 36: Crecimiento y Decrecimiento




# Gráfico: Crecimiento y Decrecimiento

Figura 36: Crecimiento y Decrecimiento



# Gráfico: Crecimiento y Decrecimiento

Figura 36: Crecimiento y Decrecimiento



# Crecimiento en Intervalos

## Definición 23

Una función derivable  $f(x)$  es creciente (resp. estrictamente creciente) en el intervalo  $[a, b]$  si y sólo si  $f'(x) \geq 0$  (resp.  $f'(x) > 0$ ) para todo  $x \in [a, b]$ .

# Crecimiento en Intervalos

## Definición 23

Una función derivable  $f(x)$  es creciente (resp. estrictamente creciente) en el intervalo  $[a, b]$  si y sólo si  $f'(x) \geq 0$  (resp.  $f'(x) > 0$ ) para todo  $x \in [a, b]$ .

## Definición 24

Una función derivable  $f(x)$  es decreciente (resp. estrictamente decreciente) en el intervalo  $[a, b]$  si y sólo si  $f'(x) \leq 0$  (resp.  $f'(x) < 0$ ) para todo  $x \in [a, b]$ .

# Crecimiento en Intervalos

## Definición 23

Una función derivable  $f(x)$  es creciente (resp. estrictamente creciente) en el intervalo  $[a, b]$  si y sólo si  $f'(x) \geq 0$  (resp.  $f'(x) > 0$ ) para todo  $x \in [a, b]$ .

## Definición 24

Una función derivable  $f(x)$  es decreciente (resp. estrictamente decreciente) en el intervalo  $[a, b]$  si y sólo si  $f'(x) \leq 0$  (resp.  $f'(x) < 0$ ) para todo  $x \in [a, b]$ .

## Definición 25

Una función derivable  $f(x)$  es globalmente creciente (o bien, monótona creciente) si y sólo si  $f'(x) \geq 0$  en todo su dominio.

# Crecimiento en Intervalos

## Definición 23

Una función derivable  $f(x)$  es creciente (resp. estrictamente creciente) en el intervalo  $[a, b]$  si y sólo si  $f'(x) \geq 0$  (resp.  $f'(x) > 0$ ) para todo  $x \in [a, b]$ .

## Definición 24

Una función derivable  $f(x)$  es decreciente (resp. estrictamente decreciente) en el intervalo  $[a, b]$  si y sólo si  $f'(x) \leq 0$  (resp.  $f'(x) < 0$ ) para todo  $x \in [a, b]$ .

## Definición 25

Una función derivable  $f(x)$  es globalmente creciente (o bien, monótona creciente) si y sólo si  $f'(x) \geq 0$  en todo su dominio.

## Definición 26

Una función derivable  $f(x)$  es globalmente decreciente (o bien, monótona decreciente) si y sólo si  $f'(x) \leq 0$  en todo su dominio.



# Ejemplo: Crecimiento en Intervalos

## Ejemplo 31

Determine el/los intervalo(s) donde la función  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$  es creciente y el/los intervalo(s) donde es decreciente.

# Ejemplo: Crecimiento en Intervalos

## Ejemplo 31

Determine el/los intervalo(s) donde la función  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$  es creciente y el/los intervalo(s) donde es decreciente.

## Solución 31

Derivamos la función para obtener  $f'(x) = 3x^2 - 6x + 3 = 3(x - 1)^2 \geq 0$ .

# Ejemplo: Crecimiento en Intervalos

## Ejemplo 31

Determine el/los intervalo(s) donde la función  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$  es creciente y el/los intervalo(s) donde es decreciente.

## Solución 31

Derivamos la función para obtener  $f'(x) = 3x^2 - 6x + 3 = 3(x - 1)^2 \geq 0$ . Por lo tanto,  $f$  es siempre creciente en su dominio, i.e. es una función globalmente creciente.

# Ejemplo: Crecimiento en Intervalos

## Ejemplo 31

Determine el/los intervalo(s) donde la función  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$  es creciente y el/los intervalo(s) donde es decreciente.

## Solución 31

Derivamos la función para obtener  $f'(x) = 3x^2 - 6x + 3 = 3(x - 1)^2 \geq 0$ . Por lo tanto,  $f$  es siempre creciente en su dominio, i.e. es una función globalmente creciente.

## Propuesto 37

Repita el ejercicio anterior con la función del Ejemplo 30.

## Aplicación: Funciones Monótonas

Cuando a una función se le compone en una transformación monotónica (e.g. una función globalmente creciente), *se mantiene la ordinalidad de los valores*, esto es, si  $f(x)$  es una transformación monotónica, entonces  $A \leq B$  si y sólo si  $f(A) \leq f(B)$ .

## Aplicación: Funciones Monótonas

Cuando a una función se le compone en una transformación monotónica (e.g. una función globalmente creciente), *se mantiene la ordinalidad de los valores*, esto es, si  $f(x)$  es una transformación monotónica, entonces  $A \leq B$  si y sólo si  $f(A) \leq f(B)$ .

### Ejemplo 32

Considere una firma que debe elegir entre los planes de producción  $A$ ,  $B$  y  $C$  para decidir cómo producir. Se sabe que la firma busca maximizar sus beneficios, sin embargo, no dispone de la función de beneficios  $\pi(y)$  con  $y \in \{A, B, C\}$ , sólo dispone de los valores de  $\ln \pi(y)$ . En base a esto, ¿podrá determinar cuál es el plan de producción que le conviene?

## Aplicación: Funciones Monótonas

Cuando a una función se le compone en una transformación monótona (e.g. una función globalmente creciente), *se mantiene la ordinalidad de los valores*, esto es, si  $f(x)$  es una transformación monótona, entonces  $A \leq B$  si y sólo si  $f(A) \leq f(B)$ .

### Ejemplo 32

Considere una firma que debe elegir entre los planes de producción  $A$ ,  $B$  y  $C$  para decidir cómo producir. Se sabe que la firma busca maximizar sus beneficios, sin embargo, no dispone de la función de beneficios  $\pi(y)$  con  $y \in \{A, B, C\}$ , sólo dispone de los valores de  $\ln \pi(y)$ . En base a esto, ¿podrá determinar cuál es el plan de producción que le conviene?

### Solución 32

Sí, podrá. Notamos que  $f(x) = \ln x$  tiene derivada  $f'(x) = \frac{1}{x} > 0$  en todo el dominio de la función. Por lo tanto, si conoce los valores de  $\ln \pi(y)$  y puede determinar cuál es el mejor en términos logarítmicos, entonces también sabe cuál es el mejor sin el logaritmo.

# **Recordatorio: Parábolas**

Conocemos el concepto de una parábola cóncava y una parábola convexa.



# Recordatorio: Parábolas

Conocemos el concepto de una parábola cóncava y una parábola convexa.

En efecto, una parábola definida por la función  $f(x) = ax^2 + bx + c$  es cóncava si  $a < 0$  y es convexa si  $a > 0$ .

## Recordatorio: Parábolas

Conocemos el concepto de una parábola cóncava y una parábola convexa.

En efecto, una parábola definida por la función  $f(x) = ax^2 + bx + c$  es cóncava si  $a < 0$  y es convexa si  $a > 0$ .

Notamos que la derivada de esta función es  $f'(x) = 2ax + b$ , que es una recta creciente si  $a > 0$  y es una recta decreciente si  $a < 0$ ...

# Recordatorio: Parábolas

Conocemos el concepto de una parábola cóncava y una parábola convexa.

En efecto, una parábola definida por la función  $f(x) = ax^2 + bx + c$  es cóncava si  $a < 0$  y es convexa si  $a > 0$ .

Notamos que la derivada de esta función es  $f'(x) = 2ax + b$ , que es una recta creciente si  $a > 0$  y es una recta decreciente si  $a < 0$ ...

Si tomamos la segunda derivada de la función obtenemos  $f''(x) = 2a$ , que será positiva si  $a > 0$  y será negativa si  $a < 0$ .

## Recordatorio: Parábolas

Conocemos el concepto de una parábola cóncava y una parábola convexa.

En efecto, una parábola definida por la función  $f(x) = ax^2 + bx + c$  es cóncava si  $a < 0$  y es convexa si  $a > 0$ .

Notamos que la derivada de esta función es  $f'(x) = 2ax + b$ , que es una recta creciente si  $a > 0$  y es una recta decreciente si  $a < 0$ ...

Si tomamos la segunda derivada de la función obtenemos  $f''(x) = 2a$ , que será positiva si  $a > 0$  y será negativa si  $a < 0$ .

Esto se da precisamente porque la segunda derivada de una función identifica el crecimiento/decrecimiento de la primera derivada de la función.

# Recordatorio: Parábolas

Conocemos el concepto de una parábola cóncava y una parábola convexa.

En efecto, una parábola definida por la función  $f(x) = ax^2 + bx + c$  es cóncava si  $a < 0$  y es convexa si  $a > 0$ .

Notamos que la derivada de esta función es  $f'(x) = 2ax + b$ , que es una recta creciente si  $a > 0$  y es una recta decreciente si  $a < 0$ ...

Si tomamos la segunda derivada de la función obtenemos  $f''(x) = 2a$ , que será positiva si  $a > 0$  y será negativa si  $a < 0$ .

Esto se da precisamente porque la segunda derivada de una función identifica el crecimiento/decrecimiento de la primera derivada de la función.

Así, diremos que si la primera derivada es creciente, i.e. la segunda derivada es positiva, la función es convexa. Por otro lado, si la primera derivada es decreciente, i.e. la segunda derivada es negativa, diremos que la función es cóncava.

# Recordatorio: Parábolas

Conocemos el concepto de una parábola cóncava y una parábola convexa.

En efecto, una parábola definida por la función  $f(x) = ax^2 + bx + c$  es cóncava si  $a < 0$  y es convexa si  $a > 0$ .

Notamos que la derivada de esta función es  $f'(x) = 2ax + b$ , que es una recta creciente si  $a > 0$  y es una recta decreciente si  $a < 0$ ...

Si tomamos la segunda derivada de la función obtenemos  $f''(x) = 2a$ , que será positiva si  $a > 0$  y será negativa si  $a < 0$ .


Esto se da precisamente porque la segunda derivada de una función identifica el crecimiento/decrecimiento de la primera derivada de la función.

Así, diremos que si la primera derivada es creciente, i.e. la segunda derivada es positiva, la función es convexa. Por otro lado, si la primera derivada es decreciente, i.e. la segunda derivada es negativa, diremos que la función es cóncava.

Esto es válido para cualquier función derivable, no solo las parábolas.


# Convexidad de una Función Cuadrática

Figura 37: Convexidad de una Función Cuadrática



# Convexidad de una Función Cuadrática


Figura 37: Convexidad de una Función Cuadrática






# Convexidad de una Función Cuadrática

Figura 37: Convexidad de una Función Cuadrática




# Convexidad de una Función Cuadrática

Figura 37: Convexidad de una Función Cuadrática




# Convexidad de una Función Cuadrática

Figura 37: Convexidad de una Función Cuadrática



# Convexidad de una Función Cuadrática

Figura 37: Convexidad de una Función Cuadrática



# Concavidad y Convexidad Local

## Definición 27

Una función doblemente derivable  $f(x)$  es **convexa** en  $x = k$  si y sólo si  $f''(k) \geq 0$ .

# Concavidad y Convexidad Local

## Definición 27

Una función doblemente derivable  $f(x)$  es **convexa** en  $x = k$  si y sólo si  $f''(k) \geq 0$ .

## Definición 28

Una función doblemente derivable  $f(x)$  es **cóncava** en  $x = k$  si y sólo si  $f''(k) \leq 0$ .

# Concavidad y Convexidad Local

## Definición 27

Una función doblemente derivable  $f(x)$  es **convexa** en  $x = k$  si y sólo si  $f''(k) \geq 0$ .

## Definición 28

Una función doblemente derivable  $f(x)$  es **cóncava** en  $x = k$  si y sólo si  $f''(k) \leq 0$ .

## Definición 29

Una función doblemente derivable  $f(x)$  es **estrictamente convexa** en  $x = k$  si y sólo si  $f''(k) > 0$ .

# Concavidad y Convexidad Local

## Definición 27

Una función doblemente derivable  $f(x)$  es **convexa** en  $x = k$  si y sólo si  $f''(k) \geq 0$ .

## Definición 28

Una función doblemente derivable  $f(x)$  es **cóncava** en  $x = k$  si y sólo si  $f''(k) \leq 0$ .

## Definición 29

Una función doblemente derivable  $f(x)$  es **estrictamente convexa** en  $x = k$  si y sólo si  $f''(k) > 0$ .

## Definición 30

Una función doblemente derivable  $f(x)$  es **estrictamente cóncava** en  $x = k$  si y sólo si  $f''(k) < 0$ .



# Ejemplo: Concavidad y Convexidad

## Ejemplo 33

Determine si la función  $f(x) = x(x - 1)(x - 2)$  es cóncava o convexa en los puntos  $x = -1$ ,  $x = 1$  y  $x = 3$ .

# Ejemplo: Concavidad y Convexidad

## Ejemplo 33

Determine si la función  $f(x) = x(x-1)(x-2)$  es cóncava o convexa en los puntos  $x = -1$ ,  $x = 1$  y  $x = 3$ .

## Solución 33

Derivamos la función dos veces para obtener  $f''(x) = 6x - 6$ .

# Ejemplo: Concavidad y Convexidad

## Ejemplo 33

Determine si la función  $f(x) = x(x-1)(x-2)$  es cóncava o convexa en los puntos  $x = -1$ ,  $x = 1$  y  $x = 3$ .

## Solución 33

Derivamos la función dos veces para obtener  $f''(x) = 6x - 6$ .

Luego, evaluamos en los puntos pedidos, obteniendo

$$f''(-1) = -12 < 0, f''(1) = 0 \text{ y } f''(3) = 12 > 0.$$

# Ejemplo: Concavidad y Convexidad

## Ejemplo 33

Determine si la función  $f(x) = x(x-1)(x-2)$  es cóncava o convexa en los puntos  $x = -1$ ,  $x = 1$  y  $x = 3$ .

## Solución 33

Derivamos la función dos veces para obtener  $f''(x) = 6x - 6$ .

Luego, evaluamos en los puntos pedidos, obteniendo

$$f''(-1) = -12 < 0, f''(1) = 0 \text{ y } f''(3) = 12 > 0.$$

Por lo tanto,  $f$  es cóncava en  $-1$ , *cóncava y convexa* en  $1$  y convexa en  $3$ .

# Concavidad en Intervalos

## Definición 31

Una función doblemente derivable  $f(x)$  es convexa (resp. estrictamente convexa) en el intervalo  $[a, b]$  si y sólo si  $f''(x) \geq 0$  (resp.  $f''(x) > 0$ ) para todo  $x \in [a, b]$ .

# Concavidad en Intervalos

## Definición 31

Una función doblemente derivable  $f(x)$  es convexa (resp. estrictamente convexa) en el intervalo  $[a, b]$  si y sólo si  $f''(x) \geq 0$  (resp.  $f''(x) > 0$ ) para todo  $x \in [a, b]$ .

## Definición 32

Una función doblemente derivable  $f(x)$  es cóncava (resp. estrictamente cóncava) en el intervalo  $[a, b]$  si y sólo si  $f''(x) \leq 0$  (resp.  $f''(x) < 0$ ) para todo  $x \in [a, b]$ .

# Concavidad en Intervalos

## Definición 31

Una función doblemente derivable  $f(x)$  es convexa (resp. estrictamente convexa) en el intervalo  $[a, b]$  si y sólo si  $f''(x) \geq 0$  (resp.  $f''(x) > 0$ ) para todo  $x \in [a, b]$ .

## Definición 32

Una función doblemente derivable  $f(x)$  es cóncava (resp. estrictamente cóncava) en el intervalo  $[a, b]$  si y sólo si  $f''(x) \leq 0$  (resp.  $f''(x) < 0$ ) para todo  $x \in [a, b]$ .

## Definición 33

Una función doblemente derivable  $f(x)$  es globalmente convexa si y sólo si  $f''(x) \geq 0$  en todo su dominio.

# Concavidad en Intervalos

## Definición 31

Una función doblemente derivable  $f(x)$  es convexa (resp. estrictamente convexa) en el intervalo  $[a, b]$  si y sólo si  $f''(x) \geq 0$  (resp.  $f''(x) > 0$ ) para todo  $x \in [a, b]$ .

## Definición 32

Una función doblemente derivable  $f(x)$  es cóncava (resp. estrictamente cóncava) en el intervalo  $[a, b]$  si y sólo si  $f''(x) \leq 0$  (resp.  $f''(x) < 0$ ) para todo  $x \in [a, b]$ .

## Definición 33

Una función doblemente derivable  $f(x)$  es globalmente convexa si y sólo si  $f''(x) \geq 0$  en todo su dominio.

## Definición 34

Una función doblemente derivable  $f(x)$  es globalmente cóncava si y sólo si  $f''(x) \leq 0$  en todo su dominio.



# Ejemplo: Concavidad en Intervalos

## Ejemplo 34

Determine el/los intervalo(s) donde la función  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$  es cóncava y el/los intervalo(s) donde es convexa.

# Ejemplo: Concavidad en Intervalos

## Ejemplo 34

Determine el/los intervalo(s) donde la función  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$  es cóncava y el/los intervalo(s) donde es convexa.

## Solución 34

Derivamos la función dos veces para obtener  $f''(x) = 6x - 6$ .

# Ejemplo: Concavidad en Intervalos

## Ejemplo 34

Determine el/los intervalo(s) donde la función  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$  es cóncava y el/los intervalo(s) donde es convexa.

## Solución 34

Derivamos la función dos veces para obtener  $f''(x) = 6x - 6$ .

Para que  $f'' \leq 0$ , se tiene que dar que  $x \leq 1$  y para que  $f'' \geq 0$  se tiene que dar que  $x \geq 1$ .

Por lo tanto,  $f$  es cóncava en el intervalo  $(-\infty, 1]$  y es convexa en el intervalo  $[1, \infty)$ .

# Ejemplo: Concavidad en Intervalos

## Ejemplo 34

Determine el/los intervalo(s) donde la función  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$  es cóncava y el/los intervalo(s) donde es convexa.

## Solución 34

Derivamos la función dos veces para obtener  $f''(x) = 6x - 6$ .

Para que  $f'' \leq 0$ , se tiene que dar que  $x \leq 1$  y para que  $f'' \geq 0$  se tiene que dar que  $x \geq 1$ .

Por lo tanto,  $f$  es cóncava en el intervalo  $(-\infty, 1]$  y es convexa en el intervalo  $[1, \infty)$ .

## Propuesto 38

Repita el ejercicio anterior con la función del Ejemplo 33.

## Aplicación: Rendimientos Decrecientes

En general, cuando se dice que una función (e.g. una función de producción) tiene rendimientos marginales decrecientes, es porque la función es cóncava. La idea de hablar de *rendimientos marginales decrecientes* es que el efecto de incrementar en una unidad marginal el argumento se vuelve cada vez menor, i.e. cada vez *rinde menos*.

## Aplicación: Rendimientos Decrecientes

En general, cuando se dice que una función (e.g. una función de producción) tiene rendimientos marginales decrecientes, es porque la función es cóncava. La idea de hablar de *rendimientos marginales decrecientes* es que el efecto de incrementar en una unidad marginal el argumento se vuelve cada vez menor, i.e. cada vez *rinde menos*. Por ejemplo, en una función de producción, se dice que hay rendimientos marginales decrecientes al factor si la derivada de la función respecto a este factor es decreciente, i.e. si la segunda derivada de la función de producción es negativa.

## Aplicación: Rendimientos Decrecientes

En general, cuando se dice que una función (e.g. una función de producción) tiene rendimientos marginales decrecientes, es porque la función es cóncava. La idea de hablar de *rendimientos marginales decrecientes* es que el efecto de incrementar en una unidad marginal el argumento se vuelve cada vez menor, i.e. cada vez *rinde menos*.

Por ejemplo, en una función de producción, se dice que hay rendimientos marginales decrecientes al factor si la derivada de la función respecto a este factor es decreciente, i.e. si la segunda derivada de la función de producción es negativa.

Análogamente, si la segunda derivada es positiva, se dice que la función tiene rendimientos crecientes.

## Aplicación: Rendimientos Decrecientes

En general, cuando se dice que una función (e.g. una función de producción) tiene rendimientos marginales decrecientes, es porque la función es cóncava. La idea de hablar de *rendimientos marginales decrecientes* es que el efecto de incrementar en una unidad marginal el argumento se vuelve cada vez menor, i.e. cada vez *rinde menos*.

Por ejemplo, en una función de producción, se dice que hay rendimientos marginales decrecientes al factor si la derivada de la función respecto a este factor es decreciente, i.e. si la segunda derivada de la función de producción es negativa.

Análogamente, si la segunda derivada es positiva, se dice que la función tiene rendimientos crecientes.

### Ejemplo 35

Determine si la función  $f(x) = \sqrt{\ln(x+1)}$  tiene rendimientos decrecientes.



## Aplicación: Rendimientos Decrecientes

En general, cuando se dice que una función (e.g. una función de producción) tiene rendimientos marginales decrecientes, es porque la función es cóncava. La idea de hablar de *rendimientos marginales decrecientes* es que el efecto de incrementar en una unidad marginal el argumento se vuelve cada vez menor, i.e. cada vez *rinde menos*.

Por ejemplo, en una función de producción, se dice que hay rendimientos marginales decrecientes al factor si la derivada de la función respecto a este factor es decreciente, i.e. si la segunda derivada de la función de producción es negativa.

Análogamente, si la segunda derivada es positiva, se dice que la función tiene rendimientos crecientes.

### Ejemplo 35

Determine si la función  $f(x) = \sqrt{\ln(x+1)}$  tiene rendimientos decrecientes.

### Solución 35

Sí, pues la segunda derivada es negativa en todo el dominio.

# Ejercicios: Crecimiento y Concavidad

## Propuesto 39

Analice el crecimiento y la concavidad de las siguientes funciones en todo el dominio:

1.  $f(x) = \sqrt{x} - x$

# Ejercicios: Crecimiento y Concavidad

## Propuesto 39

Analice el crecimiento y la concavidad de las siguientes funciones en todo el dominio:

1.  $f(x) = \sqrt{x} - x$

2.  $g(x) = \ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$

# Ejercicios: Crecimiento y Concavidad

## Propuesto 39

Analice el crecimiento y la concavidad de las siguientes funciones en todo el dominio:

1.  $f(x) = \sqrt{x} - x$

2.  $g(x) = \ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$

3.  $h(x) = \exp(-x^2)$

# Extra: Concavidad y Convexidad

## Definición 35

Sean  $x_1$  y  $x_2$  dos valores y sea  $\lambda \in (0, 1)$ . Una combinación convexa entre  $x_1$  y  $x_2$  se define como  $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ .

# Extra: Concavidad y Convexidad

## Definición 35

Sean  $x_1$  y  $x_2$  dos valores y sea  $\lambda \in (0, 1)$ . Una combinación convexa entre  $x_1$  y  $x_2$  se define como  $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ .

## Definición 36

Una función es estrictamente convexa en un intervalo si cualquier combinación convexa de dos valores de la función evaluada en argumentos en el intervalo está siempre por sobre el valor de la función evaluada en la combinación convexa de los argumentos anteriores. Esto es  $f(x)$  es estrictamente convexa en  $[a, b]$ , si  $\forall \lambda \in (0, 1)$  se tiene que para cualquier  $x_1, x_2 \in [a, b]$  la siguiente desigualdad se satisface:  $f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) < \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$ . Se dirá que la función es convexa si la desigualdad no es estricta.

# Extra: Concavidad y Convexidad

## Definición 35

Sean  $x_1$  y  $x_2$  dos valores y sea  $\lambda \in (0, 1)$ . Una combinación convexa entre  $x_1$  y  $x_2$  se define como  $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ .

## Definición 36

Una función es estrictamente convexa en un intervalo si cualquier combinación convexa de dos valores de la función evaluada en argumentos en el intervalo está siempre por sobre el valor de la función evaluada en la combinación convexa de los argumentos anteriores. Esto es  $f(x)$  es estrictamente convexa en  $[a, b]$ , si  $\forall \lambda \in (0, 1)$  se tiene que para cualquier  $x_1, x_2 \in [a, b]$  la siguiente desigualdad se satisface:  $f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) < \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$ . Se dirá que la función es convexa si la desigualdad no es estricta.

## Definición 37

Análogo para concavidad estricta:

$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) > \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$ . Se dirá que la función es cóncava si la desigualdad no es estricta.

# Convexidad del Valor Absoluto

## Ejemplo 36

Demuestre formalmente que la función  $f(x) = |x|$  es siempre convexa.



# Convexidad del Valor Absoluto

## Ejemplo 36

Demuestre formalmente que la función  $f(x) = |x|$  es siempre convexa.

## Solución 36

Sean  $x_1$  y  $x_2$  dos números reales y sea  $\lambda \in (0, 1)$ .

# Convexidad del Valor Absoluto

## Ejemplo 36

Demuestre formalmente que la función  $f(x) = |x|$  es siempre convexa.

## Solución 36

Sean  $x_1$  y  $x_2$  dos números reales y sea  $\lambda \in (0, 1)$ .

Si planteamos una combinación convexa de estos valores tendríamos  $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ , mientras que una combinación convexa de la función evaluada en  $x_1$  y  $x_2$  sería  $\lambda|x_1| + (1 - \lambda)|x_2|$ .

# Convexidad del Valor Absoluto

## Ejemplo 36

Demuestre formalmente que la función  $f(x) = |x|$  es siempre convexa.

## Solución 36

Sean  $x_1$  y  $x_2$  dos números reales y sea  $\lambda \in (0, 1)$ .

Si planteamos una combinación convexa de estos valores tendríamos  $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ , mientras que una combinación convexa de la función evaluada en  $x_1$  y  $x_2$  sería  $\lambda|x_1| + (1 - \lambda)|x_2|$ .

Ahora bien, como  $\lambda \geq 0$ , tenemos que

$$\lambda|x_1| + (1 - \lambda)|x_2| = |\lambda x_1| + |(1 - \lambda)x_2|.$$

# Convexidad del Valor Absoluto

## Ejemplo 36

Demuestre formalmente que la función  $f(x) = |x|$  es siempre convexa.

## Solución 36

Sean  $x_1$  y  $x_2$  dos números reales y sea  $\lambda \in (0, 1)$ .

Si planteamos una combinación convexa de estos valores tendríamos  $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ , mientras que una combinación convexa de la función evaluada en  $x_1$  y  $x_2$  sería  $\lambda|x_1| + (1 - \lambda)|x_2|$ .

Ahora bien, como  $\lambda \geq 0$ , tenemos que

$$\lambda|x_1| + (1 - \lambda)|x_2| = |\lambda x_1| + |(1 - \lambda)x_2|.$$

Pero por la desigualdad triangular sabemos que

$$|\lambda x_1| + |(1 - \lambda)x_2| \geq |\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2|.$$

# Convexidad del Valor Absoluto

## Ejemplo 36

Demuestre formalmente que la función  $f(x) = |x|$  es siempre convexa.

## Solución 36

Sean  $x_1$  y  $x_2$  dos números reales y sea  $\lambda \in (0, 1)$ .

Si planteamos una combinación convexa de estos valores tendríamos  $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ , mientras que una combinación convexa de la función evaluada en  $x_1$  y  $x_2$  sería  $\lambda|x_1| + (1 - \lambda)|x_2|$ .

Ahora bien, como  $\lambda \geq 0$ , tenemos que

$$\lambda|x_1| + (1 - \lambda)|x_2| = |\lambda x_1| + |(1 - \lambda)x_2|.$$

Pero por la desigualdad triangular sabemos que

$$|\lambda x_1| + |(1 - \lambda)x_2| \geq |\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2|.$$

Esta es precisamente la definición de convexidad aplicada a la función  $f(x) = |x|$ .  $\square$

# Convexidad del Valor Absoluto

## Ejemplo 36

Demuestre formalmente que la función  $f(x) = |x|$  es siempre convexa.

## Solución 36

Sean  $x_1$  y  $x_2$  dos números reales y sea  $\lambda \in (0, 1)$ .

Si planteamos una combinación convexa de estos valores tendríamos  $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ , mientras que una combinación convexa de la función evaluada en  $x_1$  y  $x_2$  sería  $\lambda|x_1| + (1 - \lambda)|x_2|$ .

Ahora bien, como  $\lambda \geq 0$ , tenemos que

$$\lambda|x_1| + (1 - \lambda)|x_2| = |\lambda x_1| + |(1 - \lambda)x_2|.$$

Pero por la desigualdad triangular sabemos que

$$|\lambda x_1| + |(1 - \lambda)x_2| \geq |\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2|.$$

Esta es precisamente la definición de convexidad aplicada a la función  $f(x) = |x|$ .  $\square$

## Propuesto 40

Demuestre formalmente que la función  $g(x) = -|x|$  es siempre cóncava.

# Derivadas Igualadas a Cero

Sabemos que cuando la derivada de una función es positiva, es porque dicha función es creciente y que si esta derivada es negativa, la función es decreciente.

# Derivadas Igualadas a Cero

Sabemos que cuando la derivada de una función es positiva, es porque dicha función es creciente y que si esta derivada es negativa, la función es decreciente.

Sin embargo, si la función pasó de tener una derivada positiva a tener una derivada negativa, es porque en algún momento dejó de crecer y comenzó a decrecer. En este punto, donde la derivada es 0, se forma una especie de “monte”.



## Derivadas Igualadas a Cero

Sabemos que cuando la derivada de una función es positiva, es porque dicha función es creciente y que si esta derivada es negativa, la función es decreciente.

Sin embargo, si la función pasó de tener una derivada positiva a tener una derivada negativa, es porque en algún momento dejó de crecer y comenzó a decrecer. En este punto, donde la derivada es 0, se forma una especie de “monte”.

Similarmente, si la función pasó de tener una derivada negativa a una positiva, debió dejar de caer para que valor pase a aumentar. En este punto, donde la derivada también es 0, se forma un valle.

# Derivadas Igualadas a Cero

Sabemos que cuando la derivada de una función es positiva, es porque dicha función es creciente y que si esta derivada es negativa, la función es decreciente.


Sin embargo, si la función pasó de tener una derivada positiva a tener una derivada negativa, es porque en algún momento dejó de crecer y comenzó a decrecer. En este punto, donde la derivada es 0, se forma una especie de “monte”.

Similarmente, si la función pasó de tener una derivada negativa a una positiva, debió dejar de caer para que valor pase a aumentar. En este punto, donde la derivada también es 0, se forma un valle.

En base a estas ideas, vamos a formalizar el concepto de un máximo o un mínimo local en una función. (Notar que, a priori, no podemos asegurar que una derivada igualada a cero genera los montes o los valles mencionados anteriormente.)


# Gráfico: Derivadas Nulas

Figura 38: Montes y Valles




# Gráfico: Derivadas Nulas

Figura 38: Montes y Valles




# Gráfico: Derivadas Nulas

Figura 38: Montes y Valles




## Gráfico: Derivadas Nulas (cont.)

Figura 39: Derivada Nula sin Monte ni Valle



## Gráfico: Derivadas Nulas (cont.)

Figura 39: Derivada Nula sin Monte ni Valle



## **Comentario: Derivadas Nulas**

Como vimos en las Figuras 38 y 39, no es suficiente encontrar una derivada nula para identificar un monte o un valle.



## **Comentario: Derivadas Nulas**

Como vimos en las Figuras 38 y 39, no es suficiente encontrar una derivada nula para identificar un monte o un valle.

En efecto, tenía que darse que la función pasara de ser estrictamente creciente a ser estrictamente decreciente, o al revés.

## Comentario: Derivadas Nulas

Como vimos en las Figuras 38 y 39, no es suficiente encontrar una derivada nula para identificar un monte o un valle.

En efecto, tenía que darse que la función pasara de ser estrictamente creciente a ser estrictamente decreciente, o al revés.

Sin embargo, si la derivada pasó de ser positiva a ser negativa, es porque *la derivada cayó*. Pero ya vimos que si la primera derivada es decreciente, entonces la función es cóncava.

## Comentario: Derivadas Nulas

Como vimos en las Figuras 38 y 39, no es suficiente encontrar una derivada nula para identificar un monte o un valle.

En efecto, tenía que darse que la función pasara de ser estrictamente creciente a ser estrictamente decreciente, o al revés.

Sin embargo, si la derivada pasó de ser positiva a ser negativa, es porque *la derivada cayó*. Pero ya vimos que si la primera derivada es decreciente, entonces la función es cóncava.

Por lo tanto, para que encontremos un monte, es condición necesaria que la primera derivada sea nula, pero además necesitamos una *condición de suficiencia*, que es que la segunda derivada sea negativa.

## Comentario: Derivadas Nulas

Como vimos en las Figuras 38 y 39, no es suficiente encontrar una derivada nula para identificar un monte o un valle.

En efecto, tenía que darse que la función pasara de ser estrictamente creciente a ser estrictamente decreciente, o al revés.

Sin embargo, si la derivada pasó de ser positiva a ser negativa, es porque *la derivada cayó*. Pero ya vimos que si la primera derivada es decreciente, entonces la función es cóncava.

Por lo tanto, para que encontremos un monte, es condición necesaria que la primera derivada sea nula, pero además necesitamos una *condición de suficiencia*, que es que la segunda derivada sea negativa.

Análogamente, encontraremos un valle si la primera derivada es nula y la segunda derivada es positiva, pues así nos aseguramos de que la función tenía pendiente negativa y pasó a ser positiva (i.e. que la primera derivada era creciente).

# MÓDULO 13

► [Volver al Inicio de la Sección](#)

# Introducción: Optimización

En muchas situaciones nos puede interesar encontrar el **valor óptimo** de alguna variable. Este valor óptimo puede ser un **máximo** o un **mínimo**.

# Introducción: Optimización

En muchas situaciones nos puede interesar encontrar el **valor óptimo** de alguna variable. Este valor óptimo puede ser un **máximo** o un **mínimo**.

Por ejemplo, podemos estar interesados en minimizar la evasión tributaria o maximizar la cantidad de procesos por segundo de un sistema de información, maximizar las utilidades de una firma o minimizar sus emisiones de gases de invernadero. Existe una infinidad de casos donde podríamos buscar valores óptimos.

# Introducción: Optimización

En muchas situaciones nos puede interesar encontrar el **valor óptimo** de alguna variable. Este valor óptimo puede ser un **máximo** o un **mínimo**.

Por ejemplo, podemos estar interesados en minimizar la evasión tributaria o maximizar la cantidad de procesos por segundo de un sistema de información, maximizar las utilidades de una firma o minimizar sus emisiones de gases de invernadero. Existe una infinidad de casos donde podríamos buscar valores óptimos.

Un **problema de optimización** consiste en minimizar o maximizar el valor de una variable (dependiente). En otras palabras se trata de calcular o determinar el valor mínimo o el valor máximo de una función  $f(x)$ .



# Introducción: Optimización

En muchas situaciones nos puede interesar encontrar el **valor óptimo** de alguna variable. Este valor óptimo puede ser un **máximo** o un **mínimo**.

Por ejemplo, podemos estar interesados en minimizar la evasión tributaria o maximizar la cantidad de procesos por segundo de un sistema de información, maximizar las utilidades de una firma o minimizar sus emisiones de gases de invernadero. Existe una infinidad de casos donde podríamos buscar valores óptimos.

Un **problema de optimización** consiste en minimizar o maximizar el valor de una variable (dependiente). En otras palabras se trata de calcular o determinar el valor mínimo o el valor máximo de una función  $f(x)$ .

Para ello, debemos determinar el valor de la variable independiente  $x$  que hace que la función sea máxima o mínima.

# Introducción: Optimización

En muchas situaciones nos puede interesar encontrar el **valor óptimo** de alguna variable. Este valor óptimo puede ser un **máximo** o un **mínimo**.

Por ejemplo, podemos estar interesados en minimizar la evasión tributaria o maximizar la cantidad de procesos por segundo de un sistema de información, maximizar las utilidades de una firma o minimizar sus emisiones de gases de invernadero. Existe una infinidad de casos donde podríamos buscar valores óptimos.

Un **problema de optimización** consiste en minimizar o maximizar el valor de una variable (dependiente). En otras palabras se trata de calcular o determinar el valor mínimo o el valor máximo de una función  $f(x)$ .

Para ello, debemos determinar el valor de la variable independiente  $x$  que hace que la función sea máxima o mínima.

## Proposición 31

*(Extra: Teorema de Bolzano–Weierstrass). Toda función continua en un intervalo cerrado  $[a, b]$  alcanza un valor máximo  $M$  en algún  $x_M \in [a, b]$  y alcanza un valor mínimo  $m$  en algún  $x_m \in [a, b]$ .*

# Optimización: Definiciones

## Definición 38

Una función derivable  $f(x)$  cumple con la **condición de primer orden** (CPO) en  $x = k$  si  $f'(k) = 0$ . Esta es una *condición necesaria* para que  $x = k$  sea un máximo (monte) o mínimo (valle) local, pero no suficiente...

# Optimización: Definiciones

## Definición 38

Una función derivable  $f(x)$  cumple con la **condición de primer orden** (CPO) en  $x = k$  si  $f'(k) = 0$ . Esta es una *condición necesaria* para que  $x = k$  sea un máximo (monte) o mínimo (valle) local, pero no suficiente...

## Definición 39

Una función derivable  $f(x)$  cumple con una **condición de segundo orden** (CSO) en  $x = k$  si  $f''(k) > 0$  o si  $f''(k) < 0$ . Estas son condiciones de suficiencia para alcanzar un óptimo local.

# Optimización: Definiciones

## Definición 38

Una función derivable  $f(x)$  cumple con la **condición de primer orden** (CPO) en  $x = k$  si  $f'(k) = 0$ . Esta es una *condición necesaria* para que  $x = k$  sea un máximo (monte) o mínimo (valle) local, pero no suficiente...

## Definición 39

Una función derivable  $f(x)$  cumple con una **condición de segundo orden** (CSO) en  $x = k$  si  $f''(k) > 0$  o si  $f''(k) < 0$ . Estas son condiciones de suficiencia para alcanzar un óptimo local.

## Proposición 32

*Una función doblemente derivable  $f(x)$  alcanza un **óptimo local** en  $x = k$  si y sólo si cumple con la condición de primer orden en  $x = k$  y alguna de las condiciones de segundo orden en el mismo punto. Si la condición de segundo orden es positiva, la función alcanza un mínimo, mientras que si la condición de segundo orden es negativa, la función alcanza un máximo en  $x = k$ .*

# Ejercicios: Optimización

## Propuesto 41

Optimice las siguientes funciones e indique si el valor es un mínimo o un máximo:

1.  $e(x) = \exp(4x) - \exp(5x)$

2.  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$

3.  $g(k) = Ak^\alpha - \delta k$  con  $\alpha, \delta \in (0, 1)$  y  $A > 0$

4.  $h(s) = \frac{\ln(s)}{r} e^{-rs}$  con  $r > 0$  (deje expresado)

# Sobre los Valores Óptimos

Supongamos que sabemos que una función  $f()$  tiene un máximo o un mínimo en un intervalo cerrado y acotado  $I$ .

# Sobre los Valores Óptimos

Supongamos que sabemos que una función  $f()$  tiene un máximo o un mínimo en un intervalo cerrado y acotado  $I$ .

El máximo o mínimo puede estar en un extremo o en uno de los puntos interiores de  $I$ .



# Sobre los Valores Óptimos

Supongamos que sabemos que una función  $f()$  tiene un máximo o un mínimo en un intervalo cerrado y acotado  $I$ .

El máximo o mínimo puede estar en un extremo o en uno de los puntos interiores de  $I$ .

Si está en un interior, y si  $f()$  es derivable, entonces la derivada  $f'()$  es cero en ese punto.

# Sobre los Valores Óptimos

Supongamos que sabemos que una función  $f()$  tiene un máximo o un mínimo en un intervalo cerrado y acotado  $I$ .

El máximo o mínimo puede estar en un extremo o en uno de los puntos interiores de  $I$ .

Si está en un interior, y si  $f()$  es derivable, entonces la derivada  $f'()$  es cero en ese punto.

Además, está la posibilidad de que el máximo o mínimo esté en un punto en el que  $f()$  no sea derivable, por ejemplo, en un extremo del intervalo  $I$ .

# Sobre los Valores Óptimos

Supongamos que sabemos que una función  $f()$  tiene un máximo o un mínimo en un intervalo cerrado y acotado  $I$ .

El máximo o mínimo puede estar en un extremo o en uno de los puntos interiores de  $I$ .

Si está en un interior, y si  $f()$  es derivable, entonces la derivada  $f'()$  es cero en ese punto.

Además, está la posibilidad de que el máximo o mínimo esté en un punto en el que  $f()$  no sea derivable, por ejemplo, en un extremo del intervalo  $I$ .

Por lo tanto, los máximos o mínimos pueden ser únicamente de los tres tipos siguientes:

# Sobre los Valores Óptimos

Supongamos que sabemos que una función  $f()$  tiene un máximo o un mínimo en un intervalo cerrado y acotado  $I$ .

El máximo o mínimo puede estar en un extremo o en uno de los puntos interiores de  $I$ .

Si está en un interior, y si  $f()$  es derivable, entonces la derivada  $f'()$  es cero en ese punto.

Además, está la posibilidad de que el máximo o mínimo esté en un punto en el que  $f()$  no sea derivable, por ejemplo, en un extremo del intervalo  $I$ .

Por lo tanto, los máximos o mínimos pueden ser únicamente de los tres tipos siguientes:

1. Puntos interiores de  $I$  en los que  $f'(x) = 0$ .

# Sobre los Valores Óptimos

Supongamos que sabemos que una función  $f()$  tiene un máximo o un mínimo en un intervalo cerrado y acotado  $I$ .

El máximo o mínimo puede estar en un extremo o en uno de los puntos interiores de  $I$ .

Si está en un interior, y si  $f()$  es derivable, entonces la derivada  $f'()$  es cero en ese punto.

Además, está la posibilidad de que el máximo o mínimo esté en un punto en el que  $f()$  no sea derivable, por ejemplo, en un extremo del intervalo  $I$ .

Por lo tanto, los máximos o mínimos pueden ser únicamente de los tres tipos siguientes:

1. Puntos interiores de  $I$  en los que  $f'(x) = 0$ .
2. Los dos extremos de  $I$  (si el intervalo los incluye).

# Sobre los Valores Óptimos

Supongamos que sabemos que una función  $f()$  tiene un máximo o un mínimo en un intervalo cerrado y acotado  $I$ .

El máximo o mínimo puede estar en un extremo o en uno de los puntos interiores de  $I$ .

Si está en un interior, y si  $f()$  es derivable, entonces la derivada  $f'()$  es cero en ese punto.

Además, está la posibilidad de que el máximo o mínimo esté en un punto en el que  $f()$  no sea derivable, por ejemplo, en un extremo del intervalo  $I$ .

Por lo tanto, los máximos o mínimos pueden ser únicamente de los tres tipos siguientes:

1. Puntos interiores de  $I$  en los que  $f'(x) = 0$ .
2. Los dos extremos de  $I$  (si el intervalo los incluye).
3. Puntos de  $I$  en los que no exista  $f'(x)$ .

## Sobre los Valores Óptimos (cont.)

Por lo tanto, cuando se solicite hallar los valores máximos y mínimos de una función derivable  $f()$  definida en un intervalo  $[a, b]$  cerrado y acotado. Se debe proceder de la siguiente manera:

## Sobre los Valores Óptimos (cont.)

Por lo tanto, cuando se solicite hallar los valores máximos y mínimos de una función derivable  $f()$  definida en un intervalo  $[a, b]$  cerrado y acotado. Se debe proceder de la siguiente manera:

1. Hallar todos los puntos estacionarios de  $f()$  en  $(a, b)$ .



## Sobre los Valores Óptimos (cont.)

Por lo tanto, cuando se solicite hallar los valores máximos y mínimos de una función derivable  $f()$  definida en un intervalo  $[a, b]$  cerrado y acotado. Se debe proceder de la siguiente manera:

1. Hallar todos los puntos estacionarios de  $f()$  en  $(a, b)$ .
2. Evaluar  $f()$  en los extremos del intervalo  $(a$  y  $b)$  y en todos sus puntos estacionarios.

## Sobre los Valores Óptimos (cont.)

Por lo tanto, cuando se solicite hallar los valores máximos y mínimos de una función derivable  $f()$  definida en un intervalo  $[a, b]$  cerrado y acotado. Se debe proceder de la siguiente manera:

1. Hallar todos los puntos estacionarios de  $f()$  en  $(a, b)$ .
2. Evaluar  $f()$  en los extremos del intervalo ( $a$  y  $b$ ) y en todos sus puntos estacionarios.
3. El mayor valor de la función hallado anteriormente es el valor máximo de  $f()$  en  $[a, b]$  y el menor valor de la función hallado es el valor mínimo de  $f()$  en  $[a, b]$ .

# MÓDULO 14

► [Volver al Inicio de la Sección](#)

# El Problema de una Firma

Supongamos una empresa que produce un cierto bien y quiere maximizar sus beneficios.

# El Problema de una Firma

Supongamos una empresa que produce un cierto bien y quiere maximizar sus beneficios.

Los ingresos totales generados en un cierto periodo por la producción y venta de  $Q$  unidades son  $I(Q)$  (en Unidades Monetarias: UM), mientras que  $C(Q)$  designa el costo total en [UM] del proceso.

# El Problema de una Firma

Supongamos una empresa que produce un cierto bien y quiere maximizar sus beneficios.

Los ingresos totales generados en un cierto periodo por la producción y venta de  $Q$  unidades son  $I(Q)$  (en Unidades Monetarias: UM), mientras que  $C(Q)$  designa el costo total en [UM] del proceso.

El beneficio obtenido como resultado de producir y vender  $Q$  unidades es entonces

$$\pi(Q) = I(Q) - C(Q).$$

## **El Problema de una Firma (cont.)**

Consideremos que hay una cota máxima de  $Q_0$  de la producción en el periodo dado, por limitaciones técnicas.

## El Problema de una Firma (cont.)

Consideremos que hay un cota máxima de  $Q_0$  de la producción en el periodo dado, por limitaciones técnicas.

Supongamos que  $I(Q)$  y  $C(Q)$  son funciones derivables de  $Q$  en el intervalo  $[0, Q_0]$ . Así, la función de beneficios  $\pi$  es también derivable y, por consiguiente, tiene un valor máximo.



## El Problema de una Firma (cont.)

Consideremos que hay un cota máxima de  $Q_0$  de la producción en el periodo dado, por limitaciones técnicas.

Supongamos que  $I(Q)$  y  $C(Q)$  son funciones derivables de  $Q$  en el intervalo  $[0, Q_0]$ . Así, la función de beneficios  $\pi$  es también derivable y, por consiguiente, tiene un valor máximo.

En ciertos casos, este máximo puede darse en  $Q = 0$  o en  $Q = Q_0$ . Si no, el nivel máximo de producción  $Q^*$  verifica que  $\pi'(Q^*) = 0$  y así

$$I'(Q) = C'(Q).$$

En términos más comunes esto se expresaría, como

$$IMg(Q) = CMg(Q).$$

## El Problema de una Firma (cont.)

Consideremos que hay una cota máxima de  $Q_0$  de la producción en el periodo dado, por limitaciones técnicas.

Supongamos que  $I(Q)$  y  $C(Q)$  son funciones derivables de  $Q$  en el intervalo  $[0, Q_0]$ . Así, la función de beneficios  $\pi$  es también derivable y, por consiguiente, tiene un valor máximo.

En ciertos casos, este máximo puede darse en  $Q = 0$  o en  $Q = Q_0$ . Si no, el nivel máximo de producción  $Q^*$  verifica que  $\pi'(Q^*) = 0$  y así

$$I'(Q) = C'(Q).$$

En términos más comunes esto se expresaría, como

$$IMg(Q) = CMg(Q).$$

Así, se debe ajustar la producción hasta un punto en el que el ingreso marginal sea igual al costo marginal de producirlo.

## El Problema de una Firma (cont.)

Firma tomadora de precios: Supongamos que la empresa obtiene un precio fijo  $P$  por unidad vendida.

## El Problema de una Firma (cont.)

Firma tomadora de precios: Supongamos que la empresa obtiene un precio fijo  $P$  por unidad vendida.

Entonces  $IMg(Q) = P$ , de manera que si la empresa no controla el precio, hay que ajustar la producción al nivel en el cual el costo marginal sea igual al precio unitario del producto.

## El Problema de una Firma (cont.)

Firma tomadora de precios: Supongamos que la empresa obtiene un precio fijo  $P$  por unidad vendida.

Entonces  $IMg(Q) = P$ , de manera que si la empresa no controla el precio, hay que ajustar la producción al nivel en el cual el costo marginal sea igual al precio unitario del producto.

En el caso en que la firma no sea tomadora de precios y se enfrente a la demanda de mercado, el ingreso  $I(Q)$  será igual a  $P(Q) \cdot Q$ , es decir, el ingreso total será igual al producto entre el precio (en función de la cantidad vendida) y la cantidad que se produce.

# **Ejercicio: El Problema de una Firma**

## **Ejemplo 37**

Suponga que una empresa puede controlar el precio del producto que vende (monopolio).

# Ejercicio: El Problema de una Firma

## Ejemplo 37

Suponga que una empresa puede controlar el precio del producto que vende (monopolio).

La demanda por el bien que produce esta empresa está dada por

$$P = 1000 - \frac{1}{2}Q,$$

donde  $P$  representa el precio (demanda inversa) y  $Q$  la cantidad que sería demandada, por lo tanto,  $Q \in [0; 2000]$ , ya que la demanda estaría satisfecha con 2000 unidades.

# Ejercicio: El Problema de una Firma

## Ejemplo 37

Suponga que una empresa puede controlar el precio del producto que vende (monopolio).

La demanda por el bien que produce esta empresa está dada por

$$P = 1000 - \frac{1}{2}Q,$$

donde  $P$  representa el precio (demanda inversa) y  $Q$  la cantidad que sería demandada, por lo tanto,  $Q \in [0; 2000]$ , ya que la demanda estaría satisfecha con 2000 unidades.

Además, suponga que el costo de producir  $Q$  unidades está definido por

$$C(Q) = 100 + \frac{1}{c}Q^2,$$

donde  $c > 0$  es un factor tecnológico, el cual es constante dentro del proceso productivo.



# Ejercicio: El Problema de una Firma

## Ejemplo 37

Suponga que una empresa puede controlar el precio del producto que vende (monopolio).

La demanda por el bien que produce esta empresa está dada por

$$P = 1000 - \frac{1}{2}Q,$$

donde  $P$  representa el precio (demanda inversa) y  $Q$  la cantidad que sería demandada, por lo tanto,  $Q \in [0; 2000]$ , ya que la demanda estaría satisfecha con 2000 unidades.

Además, suponga que el costo de producir  $Q$  unidades está definido por

$$C(Q) = 100 + \frac{1}{c}Q^2,$$

donde  $c > 0$  es un factor tecnológico, el cual es constante dentro del proceso productivo.

En base a estas condiciones, ¿cuál sería la cantidad que debería producir la empresa con el propósito de maximizar sus beneficios?

# Respuesta: El Problema de una Firma

## Solución 37

Sea...

$Q$ : Cantidad producida que será igual a la cantidad demanda.

$Q^*$ : Cantidad óptima a producir.

$P$ : Precio, que también representa la demanda inversa.

$\pi(Q)$ : Beneficio de producir  $Q$  unidades.

# Respuesta: El Problema de una Firma

## Solución 37

Sea...

$Q$ : Cantidad producida que será igual a la cantidad demanda.

$Q^*$ : Cantidad óptima a producir.

$P$ : Precio, que también representa la demanda inversa.

$\pi(Q)$ : Beneficio de producir  $Q$  unidades.

El planteamiento del problema es:

$$\begin{array}{ll} \max_{Q \in [0; 2000]} & \pi(Q) = I(Q) - C(Q) \\ \text{Suponiendo} & P(Q) = 1000 - \frac{1}{2}Q \end{array}$$

De manera que habrá una cantidad  $Q^*$  que maximice el beneficio, si  $Q^* \in [0; 2,000]$ .

# Respuesta: El Problema de una Firma

Primero es necesario descomponer la función de beneficios, dejándola en función de  $Q$ , de manera que sea más clara la realización de los cálculos, es decir,

$$\pi(Q) = I(Q) - C(Q)$$

$$\pi(Q) = P(Q) \cdot Q - C(Q)$$

$$\pi(Q) = \left(1000 - \frac{1}{2}Q\right) \cdot Q - \left(100 + \frac{1}{c}Q^2\right)$$

$$\pi(Q) = 1000 \cdot Q - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{c}\right) \cdot Q^2 - 100.$$

## **Respuesta: El Problema de una Firma**

Ahora que se tiene la función, podemos imponer la condición de primer orden, la cual consiste en derivar la función de beneficios con respecto a la cantidad producida  $Q$ :

## Respuesta: El Problema de una Firma

Ahora que se tiene la función, podemos imponer la condición de primer orden, la cual consiste en derivar la función de beneficios con respecto a la cantidad producida  $Q$ :

$$\begin{aligned}\frac{d\pi(Q)}{dQ} &= 0 \\ 1000 - 2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{c}\right) \cdot Q &= 0 \\ \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{c}\right) \cdot Q &= 500 \\ Q^* &= \frac{1000 \cdot c}{c + 2}.\end{aligned}$$

## Respuesta: El Problema de una Firma

Ahora que se tiene la función, podemos imponer la condición de primer orden, la cual consiste en derivar la función de beneficios con respecto a la cantidad producida  $Q$ :

$$\begin{aligned}\frac{d\pi(Q)}{dQ} &= 0 \\ 1000 - 2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{c}\right) \cdot Q &= 0 \\ \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{c}\right) \cdot Q &= 500 \\ Q^* &= \frac{1000 \cdot c}{c + 2}.\end{aligned}$$

Al reemplazar la cantidad óptima en el beneficio, encontramos el beneficio máximo, el que asciende a

$$\pi^* = \pi(Q^*) = \frac{500000 \cdot c}{c + 2} - 100.$$

## **Respuesta: El Problema de una Firma**

Sería apresurado concluir que es conveniente llevar la producción hasta  $Q^*$ .



## **Respuesta: El Problema de una Firma**

Sería apresurado concluir que es conveniente llevar la producción hasta  $Q^*$ .

Esto se debe a que no sabemos si los beneficios máximos son positivos o no.

## Respuesta: El Problema de una Firma

Sería apresurado concluir que es conveniente llevar la producción hasta  $Q^*$ .

Esto se debe a que no sabemos si los beneficios máximos son positivos o no.

Si fueran positivos, sucedería que

$$\pi^* = \pi(Q^*) = \frac{500000 \cdot c}{c + 2} - 100 > 0 \implies c > \frac{2}{4999}.$$

## Respuesta: El Problema de una Firma

Sería apresurado concluir que es conveniente llevar la producción hasta  $Q^*$ .

Esto se debe a que no sabemos si los beneficios máximos son positivos o no.

Si fueran positivos, sucedería que

$$\pi^* = \pi(Q^*) = \frac{500000 \cdot c}{c + 2} - 100 > 0 \implies c > \frac{2}{4999}.$$

Por lo tanto, la conclusión es que es conveniente llevar la producción hasta  $Q^*$  siempre y cuando  $c > \frac{2}{4999}$ .

# Ejercicio: Línea Telefónica

## Ejemplo 38


La línea de transmisión telefónica cruza toda la décima región del país en línea recta. Sin embargo, dos poblados actualmente se encuentran incomunicados, por tal motivo han solicitado la instalación de líneas telefónicas. Ellos se encuentran a 2 y 3 kilómetros, en forma perpendicular a la línea de transmisión telefónica, respectivamente. La distancia entre los pies de estas perpendiculares por la línea de transmisión telefónica es de 4 kilómetros. Actualmente se dispone de un sólo conmutador que hace posibles las comunicaciones de un teléfono a otro, el cual debe conectarse a la línea de transmisión y desde él se debe conectar a los pueblos. Otra restricción es que sólo se dispone de 6,5 kilómetros de cableado de fibra óptica diseñado para este tipo de conexión. Determine si es posible conectar a los dos poblados, para ello deberá encontrar una ubicación para el conmutador que minimice el uso de cableado de fibra óptica.

# Respuesta: Línea Telefónica

## Solución 38

Diremos que  $X$  representa la distancia desde el conmutador, al pie de la perpendicular del primer poblado (sobre la línea de transmisión). Esto se puede ver representado en la Figura 40.

Figura 40: Poblados, Conmutador y Línea de Transmisión



## Respuesta: Línea Telefónica

Así, diremos que la distancia desde el primer poblado ( $P_a$ ) al conmutador (punto  $C$ ), se define, como

$$L_a(x) = \sqrt{4 + x^2}.$$

## Respuesta: Línea Telefónica

Así, diremos que la distancia desde el primer poblado ( $P_a$ ) al conmutador (punto  $C$ ), se define, como

$$L_a(x) = \sqrt{4 + x^2}.$$

Por otro lado, la distancia del segundo poblado ( $P_b$ ) al conmutador, es

$$L_b(x) = \sqrt{9 + (4 - x)^2}.$$

## Respuesta: Línea Telefónica

Así, diremos que la distancia desde el primer poblado ( $P_a$ ) al conmutador (punto  $C$ ), se define, como

$$L_a(x) = \sqrt{4 + x^2}.$$

Por otro lado, la distancia del segundo poblado ( $P_b$ ) al conmutador, es

$$L_b(x) = \sqrt{9 + (4 - x)^2}.$$

Entonces, la longitud total que debe recorrer el cableado de fibra óptica, será

$$L(x) = L_a + L_b(x) = \sqrt{4 + x^2} + \sqrt{9 + (4 - x)^2}.$$

**NOTA:** Recordar que según Pitágoras  $c^2 = a^2 + b^2$ : el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.



# Respuesta: Línea Telefónica

El planteamiento del problema, es

$$\min_{x \in [0,4]} L(x) = L_a(x) + L_b(x),$$

de manera que habrá una distancia en el eje  $x$ ,  $x^*$  que minimice la cantidad de cableado que se utilizará, tal que  $L(x^*) \leq 6,5$ .

# Respuesta: Línea Telefónica

El planteamiento del problema, es

$$\min_{x \in [0,4]} L(x) = L_a(x) + L_b(x),$$

de manera que habrá una distancia en el eje  $x$ ,  $x^*$  que minimice la cantidad de cableado que se utilizará, tal que  $L(x^*) \leq 6,5$ .

En caso de que  $L(x^*) > 6,5$ , no será posible conectar los dos poblados.

## Respuesta: Línea Telefónica

Aplicando las condiciones de primer orden (CPO), se tiene que

$$\frac{dL(x)}{dx} = \frac{2x}{2\sqrt{4+x^2}} - \frac{4-x}{\sqrt{9+(4-x)^2}} = 0.$$

## Respuesta: Línea Telefónica

Aplicando las condiciones de primer orden (CPO), se tiene que

$$\frac{dL(x)}{dx} = \frac{2x}{2\sqrt{4+x^2}} - \frac{4-x}{\sqrt{9+(4-x)^2}} = 0.$$

Resolviendo la ecuación,

$$\begin{aligned}\frac{2x}{2\sqrt{4+x^2}} &= \frac{4-x}{\sqrt{9+(4-x)^2}} \\ x^2(9+(4-x)^2) &= (4-x)^2(4+x^2) \\ 9x^2 &= 4(16-8x+x^2) \\ 5x^2+32x-64 &= 0 \\ x_{1,2} &= \frac{-32 \pm \sqrt{(32)^2 - 4 \cdot 5 \cdot (-64)}}{10} \\ x_{1,2} &= \frac{-32 \pm 48}{10}.\end{aligned}$$

## Respuesta: Línea Telefónica

Entonces, las posibles soluciones, son  $x_1 = 1,6$  y  $x_2 = -8$ . Claramente, la segunda solución no es factible con respecto a lo que se busca, ya que  $x \in [0;4]$ . Así, sólo nos resta verificar que el valor encontrado efectivamente es aquel que minimiza la logitud del cableado, para ello se verificará la condición de segundo orden:

$$\frac{d^2L(x)}{dx^2} = \frac{4}{(4+x^2)^{3/2}} + \frac{9}{(9+(4-x)^2)^{3/2}}.$$

## Respuesta: Línea Telefónica

Entonces, las posibles soluciones, son  $x_1 = 1,6$  y  $x_2 = -8$ . Claramente, la segunda solución no es factible con respecto a lo que se busca, ya que  $x \in [0;4]$ . Así, sólo nos resta verificar que el valor encontrado efectivamente es aquel que minimiza la logitud del cableado, para ello se verificará la condición de segundo orden:

$$\frac{d^2L(x)}{dx^2} = \frac{4}{(4+x^2)^{3/2}} + \frac{9}{(9+(4-x)^2)^{3/2}}.$$

Al evaluar esta segunda derivada en el punto  $x = 1,6$ , claramente se puede observar que la segunda derivada resulta ser positiva, por lo tanto, éste valor hace mínima la función:

$$L(x = 1,6) = \sqrt{4 + (1,6)^2} + \sqrt{9 + (4 - 1,6)^2} = 6,4.$$

## **Respuesta: Línea Telefónica**

Sin embargo, también se debería verificar en los extremos, ya que el dominio de la función es acotado y cerrado.

## Respuesta: Línea Telefónica

Sin embargo, también se debería verificar en los extremos, ya que el dominio de la función es acotado y cerrado.

Al verificar, se aprecia que

$$L(x=0) = \sqrt{4+(0)^2} + \sqrt{9+(4-0)^2} = 7,$$

y que

$$L(x=4) = \sqrt{4+(4)^2} + \sqrt{9+(4-4)^2} = 7,5.$$



## Respuesta: Línea Telefónica

Sin embargo, también se debería verificar en los extremos, ya que el dominio de la función es acotado y cerrado.

Al verificar, se aprecia que

$$L(x=0) = \sqrt{4+(0)^2} + \sqrt{9+(4-0)^2} = 7,$$

y que

$$L(x=4) = \sqrt{4+(4)^2} + \sqrt{9+(4-4)^2} = 7,5.$$

Notamos que estas no son soluciones válidas.

## Respuesta: Línea Telefónica

Sin embargo, también se debería verificar en los extremos, ya que el dominio de la función es acotado y cerrado.

Al verificar, se aprecia que

$$L(x=0) = \sqrt{4+(0)^2} + \sqrt{9+(4-0)^2} = 7,$$

y que

$$L(x=4) = \sqrt{4+(4)^2} + \sqrt{9+(4-4)^2} = 7,5.$$

Notamos que estas no son soluciones válidas.

Por lo tanto, la posición del conmutador debe estar a 1,6 kilómetros del punto perpendicular del primer poblado con respecto a la línea de transmisión. Este punto utilizará una longitud de cableado igual a 6,4 kilómetros, la cual es menor a la disponible que es de 6,5 kilómetros, así que podrá conectar a los dos poblados.

# Propuesto: Extracción Petrolera


## Propuesto 42

Suponga que se requiere construir una línea de tuberías para transportar petróleo (oleoducto) desde una plataforma en el mar que está localizada 20 kilómetros al Norte mar adentro (perpendicular a la playa), hasta unos tanques de almacenamiento que están en la playa a 15 kilómetros al Este de la ubicación de la plataforma. Además, se sabe que el costo de construcción de cada kilómetro de oleoducto en el mar es de U\$2.000.000, pero por tierra es de 1.000.000 [U\$/Km], ¿a qué distancia hacia el Este de la plataforma debería salir al mar el oleoducto de manera que el costo de la construcción sea mínimo?

# Propuesto: Extracción Petrolera

En la Figura 41 se observa un esquema de la ubicación de la plataforma petrolera y los tanques de almacenamiento.

Figura 41: Plataforma Petrolera y Oleoducto



# Unidad 3

## Unidad 3

Módulo 15

Módulo 16

Módulo 17

Módulo 18

Módulo 19

► [Volver al Inicio](#)

# MÓDULO 15

► [Volver al Inicio de la Sección](#)

# **Antiderivadas**

En la unidad anterior aprendimos a derivar funciones...

# Antiderivadas

En la unidad anterior aprendimos a derivar funciones... Ahora haremos todo lo contrario.



# Antiderivadas

En la unidad anterior aprendimos a derivar funciones... Ahora haremos todo lo contrario.

Si teníamos una función  $f(x) = x^2$  era bastante sencillo concluir que  $f'(x) = 2x$  era la derivada de  $f(x)$  respecto a  $x$ .

# Antiderivadas

En la unidad anterior aprendimos a derivar funciones... Ahora haremos todo lo contrario.

Si teníamos una función  $f(x) = x^2$  era bastante sencillo concluir que  $f'(x) = 2x$  era la derivada de  $f(x)$  respecto a  $x$ . Sin embargo, si supiéramos que la derivada de una función respecto a  $x$  es  $2x$ , ¿podríamos concluir que la función original era  $x^2$ ?

# Antiderivadas

En la unidad anterior aprendimos a derivar funciones... Ahora haremos todo lo contrario.

Si teníamos una función  $f(x) = x^2$  era bastante sencillo concluir que  $f'(x) = 2x$  era la derivada de  $f(x)$  respecto a  $x$ . Sin embargo, si supiéramos que la derivada de una función respecto a  $x$  es  $2x$ , ¿podríamos concluir que la función original era  $x^2$ ?

**NO exactamente.**

# Antiderivadas

En la unidad anterior aprendimos a derivar funciones... Ahora haremos todo lo contrario.

Si teníamos una función  $f(x) = x^2$  era bastante sencillo concluir que  $f'(x) = 2x$  era la derivada de  $f(x)$  respecto a  $x$ . Sin embargo, si supiéramos que la derivada de una función respecto a  $x$  es  $2x$ , ¿podríamos concluir que la función original era  $x^2$ ?

**NO exactamente.** ¿Por qué?

# Antiderivadas

En la unidad anterior aprendimos a derivar funciones... Ahora haremos todo lo contrario.

Si teníamos una función  $f(x) = x^2$  era bastante sencillo concluir que  $f'(x) = 2x$  era la derivada de  $f(x)$  respecto a  $x$ . Sin embargo, si supiéramos que la derivada de una función respecto a  $x$  es  $2x$ , ¿podríamos concluir que la función original era  $x^2$ ?

**NO exactamente.** *¿Por qué?*

La derivada de  $x^2 + 5$  respecto a  $x$  también es  $2x$ , y la de  $x^2 - 1000$  también.

# Antiderivadas

En la unidad anterior aprendimos a derivar funciones... Ahora haremos todo lo contrario.

Si teníamos una función  $f(x) = x^2$  era bastante sencillo concluir que  $f'(x) = 2x$  era la derivada de  $f(x)$  respecto a  $x$ . Sin embargo, si supiéramos que la derivada de una función respecto a  $x$  es  $2x$ , ¿podríamos concluir que la función original era  $x^2$ ?

**NO exactamente.** ¿Por qué?

La derivada de  $x^2 + 5$  respecto a  $x$  también es  $2x$ , y la de  $x^2 - 1000$  también.

En efecto, cualquier función de la forma  $x^2 + c$ , con  $c \in \mathbb{R}$  constante tiene como derivada respecto a  $x$  a la función  $2x$ .

# Antiderivadas

En la unidad anterior aprendimos a derivar funciones... Ahora haremos todo lo contrario.

Si teníamos una función  $f(x) = x^2$  era bastante sencillo concluir que  $f'(x) = 2x$  era la derivada de  $f(x)$  respecto a  $x$ . Sin embargo, si supiéramos que la derivada de una función respecto a  $x$  es  $2x$ , ¿podríamos concluir que la función original era  $x^2$ ?

**NO exactamente.** *¿Por qué?*

La derivada de  $x^2 + 5$  respecto a  $x$  también es  $2x$ , y la de  $x^2 - 1000$  también.

En efecto, cualquier función de la forma  $x^2 + c$ , con  $k \in \mathbb{R}$  constante tiene como derivada respecto a  $x$  a la función  $2x$ . Esta **familia de funciones** se llamará **antiderivada** o **primitiva** de la función  $2x$  respecto a  $x$ .

# Antiderivadas

En la unidad anterior aprendimos a derivar funciones... Ahora haremos todo lo contrario.

Si teníamos una función  $f(x) = x^2$  era bastante sencillo concluir que  $f'(x) = 2x$  era la derivada de  $f(x)$  respecto a  $x$ . Sin embargo, si supiéramos que la derivada de una función respecto a  $x$  es  $2x$ , ¿podríamos concluir que la función original era  $x^2$ ?

**NO exactamente.** ¿Por qué?

La derivada de  $x^2 + 5$  respecto a  $x$  también es  $2x$ , y la de  $x^2 - 1000$  también.

En efecto, cualquier función de la forma  $x^2 + c$ , con  $k \in \mathbb{R}$  constante tiene como derivada respecto a  $x$  a la función  $2x$ . Esta **familia de funciones** se llamará **antiderivada** o **primitiva** de la función  $2x$  respecto a  $x$ .

## Definición 40

La antiderivada o primitiva de una función  $f(x)$  respecto a  $x$  es una familia (o conjunto) de funciones de la forma  $F(x) + c$  (con  $c \in \mathbb{R}$  constante) tal que  $\frac{dF(x)}{dx} = f(x)$ .



# Antiderivadas

En la unidad anterior aprendimos a derivar funciones... Ahora haremos todo lo contrario.

Si teníamos una función  $f(x) = x^2$  era bastante sencillo concluir que  $f'(x) = 2x$  era la derivada de  $f(x)$  respecto a  $x$ . Sin embargo, si supiéramos que la derivada de una función respecto a  $x$  es  $2x$ , ¿podríamos concluir que la función original era  $x^2$ ?

**NO exactamente.** ¿Por qué?

La derivada de  $x^2 + 5$  respecto a  $x$  también es  $2x$ , y la de  $x^2 - 1000$  también.

En efecto, cualquier función de la forma  $x^2 + c$ , con  $k \in \mathbb{R}$  constante tiene como derivada respecto a  $x$  a la función  $2x$ . Esta **familia de funciones** se llamará **antiderivada** o **primitiva** de la función  $2x$  respecto a  $x$ .

## Definición 40

La antiderivada o primitiva de una función  $f(x)$  respecto a  $x$  es una familia (o conjunto) de funciones de la forma  $F(x) + c$  (con  $c \in \mathbb{R}$  constante) tal que  $\frac{dF(x)}{dx} = f(x)$ .

# Integrales Indefinidas

Para formalizar el proceso de obtener una primitiva, introduciremos una nueva operación sobre las funciones continuas: la **integración indefinida**<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup>Próximamente introduciremos el concepto de integración definida.

# Integrales Indefinidas

Para formalizar el proceso de obtener una primitiva, introduciremos una nueva operación sobre las funciones continuas: la **integración indefinida**<sup>8</sup>.

## Definición 41

Si  $F(x) + c$  es la primitiva de una función  $f(x)$  respecto a  $x$ , entonces podemos afirmar que la *integral indefinida* de  $f(x)$  respecto a  $x$  es  $F(x) + c$ . Esto se denota por

$$\int f(x)dx = F(x) + c.$$

---

<sup>8</sup>Próximamente introduciremos el concepto de integración definida.

# Integrales Indefinidas

Para formalizar el proceso de obtener una primitiva, introduciremos una nueva operación sobre las funciones continuas: la **integración indefinida**<sup>8</sup>.

## Definición 41

Si  $F(x) + c$  es la primitiva de una función  $f(x)$  respecto a  $x$ , entonces podemos afirmar que la *integral indefinida* de  $f(x)$  respecto a  $x$  es  $F(x) + c$ . Esto se denota por

$$\int f(x)dx = F(x) + c.$$

Por lo tanto, al calcular la integral de una función  $f(x)$ , la pregunta subyacente que uno debería hacerse es “*¿qué función derivada me da  $f(x)$ ?*”.

---

<sup>8</sup>Próximamente introduciremos el concepto de integración definida.

# Integrales Indefinidas

Para formalizar el proceso de obtener una primitiva, introduciremos una nueva operación sobre las funciones continuas: la **integración indefinida**<sup>8</sup>.

## Definición 41

Si  $F(x) + c$  es la primitiva de una función  $f(x)$  respecto a  $x$ , entonces podemos afirmar que la *integral indefinida* de  $f(x)$  respecto a  $x$  es  $F(x) + c$ . Esto se denota por

$$\int f(x)dx = F(x) + c.$$

Por lo tanto, al calcular la integral de una función  $f(x)$ , la pregunta subyacente que uno debería hacerse es “*¿qué función derivada me da  $f(x)$ ?*”.

**Observación:** Se puede inferir que

$$\frac{d}{dx} \int f(x)dx = f(x) \quad \text{y que} \quad \int f'(x)dx = f(x) + c.$$

---

<sup>8</sup>Próximamente introduciremos el concepto de integración definida.

## Alerta: Sobre la Constante

Al calcular una integral indefinida, **SIEMPRE INCLUIR CONSTANTE.**  
Da lo mismo el nombre, la forma o el color de la constante ( $c$ , ★ o  $k$ ), pero si no lo hacen, el resultado es incorrecto.

## Alerta: Sobre la Constante

Al calcular una integral indefinida, **SIEMPRE INCLUIR CONSTANTE.**

Da lo mismo el nombre, la forma o el color de la constante ( $c$ , ★ o  $k$ ), pero si no lo hacen, el resultado es incorrecto.

La razón es sencilla: si no lo hacen, afirman que una primitiva es una función, y no una familia de funciones.

## Alerta: Sobre la Constante

Al calcular una integral indefinida, **SIEMPRE INCLUIR CONSTANTE.**

Da lo mismo el nombre, la forma o el color de la constante ( $c$ , ★ o  $k$ ), pero si no lo hacen, el resultado es incorrecto.

La razón es sencilla: si no lo hacen, afirman que una primitiva es una función, y no una familia de funciones.

Dicho de otro modo, afirman que la derivada de  $x^2$  es  $2x$ , pero que la derivada de  $x^2 + 5$  o la de  $x^2 - 1000$  no es  $2x$ , lo cual es incorrecto.



## Alerta: Sobre la Constante

Al calcular una integral indefinida, **SIEMPRE INCLUIR CONSTANTE.**

Da lo mismo el nombre, la forma o el color de la constante ( $c$ , ★ o  $k$ ), pero si no lo hacen, el resultado es incorrecto.

La razón es sencilla: si no lo hacen, afirman que una primitiva es una función, y no una familia de funciones.

Dicho de otro modo, afirman que la derivada de  $x^2$  es  $2x$ , pero que la derivada de  $x^2 + 5$  o la de  $x^2 - 1000$  no es  $2x$ , lo cual es incorrecto.

*Por favor, no pierdan puntos por no hacer esto.*

# Primitivas Conocidas

## Ejemplo 39

Encuentre las primitivas respecto a  $x$  de las siguientes funciones:

- $f(x) = x^n$  con  $n \neq -1$ .
- $g(x) = x^{-1}$ .
- $h(x) = \exp(x)$ .
- $i(x) = [y(x)]^n y'(x)$  con  $n \neq -1$ .
- $j(x) = \frac{y'(x)}{y(x)}$ .
- $k(x) = y'(x) \exp[y(x)]$ .
- $l(x) = k$  con  $k$  constante. ¿Y si  $k = 0$ ?
- $m(z) = z$ .
- $n(x) = a^x$  con  $a$  constante. Notar que es una extensión de  $k(x)$ .

# Primitivas Conocidas

## Solución 39

- $\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + c$  con  $n \neq -1$ .
- $\int x^{-1} dx = \ln|x| + c$ .
- $\int \exp(x) dx = \exp(x) + c$ .
- $\int [y(x)]^n y'(x) dx = \frac{1}{n+1} [y(x)]^{n+1} + c$  con  $n \neq -1$ .
- $\int \frac{y'(x)}{y(x)} dx = \ln|y(x)| + c$ .
- $\int y'(x) \exp[y(x)] dx = \exp[y(x)] + c$ .
- $\int k dx = kx + c$  con  $k$  constante.
- $\int z dx = zx + c$ .
- $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$  con  $a$  constante.

# Reglas de Integración

## Proposición 33

*Sean  $f(x)$  y  $g(x)$  dos funciones continuas. Entonces la integral de la suma (resta) entre estas funciones equivale a la suma (resta) entre las integrales de estas funciones. Esto es*

$$\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx.$$

# Reglas de Integración

## Proposición 33

*Sean  $f(x)$  y  $g(x)$  dos funciones continuas. Entonces la integral de la suma (resta) entre estas funciones equivale a la suma (resta) entre las integrales de estas funciones. Esto es*

$$\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx.$$

## Proposición 34

*Sea  $f(x)$  una función continua y  $k \in \mathbb{R}$  una constante. Entonces la integral de la función ponderada equivale a la ponderada de la función integrada. Esto es*

$$\int kf(x) dx = k \int f(x) dx.$$

# Reglas de Integración

## Proposición 33

*Sean  $f(x)$  y  $g(x)$  dos funciones continuas. Entonces la integral de la suma (resta) entre estas funciones equivale a la suma (resta) entre las integrales de estas funciones. Esto es*

$$\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx.$$

## Proposición 34

*Sea  $f(x)$  una función continua y  $k \in \mathbb{R}$  una constante. Entonces la integral de la función ponderada equivale a la ponderada de la función integrada. Esto es*

$$\int kf(x) dx = k \int f(x) dx.$$

**Observación:**  $\int [\alpha f(x) \pm \beta g(x)] dx = \alpha \int f(x) dx \pm \beta \int g(x) dx$ , donde  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  son constantes.

# Integración con Condiciones Iniciales

A pesar de que la primitiva de una función  $f(x)$  sea una familia de funciones, existe la posibilidad de que hayan *condiciones iniciales* las primitivas, de modo que, eventualmente, podemos identificar una única función cuya derivada sea  $f(x)$  y que satisfaga las condiciones iniciales.

# Integración con Condiciones Iniciales

A pesar de que la primitiva de una función  $f(x)$  sea una familia de funciones, existe la posibilidad de que hayan *condiciones iniciales* las primitivas, de modo que, eventualmente, podemos identificar una única función cuya derivada sea  $f(x)$  y que satisfaga las condiciones iniciales.

## Ejemplo 40

Encuentre la primitiva  $F(x)$  de  $f(x) = \exp(2x)$  que pasa por el origen.



# Integración con Condiciones Iniciales

A pesar de que la primitiva de una función  $f(x)$  sea una familia de funciones, existe la posibilidad de que hayan *condiciones iniciales* las primitivas, de modo que, eventualmente, podemos identificar una única función cuya derivada sea  $f(x)$  y que satisfaga las condiciones iniciales.

## Ejemplo 40

Encuentre la primitiva  $F(x)$  de  $f(x) = \exp(2x)$  que pasa por el origen.

## Solución 40

La primitiva de  $\exp(2x)$  es  $\int \exp(2x)dx = \frac{1}{2} \exp(2x) + c$ .

# Integración con Condiciones Iniciales

A pesar de que la primitiva de una función  $f(x)$  sea una familia de funciones, existe la posibilidad de que hayan *condiciones iniciales* las primitivas, de modo que, eventualmente, podemos identificar una única función cuya derivada sea  $f(x)$  y que satisfaga las condiciones iniciales.

## Ejemplo 40

Encuentre la primitiva  $F(x)$  de  $f(x) = \exp(2x)$  que pasa por el origen.

## Solución 40

La primitiva de  $\exp(2x)$  es  $\int \exp(2x)dx = \frac{1}{2} \exp(2x) + c$ .

Sin embargo, como debe pasar por el origen, tenemos que

$$\frac{1}{2} + c = 0 \implies c = -\frac{1}{2}.$$

# Integración con Condiciones Iniciales

A pesar de que la primitiva de una función  $f(x)$  sea una familia de funciones, existe la posibilidad de que hayan *condiciones iniciales* las primitivas, de modo que, eventualmente, podemos identificar una única función cuya derivada sea  $f(x)$  y que satisfaga las condiciones iniciales.

## Ejemplo 40

Encuentre la primitiva  $F(x)$  de  $f(x) = \exp(2x)$  que pasa por el origen.

## Solución 40

La primitiva de  $\exp(2x)$  es  $\int \exp(2x)dx = \frac{1}{2} \exp(2x) + c$ .

Sin embargo, como debe pasar por el origen, tenemos que

$$\frac{1}{2} + c = 0 \implies c = -\frac{1}{2}.$$

Por lo tanto,  $F(x) = \int \exp(2x)dx \Big|_{F(0)=0} = \frac{1}{2} \exp(2x) - \frac{1}{2}$ .

# Aplicación: Costos Totales

## Ejemplo 41

A través de una exhaustiva investigación a una empresa monopólica, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) fue capaz de determinar que los costos marginales de la empresa en UM se comportan como la función  $CMg(q) = \phi^q \ln \phi$ , con  $\phi > 1$  constante.

# Aplicación: Costos Totales

## Ejemplo 41

A través de una exhaustiva investigación a una empresa monopólica, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) fue capaz de determinar que los costos marginales de la empresa en UM se comportan como la función  $CMg(q) = \phi^q \ln \phi$ , con  $\phi > 1$  constante. Están interesados en obtener los beneficios netos de esta firma, pero sólo han podido determinar los ingresos totales de la firma y sus costos fijos, donde estos últimos ascienden a 101 UM.

# Aplicación: Costos Totales

## Ejemplo 41

A través de una exhaustiva investigación a una empresa monopólica, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) fue capaz de determinar que los costos marginales de la empresa en UM se comportan como la función  $CMg(q) = \phi^q \ln \phi$ , con  $\phi > 1$  constante. Están interesados en obtener los beneficios netos de esta firma, pero sólo han podido determinar los ingresos totales de la firma y sus costos fijos, donde estos últimos ascienden a 101 UM.

¿Cuáles son los costos variables de esta empresa?

# Aplicación: Costos Totales

## Ejemplo 41

A través de una exhaustiva investigación a una empresa monopólica, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) fue capaz de determinar que los costos marginales de la empresa en UM se comportan como la función  $CMg(q) = \phi^q \ln \phi$ , con  $\phi > 1$  constante. Están interesados en obtener los beneficios netos de esta firma, pero sólo han podido determinar los ingresos totales de la firma y sus costos fijos, donde estos últimos ascienden a 101 UM. ¿Cuáles son los costos variables de esta empresa?

## Solución 41

Los costos totales  $CT(q)$  de la empresa satisfacen  $CT'(q) = CMg(q)$ .

# Aplicación: Costos Totales

## Ejemplo 41

A través de una exhaustiva investigación a una empresa monopólica, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) fue capaz de determinar que los costos marginales de la empresa en UM se comportan como la función  $CMg(q) = \phi^q \ln \phi$ , con  $\phi > 1$  constante. Están interesados en obtener los beneficios netos de esta firma, pero sólo han podido determinar los ingresos totales de la firma y sus costos fijos, donde estos últimos ascienden a 101 UM. ¿Cuáles son los costos variables de esta empresa?

## Solución 41

Los costos totales  $CT(q)$  de la empresa satisfacen  $CT'(q) = CMg(q)$ . Por lo tanto, integramos los costos marginales, obteniendo

$$CT(q) = \int \phi^q \ln \phi dq = \phi^q + c.$$



# Aplicación: Costos Totales

## Ejemplo 41

A través de una exhaustiva investigación a una empresa monopólica, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) fue capaz de determinar que los costos marginales de la empresa en UM se comportan como la función  $CMg(q) = \phi^q \ln \phi$ , con  $\phi > 1$  constante. Están interesados en obtener los beneficios netos de esta firma, pero sólo han podido determinar los ingresos totales de la firma y sus costos fijos, donde estos últimos ascienden a 101 UM.  
¿Cuáles son los costos variables de esta empresa?

## Solución 41

Los costos totales  $CT(q)$  de la empresa satisfacen  $CT'(q) = CMg(q)$ . Por lo tanto, integramos los costos marginales, obteniendo

$$CT(q) = \int \phi^q \ln \phi dq = \phi^q + c.$$

Ahora bien, los costos fijos son aquellos en los que se incurren cuando no hay producción, es decir,

$$CF = CT(0) \iff 101 = 1 + c \iff c = 100.$$

# Aplicación: Costos Totales

## Ejemplo 41

A través de una exhaustiva investigación a una empresa monopólica, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) fue capaz de determinar que los costos marginales de la empresa en UM se comportan como la función  $CMg(q) = \phi^q \ln \phi$ , con  $\phi > 1$  constante. Están interesados en obtener los beneficios netos de esta firma, pero sólo han podido determinar los ingresos totales de la firma y sus costos fijos, donde estos últimos ascienden a 101 UM. ¿Cuáles son los costos variables de esta empresa?

## Solución 41

Los costos totales  $CT(q)$  de la empresa satisfacen  $CT'(q) = CMg(q)$ . Por lo tanto, integramos los costos marginales, obteniendo

$$CT(q) = \int \phi^q \ln \phi dq = \phi^q + c.$$

Ahora bien, los costos fijos son aquellos en los que se incurren cuando no hay producción, es decir,

$$CF = CT(0) \iff 101 = 1 + c \iff c = 100.$$

Por lo tanto, los costos totales son  $CT(q) = \phi^q + 100$  y los costos variables son  $CV(q) = \phi^q - 1$ .

# MÓDULO 16

► [Volver al Inicio de la Sección](#)

# Técnicas de Integración

*Derivar es una técnica,  
integrar es un arte.*

La afirmación anterior es bastante acertada. Para derivar funciones bastaba con comprender algunas derivadas y reglas conocidas, no habían mayores complicaciones metodológicas. Sin embargo, las integrales son otro mundo, pues su resolución puede requerir un poco más de creatividad.

# Técnicas de Integración

*Derivar es una técnica,  
integrar es un arte.*

La afirmación anterior es bastante acertada. Para derivar funciones bastaba con comprender algunas derivadas y reglas conocidas, no habían mayores complicaciones metodológicas. Sin embargo, las integrales son otro mundo, pues su resolución puede requerir un poco más de creatividad.

A pesar de ello, existen algunas técnicas para resolver integrales con algunas estructuras conocidas. En este módulo y en el próximo veremos tres de ellas. Existen más (e.g. sustitución trigonométrica) que no abordaremos en este curso.

# Técnicas de Integración

*Derivar es una técnica,  
integrar es un arte.*

La afirmación anterior es bastante acertada. Para derivar funciones bastaba con comprender algunas derivadas y reglas conocidas, no habían mayores complicaciones metodológicas. Sin embargo, las integrales son otro mundo, pues su resolución puede requerir un poco más de creatividad.

A pesar de ello, existen algunas técnicas para resolver integrales con algunas estructuras conocidas. En este módulo y en el próximo veremos tres de ellas. Existen más (e.g. sustitución trigonométrica) que no abordaremos en este curso.

Las tres técnicas que veremos en este curso se llaman

1. método de sustitución,

# Técnicas de Integración

*Derivar es una técnica,  
integrar es un arte.*

La afirmación anterior es bastante acertada. Para derivar funciones bastaba con comprender algunas derivadas y reglas conocidas, no habían mayores complicaciones metodológicas. Sin embargo, las integrales son otro mundo, pues su resolución puede requerir un poco más de creatividad.

A pesar de ello, existen algunas técnicas para resolver integrales con algunas estructuras conocidas. En este módulo y en el próximo veremos tres de ellas. Existen más (e.g. sustitución trigonométrica) que no abordaremos en este curso.

Las tres técnicas que veremos en este curso se llaman

1. método de sustitución,
2. integración por partes y

# Técnicas de Integración

*Derivar es una técnica,  
integrar es un arte.*

La afirmación anterior es bastante acertada. Para derivar funciones bastaba con comprender algunas derivadas y reglas conocidas, no habían mayores complicaciones metodológicas. Sin embargo, las integrales son otro mundo, pues su resolución puede requerir un poco más de creatividad.

A pesar de ello, existen algunas técnicas para resolver integrales con algunas estructuras conocidas. En este módulo y en el próximo veremos tres de ellas. Existen más (e.g. sustitución trigonométrica) que no abordaremos en este curso.

Las tres técnicas que veremos en este curso se llaman

1. método de sustitución,
2. integración por partes y
3. fracciones parciales.



## Previo: Diferenciación

Anteriormente vimos que si  $y = f(x)$ , podíamos expresar la *derivada de  $y$  respecto a  $x$*  como  $\frac{dy}{dx} = f'(x)$ .

## Previo: Diferenciación

Anteriormente vimos que si  $y = f(x)$ , podíamos expresar la *derivada de  $y$  respecto a  $x$*  como  $\frac{dy}{dx} = f'(x)$ .

Además, afirmamos que  $\frac{dy}{dx}$  es sólo notación, es decir, no es precisamente una fracción. Sin embargo, ahora definiremos otro concepto que puede conversar bastante bien con la idea anterior. Éste es el concepto de “diferencial”.

## Previo: Diferenciación

Anteriormente vimos que si  $y = f(x)$ , podíamos expresar la *derivada de  $y$  respecto a  $x$*  como  $\frac{dy}{dx} = f'(x)$ .

Además, afirmamos que  $\frac{dy}{dx}$  es sólo notación, es decir, no es precisamente una fracción. Sin embargo, ahora definiremos otro concepto que puede conversar bastante bien con la idea anterior. Éste es el concepto de “diferencial”.

Definiremos  $dx$  como el *diferencial de  $x$*  y lo trataremos como una *variación arbitrariamente pequeña* de la variable  $x$ .

## Previo: Diferenciación

Anteriormente vimos que si  $y = f(x)$ , podíamos expresar la *derivada de  $y$  respecto a  $x$*  como  $\frac{dy}{dx} = f'(x)$ .

Además, afirmamos que  $\frac{dy}{dx}$  es sólo notación, es decir, no es precisamente una fracción. Sin embargo, ahora definiremos otro concepto que puede conversar bastante bien con la idea anterior. Éste es el concepto de “diferencial”.

Definiremos  $dx$  como el *diferencial de  $x$*  y lo trataremos como una *variación arbitrariamente pequeña* de la variable  $x$ .

Así, el diferencial de una variable dependiente o el *diferencial de una función* es  $dy = f'(x)dx$ . Dicho de otro modo, el diferencial de una función es directamente proporcional al diferencial de la variable independiente, donde la constante de proporcionalidad es la derivada de la función.

## Previo: Diferenciación

Anteriormente vimos que si  $y = f(x)$ , podíamos expresar la *derivada de  $y$  respecto a  $x$*  como  $\frac{dy}{dx} = f'(x)$ .

Además, afirmamos que  $\frac{dy}{dx}$  es sólo notación, es decir, no es precisamente una fracción. Sin embargo, ahora definiremos otro concepto que puede conversar bastante bien con la idea anterior. Éste es el concepto de “diferencial”.


Definiremos  $dx$  como el *diferencial de  $x$*  y lo trataremos como una *variación arbitrariamente pequeña* de la variable  $x$ .

Así, el diferencial de una variable dependiente o el *diferencial de una función* es  $dy = f'(x)dx$ . Dicho de otro modo, el diferencial de una función es directamente proporcional al diferencial de la variable independiente, donde la constante de proporcionalidad es la derivada de la función.

En el párrafo anterior pareciera como si hubiésemos “pasado multiplicando”  $dx$ , pero esto no es así, estamos hablando de conceptos distintos.


# Gráfico: Diferenciación

Figura 42: Diferencial de una Función




# Gráfico: Diferenciación

Figura 42: Diferencial de una Función



# Gráfico: Diferenciación


Figura 42: Diferencial de una Función





# Gráfico: Diferenciación

Figura 42: Diferencial de una Función



# **Método de Sustitución**

El método de sustitución es el más sencillo de todos, pues consiste simplemente en un “cambio de variable”.

# Método de Sustitución

El método de sustitución es el más sencillo de todos, pues consiste simplemente en un “cambio de variable”.

Este método es útil cuando tenemos integrales que de alguna forma se pueden escribir como

$$\int f(g(x))g'(x)dx,$$

donde  $g(x)$  es una función de  $x$  que sustituiremos por otra variable y  $f$  es una función que compone a  $g$ .

# Método de Sustitución

El método de sustitución es el más sencillo de todos, pues consiste simplemente en un “cambio de variable”.

Este método es útil cuando tenemos integrales que de alguna forma se pueden escribir como

$$\int f(g(x))g'(x)dx,$$

donde  $g(x)$  es una función de  $x$  que sustituiremos por otra variable y  $f$  es una función que compone a  $g$ .

En efecto, *sustituyendo*  $u = g(x)$  podemos concluir que  $du = g'(x)dx$  y por lo tanto

$$\int f(u)du = F(u) + c = F(g(x)) + c,$$

donde  $F' = f$ .

# Método de Sustitución

El método de sustitución es el más sencillo de todos, pues consiste simplemente en un “cambio de variable”.

Este método es útil cuando tenemos integrales que de alguna forma se pueden escribir como

$$\int f(g(x))g'(x)dx,$$

donde  $g(x)$  es una función de  $x$  que sustituiremos por otra variable y  $f$  es una función que compone a  $g$ .

En efecto, *sustituyendo*  $u = g(x)$  podemos concluir que  $du = g'(x)dx$  y por lo tanto

$$\int f(u)du = F(u) + c = F(g(x)) + c,$$

donde  $F' = f$ .

En general, la dificultad de este método radica en encontrar la expresión conveniente a sustituir.

# Ejemplos: Integración por Sustitución

## Ejemplo 42

Obtenga  $\int (x^2 + 5)^{100} 2x dx$ .

# Ejemplos: Integración por Sustitución

## Ejemplo 42

Obtenga  $\int (x^2 + 5)^{100} 2x dx$ .

## Solución 42

Sea  $u = x^2 + 5 \implies du = 2x dx$ . Por el método de sustitución tenemos

$$\int (x^2 + 5)^{100} 2x dx = \int u^{100} du = \frac{1}{101} u^{101} + c = \frac{(x^2 + 5)^{101}}{101} + c.$$

# Ejemplos: Integración por Sustitución

## Ejemplo 42

Obtenga  $\int (x^2 + 5)^{100} 2x dx$ .

## Solución 42

Sea  $u = x^2 + 5 \implies du = 2x dx$ . Por el método de sustitución tenemos

$$\int (x^2 + 5)^{100} 2x dx = \int u^{100} du = \frac{1}{101} u^{101} + c = \frac{(x^2 + 5)^{101}}{101} + c.$$

## Ejemplo 43

Obtenga  $\int \frac{\exp(x) + \exp(2x)}{\sqrt[3]{(1 + \exp(x))^2}} dx$ .



# Ejemplos: Integración por Sustitución

## Ejemplo 42

Obtenga  $\int (x^2 + 5)^{100} 2x dx$ .

## Solución 42

Sea  $u = x^2 + 5 \implies du = 2x dx$ . Por el método de sustitución tenemos

$$\int (x^2 + 5)^{100} 2x dx = \int u^{100} du = \frac{1}{101} u^{101} + c = \frac{(x^2 + 5)^{101}}{101} + c.$$

## Ejemplo 43

Obtenga  $\int \frac{\exp(x) + \exp(2x)}{\sqrt[3]{(1 + \exp(x))^2}} dx$ .

## Solución 43

Sea  $u = [1 + \exp(x)]^2 \implies du = 2[\exp(x) + \exp(2x)] dx$ . Luego

$$\int \frac{\exp(x) + \exp(2x)}{\sqrt[3]{(1 + \exp(x))^2}} dx = \int \frac{0,5 du}{\sqrt[3]{u}} dx = \frac{3}{4} u^{\frac{2}{3}} + c = \frac{3}{4} [1 + \exp(x)]^{\frac{4}{3}} + c.$$

# Propuestos: Integración por Sustitución

## Propuesto 43

Determinar cada integral, usando el método de sustitución *según corresponda*. Comprobar el resultado usando derivadas.

1.  $\int \left(x - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 dx$

2.  $\int \sqrt{1-x} dx$

3.  $\int \frac{1+3xy}{y^2} dy$

4.  $\int \frac{x^3+1}{x+1} dx$

5.  $\int (1+x) \sqrt{x^2+2x-5} dx$

6.  $\int \frac{\ln(5x)}{x} dx$

7.  $\int \sqrt[3]{\frac{2-\sqrt[3]{x}}{x^2}} dx$

8.  $\int x\sqrt{1-2x} dx$

9.  $\int \frac{x+3}{(x+1)^2} dx$

10.  $\int \frac{1}{\sqrt{4x^2-9}} dx$

11.  $\int \frac{1}{x\sqrt{9-x^2}} dx$

12.  $\int \exp(x) \sqrt{\exp(x)-1} dx$

13.  $\int \frac{1-2\ln(5x)}{x} dx$

14.  $\int \frac{\ln(x-1)}{2x-2} dx$

# Recordatorio: Derivada de un Producto

Sean  $u(x)$  y  $v(x)$  dos funciones derivables.

# Recordatorio: Derivada de un Producto

Sean  $u(x)$  y  $v(x)$  dos funciones derivables.  
Sabemos que

$$\frac{d(u(x)v(x))}{dx} = u(x) \frac{dv(x)}{dx} + v(x) \frac{du(x)}{dx}.$$

# Recordatorio: Derivada de un Producto

Sean  $u(x)$  y  $v(x)$  dos funciones derivables.  
Sabemos que

$$\frac{d(u(x)v(x))}{dx} = u(x) \frac{dv(x)}{dx} + v(x) \frac{du(x)}{dx}.$$

Luego, integrando ambos lados de la igualdad llegamos a

$$\begin{aligned} \int \frac{d(u(x)v(x))}{dx} dx &= \int u(x) \frac{dv(x)}{dx} dx + \int v(x) \frac{du(x)}{dx} dx \\ u(x)v(x) &= \int u(x) dv(x) + \int v(x) du(x) \end{aligned}$$

# Recordatorio: Derivada de un Producto

Sean  $u(x)$  y  $v(x)$  dos funciones derivables.  
Sabemos que

$$\frac{d(u(x)v(x))}{dx} = u(x) \frac{dv(x)}{dx} + v(x) \frac{du(x)}{dx}.$$

Luego, integrando ambos lados de la igualdad llegamos a

$$\begin{aligned} \int \frac{d(u(x)v(x))}{dx} dx &= \int u(x) \frac{dv(x)}{dx} dx + \int v(x) \frac{du(x)}{dx} dx \\ u(x)v(x) &= \int u(x) dv(x) + \int v(x) du(x) \end{aligned}$$

Finalmente, reordenamos los términos y obtenemos

$$\int u(x) dv(x) = u(x)v(x) - \int v(x) du(x).$$

# Integración por Partes (a.k.a. Teorema de la Vaca)

El método de Integración por Partes consiste en descomponer una integral en *dos partes*,  $u$  y  $dv$ , tal que se cumpla que

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

# Integración por Partes (a.k.a. Teorema de la Vaca)

El método de Integración por Partes consiste en descomponer una integral en *dos partes*,  $u$  y  $dv$ , tal que se cumpla que

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

**Mnemotecnia:** un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme.



# Integración por Partes (a.k.a. Teorema de la Vaca)

El método de Integración por Partes consiste en descomponer una integral en *dos partes*,  $u$  y  $dv$ , tal que se cumpla que

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

**Mnemotecnia:** un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme.

Figura 43: Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme



# Ejemplo: Integración por Partes

## Ejemplo 44

Obtenga  $\int x \ln x dx$ .

## Ejemplo: Integración por Partes

### Ejemplo 44

Obtenga  $\int x \ln x dx$ .

### Solución 44

Sea  $u = \ln x$  y  $dv = x dx$ , de modo que  $du = \frac{dx}{x}$  y  $v = \frac{x^2}{2}$ .

# Ejemplo: Integración por Partes

## Ejemplo 44

Obtenga  $\int x \ln x dx$ .

## Solución 44

Sea  $u = \ln x$  y  $dv = x dx$ , de modo que  $du = \frac{dx}{x}$  y  $v = \frac{x^2}{2}$ .

Luego, integrando por partes se tiene

$$\begin{aligned}\int x \ln x dx &= \ln x \cdot \frac{x^2}{2} - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{dx}{x} \\ &= \ln x \cdot \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{4} + c.\end{aligned}$$

# Ejemplo: Integración por Partes

## Ejemplo 44

Obtenga  $\int x \ln x dx$ .

## Solución 44

Sea  $u = \ln x$  y  $dv = x dx$ , de modo que  $du = \frac{dx}{x}$  y  $v = \frac{x^2}{2}$ .

Luego, integrando por partes se tiene

$$\begin{aligned}\int x \ln x dx &= \ln x \cdot \frac{x^2}{2} - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{dx}{x} \\ &= \ln x \cdot \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{4} + c.\end{aligned}$$

## Propuesto 44

Calcular  $\int \ln x dx$ .

# Ejemplo: Integración por Partes<sup>2</sup>

## Ejemplo 45

Obtenga  $\int x^2 \exp(x) dx$ .

## Ejemplo: Integración por Partes<sup>2</sup>

### Ejemplo 45

Obtenga  $\int x^2 \exp(x) dx$ .

### Solución 45

Sea  $u = x^2$  y  $dv = \exp(x)dx$ , de modo que  $du = 2xdx$  y  $v = \exp(x)$ .

## Ejemplo: Integración por Partes<sup>2</sup>

### Ejemplo 45

Obtenga  $\int x^2 \exp(x) dx$ .

### Solución 45

Sea  $u = x^2$  y  $dv = \exp(x)dx$ , de modo que  $du = 2xdx$  y  $v = \exp(x)$ .  
Luego, integrando por partes se tiene que

$$\int x^2 \exp(x) dx = x^2 \exp(x) - 2 \int \exp(x) x dx. \quad (3)$$



## Ejemplo: Integración por Partes<sup>2</sup>

### Ejemplo 45

Obtenga  $\int x^2 \exp(x) dx$ .

### Solución 45

Sea  $u = x^2$  y  $dv = \exp(x)dx$ , de modo que  $du = 2xdx$  y  $v = \exp(x)$ .

Luego, integrando por partes se tiene que

$$\int x^2 \exp(x) dx = x^2 \exp(x) - 2 \int \exp(x) x dx. \quad (3)$$

Debemos integrar por partes de nuevo para obtener  $\int \exp(x) x dx \dots$

# Ejemplo: Integración por Partes<sup>2</sup>

## Ejemplo 45

Obtenga  $\int x^2 \exp(x) dx$ .

## Solución 45

Sea  $u = x^2$  y  $dv = \exp(x)dx$ , de modo que  $du = 2xdx$  y  $v = \exp(x)$ .  
Luego, integrando por partes se tiene que

$$\int x^2 \exp(x) dx = x^2 \exp(x) - 2 \int \exp(x) x dx. \quad (3)$$

Debemos integrar por partes de nuevo para obtener  $\int \exp(x) x dx \dots$   
Sea  $U = x$  y  $dV = \exp(x)dx$ , tal que  $dU = dx$  y  $V = \exp(x)$ , tal que

$$\int \exp(x) x dx = x \exp(x) - \int \exp(x) dx = x \exp(x) - \exp(x) + c. \quad (4)$$

## Ejemplo: Integración por Partes<sup>2</sup>

### Ejemplo 45

Obtenga  $\int x^2 \exp(x) dx$ .

### Solución 45

Sea  $u = x^2$  y  $dv = \exp(x)dx$ , de modo que  $du = 2x dx$  y  $v = \exp(x)$ .  
Luego, integrando por partes se tiene que

$$\int x^2 \exp(x) dx = x^2 \exp(x) - 2 \int \exp(x) x dx. \quad (3)$$

Debemos integrar por partes de nuevo para obtener  $\int \exp(x) x dx \dots$   
Sea  $U = x$  y  $dV = \exp(x)dx$ , tal que  $dU = dx$  y  $V = \exp(x)$ , tal que

$$\int \exp(x) x dx = x \exp(x) - \int \exp(x) dx = x \exp(x) - \exp(x) + c. \quad (4)$$

Reemplazamos (4) en (3) y obtenemos

$$\int x^2 \exp(x) dx = x^2 \exp(x) - 2x \exp(x) + 2 \exp(x) + C.$$

# Recomendaciones al Integrar por Partes

- Pensar bien en la elección de  $u$  y  $dv$ .

# Recomendaciones al Integrar por Partes

- Pensar bien en la elección de  $u$  y  $dv$ .
- Considerar que al elegir  $u$  se va a generar una integral que contenga  $du$ , es decir, integrar algo con  $du$  **debe** ser más sencillo que con  $u$ . Si no, no hace sentido aplicar la regla.

# Recomendaciones al Integrar por Partes

- Pensar bien en la elección de  $u$  y  $dv$ .
- Considerar que al elegir  $u$  se va a generar una integral que contenga  $du$ , es decir, integrar algo con  $du$  **debe** ser más sencillo que con  $u$ . Si no, no hace sentido aplicar la regla.
- En general, la expresión de  $u$  se va a “*simplificar*”, mientras que la de  $dv$  se va a “*complejizar*”.

# Recomendaciones al Integrar por Partes

- Pensar bien en la elección de  $u$  y  $dv$ .
- Considerar que al elegir  $u$  se va a generar una integral que contenga  $du$ , es decir, integrar algo con  $du$  **debe** ser más sencillo que con  $u$ . Si no, no hace sentido aplicar la regla.
- En general, la expresión de  $u$  se va a “*simplificar*”, mientras que la de  $dv$  se va a “*complejizar*”.
- Notar que si  $u$  es un logaritmo natural, se puede convertir en una función cociente  $du$ . Esto puede ser útil para simplificar expresiones.

# Recomendaciones al Integrar por Partes

- Pensar bien en la elección de  $u$  y  $dv$ .
- Considerar que al elegir  $u$  se va a generar una integral que contenga  $du$ , es decir, integrar algo con  $du$  **debe** ser más sencillo que con  $u$ . Si no, no hace sentido aplicar la regla.
- En general, la expresión de  $u$  se va a “*simplificar*”, mientras que la de  $dv$  se va a “*complejizar*”.
- Notar que si  $u$  es un logaritmo natural, se puede convertir en una función cociente  $du$ . Esto puede ser útil para simplificar expresiones.
- Al contrario, al considerar una exponencial como  $u$  o  $dv$ , no han de esperarse grandes cambios.



# Recomendaciones al Integrar por Partes

- Pensar bien en la elección de  $u$  y  $dv$ .
- Considerar que al elegir  $u$  se va a generar una integral que contenga  $du$ , es decir, integrar algo con  $du$  **debe** ser más sencillo que con  $u$ . Si no, no hace sentido aplicar la regla.
- En general, la expresión de  $u$  se va a “*simplificar*”, mientras que la de  $dv$  se va a “*complejizar*”.
- Notar que si  $u$  es un logaritmo natural, se puede convertir en una función cociente  $du$ . Esto puede ser útil para simplificar expresiones.
- Al contrario, al considerar una exponencial como  $u$  o  $dv$ , no han de esperarse grandes cambios.
- Regla útil para elegir  $u$ : LIATE (Logaritmos, **I**nversas trigonométricas, **A**ritméticas, **T**rigonométricas, **E**xponenciales).

# Propuestos: Integración por Partes

## Propuesto 45

Determinar cada integral, usando integración por partes.  
Comprobar el resultado usando derivadas.

1.  $\int x \exp(-x) dx$

5.  $\int 2x 2^x dx$

2.  $\int x^2 \exp(x) dx$

6.  $\int x \ln(x^2) dx$

3.  $\int \ln(3x) dy$

7.  $\int 7x^2 \ln(4x) dx$

4.  $\int (\ln x)^3 dx$

8.  $\int \frac{\ln x}{x^3} dx$

## Propuesto 46

Integrar  $\int x\sqrt{4+x} dx$  por los siguientes métodos:

1. Sustitución con cambio de variable  $u = \sqrt{4+x}$ .
2. Sustitución con cambio de variable  $u = 4+x$ .
3. Por partes con  $dv = \sqrt{4+x} dx$ .

# MÓDULO 17

► [Volver al Inicio de la Sección](#)

## Recordatorio: Fracciones

Siempre que tenemos una fracción cuyo numerador y denominador son polinomios (factorizables), está la opción de *separar* la fracción original como una suma o resta de *fracciones parciales*.

## Recordatorio: Fracciones

Siempre que tenemos una fracción cuyo numerador y denominador son polinomios (factorizables), está la opción de *separar* la fracción original como una suma o resta de *fracciones parciales*.

En efecto, tomemos como ejemplo a la fracción  $\frac{x+2}{x^2+7x+12}$ .

## Recordatorio: Fracciones

Siempre que tenemos una fracción cuyo numerador y denominador son polinomios (factorizables), está la opción de *separar* la fracción original como una suma o resta de *fracciones parciales*.

En efecto, tomemos como ejemplo a la fracción  $\frac{x+2}{x^2+7x+12}$ .

El denominador se puede factorizar, pues  $x^2+7x+12 = (x+3)(x+4)$ .

## Recordatorio: Fracciones

Siempre que tenemos una fracción cuyo numerador y denominador son polinomios (factorizables), está la opción de *separar* la fracción original como una suma o resta de *fracciones parciales*.

En efecto, tomemos como ejemplo a la fracción  $\frac{x+2}{x^2+7x+12}$ .

El denominador se puede factorizar, pues  $x^2+7x+12 = (x+3)(x+4)$ . Así, es razonable pensar que la fracción se puede separar en la suma o resta de dos fracciones: una con denominador  $x+3$  y otra con denominador  $x+4$ .

## Recordatorio: Fracciones

Siempre que tenemos una fracción cuyo numerador y denominador son polinomios (factorizables), está la opción de *separar* la fracción original como una suma o resta de *fracciones parciales*.

En efecto, tomemos como ejemplo a la fracción  $\frac{x+2}{x^2+7x+12}$ .

El denominador se puede factorizar, pues  $x^2+7x+12 = (x+3)(x+4)$ . Así, es razonable pensar que la fracción se puede separar en la suma o resta de dos fracciones: una con denominador  $x+3$  y otra con denominador  $x+4$ .

Sin embargo, *¿qué valores deberían tomar los numeradores?*



## Recordatorio: Fracciones

Siempre que tenemos una fracción cuyo numerador y denominador son polinomios (factorizables), está la opción de *separar* la fracción original como una suma o resta de *fracciones parciales*.

En efecto, tomemos como ejemplo a la fracción  $\frac{x+2}{x^2+7x+12}$ .

El denominador se puede factorizar, pues  $x^2+7x+12 = (x+3)(x+4)$ . Así, es razonable pensar que la fracción se puede separar en la suma o resta de dos fracciones: una con denominador  $x+3$  y otra con denominador  $x+4$ .

Sin embargo, *¿qué valores deberían tomar los numeradores?*

Como no sabemos a priori cuáles son los numeradores, podemos pensar que éstos pueden ser polinomios genéricos, con incógnitas que nosotros deberíamos determinar.

## Recordatorio: Fracciones

Siempre que tenemos una fracción cuyo numerador y denominador son polinomios (factorizables), está la opción de *separar* la fracción original como una suma o resta de *fracciones parciales*.

En efecto, tomemos como ejemplo a la fracción  $\frac{x+2}{x^2+7x+12}$ .

El denominador se puede factorizar, pues  $x^2+7x+12 = (x+3)(x+4)$ . Así, es razonable pensar que la fracción se puede separar en la suma o resta de dos fracciones: una con denominador  $x+3$  y otra con denominador  $x+4$ .

Sin embargo, *¿qué valores deberían tomar los numeradores?*

Como no sabemos a priori cuáles son los numeradores, podemos pensar que éstos pueden ser polinomios genéricos, con incógnitas que nosotros deberíamos determinar.

Sin embargo, estos polinomios genéricos que pondremos en los numeradores deben tener un grado menor que sus respectivos denominadores (*¿Por qué?*).

## Recordatorio: Fracciones (cont.)

Así, planteamos que  $\frac{x+2}{x^2+7x+12} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x+4}$ .

## Recordatorio: Fracciones (cont.)

Así, planteamos que  $\frac{x+2}{x^2+7x+12} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x+4}$ .

Sumando tenemos  $\frac{A}{x+3} + \frac{B}{x+4} = \frac{Ax+4A+Bx+3B}{(x+3)(x+4)} = \frac{(A+B)x+4A+3B}{x^2+7x+12}$ .

## Recordatorio: Fracciones (cont.)

Así, planteamos que  $\frac{x+2}{x^2+7x+12} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x+4}$ .

Sumando tenemos  $\frac{A}{x+3} + \frac{B}{x+4} = \frac{Ax+4A+Bx+3B}{(x+3)(x+4)} = \frac{(A+B)x+4A+3B}{x^2+7x+12}$ .

Pero como esta última expresión debe ser equivalente a la fracción original, se debe cumplir que  $x = (A+B)x$  y que  $2 = 4A+3B$ .

## Recordatorio: Fracciones (cont.)

Así, planteamos que  $\frac{x+2}{x^2+7x+12} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x+4}$ .

Sumando tenemos  $\frac{A}{x+3} + \frac{B}{x+4} = \frac{Ax+4A+Bx+3B}{(x+3)(x+4)} = \frac{(A+B)x+4A+3B}{x^2+7x+12}$ .

Pero como esta última expresión debe ser equivalente a la fracción original, se debe cumplir que  $x = (A+B)x$  y que  $2 = 4A + 3B$ .

Con esto planteamos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{array}{rclcl} A & + & B & = & 1 \\ 4A & + & 3B & = & 2 \end{array} \quad \Bigg|$$

## Recordatorio: Fracciones (cont.)

Así, planteamos que  $\frac{x+2}{x^2+7x+12} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x+4}$ .

Sumando tenemos  $\frac{A}{x+3} + \frac{B}{x+4} = \frac{Ax+4A+Bx+3B}{(x+3)(x+4)} = \frac{(A+B)x+4A+3B}{x^2+7x+12}$ .

Pero como esta última expresión debe ser equivalente a la fracción original, se debe cumplir que  $x = (A+B)x$  y que  $2 = 4A + 3B$ .

Con esto planteamos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{array}{rclcl} A & + & B & = & 1 \\ 4A & + & 3B & = & 2 \end{array}$$

Resolviéndolo llegamos a que  $A = -1$  y  $B = 2$ .

## Recordatorio: Fracciones (cont.)

Así, planteamos que  $\frac{x+2}{x^2+7x+12} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x+4}$ .

Sumando tenemos  $\frac{A}{x+3} + \frac{B}{x+4} = \frac{Ax+4A+Bx+3B}{(x+3)(x+4)} = \frac{(A+B)x+4A+3B}{x^2+7x+12}$ .

Pero como esta última expresión debe ser equivalente a la fracción original, se debe cumplir que  $x = (A+B)x$  y que  $2 = 4A + 3B$ .

Con esto planteamos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{array}{rclcrcl} A & + & B & = & 1 \\ 4A & + & 3B & = & 2 \end{array}$$

Resolviéndolo llegamos a que  $A = -1$  y  $B = 2$ .

Por lo tanto,  $\frac{x+2}{x^2+7x+12} = -\frac{1}{x+3} + \frac{2}{x+4}$ .



## Recordatorio: Fracciones (cont.)

Así, planteamos que  $\frac{x+2}{x^2+7x+12} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x+4}$ .

Sumando tenemos  $\frac{A}{x+3} + \frac{B}{x+4} = \frac{Ax+4A+Bx+3B}{(x+3)(x+4)} = \frac{(A+B)x+4A+3B}{x^2+7x+12}$ .

Pero como esta última expresión debe ser equivalente a la fracción original, se debe cumplir que  $x = (A+B)x$  y que  $2 = 4A + 3B$ .

Con esto planteamos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{array}{rclcrcl} A & + & B & = & 1 \\ 4A & + & 3B & = & 2 \end{array}$$

Resolviéndolo llegamos a que  $A = -1$  y  $B = 2$ .

Por lo tanto,  $\frac{x+2}{x^2+7x+12} = -\frac{1}{x+3} + \frac{2}{x+4}$ .

*¿Qué tiene que ver esto con integrales?*

# Integración por Fracciones Parciales

Cuando tenemos una integral de la forma  $\int \frac{x+2}{x^2+7x+12} dx$ , no es trivial deducir la solución, pues no tiene exactamente la forma de una primitiva conocida.

---

<sup>9</sup>Cuando los denominadores son afines. Ya veremos qué pasa cuando no lo son.

# Integración por Fracciones Parciales

Cuando tenemos una integral de la forma  $\int \frac{x+2}{x^2+7x+12} dx$ , no es trivial deducir la solución, pues no tiene exactamente la forma de una primitiva conocida.

Sin embargo, al calcular  $-\int \frac{1}{x+3} dx + 2 \int \frac{1}{x+4} dx$ , que es una expresión equivalente, notamos que ambas integrales cumplen con ser logaritmos (ver Solución 39).

---

<sup>9</sup>Cuando los denominadores son afines. Ya veremos qué pasa cuando no lo son.

# Integración por Fracciones Parciales

Cuando tenemos una integral de la forma  $\int \frac{x+2}{x^2+7x+12} dx$ , no es trivial deducir la solución, pues no tiene exactamente la forma de una primitiva conocida.

Sin embargo, al calcular  $-\int \frac{1}{x+3} dx + 2 \int \frac{1}{x+4} dx$ , que es una expresión equivalente, notamos que ambas integrales cumplen con ser logaritmos (ver Solución 39).

Por lo tanto,

$$\int \frac{x+2}{x^2+7x+12} dx = -\int \frac{1}{x+3} dx + 2 \int \frac{1}{x+4} dx = -\ln|x+3| + 2\ln|x+4| + c.$$

---

<sup>9</sup>Cuando los denominadores son afines. Ya veremos qué pasa cuando no lo son.

# Integración por Fracciones Parciales

Cuando tenemos una integral de la forma  $\int \frac{x+2}{x^2+7x+12} dx$ , no es trivial deducir la solución, pues no tiene exactamente la forma de una primitiva conocida.

Sin embargo, al calcular  $-\int \frac{1}{x+3} dx + 2 \int \frac{1}{x+4} dx$ , que es una expresión equivalente, notamos que ambas integrales cumplen con ser logaritmos (ver Solución 39).

Por lo tanto,

$$\int \frac{x+2}{x^2+7x+12} dx = -\int \frac{1}{x+3} dx + 2 \int \frac{1}{x+4} dx = -\ln|x+3| + 2\ln|x+4| + c.$$

Este razonamiento corresponde al método de fracciones parciales.

---

<sup>9</sup>Cuando los denominadores son afines. Ya veremos qué pasa cuando no lo son.

# Integración por Fracciones Parciales

Cuando tenemos una integral de la forma  $\int \frac{x+2}{x^2+7x+12} dx$ , no es trivial deducir la solución, pues no tiene exactamente la forma de una primitiva conocida.

Sin embargo, al calcular  $-\int \frac{1}{x+3} dx + 2 \int \frac{1}{x+4} dx$ , que es una expresión equivalente, notamos que ambas integrales cumplen con ser logaritmos (ver Solución 39).

Por lo tanto,

$$\int \frac{x+2}{x^2+7x+12} dx = -\int \frac{1}{x+3} dx + 2 \int \frac{1}{x+4} dx = -\ln|x+3| + 2\ln|x+4| + c.$$

Este razonamiento corresponde al método de fracciones parciales.

**Observación:** En general, el resultado de este método es un logaritmo natural<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup>Cuando los denominadores son afines. Ya veremos qué pasa cuando no lo son.

# Ejercicio: Fracciones Parciales

## Ejemplo 46

Calcule  $\int \frac{4x+6}{x^3+3x^2+2x} dx$ .

## Ejercicio: Fracciones Parciales

### Ejemplo 46

Calcule  $\int \frac{4x+6}{x^3+3x^2+2x} dx$ .

### Solución 46

En efecto,

$$\frac{4x+6}{x^3+3x^2+2x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x+2} = \frac{(A+B+C)x^2 + (3A+2B+C)x + 2A}{x^3+3x^2+2x}.$$



# Ejercicio: Fracciones Parciales

## Ejemplo 46

Calcule  $\int \frac{4x+6}{x^3+3x^2+2x} dx$ .

## Solución 46

En efecto,

$$\frac{4x+6}{x^3+3x^2+2x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x+2} = \frac{(A+B+C)x^2 + (3A+2B+C)x + 2A}{x^3+3x^2+2x}.$$

$$\begin{array}{rclcl} \text{Luego, resolvemos} & \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x+2} & = & \frac{0}{x^3+3x^2+2x} & \\ & \begin{array}{rclcl} 3A & + & 2B & + & C & = & 0 \\ 2A & & & & & = & 4 \\ & & & & & & = & 6 \end{array} & \text{y obtenemos} \end{array}$$

$$A = 3, B = -2 \text{ y } C = -1. \text{ Por lo tanto, } \int \frac{4x+6}{x^3+3x^2+2x} dx =$$

$$3 \int \frac{dx}{x} - 2 \int \frac{dx}{x+1} - \int \frac{dx}{x+2} = 3 \ln|x| - 2 \ln|x+1| - \ln|x+2| + C.$$

# Distintas Fracciones Parciales

Al descomponer las fracciones podemos encontrarnos con casos donde los denominadores no sean afines, es decir, podemos encontrar polinomios de grado mayor a 1.

## Distintas Fracciones Parciales

Al descomponer las fracciones podemos encontrarnos con casos donde los denominadores no sean afines, es decir, podemos encontrar polinomios de grado mayor a 1.

Por ejemplo, podemos pensar en la fracción  $\frac{3x^2 + 5x + 1}{x^3 - 1}$ . En este caso, el denominador sólo se puede factorizar como  $(x - 1)(x^2 + x + 1)$ , es decir, tendremos un denominador cuadrático en alguna de nuestras fracciones parciales.

# Distintas Fracciones Parciales

Al descomponer las fracciones podemos encontrarnos con casos donde los denominadores no sean afines, es decir, podemos encontrar polinomios de grado mayor a 1.

Por ejemplo, podemos pensar en la fracción  $\frac{3x^2 + 5x + 1}{x^3 - 1}$ . En este caso, el denominador sólo se puede factorizar como  $(x - 1)(x^2 + x + 1)$ , es decir, tendremos un denominador cuadrático en alguna de nuestras fracciones parciales.

Otra posibilidad es que tengamos un denominador que sea equivalente a una expresión más sencilla, *elevada* a un grado mayor que 1. Por ejemplo  $\frac{x + 2}{x^3 - 3x^2 + 3x - 1}$ , donde el denominador equivale a  $(x - 1)^3$ . En esta situación, es necesario que incorporemos a  $x - 1$ ,  $(x - 1)^2$  y  $(x - 1)^3$ , todos como denominadores de tres fracciones parciales distintas.

# Distintas Fracciones Parciales

Al descomponer las fracciones podemos encontrarnos con casos donde los denominadores no sean afines, es decir, podemos encontrar polinomios de grado mayor a 1.

Por ejemplo, podemos pensar en la fracción  $\frac{3x^2 + 5x + 1}{x^3 - 1}$ . En este caso, el denominador sólo se puede factorizar como  $(x - 1)(x^2 + x + 1)$ , es decir, tendremos un denominador cuadrático en alguna de nuestras fracciones parciales.

Otra posibilidad es que tengamos un denominador que sea equivalente a una expresión más sencilla, *elevada* a un grado mayor que 1. Por ejemplo  $\frac{x + 2}{x^3 - 3x^2 + 3x - 1}$ , donde el denominador equivale a  $(x - 1)^3$ . En esta situación, es necesario que incorporemos a  $x - 1$ ,  $(x - 1)^2$  y  $(x - 1)^3$ , todos como denominadores de tres fracciones parciales distintas.

Así, hay una infinidad de casos distintos...

# Fracciones Parciales y sus Factores

El resumen con todas las formas de plantear fracciones parciales se encuentra en la Tabla 3.

Tabla 3: Factores y Fracciones Parciales

Forma del Factor	Forma de la Fracción Parcial
Lineal único: $ax + b$	$\frac{A}{ax + b}$
Lineal repetido: $(ax + b)^n$	$\frac{A_1}{ax + b} + \frac{A_2}{(ax + b)^2} + \cdots + \frac{A_n}{(ax + b)^n}$
Cuad. único: $ax^2 + bx + c$	$\frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c}$
Cuad. rep.: $(ax^2 + bx + c)^n$	$\frac{A_1x + B_1}{ax^2 + bx + c} + \frac{A_2x + B_2}{(ax^2 + bx + c)^2} + \cdots + \frac{A_nx + B_n}{(ax^2 + bx + c)^n}$
$\vdots$	$\vdots$
$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_kx^k$	$\frac{A_0 + A_1x + \cdots + A_{k-1}x^{k-1}}{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_kx^k}$

# Ejemplo: Fracciones Parciales

## Ejemplo 47

Obtenga  $\int \frac{2x^2 - 1}{x^3 + x^2} dx$

# Ejemplo: Fracciones Parciales

## Ejemplo 47

Obtenga  $\int \frac{2x^2 - 1}{x^3 + x^2} dx$

## Solución 47

Sea  $\frac{2x^2 - 1}{x^3 + x^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x + 1}.$



# Ejemplo: Fracciones Parciales

## Ejemplo 47

Obtenga  $\int \frac{2x^2 - 1}{x^3 + x^2} dx$

## Solución 47

Sea  $\frac{2x^2 - 1}{x^3 + x^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x + 1}$ .

Luego,  $Ax^2 + Ax + Bx + B + Cx^2 = 2x^2 - 1$ .

# Ejemplo: Fracciones Parciales

## Ejemplo 47

Obtenga  $\int \frac{2x^2 - 1}{x^3 + x^2} dx$

## Solución 47

Sea  $\frac{2x^2 - 1}{x^3 + x^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x + 1}$ .

Luego,  $Ax^2 + Ax + Bx + B + Cx^2 = 2x^2 - 1$ .

Resolviendo el sistema correspondiente se obtiene  $A = 1$ ,  $B = -1$ ,  $C = 1$ .

# Ejemplo: Fracciones Parciales

## Ejemplo 47

Obtenga  $\int \frac{2x^2 - 1}{x^3 + x^2} dx$

## Solución 47

Sea  $\frac{2x^2 - 1}{x^3 + x^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x + 1}$ .

Luego,  $Ax^2 + Ax + Bx + B + Cx^2 = 2x^2 - 1$ .

Resolviendo el sistema correspondiente se obtiene  $A = 1$ ,  $B = -1$ ,  $C = 1$ .

Por lo tanto,

$$\int \frac{2x^2 - 1}{x^3 + x^2} dx = \int \frac{dx}{x} - \int \frac{dx}{x^2} + \int \frac{dx}{x + 1} = \ln|x| + x^{-1} + \ln|x + 1| + c.$$

# MÓDULO 18

► [Volver al Inicio de la Sección](#)

# Área Bajo una Función

Figura 44: Recorte de la PSU (Admisión 2005)

DEMRE N°07 MATEMATICAS 6/2/04 13:33 Página 10




10

38. En el plano de la figura 3, se muestra el polígono ABCD, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s) ?

- I) El perímetro del polígono es  $8\sqrt{2}$ .
- II) Cada diagonal del polígono mide 4.
- III) El área del polígono es  $4\sqrt{2}$ .

- A) Sólo I
- B) Sólo II
- C) Sólo I y II
- D) Sólo II y III
- E) I, II y III

fig. 3



# Área Bajo una Función

Figura 44: Recorte de la PSU (Admisión 2005)

DEMRE N°07 MATEMATICAS 6/2/04 13:33 Página 10



10

38. En el plano de la figura 3, se muestra el polígono ABCD, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s) ?

- I) El perímetro del polígono es  $8\sqrt{2}$ .
- II) Cada diagonal del polígono mide 4.
- III) El área del polígono es  $4\sqrt{2}$ .

- A) Sólo I
- B) Sólo II
- C) Sólo I y II
- D) Sólo II y III
- E) I, II y III




fig. 3

En general, no tenemos problemas con calcular áreas debajo de funciones afines.

# Área Bajo una Función

Figura 44: Recorte de la PSU (Admisión 2005)

DEMRE N°07 MATEMATICAS 6/2/04 13:33 Página 10



10

38. En el plano de la figura 3, se muestra el polígono ABCD, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) verdadera(s) ?

- I) El perímetro del polígono es  $8\sqrt{2}$ .
  - II) Cada diagonal del polígono mide 4.
  - III) El área del polígono es  $4\sqrt{2}$ .
- A) Sólo I
  - B) Sólo II
  - C) Sólo I y II
  - D) Sólo II y III
  - E) I, II y III




fig. 3

En general, no tenemos problemas con calcular áreas debajo de funciones afines. Pero, *¿cómo se calcula el área bajo una curva?*

# Suma de Riemann

Supongamos que queremos calcular el área debajo de una función limitada en algún intervalo por el eje de las abscisas.



## Suma de Riemann

Supongamos que queremos calcular el área debajo de una función limitada en algún intervalo por el eje de las abscisas.


Podríamos intentar aproximar dicha superficie a través de *muchos* rectángulos *muy* delgados, tal como se muestra en la Figura 45.

# Suma de Riemann

Supongamos que queremos calcular el área debajo de una función limitada en algún intervalo por el eje de las abscisas.

Podríamos intentar aproximar dicha superficie a través de *muchos* rectángulos *muy* delgados, tal como se muestra en la Figura 45.

Figura 45: 18 Rectángulos Emulando a  $f(x) = \sqrt{x} \sin x$  en  $[0,9]$



## Suma de Riemann (cont.)

### Ejemplo 48

Calcule el área total de los 4 rectángulos con bases iguales que emulan a  $f(x) = x^2$  en el intervalo  $[0, 2]$  por la derecha.

## Suma de Riemann (cont.)

### Ejemplo 48

Calcule el área total de los 4 rectángulos con bases iguales que emulan a  $f(x) = x^2$  en el intervalo  $[0, 2]$  por la derecha. Repita el proceso con 20 rectángulos.

## Suma de Riemann (cont.)

### Ejemplo 48

Calcule el área total de los 4 rectángulos con bases iguales que emulan a  $f(x) = x^2$  en el intervalo  $[0, 2]$  por la derecha. Repita el proceso con 20 rectángulos. ¿Qué ocurre cuando la cantidad de rectángulos tiende a infinito?

**Recordatorio MEM105:**  $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$

### Solución 48

4 rectángulos:  $0,5(0,5^2 + 1^2 + 1,5^2 + 2^2) = 3,75.$

## Suma de Riemann (cont.)

### Ejemplo 48

Calcule el área total de los 4 rectángulos con bases iguales que emulan a  $f(x) = x^2$  en el intervalo  $[0, 2]$  por la derecha. Repita el proceso con 20 rectángulos. ¿Qué ocurre cuando la cantidad de rectángulos tiende a infinito?

**Recordatorio MEM105:**  $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$

### Solución 48

4 rectángulos:  $0,5(0,5^2 + 1^2 + 1,5^2 + 2^2) = 3,75.$

20 rectángulos (ver Figura 46) :

$$0,1(0,1^2 + 0,2^2 + 0,3^2 + \cdots + 1,9^2 + 2^2) = 0,1 \left[ \sum_{k=1}^{20} \left( \frac{k}{10} \right)^2 \right] = 2,87.$$

## Suma de Riemann (cont.)

### Ejemplo 48

Calcule el área total de los 4 rectángulos con bases iguales que emulan a  $f(x) = x^2$  en el intervalo  $[0, 2]$  por la derecha. Repita el proceso con 20 rectángulos. ¿Qué ocurre cuando la cantidad de rectángulos tiende a infinito?

**Recordatorio MEM105:** 
$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

### Solución 48

4 rectángulos:  $0,5(0,5^2 + 1^2 + 1,5^2 + 2^2) = 3,75.$

20 rectángulos (ver Figura 46) :

$$0,1(0,1^2 + 0,2^2 + 0,3^2 + \dots + 1,9^2 + 2^2) = 0,1 \left[ \sum_{k=1}^{20} \left( \frac{k}{10} \right)^2 \right] = 2,87.$$

$$n \text{ rectángulos: } \frac{2}{n} \left[ \sum_{k=1}^n \left( \frac{2k}{n} \right)^2 \right] = \frac{2}{n} \cdot \frac{4}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

## Suma de Riemann (cont.)

### Ejemplo 48

Calcule el área total de los 4 rectángulos con bases iguales que emulan a  $f(x) = x^2$  en el intervalo  $[0, 2]$  por la derecha. Repita el proceso con 20 rectángulos. ¿Qué ocurre cuando la cantidad de rectángulos tiende a infinito?

**Recordatorio MEM105:** 
$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

### Solución 48

4 rectángulos:  $0,5(0,5^2 + 1^2 + 1,5^2 + 2^2) = 3,75.$

20 rectángulos (ver Figura 46) :

$$0,1(0,1^2 + 0,2^2 + 0,3^2 + \cdots + 1,9^2 + 2^2) = 0,1 \left[ \sum_{k=1}^{20} \left( \frac{k}{10} \right)^2 \right] = 2,87.$$


$$n \text{ rectángulos: } \frac{2}{n} \left[ \sum_{k=1}^n \left( \frac{2k}{n} \right)^2 \right] = \frac{2}{n} \cdot \frac{4}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Obteniendo el límite cuando  $n \rightarrow \infty$  obtenemos  $\frac{8}{3}.$



# Gráfico: Suma de Riemann

Figura 46: 4, 20 y 100 Rectángulos Emulando a  $f(x) = x^2$  en  $[0, 2]$



# Integrales Definidas

Calcular el área anterior no requiere tanto esfuerzo...

# Integrales Definidas

Calcular el área anterior no requiere tanto esfuerzo...

## Ejemplo 49

Sea  $\int x^2 dx = F(x) + c$ . Calcule  $F(2) - F(0)$ .

# Integrales Definidas

Calcular el área anterior no requiere tanto esfuerzo...

## Ejemplo 49

Sea  $\int x^2 dx = F(x) + c$ . Calcule  $F(2) - F(0)$ .

## Solución 49

Sabemos que  $\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + c$ .

# Integrales Definidas

Calcular el área anterior no requiere tanto esfuerzo...

## Ejemplo 49

Sea  $\int x^2 dx = F(x) + c$ . Calcule  $F(2) - F(0)$ .

## Solución 49

Sabemos que  $\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + c$ . Luego,  $F(2) - F(0) = \frac{8}{3}$ .

# Integrales Definidas

Calcular el área anterior no requiere tanto esfuerzo...

## Ejemplo 49

Sea  $\int x^2 dx = F(x) + c$ . Calcule  $F(2) - F(0)$ .

## Solución 49

Sabemos que  $\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + c$ . Luego,  $F(2) - F(0) = \frac{8}{3}$ .

## Definición 42

(Segundo Teorema Fundamental del Cálculo) Si  $\int f(x) dx = F(x) + c$ , entonces la **integral definida** de  $f(x)$  entre  $a$  y  $b$  se define como

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a) \left( = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(k \cdot \frac{b-a}{n}\right) \right).$$

# Integrales Definidas

Calcular el área anterior no requiere tanto esfuerzo...

## Ejemplo 49

Sea  $\int x^2 dx = F(x) + c$ . Calcule  $F(2) - F(0)$ .

## Solución 49

Sabemos que  $\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + c$ . Luego,  $F(2) - F(0) = \frac{8}{3}$ .

## Definición 42

(Segundo Teorema Fundamental del Cálculo) Si  $\int f(x) dx = F(x) + c$ , entonces la **integral definida** de  $f(x)$  entre  $a$  y  $b$  se define como

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a) \left( = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(k \cdot \frac{b-a}{n}\right) \right).$$

Esta expresión puede ser utilizada para calcular el área bajo la función  $f(x)$  entre  $a$  y  $b$ , los *límites de integración*.

# Integrales Definidas

Calcular el área anterior no requiere tanto esfuerzo...

## Ejemplo 49

Sea  $\int x^2 dx = F(x) + c$ . Calcule  $F(2) - F(0)$ .

## Solución 49

Sabemos que  $\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + c$ . Luego,  $F(2) - F(0) = \frac{8}{3}$ .

## Definición 42

(Segundo Teorema Fundamental del Cálculo) Si  $\int f(x) dx = F(x) + c$ , entonces la **integral definida** de  $f(x)$  entre  $a$  y  $b$  se define como

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a) \left( = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(k \cdot \frac{b-a}{n}\right) \right).$$

Esta expresión puede ser utilizada para calcular el área bajo la función  $f(x)$  entre  $a$  y  $b$ , los *límites de integración*.

**Observación:** ¡Ya no hay constante!



# Integrales Definidas

Calcular el área anterior no requiere tanto esfuerzo...

## Ejemplo 49

Sea  $\int x^2 dx = F(x) + c$ . Calcule  $F(2) - F(0)$ .

## Solución 49

Sabemos que  $\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + c$ . Luego,  $F(2) - F(0) = \frac{8}{3}$ .

## Definición 42

(Segundo Teorema Fundamental del Cálculo) Si  $\int f(x) dx = F(x) + c$ , entonces la **integral definida** de  $f(x)$  entre  $a$  y  $b$  se define como

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a) \left( = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(k \cdot \frac{b-a}{n}\right) \right).$$

Esta expresión puede ser utilizada para calcular el área bajo la función  $f(x)$  entre  $a$  y  $b$ , los *límites de integración*.

**Observación:** ¡Ya no hay constante! ¿Por qué?

# Animación: Área Bajo una Curva

Figura 47: Área bajo  $f(x) = x^2$  ante distintos intervalos

## Ejemplo: Integral Definida

### Ejemplo 50

Obtenga  $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$ .

## Ejemplo: Integral Definida

### Ejemplo 50

Obtenga  $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$ .

### Solución 50

Sea  $u = \ln x$  y  $dv = x dx$ , de modo que  $du = \frac{dx}{x}$  y  $v = \frac{x^2}{2}$ .

## Ejemplo: Integral Definida

### Ejemplo 50

Obtenga  $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$ .

### Solución 50

Sea  $u = \ln x$  y  $dv = x dx$ , de modo que  $du = \frac{dx}{x}$  y  $v = \frac{x^2}{2}$ .

$$\text{Luego, } \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = F(x) \Big|_1^e = \left( \ln x \cdot \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} \cdot \frac{dx}{x}$$

## Ejemplo: Integral Definida

### Ejemplo 50

Obtenga  $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$ .

### Solución 50

Sea  $u = \ln x$  y  $dv = x dx$ , de modo que  $du = \frac{dx}{x}$  y  $v = \frac{x^2}{2}$ .

$$\begin{aligned}\text{Luego, } \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx &= F(x) \Big|_1^e = \left( \ln x \cdot \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} \cdot \frac{dx}{x} \\ &= \left( \ln x \cdot \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{4} \right) \Big|_1^e = \left( \ln e \cdot \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} \right) - \left( \ln 1 \cdot \frac{1^2}{2} - \frac{1^2}{4} \right)\end{aligned}$$

## Ejemplo: Integral Definida

### Ejemplo 50

Obtenga  $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$ .

### Solución 50

Sea  $u = \ln x$  y  $dv = x dx$ , de modo que  $du = \frac{dx}{x}$  y  $v = \frac{x^2}{2}$ .

$$\begin{aligned}\text{Luego, } \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx &= F(x) \Big|_1^e = \left( \ln x \cdot \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} \cdot \frac{dx}{x} \\ &= \left( \ln x \cdot \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{4} \right) \Big|_1^e = \left( \ln e \cdot \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} \right) - \left( \ln 1 \cdot \frac{1^2}{2} - \frac{1^2}{4} \right) \\ &= \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

# Ejemplo: Integral Definida

## Ejemplo 50

Obtenga  $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$ .

## Solución 50

Sea  $u = \ln x$  y  $dv = x dx$ , de modo que  $du = \frac{dx}{x}$  y  $v = \frac{x^2}{2}$ .

$$\begin{aligned}\text{Luego, } \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx &= F(x) \Big|_1^e = \left( \ln x \cdot \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} \cdot \frac{dx}{x} \\ &= \left( \ln x \cdot \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{4} \right) \Big|_1^e = \left( \ln e \cdot \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} \right) - \left( \ln 1 \cdot \frac{1^2}{2} - \frac{1^2}{4} \right) \\ &= \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

## Propuesto 47

Obtenga el área del trapecio formado por  $y = 4 - x$ ,  $x = 1$ ,  $x = 3$  e  $y = 0$  como en la PSU. Compruebe su resultado usando integrales.



# Integrales Definidas y Sustitución

Es importante notar que cuando se desea computar una integral definida utilizando el método de sustitución, *los límites de integración también se sustituyen.*

## Integrales Definidas y Sustitución

Es importante notar que cuando se desea computar una integral definida utilizando el método de sustitución, *los límites de integración también se sustituyen*.

Por ejemplo, si queremos obtener la integral del Propuesto 1 entre 5 y 12,  $\int_5^{12} x\sqrt{4+x}dx$ , al plantear  $u = \sqrt{4+x}$ , también hay que considerar que  $x = 5 \implies u = 3$  y que  $x = 12 \implies u = 4$ .

# Integrales Definidas y Sustitución

Es importante notar que cuando se desea computar una integral definida utilizando el método de sustitución, *los límites de integración también se sustituyen*.

Por ejemplo, si queremos obtener la integral del Propuesto 1 entre 5 y 12,  $\int_5^{12} x\sqrt{4+x}dx$ , al plantear  $u = \sqrt{4+x}$ , también hay que considerar que  $x = 5 \implies u = 3$  y que  $x = 12 \implies u = 4$ .

Por lo tanto, resolviendo por el método de sustitución tenemos

$$\begin{aligned}\int_5^{12} x\sqrt{4+x}dx &= \int_3^4 (u^2 - 4) \cdot u \cdot 2udu \\ &= \left(2u^4 - 8u^2\right)\Big|_3^4 = (512 - 128) - (162 - 72) = 384 - 90 = 294.\end{aligned}$$

# Integrales Definidas y Sustitución

Es importante notar que cuando se desea computar una integral definida utilizando el método de sustitución, *los límites de integración también se sustituyen*.

Por ejemplo, si queremos obtener la integral del Propuesto 1 entre 5 y 12,  $\int_5^{12} x\sqrt{4+x}dx$ , al plantear  $u = \sqrt{4+x}$ , también hay que considerar que  $x = 5 \Rightarrow u = 3$  y que  $x = 12 \Rightarrow u = 4$ .

Por lo tanto, resolviendo por el método de sustitución tenemos

$$\begin{aligned}\int_5^{12} x\sqrt{4+x}dx &= \int_3^4 (u^2 - 4) \cdot u \cdot 2udu \\ &= \left(2u^4 - 8u^2\right)\Big|_3^4 = (512 - 128) - (162 - 72) = 384 - 90 = 294.\end{aligned}$$

Sin cambiar los límites de integración, el resultado es erróneo.

# Integrales Definidas y Sustitución

Es importante notar que cuando se desea computar una integral definida utilizando el método de sustitución, *los límites de integración también se sustituyen*.

Por ejemplo, si queremos obtener la integral del Propuesto 1 entre 5 y 12,  $\int_5^{12} x\sqrt{4+x}dx$ , al plantear  $u = \sqrt{4+x}$ , también hay que considerar que  $x = 5 \Rightarrow u = 3$  y que  $x = 12 \Rightarrow u = 4$ .

Por lo tanto, resolviendo por el método de sustitución tenemos

$$\begin{aligned}\int_5^{12} x\sqrt{4+x}dx &= \int_3^4 (u^2 - 4) \cdot u \cdot 2udu \\ &= \left(2u^4 - 8u^2\right)\Big|_3^4 = (512 - 128) - (162 - 72) = 384 - 90 = 294.\end{aligned}$$

Sin cambiar los límites de integración, el resultado es erróneo.

## Propuesto 48

Calcule  $\int_{\exp(\exp(e))}^{\exp(\exp(\exp(e)))} \frac{dx}{x \cdot \ln(x) \cdot \ln(\ln(x)) \cdot \ln(\ln(\ln(x)))}.$

## Áreas Negativas

Cuando los referimos a que una integral definida  $\int_a^b f(x)dx$  permite calcular el área bajo una curva, hacemos alusión a que calcula la superficie comprendida *por debajo de  $f(x)$  y por encima del eje  $x$*  entre los límites de integración.

## Áreas Negativas

Cuando los referimos a que una integral definida  $\int_a^b f(x)dx$  permite calcular el área bajo una curva, hacemos alusión a que calcula la superficie comprendida *por debajo de  $f(x)$  y por encima del eje  $x$*  entre los límites de integración. (Pensar en integrar  $f(x) - 0$ .) Pero, *¿qué ocurre cuando  $f(x)$  está por debajo del eje  $x$ ?*

# Áreas Negativas

Cuando los referimos a que una integral definida  $\int_a^b f(x)dx$  permite calcular el área bajo una curva, hacemos alusión a que calcula la superficie comprendida *por debajo de  $f(x)$*  y *por encima del eje  $x$*  entre los límites de integración. (Pensar en integrar  $f(x) - 0$ .) Pero, *¿qué ocurre cuando  $f(x)$  está por debajo del eje  $x$ ?*

## Ejemplo 51

Calcule  $A = \int_1^2 (x^2 - 5)dx$ .



# Áreas Negativas

Cuando los referimos a que una integral definida  $\int_a^b f(x)dx$  permite calcular el área bajo una curva, hacemos alusión a que calcula la superficie comprendida *por debajo de  $f(x)$  y por encima del eje  $x$*  entre los límites de integración. (Pensar en integrar  $f(x) - 0$ .) Pero, *¿qué ocurre cuando  $f(x)$  está por debajo del eje  $x$ ?*

## Ejemplo 51

Calcule  $A = \int_1^2 (x^2 - 5)dx$ .

## Solución 51

$$A = \int_1^2 (x^2 - 5)dx = \left( \frac{x^3}{3} - 5x \right) \Big|_1^2 = \frac{8}{3} - 10 - \frac{1}{3} + 5 = -\frac{20}{3}.$$

# Áreas Negativas

Cuando los referimos a que una integral definida  $\int_a^b f(x)dx$  permite calcular el área bajo una curva, hacemos alusión a que calcula la superficie comprendida *por debajo de  $f(x)$  y por encima del eje  $x$*  entre los límites de integración. (Pensar en integrar  $f(x) - 0$ .) Pero, *¿qué ocurre cuando  $f(x)$  está por debajo del eje  $x$ ?*

## Ejemplo 51

Calcule  $A = \int_1^2 (x^2 - 5)dx$ .

## Solución 51

$$A = \int_1^2 (x^2 - 5)dx = \left( \frac{x^3}{3} - 5x \right) \Big|_1^2 = \frac{8}{3} - 10 - \frac{1}{3} + 1 = -\frac{20}{3}.$$

*Intuición:* En efecto, como  $y = 0$  está por sobre  $y = x^2 - 5$  en el intervalo  $[1, 2]$ , el *gran rectángulo* que forma la integral de  $y = 0$  tiene mayor superficie que la *gran figura curvada* que forma  $y = x^2 - 5$ , por lo que la *resta*  $f(x) - 0$  es negativa.

## Áreas Negativas (cont.)

Como obviamente buscamos calcular áreas positivas, si quisiéramos computar la superficie comprendida entre  $y = 0$  e  $y = x^2 - 5$ , tendríamos que encontrar una figura equivalente donde la función esté por sobre el eje de las abscisas.

## Áreas Negativas (cont.)

Como obviamente buscamos calcular áreas positivas, si quisiéramos computar la superficie comprendida entre  $y = 0$  e  $y = x^2 - 5$ , tendríamos que encontrar una figura equivalente donde la función esté por sobre el eje de las abscisas.

La candidata natural es la función inversa aditiva, es decir,  $-x^2 + 5$ .

## Áreas Negativas (cont.)

Como obviamente buscamos calcular áreas positivas, si quisiéramos computar la superficie comprendida entre  $y = 0$  e  $y = x^2 - 5$ , tendríamos que encontrar una figura equivalente donde la función esté por sobre el eje de las abscisas.

La candidata natural es la función inversa aditiva, es decir,  $-x^2 + 5$ . Por lo tanto, la superficie comprendida entre  $x^2 - 5$  y el eje de las

abscisas es  $\int_1^2 (-x^2 + 5)dx = \frac{20}{3} = -A$ .

## Áreas Negativas (cont.)

Como obviamente buscamos calcular áreas positivas, si quisiéramos computar la superficie comprendida entre  $y = 0$  e  $y = x^2 - 5$ , tendríamos que encontrar una figura equivalente donde la función esté por sobre el eje de las abscisas.

La candidata natural es la función inversa aditiva, es decir,  $-x^2 + 5$ . Por lo tanto, la superficie comprendida entre  $x^2 - 5$  y el eje de las

abscisas es  $\int_1^2 (-x^2 + 5)dx = \frac{20}{3} = -A$ .

En resumen, cuando queremos calcular el *área que genera una función negativa*, computamos el *negativo de la integral definida*.

## Áreas Negativas (cont.)

Como obviamente buscamos calcular áreas positivas, si quisiéramos computar la superficie comprendida entre  $y = 0$  e  $y = x^2 - 5$ , tendríamos que encontrar una figura equivalente donde la función esté por sobre el eje de las abscisas.

La candidata natural es la función inversa aditiva, es decir,  $-x^2 + 5$ . Por lo tanto, la superficie comprendida entre  $x^2 - 5$  y el eje de las abscisas es  $\int_1^2 (-x^2 + 5)dx = \frac{20}{3} = -A$ .

En resumen, cuando queremos calcular el *área que genera una función negativa*, computamos el *negativo de la integral definida*.

**Observación:** Notar que otra forma de hacer esto es invirtiendo los límites de integración, pues si  $\int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$ , entonces  $\int_b^a f(x)dx = F(x)|_b^a = F(a) - F(b)$ , es decir,  $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$ .

## Áreas Negativas (cont.)

Como obviamente buscamos calcular áreas positivas, si quisiéramos computar la superficie comprendida entre  $y = 0$  e  $y = x^2 - 5$ , tendríamos que encontrar una figura equivalente donde la función esté por sobre el eje de las abscisas.

La candidata natural es la función inversa aditiva, es decir,  $-x^2 + 5$ . Por lo tanto, la superficie comprendida entre  $x^2 - 5$  y el eje de las abscisas es  $\int_1^2 (-x^2 + 5)dx = \frac{20}{3} = -A$ .

En resumen, cuando queremos calcular el *área que genera una función negativa*, computamos el *negativo de la integral definida*.

**Observación:** Notar que otra forma de hacer esto es invirtiendo los límites de integración, pues si  $\int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$ , entonces

$\int_b^a f(x)dx = F(x)|_b^a = F(a) - F(b)$ , es decir,  $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$ .

*¿Cómo podemos calcular el área de una función que tiene tramos positivos y tramos negativos?*



## Separación de Tramos

Además de preservar las Proposiciones 33 y 34 (suma, resta y ponderación por escalar), las integrales definidas tienen una propiedad adicional muy útil e intuitiva.

# Separación de Tramos

Además de preservar las Proposiciones 33 y 34 (suma, resta y ponderación por escalar), las integrales definidas tienen una propiedad adicional muy útil e intuitiva.

## Proposición 35

*Una integral definida sobre un intervalo puede descomponerse como la suma de dos (o más) integrales sobre tramos complementarios. Así, si  $c \in [a, b]$ , entonces*

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

# Separación de Tramos

Además de preservar las Proposiciones 33 y 34 (suma, resta y ponderación por escalar), las integrales definidas tienen una propiedad adicional muy útil e intuitiva.

## Proposición 35

*Una integral definida sobre un intervalo puede descomponerse como la suma de dos (o más) integrales sobre tramos complementarios. Así, si  $c \in [a, b]$ , entonces*

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

La idea detrás de ello es que la superficie total bajo la curva puede descomponerse como la suma de (sub)superficies que la componen.

# Separación de Tramos

Además de preservar las Proposiciones 33 y 34 (suma, resta y ponderación por escalar), las integrales definidas tienen una propiedad adicional muy útil e intuitiva.

## Proposición 35

*Una integral definida sobre un intervalo puede descomponerse como la suma de dos (o más) integrales sobre tramos complementarios. Así, si  $c \in [a, b]$ , entonces*

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

La idea detrás de ello es que la superficie total bajo la curva puede descomponerse como la suma de (sub)superficies que la componen. Por lo tanto, si quisiéramos calcular un área, debemos separar los tramos donde la función es positiva de los tramos donde la función es negativa, cambiando el signo de estos últimos (puesto que en ellos se tendría el inverso aditivo del área).

## Ejemplo: Áreas por Tramos

### Ejemplo 52

Compute  $\int_{-1}^1 4x^3 dx$ . Luego calcule el área de la superficie comprendida entre  $4x^3$  y el eje  $x$ . Grafique.

## Ejemplo: Áreas por Tramos

### Ejemplo 52

Compute  $\int_{-1}^1 4x^3 dx$ . Luego calcule el área de la superficie comprendida entre  $4x^3$  y el eje  $x$ . Grafique.

### Solución 52

$$\int_{-1}^1 4x^3 dx = 1^4 - (-1)^4 = 0.$$

## Ejemplo: Áreas por Tramos

### Ejemplo 52

Compute  $\int_{-1}^1 4x^3 dx$ . Luego calcule el área de la superficie comprendida entre  $4x^3$  y el eje  $x$ . Grafique.

### Solución 52

$$\int_{-1}^1 4x^3 dx = 1^4 - (-1)^4 = 0.$$

Sin embargo, para calcular el área debemos considerar que entre  $-1$  y  $0$  la función es negativa, mientras que entre  $0$  y  $1$  es positiva (ver Figura 48).

# Ejemplo: Áreas por Tramos

## Ejemplo 52

Compute  $\int_{-1}^1 4x^3 dx$ . Luego calcule el área de la superficie comprendida entre  $4x^3$  y el eje  $x$ . Grafique.


## Solución 52

$$\int_{-1}^1 4x^3 dx = 1^4 - (-1)^4 = 0.$$

Sin embargo, para calcular el área debemos considerar que entre  $-1$  y  $0$  la función es negativa, mientras que entre  $0$  y  $1$  es positiva (ver Figura 48). Por lo tanto, el área de la superficie comprendida es

$$\begin{aligned} & -\int_{-1}^0 4x^3 dx + \int_0^1 4x^3 dx \\ & = -(0 - 1) + (1 - 0) = 2. \end{aligned}$$

Figura 48: Área entre  $4x^3$  y el eje  $x$





# Área entre dos Funciones

Análogamente, también podemos calcular áreas delimitadas entre dos funciones.

## Área entre dos Funciones

Análogamente, también podemos calcular áreas delimitadas entre dos funciones.

El razonamiento es idéntico a lo anterior: sólo habrá que calcular la integral definida de la función mayor menos la función menor.

## Área entre dos Funciones

Análogamente, también podemos calcular áreas delimitadas entre dos funciones.

El razonamiento es idéntico a lo anterior: sólo habrá que calcular la integral definida de la función mayor menos la función menor.

Por lo tanto, si  $f(x) \geq g(x)$  para todo  $x \in [a, b]$ , el área comprendido entre ambas funciones es  $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$ .

# Área entre dos Funciones

Análogamente, también podemos calcular áreas delimitadas entre dos funciones.

El razonamiento es idéntico a lo anterior: sólo habrá que calcular la integral definida de la función mayor menos la función menor.

Por lo tanto, si  $f(x) \geq g(x)$  para todo  $x \in [a, b]$ , el área comprendido entre ambas funciones es  $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$ .

## Ejemplo 53

Calcule el área entre  $f(x) = x^2$  y  $g(x) = x^3$  en el intervalo  $[0, 1]$ .

# Área entre dos Funciones

Análogamente, también podemos calcular áreas delimitadas entre dos funciones.

El razonamiento es idéntico a lo anterior: sólo habrá que calcular la integral definida de la función mayor menos la función menor.

Por lo tanto, si  $f(x) \geq g(x)$  para todo  $x \in [a, b]$ , el área comprendido entre ambas funciones es  $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$ .

## Ejemplo 53

Calcule el área entre  $f(x) = x^2$  y  $g(x) = x^3$  en el intervalo  $[0, 1]$ .

## Solución 53

Como  $x^2 \geq x^3$  en  $[0, 1]$ , el área es

$$\int_0^1 [x^2 - x^3] dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}.$$

# Área entre dos Funciones

Análogamente, también podemos calcular áreas delimitadas entre dos funciones.

El razonamiento es idéntico a lo anterior: sólo habrá que calcular la integral definida de la función mayor menos la función menor.

Por lo tanto, si  $f(x) \geq g(x)$  para todo  $x \in [a, b]$ , el área comprendido entre ambas funciones es  $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$ .

## Ejemplo 53

Calcule el área entre  $f(x) = x^2$  y  $g(x) = x^3$  en el intervalo  $[0, 1]$ .

## Solución 53

Como  $x^2 \geq x^3$  en  $[0, 1]$ , el área es

$$\int_0^1 [x^2 - x^3] dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}.$$

*¿Qué pasa si una función es mayor o igual que la otra en algunos intervalos pero no en otros?*

## **(1<sup>er</sup>) Teorema Fundamental del Cálculo**

Hasta ahora hemos considerado los límites de integración como constantes.

## **(1<sup>er</sup>) Teorema Fundamental del Cálculo**

Hasta ahora hemos considerado los límites de integración como constantes. Sin embargo, perfectamente podrían ser variables.



## (1<sup>er</sup>) Teorema Fundamental del Cálculo

Hasta ahora hemos considerado los límites de integración como constantes. Sin embargo, perfectamente podrían ser variables.

Por ejemplo, las donaciones instantáneas hacia la Teletón en las 27 *horas de amor* de aproximaban a una función creciente  $f(t)$  que dependía del tiempo  $t \in [0, 27]$ .

## (1<sup>er</sup>) Teorema Fundamental del Cálculo

Hasta ahora hemos considerado los límites de integración como constantes. Sin embargo, perfectamente podrían ser variables.

Por ejemplo, las donaciones instantáneas hacia la Teletón en las 27 *horas de amor* de aproximaban a una función creciente  $f(t)$  que dependía del tiempo  $t \in [0, 27]$ . Si quisiéramos calcular las donaciones totales, bastaría con calcular  $\int_0^{27} f(t) dt$ .

## (1<sup>er</sup>) Teorema Fundamental del Cálculo

Hasta ahora hemos considerado los límites de integración como constantes. Sin embargo, perfectamente podrían ser variables.

Por ejemplo, las donaciones instantáneas hacia la Teletón en las 27 *horas de amor* de aproximaban a una función creciente  $f(t)$  que dependía del tiempo  $t \in [0, 27]$ . Si quisiéramos calcular las donaciones totales, bastaría con calcular  $\int_0^{27} f(t)dt$ .

Sin embargo, podríamos estar interesados en obtener las *donaciones totales hasta la hora  $x$* , en cuyo caso, éstas podrían denotarse por  $D(x) = \int_0^x f(t)dt$ , donde claramente esto es una función de  $x$ .

## (1<sup>er</sup>) Teorema Fundamental del Cálculo

Hasta ahora hemos considerado los límites de integración como constantes. Sin embargo, perfectamente podrían ser variables.

Por ejemplo, las donaciones instantáneas hacia la Teletón en las 27 horas de amor de aproximaban a una función creciente  $f(t)$  que dependía del tiempo  $t \in [0, 27]$ . Si quisiéramos calcular las donaciones totales, bastaría con calcular  $\int_0^{27} f(t)dt$ .

Sin embargo, podríamos estar interesados en obtener las *donaciones totales hasta la hora  $x$* , en cuyo caso, éstas podrían denotarse por  $D(x) = \int_0^x f(t)dt$ , donde claramente esto es una función de  $x$ .

Ahora bien, *¿cuál es la tasa de cambio instantánea de las donaciones en el momento  $x$ ?*

## (1<sup>er</sup>) Teorema Fundamental del Cálculo

Hasta ahora hemos considerado los límites de integración como constantes. Sin embargo, perfectamente podrían ser variables.

Por ejemplo, las donaciones instantáneas hacia la Teletón en las 27 horas de amor de aproximaban a una función creciente  $f(t)$  que dependía del tiempo  $t \in [0, 27]$ . Si quisiéramos calcular las donaciones totales, bastaría con calcular  $\int_0^{27} f(t)dt$ .

Sin embargo, podríamos estar interesados en obtener las *donaciones totales hasta la hora  $x$* , en cuyo caso, éstas podrían denotarse por  $D(x) = \int_0^x f(t)dt$ , donde claramente esto es una función de  $x$ .

Ahora bien, *¿cuál es la tasa de cambio instantánea de las donaciones en el momento  $x$ ?* Para responder esto, podemos hacer uso del (primer) Teorema Fundamental del Cálculo (TFC).

# (1<sup>er</sup>) Teorema Fundamental del Cálculo

Hasta ahora hemos considerado los límites de integración como constantes. Sin embargo, perfectamente podrían ser variables.

Por ejemplo, las donaciones instantáneas hacia la Teletón en las 27 horas de amor de aproximaban a una función creciente  $f(t)$  que dependía del tiempo  $t \in [0, 27]$ . Si quisiéramos calcular las donaciones totales, bastaría con calcular  $\int_0^{27} f(t) dt$ .

Sin embargo, podríamos estar interesados en obtener las *donaciones totales hasta la hora  $x$* , en cuyo caso, éstas podrían denotarse por  $D(x) = \int_0^x f(t) dt$ , donde claramente esto es una función de  $x$ .

Ahora bien, *¿cuál es la tasa de cambio instantánea de las donaciones en el momento  $x$ ?* Para responder esto, podemos hacer uso del (primer) Teorema Fundamental del Cálculo (TFC).

## Proposición 36

Si  $f(t)$  es integrable y  $a$  es una constante,  $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$ .

# (1<sup>er</sup>) Teorema Fundamental del Cálculo

Hasta ahora hemos considerado los límites de integración como constantes. Sin embargo, perfectamente podrían ser variables.

Por ejemplo, las donaciones instantáneas hacia la Teletón en las 27 horas de amor de aproximaban a una función creciente  $f(t)$  que dependía del tiempo  $t \in [0, 27]$ . Si quisiéramos calcular las donaciones totales, bastaría con calcular  $\int_0^{27} f(t) dt$ .

Sin embargo, podríamos estar interesados en obtener las *donaciones totales hasta la hora  $x$* , en cuyo caso, éstas podrían denotarse por  $D(x) = \int_0^x f(t) dt$ , donde claramente esto es una función de  $x$ .

Ahora bien, *¿cuál es la tasa de cambio instantánea de las donaciones en el momento  $x$ ?* Para responder esto, podemos hacer uso del (primer) Teorema Fundamental del Cálculo (TFC).

## Proposición 36

Si  $f(t)$  es integrable y  $a$  es una constante,  $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$ .

**Generalización:**  $\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} f(t) dt = f(b(x))b'(x) - f(a(x))a'(x)$ .

# Integrales Impropias

Por último, hasta ahora hemos supuesto que los límites de integración son finitos.



# Integrales Impropias

Por último, hasta ahora hemos supuesto que los límites de integración son finitos. Esto tampoco tiene por qué ser así.

# Integrales Impropias

Por último, hasta ahora hemos supuesto que los límites de integración son finitos. Esto tampoco tiene por qué ser así.

## Definición 43

Si alguno de los límites de integración de una integral definida es  $(\pm)$  infinito (o ambos lo son), diremos que dicha integral es **impropia**.

# Integrales Impropias

Por último, hasta ahora hemos supuesto que los límites de integración son finitos. Esto tampoco tiene por qué ser así.

## Definición 43

Si alguno de los límites de integración de una integral definida es  $(\pm)$  infinito (o ambos lo son), diremos que dicha integral es **impropia**.

Para calcular integrales impropias, basta con calcular el límite de dicha integral cuando el/los límite(s) correspondiente(s) tiende(n) a  $\infty$  (o  $-\infty$  según corresponda).

# Integrales Impropias

Por último, hasta ahora hemos supuesto que los límites de integración son finitos. Esto tampoco tiene por qué ser así.

## Definición 43

Si alguno de los límites de integración de una integral definida es  $(\pm)$  infinito (o ambos lo son), diremos que dicha integral es **impropia**.

Para calcular integrales impropias, basta con calcular el límite de dicha integral cuando el/los límite(s) correspondiente(s) tiende(n) a  $\infty$  (o  $-\infty$  según corresponda).

## Ejemplo 54

Obtenga  $\int_{-\infty}^0 \exp(x) dx$

# Integrales Impropias

Por último, hasta ahora hemos supuesto que los límites de integración son finitos. Esto tampoco tiene por qué ser así.

## Definición 43

Si alguno de los límites de integración de una integral definida es  $(\pm)$  infinito (o ambos lo son), diremos que dicha integral es **impropia**.

Para calcular integrales impropias, basta con calcular el límite de dicha integral cuando el/los límite(s) correspondiente(s) tiende(n) a  $\infty$  (o  $-\infty$  según corresponda).

## Ejemplo 54

Obtenga  $\int_{-\infty}^0 \exp(x) dx$

## Solución 54

$$\int_{-\infty}^0 \exp(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \exp(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \exp(x) \Big|_a^0 = 1 - 0 = 1.$$

# Unidad 4

## Unidad 4

Módulo 20

Módulo 21

Módulo 22

Módulo 23

Módulo 24

Módulo 25

► [Volver al Inicio](#)

# Unidad 5

## Unidad 5

Módulo 26

Módulo 27

Módulo 28

► [Volver al Inicio](#)

# Unidad 5

► [Volver al Inicio](#)



# PROBLEMA 3

► [Volver al Inicio](#)

## Problema 3: Enunciado

- **Contexto** introductorio (ex ante).

## Problema 3: Enunciado

- **Contexto** introductorio (ex ante).
- Inducción del **problema**.

## Problema 3: Enunciado

- **Contexto** introductorio (ex ante).
- Inducción del **problema**.
- Presentación de **variables**.

## Problema 3: Enunciado

- **Contexto** introductorio (ex ante).
- Inducción del **problema**.
- Presentación de **variables**.
- Planteamiento de una **decisión**.

## Problema 3: Enunciado

- **Contexto** introductorio (ex ante).
- Inducción del **problema**.
- Presentación de **variables**.
- Planteamiento de una **decisión**.
- Exigencia de **resultados** a partir de un **instrumento**.

## Problema 3: Enunciado

- **Contexto** introductorio (ex ante).
- Inducción del **problema**.
- Presentación de **variables**.
- Planteamiento de una **decisión**.
- Exigencia de **resultados** a partir de un **instrumento**.
- Especificación de una **conclusión**.

## Problema 3: Enunciado

- **Contexto** introductorio (ex ante).
- Inducción del **problema**.
- Presentación de **variables**.
- Planteamiento de una **decisión**.
- Exigencia de **resultados** a partir de un **instrumento**.
- Especificación de una **conclusión**.
- Ayudas, hints, indicaciones...



## Problema 3: Respuesta

- **Definir** variables, parámetros y/o funciones.

## Problema 3: Respuesta

- **Definir** variables, parámetros y/o funciones.
- **Plantear** el problema en base a las definiciones.

## Problema 3: Respuesta

- **Definir** variables, parámetros y/o funciones.
- **Plantear** el problema en base a las definiciones.
- **Desarrollar** el problema planteado.

## Problema 3: Respuesta

- **Definir** variables, parámetros y/o funciones.
- **Plantear** el problema en base a las definiciones.
- **Desarrollar** el problema planteado.
- **Resolver** lo desarrollado.

## Problema 3: Respuesta

- **Definir** variables, parámetros y/o funciones.
- **Plantear** el problema en base a las definiciones.
- **Desarrollar** el problema planteado.
- **Resolver** lo desarrollado.
- **Concluir** en base a lo resuelto.

## Contexto e Inducción

Javiera y Diego son dueños de Funcionsilandia, el parque de diversiones más connotado de la ciudad. Lo distintivo de este parque es que todas sus atracciones siguen comportamientos identificados por funciones matemáticas... Javiera y Diego planean adquirir una nueva atracción (montaña rusa) para su parque de diversiones, llamada CYD (Continua Y Derivable).


# Variables

El comportamiento funcional de esta atracción es el de una función por tramos, donde el primer tramo (la primera pieza) se comporta como la función  $a(x) = 2\ln x$  y el segundo tramo (la segunda pieza) se comporta como la función  $b(x) = 0,25x^2 + k$ , donde  $x$  corresponde a una medida de ancho de la atracción vista de perfil y ambas funciones miden la altura del riel.

## Variables (cont.)

Esto queda representado en la Figura 49.

Figura 49: CYD (Continua Y Derivable)





# Decisión, Resultados y Conclusión

Sin embargo, Javiera y Diego deben cumplir fuertes regulaciones de seguridad para poder estrenar su atracción. Particularmente, se les pide que el recorrido sea “suave”, cosa de que los carros puedan seguir una trayectoria sin quiebres en los rieles. Considerando que  $k$  es una constante técnica que deben determinar, ¿podrán estrenar la atracción?

# Indicación

**IND:** apoye su respuesta en la Figura 49 (particularmente al elegir los tramos).

# Definición de Variables y Función

## Definición de variables y función:

Sea  $c(x)$  la función por tramos que define a la atracción y  $c'(x)$  su derivada:

$$c(x) = \begin{cases} 2\ln x & \text{si } 1 < x \leq 2 \\ 0,25x^2 + k & \text{si } 2 < x < 3 \end{cases}$$

# Definición de Variables y Función

## Definición de variables y función:

Sea  $c(x)$  la función por tramos que define a la atracción y  $c'(x)$  su derivada:

$$c(x) = \begin{cases} 2\ln x & \text{si } 1 < x \leq 2 \\ 0,25x^2 + k & \text{si } 2 < x < 3 \end{cases}$$

Sea  $k$  el parámetro técnico que podría permitir que la función sea suave (siempre derivable y continua).

# Planteamiento del Problema

Planteamiento del problema:

El problema se define de esta manera:

# Planteamiento del Problema

Planteamiento del problema:

El problema se define de esta manera:

-Si  $\exists k : \forall x \in ]1, 3[ \exists c'(x) \in \mathbb{R}$ , entonces pueden estrenar la atracción.

# Planteamiento del Problema

Planteamiento del problema:

El problema se define de esta manera:

- Si  $\exists k : \forall x \in ]1, 3[ \exists c'(x) \in \mathbb{R}$ , entonces pueden estrenar la atracción.
- Si  $\nexists k : \forall x \in ]1, 3[ \exists c'(x) \in \mathbb{R}$ , entonces no pueden estrenar la atracción.

# Desarrollo

## Desarrollo:

Como ambas subfunciones  $a$  y  $b$  son derivables y continuas en sus tramos, basta con encontrar las condiciones sobre  $k$  para que la función  $c$  sea derivable en torno a  $x = 2$ . La intuición detrás de esto es que cada riel por separado es suave, sin embargo, hay que encontrar la forma de que al unirlos la estructura completa también sea suave.



# Desarrollo

## Desarrollo:

Como ambas subfunciones  $a$  y  $b$  son derivables y continuas en sus tramos, basta con encontrar las condiciones sobre  $k$  para que la función  $c$  sea derivable en torno a  $x = 2$ . La intuición detrás de esto es que cada riel por separado es suave, sin embargo, hay que encontrar la forma de que al unirlos la estructura completa también sea suave.

Derivando cada tramo en la vecindad de  $x = 2$  tenemos que  $c'(x) = \frac{2}{x}$  cuando  $x \leq 2$  y  $c'(x) = 0,5x$  cuando  $x > 2$ .

# Desarrollo

## Desarrollo:

Como ambas subfunciones  $a$  y  $b$  son derivables y continuas en sus tramos, basta con encontrar las condiciones sobre  $k$  para que la función  $c$  sea derivable en torno a  $x = 2$ . La intuición detrás de esto es que cada riel por separado es suave, sin embargo, hay que encontrar la forma de que al unirlos la estructura completa también sea suave.

Derivando cada tramo en la vecindad de  $x = 2$  tenemos que  $c'(x) = \frac{2}{x}$  cuando  $x \leq 2$  y  $c'(x) = 0,5x$  cuando  $x > 2$ .

Luego, notamos que para  $x = 2$  efectivamente ambas derivadas son iguales (a 1).

# Desarrollo

## Desarrollo:

Como ambas subfunciones  $a$  y  $b$  son derivables y continuas en sus tramos, basta con encontrar las condiciones sobre  $k$  para que la función  $c$  sea derivable en torno a  $x = 2$ . La intuición detrás de esto es que cada riel por separado es suave, sin embargo, hay que encontrar la forma de que al unirlos la estructura completa también sea suave.

Derivando cada tramo en la vecindad de  $x = 2$  tenemos que  $c'(x) = \frac{2}{x}$  cuando  $x \leq 2$  y  $c'(x) = 0,5x$  cuando  $x > 2$ .

Luego, notamos que para  $x = 2$  efectivamente ambas derivadas son iguales (a 1).

Por último, encontramos si existe o no algún valor de  $k$  tal que la función sea continua. Dado que los límites laterales para ambas funciones  $a$  y  $b$  existen, basta con igualar ambas funciones dado  $x = 2$ :

$$a(x = 2) = b(x = 2) \implies 2\ln 2 = 1 + k \implies \boxed{k = 2\ln 2 - 1}$$

# Conclusión

## Conclusión:

Por lo tanto,  $\exists k : \forall x \in ]1, 3[ \exists c'(x) \in \mathbb{R}$ , por lo que Javiera y Diego podrán estrenar la atracción CYD.

# Recomendaciones Generales

- \* Leer bien antes de empezar (subrayar puede ser útil).

# Recomendaciones Generales

- \* Leer bien antes de empezar (subrayar puede ser útil).
- \* Identificar la información que sirve (separar distractores).

# Recomendaciones Generales

- \* Leer bien antes de empezar (subrayar puede ser útil).
- \* Identificar la información que sirve (separar distractores).
- \* Deducir el tipo de problema al cual uno se enfrenta ( $\Rightarrow$  practicar).

# Recomendaciones Generales

- \* Leer bien antes de empezar (subrayar puede ser útil).
- \* Identificar la información que sirve (separar distractores).
- \* Deducir el tipo de problema al cual uno se enfrenta ( $\Rightarrow$  practicar).
- \* Imaginar la respuesta antes de escribirla (no lanzarse a escribir).



# Recomendaciones Generales

- \* Leer bien antes de empezar (subrayar puede ser útil).
- \* Identificar la información que sirve (separar distractores).
- \* Deducir el tipo de problema al cual uno se enfrenta ( $\Rightarrow$  practicar).
- \* Imaginar la respuesta antes de escribirla (no lanzarse a escribir).
- \* Ser ordenado y estructurado en la respuesta (pensar en el ayudante que revisa).

# Recomendaciones Generales

- \* Leer bien antes de empezar (subrayar puede ser útil).
- \* Identificar la información que sirve (separar distractores).
- \* Deducir el tipo de problema al cual uno se enfrenta ( $\Rightarrow$  practicar).
- \* Imaginar la respuesta antes de escribirla (no lanzarse a escribir).
- \* Ser ordenado y estructurado en la respuesta (pensar en el ayudante que revisa).
- \* Corroborar siempre que se pueda (evitar arrastres).

# Recomendaciones Generales

- \* Leer bien antes de empezar (subrayar puede ser útil).
- \* Identificar la información que sirve (separar distractores).
- \* Deducir el tipo de problema al cual uno se enfrenta ( $\Rightarrow$  practicar).
- \* Imaginar la respuesta antes de escribirla (no lanzarse a escribir).
- \* Ser ordenado y estructurado en la respuesta (pensar en el ayudante que revisa).
- \* Corroborar siempre que se pueda (evitar arrastres).
- \* No borrar algo a menos que se tenga con que suplirlo (no responder siempre otorga nota 1,0).

# Recomendaciones Generales

- \* Leer bien antes de empezar (subrayar puede ser útil).
- \* Identificar la información que sirve (separar distractores).
- \* Deducir el tipo de problema al cual uno se enfrenta ( $\Rightarrow$  practicar).
- \* Imaginar la respuesta antes de escribirla (no lanzarse a escribir).
- \* Ser ordenado y estructurado en la respuesta (pensar en el ayudante que revisa).
- \* Corroborar siempre que se pueda (evitar arrastres).
- \* No borrar algo a menos que se tenga con que suplirlo (no responder siempre otorga nota 1,0).
- \* Tachar es mejor que borrar (es más rápido).

# Recomendaciones Generales

- \* Leer bien antes de empezar (subrayar puede ser útil).
- \* Identificar la información que sirve (separar distractores).
- \* Deducir el tipo de problema al cual uno se enfrenta ( $\Rightarrow$  practicar).
- \* Imaginar la respuesta antes de escribirla (no lanzarse a escribir).
- \* Ser ordenado y estructurado en la respuesta (pensar en el ayudante que revisa).
- \* Corroborar siempre que se pueda (evitar arrastres).
- \* No borrar algo a menos que se tenga con que suplirlo (no responder siempre otorga nota 1,0).
- \* Tachar es mejor que borrar (es más rápido).
- \* Lápiz de tinta es mejor que de grafito (admite corrección).

# Recomendaciones Generales

- \* Leer bien antes de empezar (subrayar puede ser útil).
- \* Identificar la información que sirve (separar distractores).
- \* Deducir el tipo de problema al cual uno se enfrenta ( $\Rightarrow$  practicar).
- \* Imaginar la respuesta antes de escribirla (no lanzarse a escribir).
- \* Ser ordenado y estructurado en la respuesta (pensar en el ayudante que revisa).
- \* Corroborar siempre que se pueda (evitar arrastres).
- \* No borrar algo a menos que se tenga con que suplirlo (no responder siempre otorga nota 1,0).
- \* Tachar es mejor que borrar (es más rápido).
- \* Lápiz de tinta es mejor que de grafito (admite corrección).
- \* Justificar adecuadamente (¿por qué?).

# Recomendaciones Generales

- \* Leer bien antes de empezar (subrayar puede ser útil).
- \* Identificar la información que sirve (separar distractores).
- \* Deducir el tipo de problema al cual uno se enfrenta ( $\Rightarrow$  practicar).
- \* Imaginar la respuesta antes de escribirla (no lanzarse a escribir).
- \* Ser ordenado y estructurado en la respuesta (pensar en el ayudante que revisa).
- \* Corroborar siempre que se pueda (evitar arrastres).
- \* No borrar algo a menos que se tenga con que suplirlo (no responder siempre otorga nota 1,0).
- \* Tachar es mejor que borrar (es más rápido).
- \* Lápiz de tinta es mejor que de grafito (admite corrección).
- \* Justificar adecuadamente (¿por qué?).
- \* Optimizar el tiempo ( $IMg = CMg \Rightarrow$  óptimo, por ejemplo).

# MEM155 - Métodos Matemáticos II

Mohit Karnani

Universidad de Chile

Otoño, 2016