

استامینوفن (Acetaminophen) برای درمان دردهای خفیف تا متوسط و درمان تب مورد استفاده قرار می گیرد. این دارو در ترکیب با سایر مسکن های مخدر برای درمان درد های متوسط تا شدید استفاده می شود.

از دیگر کاربردهای این دارو درمان سردرد، التهاب مفاصل، کمر درد، دندان درد و سرماخوردگی است.

هشدار ها

اوردوز و یا مسمویت ناشی از استامینوفن (Acetaminophen) ممکن است به کبد آسیب برساند و حتی منجر به مرگ شود.

- بزرگسالان و جوانانی که حداقل ۵۰ کیلوگرم وزن دارند نباید بیشتر از ۱۰۰۰ میلی گرم از این دارو را در یک نوبت و یا بیشتر از ۴۰۰۰ میلی گرم را در یک روز مصرف کنند.
- کودکانی که زیر ۱۲ سال سن دارند نباید بیشتر از ۵ نوبت در روز از این دارو استفاده کنند. مقدار مصرف بر حسب میلی گرم در هر نوبت با توجه به وزن کودکان محاسبه می شود که روی برگه ی راهنمای دارو نوشته شده است. بیشتر از مقدار توصیه شده به کودک خود دارو ندهید.

استامینوفن با داروهای بسیاری ترکیب شده است. هنگامی که از داروهای دیگری استفاده میکنید (مخصوصا داروهای بدون نسخه) دقت کنید که مقداری را که در روز مصرف می کنید بیشتر از مقدار توصیه شده نباشد.

همچنین به موارد منع مصرف و احتیاط دارو که در بخش های بعدی این مطلب آمده است دقت کنید.

عوارض شایع:

- تهوع و استفراغ
- سردرد

- بی خوابی (اینسومنیا)

در صورت بروز عوارض زیر مصرف استامینوفن (Acetaminophen) راقطع کرده و به پزشک یا اورژانس مراجعه کنید:

- علائم حساسیت به دارو مانند کهیر، خارش پوست، ورم لب، زبان، گلو و ...
- تهوع، درد بالای شکم، خارش، از دست دادن اشتها
- تعریق زیاد و خستگی شدید
- ادرار تیره رنگ، مدفوع رسی رنگ
- یرقان (زرد شدن پوست و چشم ها)
- واکنش های پوستی بسیار شدیدی می تواند پس از مصرف دارو رخ دهد. در صورت مشاهده ی علائمی مانند: قرمزی و تورم پوست، تاول زدن، پوسته پوسته شدن، قرمز شدن یا سوزش چشم ها، ایجاد زخم در دهان، گلو، دماغ یا چشم ها سریعاً به پزشک یا اورژانس مراجعه کنید.

موارد منع مصرف و احتیاط

منع مصرف:

- حساسیت به این دارو (Acetaminophen) یا سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی
- مشکلات کبدی مربوط به مصرف الکل

احتیاط (حتماً با پزشک مشورت شود)

- بارداری
- شیردهی به نوزاد
- در صورت ابتلا به فاویسم
- اختلالات کبدی یا کلیوی

اطلاعات دیگر و توصیه های دارویی

- گرچه مصرف این دارو برای اطفال کمتر از ۲ سال توصیه نمی شود ولی در بسیاری از مواقع از روزهای اول تولد و پس از اولین واکسن برای نوزادان تجویز می شود.
- دقت در مقدار مصرف این دارو در اطفال بسیار مهم است و مصرف زیاد آن می تواند مسمومیت کبدی ایجاد کند.
- در صورتی که از الکل یا فرآورده های الکلی استفاده نموده اید، مصرف استامینوفن (Acetaminophen) می تواند برای شما عوارض کبدی به همراه داشته باشد.
- در صورتی که تب بیمار بالا تر از ۴۰ درجه سانتی گراد باشد یا همراه با علائمی مانند اسهال ، استفراغ ، گلو درد ، سر درد شدید و ادامه دار می باشد، مراجعه به پزشک الزامی است و تنها درمان موقتی با داروهای ضد تب، کفایت نمی کنند. لذا از مصرف استامینوفن بیش از ۲ روز یا برای کودکان زیر ۳ سال بدون نظر پزشک خودداری نمایید.
- مصرف شیاف استامینوفن می تواند منجر به اشتباهات در جواب آزمایشات بالینی شود، لذا پیش از انجام آزمایش خون، ادرار و سایر موارد، پزشک و یا مسئول آزمایشگاه را از مصرف این دارو مطلع نمایید.
- در کودکان در صورت ادامه دار شدن تب بیشتر از ۳ روز یا تشدید علائم و عدم بهبودی تا ۵ روز ، بروز قرمزی یا تورم در بدن ، دارو را قطع و به پزشک مراجعه نمایید.
- در بزرگسالان در صورت ادامه ی علائم و عدم بهبودی بیشتر از ۱۰ روز ، یا ادامه ی تب بیشتر از ۳ روز، مصرف استامینوفن را قطع کرده و به پزشک مراجعه کنید.

