

¿Podría tener sensibilidad a la histamina?

Cuestionario orientativo para reconocer síntomas y patrones relacionados con alimentos

Importante: este cuestionario organiza información, pero no diagnostica intolerancia a la histamina, alergia ni activación mastocitaria. Los síntomas también pueden tener otras causas.

Nombre: _____

Edad: _____

Fecha: _____

Cómo responder

Piensa en los últimos 3 meses y marca una sola opción por pregunta:

0 Nunca	1 Ocasionalmente	2 Frecuentemente	3 Casi siempre
------------	---------------------	---------------------	-------------------

Antes de empezar

No respondas pensando solamente en un día aislado. Lo importante es reconocer si existe un patrón repetido entre lo que consumes y lo que sientes.

Medicamentos y suplementos actuales:

A. Síntomas

N. º	En los últimos 3 meses...	0	1	2	3
1	¿Presentas enrojecimiento o sensación repentina de calor en cara, cuello o pecho?	☐	☐	☐	☐
2	¿Tienes comezón, ronchas o urticaria sin una causa clara?	☐	☐	☐	☐
3	¿Se te hinchan párpados, labios, manos u otras zonas?	☐	☐	☐	☐
4	¿Presentas congestión nasal, escurrimiento o estornudos después de comer?	☐	☐	☐	☐
5	¿Tienes dolor de cabeza o migraña después de determinados alimentos o bebidas?	☐	☐	☐	☐
6	¿Experimentas palpitaciones o aceleración del corazón?	☐	☐	☐	☐
7	¿Sientes mareo, debilidad o sensación de baja presión?	☐	☐	☐	☐
8	¿Presentas dolor abdominal, gases o inflamación?	☐	☐	☐	☐
9	¿Tienes diarrea, evacuaciones urgentes o náuseas después de comer?	☐	☐	☐	☐
10	¿Sientes reflujo, ardor de estómago o digestión pesada?	☐	☐	☐	☐
11	¿Tienes dificultad para dormir o despiertas con sensación de alerta?	☐	☐	☐	☐
12	¿Experimentas ansiedad, irritabilidad o inquietud sin una causa evidente?	☐	☐	☐	☐
13	¿Notas niebla mental o cansancio después de ciertas comidas?	☐	☐	☐	☐
14	En mujeres: ¿los síntomas empeoran antes o durante la menstruación, en perimenopausia o con cambios hormonales?	☐	☐	☐	☐

Subtotal A: _____ / 42 puntos

B. Relación con alimentos

N. º	En los últimos 3 meses...	0	1	2	3
15	¿Los síntomas aparecen entre unos minutos y varias horas después de comer?	☐	☐	☐	☐
16	¿Empeoran con vino, cerveza u otras bebidas alcohólicas?	☐	☐	☐	☐
17	¿Empeoran con quesos maduros, embutidos, fermentados o alimentos curados?	☐	☐	☐	☐
18	¿Empeoran con pescado ahumado, enlatado o que no está recién preparado?	☐	☐	☐	☐
19	¿Empeoran al consumir alimentos guardados varios días o recalentados?	☐	☐	☐	☐
20	¿Una misma comida algunas veces causa síntomas y otras veces no?	☐	☐	☐	☐
21	¿Los síntomas aumentan cuando combinas varios alimentos sospechosos?	☐	☐	☐	☐
22	¿Has observado mejoría al evitar temporalmente alguno de estos alimentos?	☐	☐	☐	☐

Subtotal B: _____ / 24 puntos

C. Patrón e historia personal

N. º	En los últimos 3 meses...	0	1	2	3
23	¿Los síntomas afectan al menos dos sistemas a la vez, por ejemplo digestión y piel, o dolor de cabeza y palpitaciones?	☐	☐	☐	☐
24	¿Tienes antecedentes de urticaria, alergias, asma, migraña o problemas digestivos?	☐	☐	☐	☐
25	¿Los síntomas comenzaron o aumentaron después de una infección, tratamiento médico o cambio importante de salud?	☐	☐	☐	☐
26	¿Algún medicamento o suplemento coincide con el inicio o empeoramiento de los síntomas?	☐	☐	☐	☐
27	¿Los síntomas afectan tu sueño, alimentación, trabajo o vida cotidiana?	☐	☐	☐	☐

Subtotal C: _____ / 15 puntos

PUNTUACIÓN TOTAL: _____ / 81

Interpretación orientativa

Puntos	Resultado orientativo	Siguiente paso
0-15	Patrón poco evidente	Observa si existe relación repetida con algún alimento.
16-30	Algunos indicios	Conviene llevar un registro de alimentos y síntomas.
31-50	Patrón compatible	Se recomienda valoración con un profesional de salud.
51-81	Síntomas frecuentes o diversos	Busca valoración médica para estudiar otras posibles causas.

La suma no confirma un diagnóstico. Esta puntuación no pertenece a una escala clínica validada. Tiene mayor valor observar si los síntomas aparecen repetidamente tras ciertos alimentos, afectan más de un sistema, mejoran al retirar el posible desencadenante y reaparecen al consumirlo.

Señales de urgencia

Dificultad para respirar, cierre de garganta, hinchazón rápida de lengua o labios, desmayo, confusión o coloración pálida/azulada requieren atención de emergencia inmediata. Podría tratarse de anafilaxia, no de una simple intolerancia.

Registro de alimentos y síntomas - 7 días

Día / hora	Alimento, bebida o suplemento	Cantidad	Síntoma e intensidad 0-10	Inicio

Anota también: menstruación o cambios hormonales, estrés, calidad del sueño, ejercicio y medicamentos. No inicies una dieta muy restrictiva, DAO o antihistamínicos por cuenta propia.

Fuentes de orientación: American Academy of Allergy, Asthma & Immunology; Cleveland Clinic; NHS.