

Anal  s Complejo

Hugo Del Castillo Mola

15 de septiembre de 2022

Índice general

I	Análisis Complejo	2
1.	Preliminares	3
1.1.	El Plano Complejo	3
1.2.	Función Exponencial	5
1.3.	Función Logaritmo	7
2.	Funciones Holomorfas	11
2.1.	Derivación Compleja	11

Parte I

Análisis Complejo

Capítulo 1

Preliminares

1.1. El Plano Complejo

Definición 1.1 (Plano Complejo). Definimos los números complejos como el conjunto $\mathbb{C} = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}$ junto con las operaciones suma y producto

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$$

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, bc + ad)$$

Observación. $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ es un cuerpo conmutativo.

(I) La identidad de la suma es $(0, 0)$ y la identidad del producto es $(1, 0)$.

(II) Se satisfacen la propiedad asociativa, la distributiva y la conmutativa.

(III) Todo elemento distinto de cero tiene inverso en \mathbb{C} .

Observación. Consideramos los números reales \mathbb{R} como el subconjunto de los números complejos \mathbb{C} de la forma $(a, 0)$. Dado $(a, b) \in \mathbb{C}$ podemos escribir $(a, b) = a(1, 0) + b(0, 1)$. Sea $i = (0, 1)$ entonces $(a, b) = a + ib$. Notese que $i = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0) \rightarrow 1 \in \mathbb{R}$.

Observación. La parte real de $z = a + ib \in \mathbb{C}$ es a y se denota $\Re(z) = a$. La parte imaginaria de z es b y se denota $\Im(z) = b$.

Definición 1.2 (Módulo). Sea $z = a + ib \in \mathbb{C}$, el módulo de z es

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Observación. El módulo de un número complejo es la distancia desde el punto del plano hasta el origen.

Definición 1.3 (Conjugado). Sea $z = a + ib \in \mathbb{C}$, el conjugado de z es

$$\bar{z} = a - ib$$

Observación. El conjugado de un número complejo es su simétrico respecto al eje de coordenadas.

Proposición 1.1. Se verifican las siguientes propiedades:

- (I) $\bar{\bar{z}} = z$ y $\bar{z} = z \Leftrightarrow z \in \mathbb{R}$.
- (II) $z + \bar{z} = 2\Re(z)$ y $z - \bar{z} = 2\Im(z)$.
- (III) $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$ y $\overline{-z} = -\bar{z}$
- (IV) $\overline{zw} = \bar{z} \cdot \bar{w}$ y si $z \neq 0$ entonces $\overline{z^{-1}} = \bar{z}^{-1}$
- (V) $|z|^2 = z\bar{z}$ y $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$, $\forall z \neq 0$.
- (VI) $|zw| = |z||w|$, $|\frac{z}{w}| = \frac{|z|}{|w|}$ si $(w \neq 0)$ y $|z| = |\bar{z}|$
- (VII) $|z + w| \leq |z| + |w|$. Además, si $\exists t \geq 0 : z = tw$ se tiene $|z + w| = |z| + |w|$.

Observación. El módulo permite definir una distancia en el plano complejo $d(z, w) = |z - w|$. De esta forma \mathbb{C} y \mathbb{R} son topológicamente iguales.

Definición 1.4 (Representación polar de un número complejo). Sea $z = a + ib \in \mathbb{C}$, z representa el punto (a, b) en el plano, cuya expresión en coordenadas polares es $(r \cos \theta, r \sin \theta)$. Y escribimos

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) := re^{i\theta}$$

donde $r = |z|$ y $\theta = \arg(z) = \arctan(\frac{b}{a})$.

Observación. Si $-\pi < \theta < \pi$ lo llamamos argumento principal y se denota (z) . El conjunto de todos los posibles argumentos de z es $\{Arg(z) + 2k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$.

Proposición 1.2. (I) $e^{i\theta} = e^{i(\theta+2k\pi)} \forall k \in \mathbb{Z}$.

$$(II) |e^{i\theta}| = 1, |\overline{e^{i\theta}}| = e^{-i\theta} = (e^{i\theta})^{-1}.$$

$$(III) e^{i(\theta+\sigma)} = e^{i\theta}e^{i\sigma}.$$

$$(IV) \arg(zw) = \arg(z) + \arg(w) \text{ y } \arg(\bar{z}) = \arg(z^{-1}) = -\arg(z)$$

Proposición 1.3. Si $z = re^{i\theta}$ entonces $z^n = r^n e^{in\theta} = |z|^n e^{in \arg(z)}$.

Observación. Una raíz n -ésima de un número complejo w es número z que cumple $z^n = w$. Si $w = 0$ la única raíz es 0, si $w \neq 0$ entonces por el Teorema Fundamental del Álgebra tenemos que hay n raíces distintas.

Sean $w = |w|e^{i\theta}$ y $z = |z|e^{i\alpha}$, tenemos que

$$|w|e^{i\theta} = |z|^n e^{in\alpha}$$

y por tanto $|z| = |w|^{\frac{1}{n}}$ y $e^{i\theta} = e^{in\alpha}$, lo cual implica que $n\alpha = \theta + 2k\pi$ para $k \in \mathbb{Z}$. Los valores de α son

$$\frac{\theta}{n}, \frac{\theta + 2\pi}{n}, \dots, \frac{\theta + 2\pi(n-1)}{n}$$

Proposición 1.4. Sea $w \in \mathbb{C}$ entonces w tiene n raíces n -ésimas distintas.

Observación. Estas n raíces son los vértices de un polígono regular de n lados inscritos en la circunferencia de centro 0 y radio $|w|^{\frac{1}{n}}$.

1.2. Función Exponencial

Definición 1.5 (Función polinómica). Sea $P : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} : z \mapsto a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n$ donde $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{C}$.

Observación. Como $f(z) = z^k$ es continua (de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$) se tiene que f es continua de $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$.

Definición 1.6 (Función Exponencial). Definimos la función exponencial como la solución de la ecuación diferencial

$$f'(z) = f(z)$$

con el valor inicial $f(0) = 1$. Haciendo

$$f(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n + \dots$$

$$f'(z) = a_1 + 2a_2 z + \dots + na_n z^{n-1} + \dots$$

se tiene que $a_{n-1} = na_n$ y $a_0 = 1$ y por inducción $a_n = \frac{1}{n!}$.

La solución se denota

$$e^z = 1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots$$

que es una serie convergente.

Proposición 1.5 (Propiedades Exponencial). Se verifican las siguientes propiedades:

- (I) Si $z \in \mathbb{R}$ entonces e^z coincide con la exponencial real.
- (II) $|e^z| = e^x$ y $\arg(e^z) = y$.
- (III) $e^{\bar{z}} = \overline{e^z}$.
- (IV) $e^z \neq 0$ y $(e^z)^{-1} = e^{-z}$.
- (V) $e^{z+w} = e^z e^w, \forall z, w \in \mathbb{C}$.
- (VI) $e^{2k\pi i} = 1, \forall k \in \mathbb{Z}$.
- (VII) es periódica, $e^z = e^{z+2\pi i}$
- (VIII) es continua, Sea $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de números complejos, si $z_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} z_0 \Rightarrow e^{z_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{z_0}$.
- (IX) No es inyectiva, existen infinitos $z \in \mathbb{C}$ tal que $e^z = 1$.

Observación. En el plano la exponencial compleja transforma las rectas horizontales de la forma $z = x + ib$ en semirectas de radio e^x y ángulo b . Y rectas verticales de la forma $z = a + iy$ a circunferencias de radio e^a y ángulo y .

Definición 1.7 (Funciones Trigonómicas). Se definen las funciones \cos y \sin como

$$\cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

Proposición 1.6 (Propiedades \cos y \sin). (I) Son funciones continuas.

(II) Sobre los números reales coinciden con las correspondientes funciones reales.

(III) $\cos(z) = \cos(-z)$ y $\sin(z) = -\sin(-z)$, $\forall z \in \mathbb{C}$.

(IV) $\cos(z) = 0 \Leftrightarrow z = \frac{\pi}{2} + k\pi$ y $\sin(z) = 0 \Leftrightarrow z = k\pi$ para $k \in \mathbb{Z}$.

(V) $\forall z, w \in \mathbb{C}$, se tiene $\cos(z+w) = \cos(z)\cos(w) - \sin(z)\sin(w)$ y $\sin(z+w) = \sin(z)\cos(w) + \sin(w)\cos(z)$.

(VI) El coseno y el seno son funciones periódicas de periodo 2π .

(VII) $\cos(z)^2 + \sin(z)^2 = 1$, $\forall z \in \mathbb{C}$.

Demostración (ii). Veamos que si $z \in \mathbb{R}$ entonces la exponencial compleja coincide con la real

$$\begin{aligned}\cos(x) &= \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} = \\ &= \frac{1}{2}(\cos(x) + \sin(x) + \cos(-x) + i\sin(-x)) = \cos(x)\end{aligned}$$

Demostración. (iv) $\cos(z) = 0 \Leftrightarrow e^{iz} + e^{-iz} = 0 \Leftrightarrow e^{iz}(e^{iz} + e^{-iz}) = e^{2iz} + 1 = 0 \Leftrightarrow e^{2iz} = -1 \Rightarrow z \in \mathbb{R}$. Si $y \neq 0$ entonces $e^{2iz} = e^{2ix-2y} \Rightarrow |e^{2iz}| \neq -1$.

Definición 1.8 (Función Tangente). A partir de las funciones seno y coseno se define la tangente,

$$\tan(z) = \frac{\sin(z)}{\cos(z)} = -i \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{e^{iz} + e^{-iz}}$$

Observación. Todas las funciones trigonométricas son funciones de e^{iz} .

Observación. También podemos definir las funciones

$$\sinh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{2} \text{ y } \cosh(z) = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

1.3. Función Logaritmo

Definición 1.9 (Logaritmo). La función logaritmo se define como la inversa de la función exponencial,

$$\log : \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$z \mapsto \log(z) = w$$

donde $\log(z) = w$ es la raíz de la ecuación $e^w = z$.

Observación. $e^z \neq 0, \forall z \in \mathbb{C} \Rightarrow$ el 0 no tiene logaritmo.

Observación. Si $w = x + iy \neq 0$, $z = e^w = e^{x+iy}$ tiene soluciones

$$e^x = |z|, \quad e^{iy} = \frac{w}{|w|}$$

donde la primera ecuación tiene solución única $x = \log(|z|)$ y la segunda ecuación tiene infinitas soluciones módulo 2π .

Observación. Distinguiendo la parte real y la parte imaginaria de w podemos escribir

$$z = \log(z) = \log |z| + i \arg(z)$$

dado que $e^{\log(z)} = e^{\log |z|} e^{i \arg(z)} = |z| e^{i \arg(z)} = z$.

Observación. Para distinguir las soluciones, se llama **rama del logaritmo** a la función que reside en $\{x + iy : y_0 \leq y \leq y_0 + 2\pi\}$. Solo definimos la función $\log(z)$ cuando se especifica un intervalo de longitud 2π donde $\arg(z)$ toma valores y se dice elegir una rama específica.

Observación. La determinación principal del argumento induce una rama del logaritmo.

Definición 1.10 (Potencias). Sea $a, \alpha \in \mathbb{C}, a, \alpha \neq 0$

$$a^\alpha = e^{\alpha \log(a)}$$

Observación. Si $\alpha = 0 \Rightarrow a^0 = 1$.

Observación. En general, a^α tiene infinitos valores. Una excepción es $\alpha = n \Rightarrow a^n = e^{n \log(a)} = e^{\log(a)} \dots e^{\log(a)} = a \dots a$.

Proposición 1.7 (Propiedades Potencias). El logaritmo verifica las siguientes propiedades:

$$(I) \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$(II) \quad a^{\alpha+\beta} = a^\alpha a^\beta \text{ solo si fijamos el valor de } \log(a)$$

$$(III) \quad 1 = e^{-2k\pi y} (\cos(2k\pi x) + i \sin(2k\pi x)) \text{ donde } \alpha = x + iy$$

Proposición 1.8. (I) $f(z) = a^z$ es continua en \mathbb{C}

(II) Sea $\alpha \in \mathbb{C}$, $f(z) = z^\alpha$ es continua en el dominio de la rama del logaritmo.

Definición 1.11 (Transformación de Möbius). Sean $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ tal que $ad - bc \neq 0$. Entonces, a la función de la forma

$$S(z) = \frac{az + b}{cz + d}$$

se llama transformación de Möbius.

Observación. S es continua en $\mathbb{C} \setminus \{-\frac{d}{c}\}$.

Proposición 1.9. La composición de transformaciones de Möbius es transformación de Möbius.

Proposición 1.10. $S : \mathbb{C} \setminus \{-\frac{d}{c}\} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \frac{a}{c}$ es un homeomorfismo (biyectiva, S continua y S^{-1} continua) cuya inversa es

$$S^{-1} : z \mapsto \frac{dw - b}{a - cw}$$

Observación. $S \circ S^{-1}(z) = S^{-1} \circ S(z) = z$

Observación. Las transformaciones de Möbius forman un grupo bajo la operación de composición de aplicaciones.

Definición 1.12 (Möbius Ampliada). Sea S la transformación de Möbius tal que $S(-\frac{d}{c}) = \infty$ y $S(\infty) = \frac{a}{c}$ si $c \neq 0$ y $S(\infty) = \infty$ si $c = 0$. Entonces, podemos definir $S : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$.

Observación. La transformación de Möbius ampliada también es homeomorfo.

Teorema 1.1. Toda transformación de Möbius es composición de homotecias, traslaciones, inversiones y giros.

Teorema 1.2. Sean $z_0, z_1, z_2 \in \mathbb{C}^*, w_0, w_1, w_2 \in \mathbb{C}^* : z_i \neq z_j, w_i \neq w_j, \forall i \neq j$. Entonces, $\exists! T(z)$ transformación de Möbius tal que $T(z_i) = w_i, \forall i \in \{0, 1, 2\}$.

Corolario 1.2.1. Si una transformación de Möbius tiene tres puntos fijos entonces es la identidad.

Corolario 1.2.2. Si dos transformaciones de Möbius coinciden en tres puntos entonces son la misma.

Teorema 1.3. Las transformaciones de Möbius transforman circunferencias de \mathbb{C}^* en circunferencias de \mathbb{C}^*

Capítulo 2

Funciones Holomorfas

2.1. Derivación Compleja

Definición 2.1 (Derivada). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto, $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $z_0 \in \mathbb{C}$. Decimos que f es derivable si existe

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}.$$

Ejemplo. (I) f constante $\Rightarrow f'(z_0) = 0$.

(II) $f(z) = z \Rightarrow f'(z_0) = 1$.

(III) $f(z) = \bar{z} \Rightarrow \frac{\bar{z} - \bar{z}_0}{z - z_0} = \frac{\overline{z - z_0}}{z - z_0} = \begin{cases} 1, & \text{si } z - z_0 \in \mathbb{R} \\ -1, & \text{si } z - z_0 \in i\mathbb{R} \end{cases} \Rightarrow \nexists \lim_{z \rightarrow z_0}.$

Observación. La continuidad de una función compleja es equivalente a la continuidad de la parte real y la parte imaginaria. No pasa lo mismo con derivabilidad.

Proposición 2.1. Sea $f : \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ derivable en $z_0 \in \Omega$. Entonces, f es continua en $z_0 \in \Omega$.

Demostración. content

Proposición 2.2. Sean $f, g : \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ derivables en $z_0 \in \Omega$. Entonces,

(I) Si $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $(\alpha f + \beta g)'(z_0) = \alpha f'(z_0) + \beta g'(z_0)$

(II) $(fg)'(z_0) = f(z_0)g'(z_0) + f'(z_0)g(z_0)$.

(III) Si $g(z_0) \neq 0$ entonces $(\frac{f}{g})'(z_0) = \frac{f'(z_0)g(z_0) + f(z_0)g'(z_0)}{g(z_0)^2}$.

Demostración. *content*

Ejemplo. (I) $f(z) = z^n \Rightarrow f'(z) = nz^{n-1}, \forall z \in \mathbb{C}$.

(II) Todo polinomio es derivable en \mathbb{C} .

(III) $f(z) = \frac{1}{z}$ es derivable $\forall z \neq 0$.

Teorema 2.1 (Regla de la Cadena). Sean $\Omega_1, \Omega_2 \subset \mathbb{C}$ abiertos, $f : \Omega_1 \rightarrow \mathbb{C}$, $g : \Omega_2 \rightarrow \mathbb{C}$ tal que f es derivable en $f(z_0) \in \Omega_2$ y g es derivable en $z_0 \in \Omega_1$. Entonces, $(f \circ g)$ es derivable en $z_0 \in \Omega_1$ y $(g \circ f)'(z_0) = g'(f(z_0))f'(z_0)$.

Demostración. Sea $G : \Omega_2 \rightarrow \mathbb{C} : G(w) = \begin{cases} \frac{g(w) - g(f(z_0))}{w - f(z_0)}, w \neq f(z_0) \\ g'(f(z_0)), w = f(z_0) \end{cases}$
entonces, G está bien definida y $\lim_{w \rightarrow f(z_0)} \frac{g(w) - g(f(z_0))}{w - f(z_0)} = g'(z_0) \Rightarrow G$ es continua en $f(z_0)$.

Si $z \neq 0$, entonces

$$\begin{aligned} & \frac{(g \circ f)(z) - (g \circ f)(z_0)}{z - z_0} = \\ &= \frac{g(f(z)) - g(f(z_0))}{f(z) - f(z_0)} \cdot \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \\ &= G(f(z)) \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \\ & \lim_{z \rightarrow z_0} G(f(z)) \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} G(f(z)) \cdot \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \\ &= G'(f(z_0))f'(z_0). \end{aligned}$$

Observación. $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ es derivable $\forall z \in \Omega$. Entonces, f es holomorfa en Ω .