

FYS1120 Elektromagnetisme 2014

# Obligatorisk oppgave 1

Innleveringsfrist **19. september kl. 23.59**

Øyvind Sigmundson Schøyen

19. september 2014

Obligar i FYS1120 leverast elektronisk på Devilry – <http://devilry.ifi.uio.no/>.  
Du kan velge om du vil skrive han maskinelt, med til dømes  $\text{\LaTeX}$ , eller skanne håndskrivne ark. Skanner finst på bibliotek og terminalstuer.

## Oppgave 1 Gradient, divergens og kvervling

a) Finn gradienten til desse skalarfeltet:

Gradienten vert rekna ut ved formelen

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}.$$

(i)  $f(x, y, z) = x^2 y$

$$\nabla f = 2xy \mathbf{i} + x^2 \mathbf{j}$$

(ii)  $g(x, y, z) = xyz$

$$\nabla g = yz \mathbf{i} + xz \mathbf{j} + xy \mathbf{k}$$

(iii)  $h(r, \theta, \phi) = \frac{1}{r} e^{r^2}$  Hint: Bruk at  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ , eller sjå etter formelen for gradient i kulekoordinatar i Rottmann. Her vil me nytte formelen for gradient i kulekoordinatar. Den er gitt ved

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \mathbf{i}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \mathbf{i}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \phi} \mathbf{i}_\phi$$

$$\nabla h = \left( -\frac{1}{r^2} e^{r^2} + 2e^{r^2} \right) \mathbf{i}_r$$

b) Finn divergensen og kvervlinga til desse vektorfeltet:

Divergensen finn me ved

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}.$$

Kvervlinga finn me ved

$$\nabla \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}$$

(i)  $\mathbf{u}(x, y, z) = (2xy, x^2, 0)$

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 2y$$

$$\nabla \times \mathbf{u} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2xy & x^2 & 0 \end{vmatrix} = \mathbf{k}(2x - 2x) = \mathbf{0}$$

$$(ii) \quad \mathbf{v}(x, y, z) = (e^{yz}, \ln(xy), z)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{y} + 1$$

$$\nabla \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ e^{yz} & \ln(xy) & z \end{vmatrix} = ye^{yz}\mathbf{j} + \mathbf{k} \left( \frac{1}{x} - ze^{yz} \right)$$

$$(iii) \quad \mathbf{w}(x, y, z) = (yz, xz, xy)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{w} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{w} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ yz & xz & xy \end{vmatrix} = \mathbf{0}$$

$$(iv) \quad \mathbf{a}(x, y, z) = (y^2z, -z^2 \sin y + 2xyz, 2z \cos y + y^2x)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{a} = 2xz - z^2 \cos y + 2 \cos y = 2xz + \cos y(2 - z^2)$$

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{a} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2z & 2xyz - z^2 \sin y & 2z \cos y + y^2x \end{vmatrix} \\ &= \mathbf{i}(2xz - 2z \sin y - 2xy + 2z \sin y) \\ &\quad - \mathbf{j}(y^2 - y^2) \\ &\quad + \mathbf{k}(2yz - 2yz) \\ &= \mathbf{0} \end{aligned}$$

- c) Kva vil det seie at eit felt er *konservativt*, matematisk sett? Og kva vil det seie at t.d. eit gravitasjonsfelt er konservativt, fysisk sett? Er det nokon av felta i **b)** som er konservative? Har nokon av dei i så fall noko med **a)** å gjere?

Felta (i), (iii) og (iv) er konservative. Dette kan me sjå då kvervlinja vert **0**. Det at eit felt er konservativt betyr at energien er bevart. For gravitasjon vil det seie at kva veg me vel å bevege oss langs er likegyldig. Den potensielle energien i begge endepunkta vil vere den same. Viss feltet er konservativt  $\exists \mathbf{F} = \nabla\phi$ . I oppgåve 1 har me at 1a)(i) er eit skalarpotensial til feltet 1b)(i) og 1a)(ii) er eit skalarpotensial til feletet 1b)(iii).

- d) Viss me tek divergensen av gradienten til eit skalarfelt  $f$ ,  $\nabla \cdot \nabla f$ , så får me eit nytt skalarfelt. Operatoren  $\nabla \cdot \nabla$  skriv me ofte  $\nabla^2$ , og han vert kalla *laplaceoperatoren*.

Bruk laplaceoperatoren på desse skalarfelta:

Laplaceoperatoren vert formelen for divergensen på ein gradient.

(i)  $j(x, y, z) = x^2 + xy + yz^2$

$$\begin{aligned}\nabla j &= (2x + y)\mathbf{i} + (x + z^2)\mathbf{j} + 2yz\mathbf{k} \\ \nabla \cdot \nabla j &= \nabla^2 j = 2 + 2y\end{aligned}$$

- (ii)  $h(r, \theta, \phi) = \frac{1}{r}e^{r^2}$  Her nyttar me formelen for gradient i kulekoordinatar. Den er gitt ved

$$\nabla^2 f = \left( \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) f + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) f + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} f.$$

$$\begin{aligned}\nabla^2 h &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \left( -\frac{1}{r^2} e^{r^2} + 2e^{r^2} \right) \right) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( 2r^2 e^{r^2} - e^{r^2} \right) \\ &= \frac{1}{r^2} \left( 4r e^{r^2} + 4r^3 e^{r^2} - 2r e^{r^2} \right) = \frac{4}{r} e^{r^2} + 4r e^{r^2} - \frac{2}{r} e^{r^2} \\ &= 2e^{r^2} \left( 2r + \frac{1}{r} \right)\end{aligned}$$

## Oppgåve 2 Vektoridentitetar

La  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{b}$  og  $\mathbf{c}$  vere tre-dimensjonale vektorar. Vis følgande identitet:

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}). \quad (1)$$

Du kan godt anta at vektorane er på formen  $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$  osb.

Me viser identiteta ved å rekne ut venstre sida av likhetsteiknet på komponentform. Etterpå legger me til og trekk ifrå 6 ledd som me bruker til å sortere uttrykket til det liknar på det på høgre sida av likhetsteiknet.

$$\begin{aligned}\mathbf{b} \times \mathbf{c} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \\ &= \mathbf{i}(b_2 c_3 - b_3 c_2) - \mathbf{j}(b_1 c_3 - b_3 c_1) + \mathbf{k}(b_1 c_2 - b_2 c_1)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_2c_3 - b_3c_2 & b_1c_3 - b_3c_1 & b_1c_2 - b_2c_1 \end{vmatrix} \\
&= \mathbf{i}(a_2(b_1c_2 - b_2c_1) + a_3(b_1c_3 - b_3c_1)) \\
&\quad - \mathbf{j}(a_1(b_1c_2 - b_2c_1) + a_3(b_3c_2 - b_2c_3)) \\
&\quad + \mathbf{k}(a_1(b_3c_1 - b_1c_3) + a_2(b_3c_2 - b_2c_3))
\end{aligned}$$

No legg me til ledda  $\mathbf{i}(a_1b_1c_1 - a_1b_1c_1)$ ,  $\mathbf{j}(a_2b_2c_2 - a_2b_2c_2)$  og  $\mathbf{k}(a_3b_3c_3 - a_3b_3c_3)$ . Me sorterer litt og får

$$\begin{aligned}
\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) &= \mathbf{i}(a_1b_1c_1 + a_2b_1c_2 + a_3b_1c_3) - \mathbf{i}(a_1b_1c_1 + a_2b_2c_1 + a_3b_3c_1) \\
&\quad + \mathbf{j}(a_1b_2c_1 + a_2b_2c_2 + a_3b_2c_3) - \mathbf{j}(a_1b_1c_2 + a_2b_2c_2 + a_3b_3c_2) \\
&\quad + \mathbf{k}(a_1b_3c_1 + a_2b_3c_2 + a_3b_3c_3) - \mathbf{k}(a_1b_1c_3 + a_2b_2c_3 + a_3b_3c_3) \\
&= (b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k})(a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3) \\
&\quad - (c_1\mathbf{i} + c_2\mathbf{j} + c_3\mathbf{k})(a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3) \\
&= \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})
\end{aligned}$$

### Oppg ve 3 Fluksintegral og Gauss' teorem

a) Eit vektorfelt er gitt ved

$$\mathbf{v}(x, y, z) = (y, x, z - x). \quad (2)$$

Rekn ut fluksen av dette feltet ut av einingskuben, som er gitt ved  $x, y, z \in [0, 1]$ . *Hint: Berekn fluksen,  $\iint_A \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, dx dy$ , der  $\mathbf{n}$  er einingsnormalvektoren for flata  $A$ , for kvar sideflate av kub n og legg saman.*

Kuben har 6 sider som me rekner ut kvar for seg og legg saman til slutt.

For sida  $x = 1$  f r me  $\mathbf{n} = dydz\mathbf{i}$  i positiv  $x$ -retning.

$$\int_0^1 \int_0^1 y \, dy dz = \frac{1}{2}.$$

For sida  $x = 0$  f r me  $\mathbf{n} = -dydz\mathbf{i}$  i negativ  $x$ -retning.

$$\int_0^1 \int_0^1 -y \, dy dz = -\frac{1}{2}.$$

For sida  $y = 1$  f r me  $\mathbf{n} = dx dz\mathbf{j}$  i positiv  $y$ -retning.

$$\int_0^1 \int_0^1 x \, dx dz = \frac{1}{2}.$$

For sida  $y = 0$  f r me  $\mathbf{n} = -dx dz\mathbf{j}$  i negativ  $y$ -retning.

$$\int_0^1 \int_0^1 -x \, dx dz = -\frac{1}{2}.$$

For sida  $z = 1$  f r me  $\mathbf{n} = dx dy\mathbf{k}$  i positiv  $z$ -retning.

$$\int_0^1 \int_0^1 1 - x \, dx dy = \frac{1}{2}.$$

For sida  $z = 0$  f r me  $\mathbf{n} = -dx dy\mathbf{k}$  i negativ  $z$ -retning.

$$\int_0^1 \int_0^1 x \, dx dy = \frac{1}{2}.$$

Totalt f r me d 

$$\int_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

- b) Bruk Gauss' teorem til å berekne den samme fluksen. Sjekk at du får samme svar!

Me startar med å rekne ut divergensen og etterpå rekner me ut volumintegralet.

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 1.$$

Me har at det infinitesimale volumelementet er gitt ved  $d\tau = dxdydz$

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{v} \, d\tau = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 1 \, dxdydz = 1.$$

#### Oppgåve 4 Linjeintegral og Stokes' teorem

Endå eit vektorfelt er gitt ved

$$\vec{w}(x, y, z) = (2x - y)\vec{i} - y^2\vec{j} - y^2z\vec{k}, \quad (3)$$

der  $\vec{i}, \vec{j}$  og  $\vec{k}$  er einingsvektorene i høvesvis  $x, y$  og  $z$ -retning. Vi har òg ei lukka kurve  $\gamma$  gitt ved  $x^2 + y^2 = 1, z = 1$ .

- a) Rekn ut divergensen til  $\vec{w}$ .

$$\nabla \cdot \mathbf{w} = 2 - 2y + y^2.$$

- b) Rekn ut kvervlinga til  $\vec{w}$ .

$$\nabla \times \mathbf{w} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2x - y & -y^2 & -y^2z \end{vmatrix} = -2yz\mathbf{i} + \mathbf{k}.$$

- c) Parametrisér kurva  $\gamma$  som ein vektor  $\vec{\gamma}(t)$ , og finn  $d\vec{\gamma}$  uttrykt ved  $dt$ .

Me ser at  $\gamma$  utgjer ein sirkel. Me vil difor parametrisere ved hjelp av sylinderkoordinatar. Då har me at  $x = r \cos t$ ,  $y = r \sin t$  og  $z = 1$ , kor  $r = 1$  og  $t \in [0, 2\pi]$ . Då får me

$$\begin{aligned} \gamma(t) &= \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + \mathbf{k}, \\ d\gamma &= (-\sin t \mathbf{i} + \cos t \mathbf{j}) dt. \end{aligned}$$

- d) Rekn ut sirkulasjonen til  $\vec{w}$  rundt  $\gamma$ .

Her beveger me oss rundt sirkelen i ein fast avstand frå origo. Då

har me at  $r = 1$ . Me bruker sylinderkoordinatar på  $\mathbf{w}$ . Då får me  $\mathbf{w}(t) = (2 \cos t - \sin t)\mathbf{i} - \sin^2 t \mathbf{j} - \sin^2 t \mathbf{k}$ . Sirkulasjonen vert

$$\begin{aligned}\int_{\gamma} \mathbf{w} \cdot d\gamma &= \int_0^{2\pi} \sin^2 t - 2 \cos t \sin t - \cos t \sin^2 t \, dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 1 - \cos(2t) \, dt - \int_0^{2\pi} \sin(2t) \, dt - \int_0^{2\pi} \cos t \sin^2 t \, dt \\ &= \frac{1}{2} \left[ t - \frac{1}{2} \sin(2t) \right]_0^{2\pi} + \left[ \frac{1}{2} \cos(2t) \right]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} \cos t \sin^2 t \, dt.\end{aligned}$$

På det siste leddet bruker me substitusjon. Det gjer oss

$$\begin{aligned}u &= \sin t, & u(2\pi) &= 0 \\ dt &= \frac{du}{\cos t}, & u(0) &= 0.\end{aligned}$$

Til slutt vert det

$$\int_{\gamma} \mathbf{w} \cdot d\gamma = \pi - \left[ \frac{1}{3} u^3 \right]_0^0 = \pi.$$

- e) Bruk Stokes' teorem til å finne sirkulasjonen ved hjelp av kvervlinga til  $\vec{w}$ . Sjekk at du får samme svar!

Me bruker sylinderparametrisering i  $\nabla \times \mathbf{w}$  ( $x = r \sin t$ ,  $y = r \cos t$  og  $z = 1$ ). No vil me integrere over heile området. Me har difor  $r \in [0, 1]$ . Då får me

$$\begin{aligned}\int_S (\nabla \times \mathbf{w}) \cdot d\gamma &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} (-2 \sin t \mathbf{i} + \mathbf{k}) \cdot (-\sin t \mathbf{i} + \cos t \mathbf{j}) r \, dr \, dt \\ &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} 2r \sin^2 t \, dr \, dt = \int_0^{2\pi} \sin^2 t \, dt = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 1 - \cos(2t) \, dt \\ &= \frac{1}{2} \left[ t - \frac{1}{2} \sin(2t) \right]_0^{2\pi} = \pi.\end{aligned}$$