

1. pierwiastki 2

Usuń niewymierność z mianownika:

a) $\frac{4}{\sqrt{10}}$

b) $\frac{5}{3\sqrt{10}}$

c) $\frac{3}{2\sqrt{6}}$

Usuwanie niewymierności z mianownika polega na przekształceniu ułamka tak aby w mianowniku znajdowała się liczba wymierna.

Aby uniknąć zmiany wartości ułamka zarówno licznik i mianownik możemy pomnożyć przez tę samą liczbę.

$$a) \frac{4}{\sqrt{10}} : \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{10}} = \frac{4\sqrt{10}}{10} = \frac{2\sqrt{10}}{5}$$

Odp: $\frac{2\sqrt{10}}{5}$.

$$b) \frac{5}{3\sqrt{10}} : \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{10}} = \frac{5\sqrt{10}}{3 \cdot 10} = \frac{\cancel{5}\sqrt{10}}{30_6} = \frac{\sqrt{10}}{6}$$

Odp: $\frac{\sqrt{10}}{6}$.

$$c) \frac{3}{2\sqrt{6}} : \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}} = \frac{\cancel{3}\sqrt{6}}{2 \cdot \cancel{6}_2} = \frac{\sqrt{6}}{4}$$

Odp: $\frac{\sqrt{6}}{4}$.