TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA A LARGO PLAZO

(tras 3-6 meses de tratamiento)

1 Estudiar la presencia de **factores de riesgo**

Transitorios		Permanentes	
Mayores	Menores	Mayores	Menores
• Cirugía mayor • Encamamiento hospitalario ≥3 días • Traumatismo con fractura • Cesárea	• Cirugía menor • Encamamiento domiciliario ≥3 días • Encamamiento hospitalario <3 días • Estrógenos / anticonceptivos • Embarazo/puerperio • Viajes prolongados • Lesión en extremidad inferior sin fractura	• Cáncer activo • Síndrome antifosfolípidico • ≥2 episodios trombóticos idiopáticos	• Enfermedad inflamatoria intestinal • Enfermedad autoinmune activa • Inmovilidad permanente

Ausencia **factores de riesgo**

- Si resuelto, suspender anticoagulación
- Tratamiento indefinido
- Si enfermedad activa, mantener tratamiento

2 Valorar **riesgo de hemorragia**

VTE-BLEED		Escala **RIETE**		Tabla **ACCP**	
• Cáncer activo	2	• Sangrado mayor reciente	2	• Edad >65 años	• Anemia
• Varón con HTA	1	• Insuficiencia renal	1,5	• Edad >75 años	• Antiagregantes
• Anemia	1,5	• Anemia	1,5	• Cáncer	• Mal control de anticoagulación
• Historia de sangrado	1,5	• Edad ≥75 años	1	• Cáncer metastásico	• Capacidad funcional reducida
• Edad ≥60 años	1,5	• Embolia pulmon	1	• Insuficiencia renal	• Cirugía reciente
• Insuficiencia renal	1,5	• Cáncer activo	1	• Insuficiencia hepática	• Caídas frecuentes
				• Trombocitopenia	• Abuso alcohol
				• Ictus previo	
				• Diabetes	
Riesgo bajo: <2 **Riesgo alto:** ≥2		**Riesgo bajo:** 0 **Riesgo moderado:** 1-4 **Riesgo alto:** ≥4		**Riesgo bajo:** 0 factores **Riesgo moderado:** 1 factor **Riesgo alto:** ≥2 factores	

- Riesgo bajo/moderado
- Riesgo alto
  - Valorar suspender tratamiento

3 Valorar **riesgo de recurrencia**

- **Alto**
  - Tratamiento indefinido*
- **Bajo**
  - Suspender tratamiento

Escala **HERDOO2**

• Síndrome postrombótico (Hiperpigmentación, edema y/o rubefacción de MMII)	1
• Dímero D ≥250 ng/mL	1
• IMC ≥30 kg/m2	1
• Edad ≥65 años	1

- Varón: **Riesgo alto**
- Mujer con ≥2 puntos: **Alto**
- Mujer con ≤1 punto: **Bajo**

* **TVP distal aislada:** retirar siempre anticoagulación a los 3 meses, salvo que este asociado a cáncer

Reevaluación periódica de riesgo de hemorragia y recurrencia

Tratamiento inicial (0-21 días)	Fase tratamiento (3-6 meses)	Tratamiento extendido
Apixaban 10 mg/12 h (7 días)	**Apixaban 5 mg/12 h**	**Apixaban 2,5 mg/12 h**
Rivaroxaban 15 mg/12 h (21 días)	**Rivaroxaban 20 mg/24 h**	**Rivaroxaban 10 mg/24 h**
HBPM 5-10 días	Edoxaban 60 mg/24 h	Edoxaban 60 mg/24 h
HBPM 5-10 días	Dabigatran150 mg/12 h	Dabigatran150 mg/12 h
HBPM 5-10 días	AVK; INR 2-3	AVK; INR 2-3
HBPM, fondaparinux	HBPM, fondaparinux	HBPM, fondaparinux