

分布范围

世界

主要分布国家和地区（海域）：孟加拉、文莱、柬埔寨、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南。

中国

中华白海豚在中国主要分布在东南部沿海，据文献记载，最北可达长江口，向南延伸至浙江、福建、台湾、广东、广西和海南沿岸河口水域，有时也会进入江河；甚至黄海北部也偶有记录，比如2003年5月9日在辽宁省庄河市大郑镇近海记录到一只雌性中华白海豚。

中华白海豚在全世界分布最集中的区域是中国的珠江口（包括广东深圳、香港和澳门海域），此外在广西的北部湾、厦门的九龙江口、广东湛江等海域也都有较大种群分布。珠江口的中华白海豚群体，主要分布在河口的伶仃洋、万山群岛和香港西南部水域。据1997-2000年南海水产研究所的调查资料显示，海豚分布的北界在深圳机场对开水域，南界在东澳一小蒲台岛一带；东侧的大铲岛、深圳湾、龙鼓洲、香港新机场北部水域和大屿山沿岸，西侧的香洲湾外和澳门对开海面，均有中华白海豚分布，分布范围面积不小于1200km²。白海豚活动的密集区主要在伶仃洋的东南部，其中内伶仃岛周围、马友石至大屿山之间和桂山岛附近，海豚的目击率较高；而从淇澳岛至澳门之间的西部水域，海豚的目击率较低。分布态势呈东高西低，而且差异显著。

而北京大学的科研人员在广西通过2000多个中华白海豚的GPS定位点分析出，北部湾中华白海豚的主要分布区域为大风江口南部海域（共约350平方千米），其中三墩沙一线以东至钦州-北海交界一线以西水深不超过8米的海域为其密集分布区（共约180平方千米）。

而北京大学的科研人员在广西通过2000多个中华白海豚的GPS定位点分析出，北部湾中华白海豚的主要分布区域为大风江口南部海域（共约350平方千米），其中三墩沙一线以东至钦州-北海交界一线以西水深不超过8米的海域为其密集分布区（共约180平方千米）。

2023年8月，在广东省阳江市阳东区东平海域，十多头中华白海豚在海中嬉戏遨游。

2024年7月2日，有村民在福建漳州市云霄县列屿镇人家村海域拍摄到中华白海豚的身影。

2024年7月2日，有村民在福建漳州市云霄县列屿镇人家村海域拍摄到中华白海豚的身影。

2025年9月14日下午，在广东省潮州市饶平县汎洲岛附近海域，成群结队的中华白海豚现身，在海中穿梭嬉戏。

繁殖方式

每年繁殖一次，但通常在春季和夏季繁殖。经过10-12个月的妊娠期后，雌性通常会产下1个身长约为100厘米的后代。幼崽在2岁左右断奶，但6个月后可以吃固体食物了。雌性为幼崽提供大量照顾。幼崽在2岁左右断奶，并与母亲在一起3-4年。在香港沿岸也观察到了异母喂养，即非母婴护理。中华白海豚常年都可交配。幼豚会在全年出生，但出生率在春季和夏季稍高。刚出生的幼豚体长接近1米，幼体出生时尾部先从母体内露出（陆生哺乳动物头先露出），防止出生过程中幼崽呛水而死。出生后即由母体带领学游泳，母豚有乳汁分泌，哺乳期从8个月至2年以上。由于整个哺乳过程母子形影不离，保护周到，幼豚的成活率均比其它水生动物成活率要高得多。刚出生的幼仔是雌兽体长的1/3左右，背面为灰黑色，腹面为白色并带有粉红色，牙齿尚未露出，吻部生有十多根感觉毛。约1年后感觉毛全部脱落，牙齿完全长出。雌性在9-10岁左右达到性成熟，而雄性在12-13岁左右达到性成熟，在野外的寿命相当长，它们一般为30-40年，能活40岁或更长。通常不被圈养。许多中华白海豚在圈养3个月后死亡。

保护现状

保护级别列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN)2015年ver3.1—易危(VU)。列入《濒危野生动植物种国际贸易公约附录I、附录II和附录III》(CITES)2019年版附录I。列入中国《国家重点保护野生动物名录》(2021年2月5日)一级。

保护现状播报保护级别列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN)2015年ver3.1—易危(VU)。

[1]列入《濒危野生动植物种国际贸易公约附录I、附录II和附录III》(CITES)2019年版附录I。[13]列入中国《国家重点保护野生动物名录》(2021年2月5日)一级。

种群现状该物种的亚种群结构评估尚未得到充分研究，许多不同的种群或“种群单位”被假设存在，但在大多数情况下未经证实。特别是，沿着中国海岸线，已知中华白海豚分布在大约6-8个海岸区域，并且有一些证据表明存在不同的单位。然而，在大多数情况下，对海岸干预部分的调查工作很少，使用形态学和/或分子方法检查种群结构的实证研究有限，有时质量很差。通常缺乏来自不同研究的照片识别目录的最新比较。台湾西海岸是个例外，由于缺乏照片ID匹配以及与大陆研究地点存在明显的颜色图案差异，已知该地区有一个独特

的中华白海豚亚群（现在被认为是一个亚种）（2016 年）。[1]仅在该物种分布范围的少数部分进行了种群评估，而且大多数评估是在过去 10-15 年才开始的。没有对物种总量规模的总体估计。已知最大的亚群（假定）位于香港/珠江口（以下简称 HK/PRE），根据样线估计，2005 年至 2008 年期间，该地区估计包含 2,637 只动物（CV 范围为 19-89%）在中国大陆水域，2013 年在香港又增加了 82 种左右（2014 年）。HK/PRE 亚种群是唯一拥有长期、定量趋势数据的亚种群，在过去 10 年中，香港水域中的亚种群比例下降了约 50%，尽管这可能至少部分是由于范围变化（2014 年）。根据搁浅数据对人口参数进行建模，预测 HK/PRE 亚种群每年可能下降约 2.46%，导致局部灭绝的潜在时间短至约 80 年（2012 年）。[1]还有一些证据表明，从 2007-2008 年到 2010-2011 年，东部地区西部线样线调查中中华白海豚的目击率可能会下降（南海渔业研究所，2011 年）；然而，还无法根据实证调查数据对整个亚群的丰度趋势进行强有力的分析。对中国水域其他几个地点的丰度进行了估计，主要使用照片识别和标记或重新捕获方法。所有中国站点的动物数量总计达 4,730 只。对于东山或汕头、泉州湾、宁德和海南岛南部地区的疑似小亚群，不存在丰度估计（2014 年）。[1]对于中国以外的地区，只有少数可用的丰度估计，其中包括马来西亚和泰国的三个地点。其中许多估计已有几年历史，因此当前的数字可能会减少。根据 88 次目击事件中孟加拉国 468 头的照片识别结果，得出了 3 个个体的丰富度估计值：132 头（95% CI 115-153）、131 头（95% CI 124-137）和 635 头（95% CI 531-761）。分别为冬季。第三季估计值大幅增加的原因是，尽管努力的强度和空间覆盖范围相似，但第三年首次发现了大量新海豚。稳健的标记重估分析表明，这些丰度估计值仅适用于孟加拉国和印度占据更广泛区域的规模未知的较大“超级种群”的一部分（Smith 等，2015 年）。然而，正如上面所讨论的，这些动物可能是中华白海豚以外的物种。最后，虽然本身不是种群估计，但在马来西亚兰卡威附近发现了数量为 100-150 头的海豚群，迄今为止，至少有 120 只海豚已被编目（2014 年）。兰卡威以南约 200 公里处，沿着马来西亚马当海岸线，那里正在进行的一项研究项目至少记录了 110 只中华白海豚（2016 年）。[1]尽管可用的信息相当稀疏，但 2015 年对中华白海豚与 IUCN 评估过程相关的种群参数进行了重新审查，并根据最佳可用信息计算了新的估计值，更新了早期提供的估计值（2007 年）。估计世代时间(T_0)为 25 年，并确定仅需 3.7% 的人为死亡率即可导致 30% 的下降（对应于弱势），4.1% 的人为死亡率即可导致 50% 的下降数量在三代内减少（对应于濒危）（2015 年）。[1]截止 2022 年尚无对全球中华白海豚的数量估计，因为除中国之外的其它分布国，都没有开展过针对中华白海豚的大规模深入监测。中国珠江口的亚种群是全球已知数量最多、研究最透彻的中华白海豚亚种群，其中大陆海域根据 2005-2008 年的监测，共有 2600 余只；而香港海域根据 2013 年的监测共有 80 多只；但该亚种群数量在持续减少。[1]郝玉江等（2011 年）调查认为中华白海豚较大的种群分布于北部湾（约 150 头）、雷州湾（约 240 头）、珠江口（约 2,500 头）、厦门沿岸（约 80 头）及台湾海峡东部（约 100 头）。[8]2022 年 10 月 20 日中午，在厦门鼓浪屿附近海域记录到近 10 只国家一级保护野生动物中华白海豚集中出游。[9]2023 年 3 月，在广西防城港海域，“水上大熊猫”中华白海豚再次现身，一对中华白海豚结伴嬉戏的景象被环境监管站出海作业人员拍摄下来。[10]2024 年 3 月 3 日报道，从国家林草局了解到，经过多年保护，我国珍稀濒危物种数量实现稳中有升，雷州湾白海豚种群稳定壮大。[23]2025 年 2 月 20 日，广东省清远市清城区在北江石角渡口至清远水利枢纽段发现中华白海豚。[27]2025 年 7 月，湛江海域的中华白海豚种群传来喜讯，当地“陈氏社群”成功诞下一头幼豚。回看过去一年的数据，深海所研究团队在湛江海域共记录到 12 头中华白海豚新生儿。[29]2025 年 8 月 15 日是全国生态日，当天，10 头中华白海豚被授予“厦门生态市民”称号。

致危因素

由于中华白海豚栖息于河口和沿海地区，与经济开发区、航运密集区高度重叠，因此极易受到人类活动的干扰。填海等工程造成的浅海适宜生境的退化和丧失、被渔网误伤、被船只撞伤、船只和工程造成的噪声污染、沿海工业和农药造成的水质污染、过度捕捞导致的渔业枯竭等，都威胁着中华白海豚的生存繁衍。

保护措施

2024 年 9 月 23 日，市人大常委会召开《珠海市人民代表大会常务委员会关于确定中华白海豚为城市吉祥物的决定》实施座谈会，以立法确认城市吉祥物为切口开展集中宣传，有力激发社会各界对中华白海豚保护的热情和参与度。[26]2017 年 12 月 5 日，中华白海豚保护行动计划（2017-2026 年）启动仪式暨中华白海豚保护联盟成立大会在福建厦门成功举办。由农业部制定的中华白海豚保护行动计划（2017-2026 年）计划到 2026 年，有效保护中国 90% 以上的中华白海豚重要分布区。同时，在农业部渔业渔政管理局的支持下，由全国水生野生动物保护分会发起成立了中华白海豚保护联盟。[18]经中华白海豚保护联盟发起，2018 年 5 月 8 日（农历 3 月 23 日妈祖诞辰日）为第一个中华白海豚保护宣传日。1997 年，厦门设立中华白海豚省级自然

保护区；2000 年升级为厦门珍稀海洋物种国家级自然保护区。1999 年广东省设立珠江口中华白海豚省级自然保护区，2003 年升级为珠江口中华白海豚国家级自然保护区。2007 年广东湛江设立湛江市雷州湾中华白海豚自然保护区。2011 年广东台山市设立江门中华白海豚省级自然保护区。1996 年香港设立沙洲及龙鼓洲海岸公园，以保护中华白海豚。从 2004 年开始，北京大学潘文石团队在广西钦州的三娘湾海域对中华白海豚进行生态学和保护生物学的长期研究。

圈养情况

截止至 2022 年，中国南宁动物园饲养 1 头救助的中华白海豚，珠海长隆海洋王国展出一群来自新加坡圣淘沙海洋公园的中华白海豚。在新加坡将其所有的中华白海豚送至珠海长隆后，仅有泰国的芭提雅海豚世界 (Pattaya Dolphin World) 还饲养中华白海豚。

救助情况

2024 年 8 月 17 日下午，一头中华白海豚在南安水头镇海联网红桥下的滩涂搁浅，被发现时已奄奄一息。经多方迅速展开营救，白海豚被成功救起，并送到泉州欧乐堡海洋王国乐园水生野生动物救助站进行全面检查治疗。9 月 2 日，经过 10 余天的治疗，白海豚身体各项指标有明显好转。据了解，这是福建省首例救助成功的中华白海豚，在全国也属罕见。 [25]2025 年 7 月 25 日，广州市民在江高公园附近水域发现了误入珠江内河多日的中华白海豚。7 月 29 日，它在金沙洲大桥下现身。7 月 31 日中午 13 时许，在广州洛溪大桥桥下的水域出现了该头中华白海豚踪迹。7 月 31 日 20 时 24 分，在 4 艘船配合下，救援人员终于成功用渔网将其兜住，并被缓慢拖到安全区域。

中华白海豚的发现和命名

白海豚可能自古就生活在中国沿岸漫长的浅海区域，但遗憾的是，在中国并没有人给予专门的观察和细致的描述。直到 1757 年，瑞典牧师彼得奥斯贝克 (Peter Osbeck) 在他撰写的《中国和东印度群岛旅行记》中首次描述道：“1751 年 11 月 27 日， 在中国广州附近 (人称小广州) 的一个河口看到了一条雪白色的海豚从我乘坐的船边游过，从所处的距离判断，除了体色白，其与普通海豚大小相当。”因此，奥斯贝克牧师给它取名为 "Chinese White

Dolphin" (中国白海豚)。后来，中华白海豚的拉丁学名被确定为 "*Sousa chinensis*", 即它是以“中国”为拉丁种名的鲸豚类动物。