

中华白海豚（学名：*Sousa chinensis*），属于海豚科、白海豚属的海洋哺乳动物。体长2.0-2.5米，最长达2.7米，体重200-285千克。体粗壮，喙中等长，背鳍基部形成增厚的脊，上有近三角形的较大的背鳍，鳍肢和尾叶均宽，均具圆的梢端，标本最大体长约2.6米，下颌前端略超出上颌，喙与额隆间没有深的凹痕为界，背鳍基部形成增厚的脊；尾柄具发达的背脊和腹脊；幼体时为暗灰色，随年龄增长变浅，亚成体灰色和粉红色相杂，成体纯白色，常由于充血而透出粉红色；有些成体的身体上有暗色斑点，少数个体在呼吸孔后的颈部有暗色斑点形成的环。

中华白海豚的寿命一般为30到40年。它们在9到12岁时性成熟，通常每年繁殖一次，怀孕期约为十个月。

栖息环境：

主要分布于热带和亚热带地区，生活在温暖的水域，一般温度高于15℃，平均深度为20米，很少游到深度超过25米的水域。该物种经常出现在海湾、河口、红树林、沙洲、岩石、珊瑚礁以及大河口和附近的泥洲地区。它们通常会靠近海岸，但如果水深仍然较浅，它们偶尔会冒险走得更远。

中华白海豚有时会进入河流和红树林的内陆水道，但很少向上游移动超过几千米，通常停留在潮汐影响范围内。至少在中国和南亚，在远离河口或红树林栖息地的地方很少发现它们。在香港和菲律宾，对它们进行了最深入的研究，它们的整个栖息地都受到珠江（中国第二大河）淡水流的影响。在香港，它们更喜欢在较深的水道中觅食，并且沿着岛屿海岸和天然岩石海岸线以较高的密度出现。常见的是，在珠江口那样的小群体占据的范围为10至400平方千米。

喜欢栖息在亚热带海区的河口咸淡水交汇水域，生活在浅水区和多岩石处，休息或游玩都会集结在靠近沙滩的海域。其作息通常会与涨潮和日照的时间相配合，晨昏最为活跃，常在潮涨时觅食。食物主要是河口的咸淡水鱼类，也取食头足类，不经咀嚼快速吞食。通常在春季和夏季繁殖。经过10-12个月的妊娠期后，每胎产一仔，初生的幼豚体长约100厘米。

中华白海豚分布于从中国东南部经东南亚直到孟加拉湾的沿岸浅海区主要分布于西太平洋、东印度洋，广布于中国东南部沿海，属于国家一级保护动物，素有“水上大熊猫”之称。

中华白海豚喜欢栖息在亚热带海区的河口咸淡水交汇水域，分布于从中国东南部经东南亚直到孟加拉湾的沿岸浅海区。

主要食物来源

中华白海豚的饮食习惯相当多样，主要包括以下几类食物：

鱼类：中华白海豚主要捕食各种小型鱼类，包括棘头梅童鱼、凤鲚、银鲳、斑鰶、青鳞鱼、舌鳎、鲻鱼、长勒鱼、乌鲳、叫姑鱼、龙头鱼等。其中，狮头鱼、?鱼和黄姑鱼是它们最喜欢的食物。?

头足类：除了鱼类，中华白海豚还会捕食乌贼等头足类动物，这些食物为它们提供了丰富的营养。?

捕食策略：中华白海豚的捕食方式多样，包括追逐鱼群、伏击和合作捕食等。它们利用敏捷的身手和高度发达的声纳系统来定位和捕捉猎物。

集群

中华白海豚不集成大群，较大的群体通常与拖网渔船相关。团体往往很小，由少于10只组成，但最多可由25只组成。通常3-5只在一起，或者单独活动。群体由各个年龄段的个体组成，尽管群体中的二分之一到三分之二通常是成体，牢固的社会联系似乎并不常见。除了母亲及幼豚，白海豚组群不会有固定的成员。它们的群居结构非常的有弹性，而组群的成员也时常更换。根据记录，十余只的集群非常少，平均为4只。在食物丰富的海域，有时也可记录到30-40只聚集在一起，比如珠江口伶仃洋曾记录过44只的集群。

行为

中华白海豚比其他海豚更加神秘，它们看起来不那么顽皮，通常行动要比宽吻海豚慢。它们可以将头抬出水面，并用鳍拍打水面并突破水面。在夏末常做跃水、探头等动作，乘浪不常见到。

性情活泼，在风和日丽的天气，常在水面跳跃嬉戏，有时甚至将全身跃出水面近1米高。游泳的速度很快，有时可达每小时12海里以上。在各种渔船中，中华白海豚特别喜欢在拖网渔船后活动和觅食，而在拖网渔船后的海豚组群也比其他的大很多。常在拖网浮子前的100-200米处看到它们。跟随渔船的活动可超过2小时。中华白海豚与陆生哺乳动物一样用肺呼吸，呼吸的时间间隔有时为3-5秒钟，有时为10-20秒，也有时长达1-2分钟以上。外呼吸孔呈半月形开放于头额顶端，呼吸时头部与背部露出水面，直接呼吸空气中的氧气，并发出“Chi-Chi-”的喷气声。?

定位

中华白海豚眼睛较小，位于头部两侧，眼球黑色，视力较差，其辨别物体的位置和方向主要靠回声定位系统，在鼻孔下有一气囊，靠鼻塞肉的开闭发声，这种声线在前额隆起处一个由脂肪组成的特有器官集中，按一定的频率进行发射；声音碰到不同的物体反射回来的不同频率信号，通过海豚下腭一个由脂肪组成的凹槽接收，传入内耳进行定位。这个回声定位系统虽然复杂，但反应极其迅速准确，可以测出前面物体的大小、形状、密度结构和属性，并作出判断和反应。

叫声

该物种通过咔嗒声、口哨声和尖叫声相互交流。经常听到喀哒声，而尖叫声是最不常见的，并且仅在超过 4 或 5 只的群体中观察到。？

食性

中华白海豚主要以丰富的河口鱼类和与珊瑚礁环境相关的鱼类为食。它们通常在海底附近觅食。一些群体随着潮水上涨而进食。也会跟随拖网渔船，以废弃的生物为食。

成年海豚上下颌共有锥形齿 125-135 枚，排列稀疏，其功能不在于咀嚼，而是用于捕食。摄食对象主要是河口的咸淡水鱼类，也取食头足类，不经咀嚼快速吞食。解剖分析海豚的胃含物发现，其主要捕食的种类包括棘头梅童鱼、凤鲚、银鲳、斑鲹、青鳞鱼、舌鳎、鲻鱼、长勒鱼、乌鲳、叫姑鱼、龙头鱼、大黄鱼及梭鲈等中小型鱼类。它的食量很大，胃中的食物的重量可达 7 千克以上。

分布范围

主要分布国家和地区（海域）：孟加拉、文莱、柬埔寨、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南。

中国

中华白海豚在中国主要分布在东南部沿海，据文献记载，最北可达长江口，向南延伸至浙江、福建、台湾、广东、广西和海南沿岸河口水域，有时也会进入江河；甚至黄海北部也偶有记录，比如 2003 年 5 月 9 日在辽宁省庄河市大郑镇近海记录到一只雌性中华白海豚。

中华白海豚在全世界分布最集中的区域是中国的珠江口（包括广东深圳、香港和澳门海域），此外在广西的北部湾、厦门的九龙江口、广东湛江等海域也都有较大种群分布。

珠江口的中华白海豚群体，主要分布在河口的伶仃洋、万山群岛和香港西南部水域。据 1997-2000 年南海水产研究所的调查资料显示，海豚分布的北界在深圳机场对开水域，南界在东澳一小蒲台岛一带；东侧的大铲岛、深圳湾、龙鼓洲、香港新机场北部水域和大屿山沿岸，西侧的香洲湾外和澳门对开海面，均有中华白海豚分布，分布范围面积不小于 1200km²。白海豚活动的密集区主要在伶仃洋的东南部，其中内伶仃岛周围、马友石至大屿山之间和桂山岛附近，海豚的目击率较高；而从淇澳岛至澳门之间的西部水域，海豚的目击率较低。分布态势呈东高西低，而且差异显著。

而北京大学的科研人员在广西通过 2000 多个中华白海豚的 GPS 定位点分析出，北部湾中华白海豚的主要分布区域为大风江口南部海域（共约 350 平方千米），其中三墩沙一线以东至钦州-北海交界一线以西水深不超过 8 米的海域为其密集分布区（共约 180 平方千米）

繁殖方式

每年繁殖一次，但通常在春季和夏季繁殖。经过 10-12 个月的妊娠期后，雌性通常会产下 1 个身长约为 100 厘米的后代。幼崽在 2 岁左右断奶，但 6 个月后可以吃固体食物了。雌性为幼崽提供大量照顾。幼崽在 2 岁左右断奶，并与母亲在一起 3-4 年。在香港沿岸也观察到了异母喂养，即非母婴护理。

中华白海豚常年都可交配？。幼豚会在全年出生，但出生率在春季和夏季稍高。刚出生的幼豚体长接近 1 米，幼体出生时尾部先从母体内露出（陆生哺乳动物头先露出），防止出生过程中幼崽呛水而死。出生后即由母体带领学游泳，母豚有乳汁分泌，哺乳期从 8 个月至 2 年以上。由于整个哺乳过程母子形影不离，保护周到，幼豚的成活率均比其它水生动物成活率要高得多。

刚出生的幼仔是雌兽体长的 1/3 左右，背面为灰黑色，腹面为白色并带有粉红色，牙齿尚未露出，吻部生有十多根感觉毛。约 1 年后感觉毛全部脱落，牙齿完全长出。

雌性在 9-10 岁左右达到性成熟，而雄性在 12-13 岁左右达到性成熟，在野外的寿命相当长，它们一般为 30-40 年，能活 40 岁或更长。通常不被圈养。许多中华白海豚在圈养 3 个月后死亡

生存威胁

- 渔业活动：流刺网、幽灵渔具等导致误捕缠绕，非法电拖等破坏底栖生物资源，每年误捕致死数量若超过种群 1%，会威胁种群可持续性。

- 栖息地丧失：围填海、离岸风电等工程直接摧毁栖息地，台湾西岸 35%的摄食环境丧失，种群碎片化风险

增加。

- 海上交通：高速船只撞击和螺旋桨伤害可致其死亡，观豚旅游逼近行为干扰群体结构，导致幼豚被抛弃。
- 水下噪音与全球变暖：打桩、爆破噪音损伤听力，海水升温改变食饵分布，海平面上升影响栖息地深度适宜性