

中华白海豚相关知识

一. 是什么：

1. 中华白海豚是唯一以“中华”名字命名的海洋豚类，也是中国海洋鲸豚中唯一的国家一级保护动物。
2. 属于海豚科，白海豚属的海洋哺乳动物，是一种沿岸居住的小型齿鲸类。
3. 别名“妈祖鱼”（在福建，台湾一带农历三月前后，东北季风减弱，中华白海豚就很容易在海上见到，那时恰逢渔民信奉的女神妈祖的生日，大家认为它们专门来为妈祖祝寿，于是把中华白海豚称为“妈祖鱼”）粉红海豚，镇江鱼，太平洋驼海豚，是世界上 80 余种鲸类之一，因其珍稀被称为“海上大熊猫”“海上国宝”。
4. 1997 年，中华白海豚被遴选为香港回归的吉祥物。

二. 形态特征：

1. 中华白海豚的体色随发育阶段和地理区域的不同而有很大差异。一般来说，亚成体呈斑驳的灰粉色，幼体呈深灰色。随着年龄的增长，它们的背鳍上会出现粉红色的白色斑点。在中国周围的水域和东南亚其他地区，个体是纯白色的，通常带有粉红色调。白海豚身上的粉红色并不是色素造成的，而是表皮下的血管所致。这与调节体温有关。一般会从初生的深灰色慢慢褪淡为成年的粉红色。很多个体在背部散布有许多细小的灰黑色斑点，老年个体通常全身乳白色。
2. 中华白海豚是中型海豚，身体修长呈纺锤型，喙突出狭长。背鳍较小，位于近中央处，呈后倾三角形。背鳍和驼峰因地理区域而异：在东部水域，背鳍较短，底部宽阔，逐渐向身体倾斜。鳍尖微内弯，驼峰仅占体长的 5%-10%。在西部水域，背鳍较短且更加后弯，但它的底部更宽更长，达到身体长度的 30% 左右。
3. 胸鳍较圆浑，基部较宽，运动极为灵活；尾柄具发达的背脊和腹脊，尾鳍呈水平状，以中央缺刻分成左右对称的两叶，有利于其快速游泳。
4. 眼睛乌黑发亮，很多个体的眼睛周围聚集黑斑，从而形成“熊猫眼”。
5. 上、下颌的每侧都有 29-37 枚圆锥形的同型齿（上颌每侧齿数=30-37 枚；下颌每侧齿数=29-35），齿列稀疏。吻部狭长，长度不到体长的十分之一。喙与额隆之间被一道“V”形沟明显地隔开。
6. 脊椎骨相对较少，椎体较长。

三. 栖息环境：

1. 主要分布于热带和亚热带地区，生活在温暖的水域，一般温度高于 15℃，平均深度为 20 米，很少游到深度超过 25 米的水域。
2. 中华白海豚经常出现在海湾、河口、红树林、沙洲、岩石、珊瑚礁以及大河口和附近的泥洲地区。有时会进入河流和红树林的内陆水道，但很少向上游移动超过几千米，通常停留在潮汐影响范围内。
3. 中华白海豚喜欢栖息在亚热带海区的河口咸淡水交汇水域，分布于从中国东南部经东南亚直到孟加拉湾的沿岸浅海区。

四. 分布范围：

1. 世界范围内：主要分布国家和地区为：孟加拉，文莱，柬埔寨，中国，印度，印度尼西亚，马来西亚，缅甸，菲律宾，新加坡，泰国，越南。
2. 中国范围内：
 1. 主要分布在东南部沿海，最北可达长江口，向南延伸至浙江，福建，台湾，广东，广西和海南沿岸河口水域，有时也会进入江河，甚至黄海北部也偶有记录。
 2. 中华白海豚在全世界分布最集中的区域是中国的珠江口（包括广东深圳，香港和澳门海域），此外在广西的北部湾，厦门的九龙江口，广东湛江等海域也有较大种群分布。

五. 生活习性：

1. 集群：中华白海豚集不成大群，团体往往很小，由少于 10 只组成，但最多可由 25 只组成。通常 3-5 只在一起，或者单独活动。除了母亲及幼豚，白海豚组群不会有固定的成员，它们的群居结构非常有弹性，而组群成员也时常更换。
2. 行为：中华白海豚通常行动要比宽吻海豚慢。它们可以将头抬出水面，并用鳍拍打水面并突破水面。在夏末常做跃水、探头等动作，有时甚至将全身跃出水面近 1 米高。游泳的速度很快，有时可达每小时 12 海里以上。中华白海豚像陆生哺乳动物一样用肺呼吸，呼吸的时间间隔有时为 3-5 秒钟，有时为 10-20 秒，也有时长达 1-2 分钟以上。外呼吸孔呈半月形开放于头额顶端，呼吸时头部与背部露出水面，直接呼吸空气中的氧气，并发出“Chi-Chi-”的喷气声。
3. 定位：中华白海豚眼睛较小，位于头部两侧，眼球黑色，视力较差，其辨别物体的位置和方向主要靠回声定位系统，在鼻孔下有一气囊，靠鼻塞肉的开闭发声，这种声线在前额隆起处一个由脂肪组成的特有器官集中，按一定的频率进行发射；声音碰到不同的物体反射回来的不同频率信号，通过海豚下腭一个由脂肪组成的凹槽

接收，传入内耳进行定位。这个回声定位系统虽然复杂，但反应极其迅速准确，可以测出前面物体的大小、形状、密度结构和属性，并作出判断和反应。但中华白海豚与人类相同，随着年龄增长听力能力逐渐下降。

4. 叫声：通过咔嗒声、口哨声和尖叫声相互交流。经常听到喀哒声，而尖叫声是最不常见的。

5. 食性：中华白海豚主要以丰富的河口鱼类和与珊瑚礁环境相关的鱼类为食，通常在海底附近觅食，也喜欢跟在拖网渔船后觅食和活动。

成年海豚上下颌共有锥型齿 125-135 枚，排列稀疏，其功能不在于咀嚼，而是用于捕食。摄食对象主要是河口的咸淡水鱼类，也食取头足类，不经咀嚼快速吞食。它的食量很大，胃中的食物的重量可达 7 千克以上。

六. 繁殖方式：

1. 每年繁殖一次，但通常在春季和夏季繁殖。

2. 经过 10-12 个月的妊娠期后，雌性通常会产下 1 个身长约为 100 厘米的后代。幼崽在 2 岁左右断奶，但 6 个月后可以吃固体食物了。雌性为幼崽提供大量照顾。幼崽在 2 岁左右断奶，并与母亲在一起 3-4 年。在香港沿岸也观察到了异母喂养。

3. 刚出生的幼仔是雌兽体长的 1/3 左右，背面为灰黑色，腹面为白色并带有粉红色，牙齿尚未露出，吻部生有十多根感觉毛。约 1 年后感觉毛全部脱落，牙齿完全长出。

七. 种群现状

1. 截止 2022 年尚无对全球中华白海豚的数量估计，因为除中国之外的其它分布国，都没有开展过针对中华白海豚的大规模深入监测。中国珠江口的亚种群是全球已知数量最多、研究最透彻的中华白海豚亚种群，其中大陆海域根据 2005-2008 年的监测，共有 2600 余只；而香港海域根据 2013 年的监测共有 80 多只；但该亚种群数量在持续减少。

2. 郝玉江等（2011 年）调查认为中华白海豚较大的种群分布于北部湾（约 150 头）、雷州湾（约 240 头）、珠江口（约 2,500 头）、厦门沿岸（约 80 头）及台湾海峡东部（约 100 头）

3. 2022 年 10 月 20 日中午，在厦门鼓浪屿附近海域记录到近 10 只国家一级保护野生动物中华白海豚集中出游。

4. 2023 年 3 月，在广西防城港海域，“水上大熊猫”中华白海豚再次现身，一对中华白海豚结伴嬉戏的景象被环境监管站出海作业人员拍摄下来。

5. 2024 年 3 月 3 日报道，从国家林草局了解到，经过多年保护，我国珍稀濒危物种数量实现稳中有升，雷州湾白海豚种群稳定壮大。

6. 2025 年 2 月 20 日，广东省清远市清城区在北江石角渡口至清远水利枢纽段发现中华白海豚。

7. 2025 年 7 月，湛江海域的中华白海豚种群传来喜讯，当地“陈氏社群”成功诞下一头幼豚。回看过去一年的数据，深海所研究团队在湛江海域共记录到 12 头中华白海豚新生儿。

8. 2025 年 8 月 15 日是全国生态日，当天，10 头中华白海豚被授予“厦门生态市民”称号。

八. 保护级别：

1. 列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN)2015 年 ver3.1—易危(VU)。

2. 列入《濒危野生动植物种国际贸易公约附录 I、附录 II 和附录 III》(CITES)2019 年版附录 I。

3. 列入中国《国家重点保护野生动物名录》(2021 年 2 月 5 日) 一级。

九. 致危因素：

1. 填海等工程造成的浅海适宜生境退化与丧失

2. 被渔网误伤，船只撞伤

3. 船只和工程造成噪声污染。中华白海豚对声音的感受极为敏感，这些噪声会不时打断中华白海豚个体间正常的声通信。一旦母亲和幼崽的声通信被较长时间中断，幼年海豚将无法生存。

4. 沿海工业和农药造成水质污染

5. 过度捕捞导致渔业枯竭