

百度词条

中华白海豚（学名：*Sousa chinensis*），属于海豚科、白海豚属的海洋哺乳动物。体长2.0-2.5米，最长达2.7米，体重200-285千克。体粗壮，喙中等长，背鳍基部形成增厚的脊，上有近三角形的较大的背鳍，鳍肢和尾叶均宽，均具圆的梢端，标本最大体长约2.6米，下颌前端略超出上颌，喙与额隆间没有深的凹痕为界，背鳍基部形成增厚的脊；尾柄具发达的背脊和腹脊；幼体时为暗灰色，随年龄增长变浅，亚成体灰色和粉红色相杂，成体纯白色，常由于充血而透出粉红色；有些成体的身体上有暗色斑点，少数个体在呼吸孔后的颈部有暗色斑点形成的环。

喜欢栖息在亚热带海区的河口咸淡水交汇水域，生活在浅水区和多岩石处，休息或游玩都会集结在靠近沙滩的海域。其作息通常会与涨潮和日照的时间相配合，晨昏最为活跃，常在潮涨时觅食。食物主要是河口的咸淡水鱼类，也取食头足类，不经咀嚼快速吞食。通常在春季和夏季繁殖。经过10-12个月的妊娠期后，每胎产一仔，初生的幼豚体长约100厘米。

中华白海豚分布于从中国东南部经东南亚直到孟加拉湾的沿岸浅海区主要分布于西太平洋、东印度洋，广布于中国东南部沿海，属于国家一级保护动物，素有“水上大熊猫”之称。

中文名中华白海豚

拉丁学名 *Sousa chinensis*

别 名妈祖鱼、粉红海豚、镇江鱼、太平洋驼海豚

外文名英文 Indo-Pacific Humpback Dolphin, Chinese White Dolphin

法文 Dauphin a bosse de l'Indo-Pacifique

西班牙文 Delfin jorobado del Indo-Pacífico

印尼文 Lumba lumba putih Cina

马来文 Lumba balaq, Parampaun laut

同义学名 *Sousa borneensis* (Lydekker, 1901)

国际濒危等级易危(VU) [1]

中国动物保护等级国家一级保护野生动物 [4]

界动物界

门脊索动物门

纲哺乳纲

目鲸目

科海豚科

属白海豚属

种中华白海豚

亚 门脊椎动物亚门

亚 纲真兽亚纲

亚 目齿鲸亚目

亚 科海豚亚科

亚 种2亚种 [17]

命名者及年代(Osbeck, 1765)

按最新分类法，中华白海豚仅分布于中国、东南亚及孟加拉湾的沿海地区；澳大利亚和新几内亚海域的白海豚，已独立为澳洲白海豚，体型和中华白海豚类似，但体色深灰；南亚和非洲东海岸的白海豚，现独立为印度洋白海豚，其外貌和中华白海豚、澳洲白海豚差异巨大，有明显的驼峰，而且体色偏黑；印度洋白海豚偶尔也记录于中国北部湾地区。2015年，对台湾海峡东部亚群的分类地位进行了评估，并提出代表一个亚种，中华白海豚台湾亚种(*S.chinensis taiwanensis*)。指名亚种(*S.chinensis chinensis*)将适用于该物种中的所有其他动物。这一分类变化在2016年已得到《海洋哺乳动物学会分类委员会》的认可。

中华白海豚是中型海豚，身体修长呈纺锤型，喙突出狭长，刚出生的白海豚约1米长，性成熟个体体长2.0-2.5米，最长达2.7米，体重200-285千克。背鳍较小，位于近中央处，呈后倾三角形；中华白海豚虽然不像印度洋白海豚和大西洋白海豚那样具有显著突起的驼峰，但其背鳍基部也明显增厚，这使得其背鳍基部看起

来很宽。背鳍和驼峰因地理区域而异。在东部水域，背鳍较短，底部宽阔，逐渐向身体倾斜。鳍尖微内弯，驼峰仅占体长的 5%-10%。在西部水域，背鳍较短且更加后弯，但它的底部更宽更长，达到身体长度的 30%左右。

胸鳍较圆浑，基部较宽，运动极为灵活；尾柄具发达的背脊和腹脊，尾鳍呈水平状，以中央缺刻分成左右对称的两叶，有利于其快速游泳。眼睛乌黑发亮，很多个体的眼睛周围聚集黑斑，从而形成“熊猫眼”。上、下颌的每侧都有 29-37 枚圆锥形的同型齿（上颌每侧齿数=30-37 枚；下颌每侧齿数=29-35），齿列稀疏。吻部狭长，长度不到体长的十分之一。喙与额隆之间被一道“V”形沟明显地隔开。脊椎骨相对较少，椎体较长。

[5]中华白海豚的体色随发育阶段和地理区域的不同而有很大差异。一般来说，亚成体呈斑驳的灰粉色，幼体呈深灰色。随着年龄的增长，它们的背鳍上会出现粉红色的白色斑点。在中国周围的水域和东南亚其他地区，个体是纯白色的，通常带有粉红色调。白海豚身上的粉红色并不是色素造成的，而是表皮下的血管所致。这与调节体温有关。一般会从初生的深灰色慢慢褪淡为成年的粉红色。很多个体在背部散布有许多细小的灰黑色斑点，老年个体通常全身乳白色。

栖息环境

播报

主要分布于热带和亚热带地区，生活在温暖的水域，一般温度高于 15℃，平均深度为 20 米，很少游到深度超过 25 米的水域。该物种经常出现在海湾、河口、红树林、沙洲、岩石、珊瑚礁以及大河口和附近的泥洲地区。它们通常会靠近海岸，但如果水深仍然较浅，它们偶尔会冒险走得更远。中华白海豚有时会进入河流和红树林的内陆水道，但很少向上游移动超过几千米，通常停留在潮汐影响范围内。至少在中国和南亚，在远离河口或红树林栖息地的地方很少发现它们。在香港和菲律宾，对它们进行了最深入的研究，它们的整个栖息地都受到珠江（中国第二大河）淡水流的影响。在香港，它们更喜欢在较深的水道中觅食，并且沿着岛屿海岸和天然岩石海岸线以较高的密度出现。常见的是，在珠江口那样的小群体占据的范围为 10 至 400 平方千米。

中华白海豚喜欢栖息在亚热带海区的河口咸淡水交汇水域，分布于从中国东南部经东南亚直到孟加拉湾的沿岸浅海区。中国沿岸的中华白海豚有时进入江河中。珠江口的中华白海豚曾进入珠江到达广州的海珠桥，并曾进入西江约 300 千米之远；厦门附近的曾进入福建省九龙江约 60 千米；闽江口的曾进入闽江 45 千米；东海北部的曾进入江苏省长江段约 220 千米。

生活习性

集群中华白海豚不集成大群，较大的群体通常与拖网渔船相关。团体往往很小，由少于 10 只组成，但最多可由 25 只组成。通常 3-5 只在一起，或者单独活动。群体由各个年龄段的个体组成，尽管群体中的二分之一到三分之二通常是成体，牢固的社会联系似乎并不常见。除了母亲及幼豚，白海豚组群不会有固定的成员。它们的群居结构非常的有弹性，而组群的成员也时常更换。根据记录，十余只的集群非常少，平均为 4 只。在食物丰富的海域，有时也可记录到 30-40 只聚集在一起，比如珠江口伶仃洋曾记录过 44 只的集群。

行为

中华白海豚比其他海豚更加神秘，它们看起来不那么顽皮，通常行动要比宽吻海豚慢。它们可以将头抬出水面，并用鳍拍打水面并突破水面。在夏末常做跃水、探头等动作，乘浪不常见到。

性情活泼，在风和日丽的天气，常在水面跳跃嬉戏，有时甚至将全身跃出水面近 1 米高。游泳的速度很快，有时可达每小时 12 海里以上。在各种渔船中，中华白海豚特别喜欢在拖网渔船后活动和觅食，而在拖网渔船后的海豚组群也比其他的大很多。常在拖网浮子前的 100-200 米处看到它们。跟随渔船的活动可超过 2 小时。中华白海豚与陆生哺乳动物一样用肺呼吸，呼吸的时间间隔有时为 3-5 秒钟，有时为 10-20 秒，也有时长达 1-2 分钟以上。外呼吸孔呈半月形开放于头额顶端，呼吸时头部与背部露出水面，直接呼吸空气中的氧气，并发出“Chi-Chi-”的喷气声。

定位

中华白海豚眼睛较小，位于头部两侧，眼球黑色，视力较差，其辨别物体的位置和方向主要靠回声定位系统，在鼻孔下有一气囊，靠鼻塞肉的开闭发声，这种声线在前额隆起处一个由脂肪组成的特有器官集中，按一定的频率进行发射；声音碰到不同的物体反射回来的不同频率信号，通过海豚下腭一个由脂肪组成的凹槽接收，传入内耳进行定位。这个回声定位系统虽然复杂，但反应极其迅速准确，可以测出前面物体的大小、形状、密度结构和属性，并作出判断和反应。

叫声

该物种通过咔嗒声、口哨声和尖叫声相互交流。经常听到喀哒声，而尖叫声是最不常见的，并且仅在超过 4 或 5 只的群体中观察到。

食性

中华白海豚主要以丰富的河口鱼类和与珊瑚礁环境相关的鱼类为食。它们通常在海底附近觅食。一些群体随着潮水上涨而进食。也会跟随拖网渔船，以废弃的生物为食。

成年海豚上下颌共有锥形齿 125-135 枚，排列稀疏，其功能不在于咀嚼，而是用于捕食。摄食对象主要是河口的咸淡水鱼类，也取食头足类，不经咀嚼快速吞食。解剖分析海豚的胃含物发现，其主要捕食的种类包括棘头梅童鱼、凤鲚、银鲳、斑鰹、青鳞鱼、舌鳎、鲻鱼、长勒鱼、乌鲳、叫姑鱼、龙头鱼、大黄鱼及棱鳀等中小型鱼类。它的食量很大，胃中的食物的重量可达 7 千克以上。