

NAMIBIA · 1-14 DE NOVIEMBRE DE 2026

Fauna de Etosha

Guía de campo · 83 especies de toda la ruta

31 mamíferos · **28** aves · **11** reptiles · **4** de costa y roca · **9** bichos

Cuatro noches **dentro del parque**

Okaukuejo · 9 nov — **Halali** · 10 nov — **Namutoni** · 11 y 12 nov

Final de la estación seca: la fauna, concentrada en las charcas

Fotografías de Wikimedia Commons, todas con licencia libre (CC BY / CC BY-SA):
autoría y licencia de cada una, bajo la foto y en los créditos del final.

Los rasgos de identificación son descriptivos; lo específico de Etosha va con su fuente.

Cada ficha lleva el nombre en castellano, el científico y el inglés —el de los carteles del parque— y los rasgos que sirven para distinguirla *en el campo*.

El safari, en corto: dormís **dentro** las cuatro noches. Las puertas siguen al sol y cambian cada semana: para vuestras fechas, **06:13-19:06** del 3 al 9 y **06:10-19:10** del 10 al 16 — *trece horas de parque al día*, casi dos más que en invierno. Dentro, **60 km/h** (20 en los campamentos) y **solo se puede bajar del coche dentro de los campamentos**.

La táctica que funciona no es conducir: es esperar. Elegid una charca, apagad el motor, bajad la voz y dadle tiempo — la fauna llega por turnos. En seca, **mediodía es bueno para elefante** y primera y última hora para león. De noche no se circula: la única forma es el **safari nocturno guiado de NWR (N\$750 ≈ €38 p.p.)**, pero las **tres charcas iluminadas** se ven andando desde la parcela.

OBRAS **Aviso de obras:** están asfaltando la pista Okaukuejo-Halali-Namutoni. En 2025 el tráfico iba desviado por **Gemsbokvlakte** con la puerta de Okaukuejo hacia Halali cerrada, y en 2026 seguía habiendo bypass. **Reconfirmad con NWR al reservar** (+264 67 229 800). Lado bueno: el desvío pasa por Sueda-Salvadora-Charitsaub, el mejor tramo de borde de pan para guepardo y león.



Elefante africano de sabana

Loxodonta africana · African bush elephant

El mayor animal terrestre. Orejas enormes con forma de África y dos «dedos» en la punta de la trompa. Los de Etosha se ven blanquecinos: se rebozan en el polvo calcáreo del pan.

ETOSHA **Nebrownii, Olifantsbad, Kalkheuwel, Tsumcor y Homob**, y a **mediodía**, que es cuando llegan a bañarse. Los de aquí tienen los colmillos gastados de cavar buscando agua.

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Rinoceronte negro

Diceros bicornis · Black rhinoceros

El labio superior es **puntiagudo y prensil** —ramonea arbustos—, la cabeza va alta y lleva dos cuernos. Solitario y de genio corto. Se distingue del blanco por el labio, nunca por el color.

ETOSHA **Charca iluminada de Okaukuejo, de noche:** seguramente el mejor sitio de África para verlo. También en Halali. Etosha tiene la mayor población del mundo de la subespecie suroccidental.

Foto: AfricanConservation · CC BY-SA 4.0



Rinoceronte blanco

Ceratotherium simum · White rhinoceros

Labio **ancho y cuadrado** para pacer hierba, cabeza baja y joroba en la nuca. Más grande y más sociable que el negro. Lo de «blanco» viene de *wijd* (ancho) en afrikáans.

ETOSHA Se extinguió aquí y lo reintrodujeron en 1995: hoy es **apenas una docena**. Se cita de vez en cuando en Springbokfontein. No cuenten con verlo.

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0




León

Panthera leo · Lion

Melena en el macho, pardo uniforme. Con calor pasa el día tumbado a la sombra: la actividad es al alba, al anochecer y de noche.

ETOSHA Okondeka es la mejor (manada residente), y luego Chudop, Rietfontein, Nebrownii y Ombika. Primera y última hora. Ojo: **usan las pistas como caminos**.

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Leopardo

Panthera pardus · Leopard

Rosetas **sin punto central**, cuerpo bajo y macizo, cola larguísima. Nocturno y arborícola: el más difícil de ver de los grandes.

ETOSHA Halali/Moringa y Goas son las dos mejores apuestas del parque; también Ngobib, Kalkheuwel y Klein Namutoni. La charca iluminada de Halali es famosa por él.

Foto: Sumeet Moghe · CC BY-SA 4.0



Guepardo

Acinonyx jubatus · Cheetah

Manchas **simples**, no rosetas, y dos «lágrimas» negras del ojo a la boca. Silueta esbelta de galgo con cabeza pequeña. Caza de día, a plena luz.

ETOSHA Llanura abierta del borde de la pan: **Salvadora, Sueda, Charitsaub, Batia y Okerfontein**. De día, que es cuando caza — su presa aquí es el springbok.

Foto: AfricanConservation · CC BY-SA 4.0



Jirafa angoleña

Giraffa giraffa angolensis · Angolan giraffe

La subespecie del suroeste, de manchas irregulares que se desvanecen hacia las patas. Al beber tiene que abrir las patas en compás: su momento más vulnerable, y el mejor para la foto.

ETOSHA En cualquier charca abierta y, de noche, en la iluminada de Okaukuejo. Batia y Kalkheuwel la tienen habitual.

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Cebra de Burchell

Equus quagga burchellii · Burchell's zebra

La cebra de llanura: rayas **anchas** que siguen hasta la barriga, con «rayas de sombra» pardas intercaladas. Es la que forma manadas en las charcas.

ETOSHA Por todo el parque, en las llanuras del borde de la pan. **En noviembre siguen concentradas**: no vuelven al oeste hasta finales de diciembre.

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 3.0



Cebra de montaña de Hartmann

Equus zebra hartmannae · Hartmann's mountain zebra

Rayas **finas y apretadas**, barriga blanca sin rayar, papada colgante y una «parrilla» de rayas horizontales en la grupa. De terreno rocoso y escarpado.

ETOSHA **OJO** En esta ruta **NO la veréis**. En Etosha vive solo en las lomas de dolomita del **extremo oeste** (Dolomite, Galton Gate), no en el eje Okaukuejo-Namutoni.

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 4.0



Órix o gemsbok

Oryx gazella · Gemsbok

Cuernos rectos como lanzas —en el macho y en la hembra— y máscara facial en blanco y negro. Aguanta sin beber; es el emblema del país y sale en el escudo de Namibia.

ETOSHA Charcas abiertas: Olifantsbad, Kalkheuwel, King Nehale. Aguanta el calor mejor que nadie, así que se ve a horas en que el resto se esconde.

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Springbok

Antidorcas marsupialis · Springbok

Banda castaña que separa el lomo del vientre blanco, y una cresta de pelo blanco en la grupa que abre al saltar. Da botes rígidos con el lomo arqueado: el *pronking*.

ETOSHA Por todas partes en llanura abierta, y en Okaukuejo llegan **en manada por la tarde**. Es la presa principal del guepardo.

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Gran kudú

Tragelaphus strepsiceros · Greater kudu

El macho lleva cuernos en espiral y una uve blanca entre los ojos; el costado, rayas verticales finas. **Salta vallas altísimas: es el gran peligro de la carretera al anochecer.**

ETOSHA Zonas arboladas y charcas con monte alrededor: Chudop, Rietfontein, Groot Okevi. Al anochecer, ojo en la carretera.

Foto: L0k1m0nk33 at English Wikipedia · CC BY-SA 3.0



Eland común

Taurotragus oryx · Common eland

El antílope más grande y pesado, de aspecto casi bovino: papada colgante y cuernos rectos con una espiral en la base.

ETOSHA Chudop es la charca donde se cita. Escaso y arisco: no es un avistamiento fácil.

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 4.0



Ñu azul

Connochaetes taurinus · Blue wildebeest

Morro cuadrado, crin y barba oscuras, cuernos que bajan y vuelven a subir. Silueta desconcertante: toro por delante, caballo por detrás.

ETOSHA Grandes manadas mixtas con cebra en **Goas y Batia**.

Foto: Muhammad Mahdi Karim · GFDL 1.2



Impala de cara negra

Aepyceros melampus petersi · Black-faced impala

Subespecie endémica del noroeste de Namibia y el suroeste de Angola: como la impala común, pero con una franja negra bien marcada en la cara. Escasa y protegida.

ETOSHA Lo primero que se ve entrando por **Von Lindequist**. Klein Namutoni, Chudop, Kalkheuwel, Goas y Olifantsbad — están donde las soltaron en los 70 y en 30 años se han movido 31 km.

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Dik-dik de Damara

Madoqua damarensis · Damara dik-dik

Antílope diminuto, a la altura de la rodilla, con trompita móvil y un penacho de pelo en la frente. Casi siempre en pareja y pegado al monte espeso.

ETOSHA Casi garantizado en el **Dik-dik Drive**, el bucle nada más entrar por Von Lindequist, y en Klein Namutoni. Primera hora de la mañana y última de la tarde.

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 3.0



Hiena manchada

Crocuta crocuta · Spotted hyena

Pelaje moteado, cuello grueso, **orejas redondas** y lomo caído hacia atrás. Es la que se oye de noche desde la tienda.

ETOSHA Charcas iluminadas, y al amanecer en King Nehale, Chudop y Nebrownii. Es la hiena por defecto: ~340 en el sistema Etosha-Kunene.

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Hiena parda

Parahyaena brunnea · Brown hyena

Melena larga y desgredada de pelo oscuro y **orejas puntiagudas**. Mucho más rara y esquiva que la manchada; verla es un premio.

ETOSHA Está en el parque, pero **dala por improbable**: nocturna, solitaria y sin densidad publicada. Cruza desde Ongava a buscar comida.

Foto: Bernard DUPONT from FRANCE · CC BY-SA 2.0



Chacal de lomo negro

Lupulella mesomelas · Black-backed jackal

La «silla de montar» negra y plateada sobre el lomo, y orejas grandes. Omnipresente en las charcas y desvergonzado en los campamentos.

ETOSHA En todas las charcas, y merodeando los campamentos al anochecer a por las sobras.

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Ratel o tejón de la miel

Mellivora capensis · Honey badger

Manto gris claro desde la cabeza hasta la cola sobre cuerpo negro. Pequeño, bajo, y con una fama de temerario que se ha ganado a pulso.

Foto: Sumeet Moghe · CC BY-SA 4.0



Facóquero

Phacochoerus africanus · Common warthog

Verrugas en la cara y colmillos curvos hacia arriba. Corre con la cola tiesa como una antena y **se arrodilla sobre los codos** para pacer.

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Suricata

Suricata suricatta · Meerkat

De pie, haciendo de centinela sobre un montículo. **OJO Ojo: NO es de Etosha** — vive en el Kalahari y el sur del país, así que en esta ruta no toca. Va aquí porque todo el mundo la busca.

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Alcélafo rojo

Alcelaphus buselaphus caama · Red hartebeest

Cara larguísima y estrecha, cuernos en forma de arpa montados sobre un pedúnculo, y grupa muy caída. Color rojizo brillante al sol.

ETOSHA Llanuras abiertas del este; se cita en la charca de King Nehale, en Namutoni.

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 3.0



Steenbok

Raphicerus campestris · Steenbok

Pequeño, rojizo y con orejas enormes; solo el macho lleva cuernos, cortos y rectos. Se queda clavado mirándote y sale disparado en zigzag.

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 3.0



Zorro orejudo

Otocyon megalotis · Bat-eared fox

Orejas descomunales que usa de radar para **oír insectos bajo tierra**. En pareja o en grupillo familiar, trotando por la llanura al amanecer y al atardecer.

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 3.0



Jineta de manchas pequeñas

Genetta genetta · Small-spotted genet

Cuerpo alargado de gato, pelaje moteado y **cola anillada larguísima**. Nocturna y trepadora: la típica sombra que cruza el foco del campamento cuando cenáis.

Foto: Frédéric SALEIN · CC BY-SA 2.0



Puercoespín del Cabo

Hystrix africaeaustralis · Cape porcupine

El roedor grande de África, cubierto de **púas blancas y negras**. Nocturno; a menudo se ven solo las púas que va perdiendo por el camino.

ETOSHA De noche, en la charca iluminada de Halali: es uno de los visitantes habituales junto con el leopardo.

Foto: Steven Lek · CC BY-SA 4.0



Liebre saltadora

Pedetes capensis · Springhare

Ni liebre ni canguro, pero lo parece: **salta a dos patas** y sus ojos devuelven un reflejo rojo intenso a la linterna. Es de lo más visto en el safari nocturno.

Foto: Bernard DUPONT from FRANCE · CC BY-SA 2.0



Klipspringer o saltarrocas

Oreotragus oreotragus · Klipspringer

Antilopito de los roquedos: se sostiene **de puntillas, sobre las pezuñas**, en piedras imposibles. Casi siempre en pareja y quieto, mirándote desde arriba. Damaraland y Twyfelfontein.

Foto: Munificent · CC BY 2.5



Mangosta amarilla

Cynictis penicillata · Yellow mongoose

Rojiza-amarillenta, con la **punta de la cola blanca** y aire de zorrillo. Es la mangosta que de verdad se ve en Etosha, de día y junto a sus madrigueras.

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Oricteropo o cerdo hormiguero

Orycteropus afer · Aardvark

El premio gordo del safari nocturno: orejas de burro, hocico de cerdo y cola de canguro. **Estrictamente nocturno y rarísimo de ver** — sus excavaciones en los termiteros sí se ven por todas partes.

Foto: Kelly Abram · CC BY 4.0

Aves

28 especies

Con el coche parado en una charca, las aves llenan las esperas. Estas son las que **se ven sin ser ornitólogo**: grandes, ruidosas o de color imposible.



Avestruz común

Struthio camelus · Common ostrich

El ave más grande del mundo. El macho, negro y blanco; la hembra, parda. En Etosha se ven cruzando la llanura abierta.

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 4.0



Avutarda kori

Ardeotis kori · Kori bustard

Una de las aves voladoras más pesadas que existen. Camina por la llanura con paso solemne; en exhibición el macho hincha el cuello como un globo blanco.

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Secretario

Sagittarius serpentarius · Secretarybird

Rapaz de patas larguísimas que **caza andando** y mata serpientes a pisotones. Las plumas negras de la nuca le dan el nombre, como plumas de escribiente tras la oreja.

Foto: Sumeet Moghe · CC BY-SA 4.0



Carraca lila

Coracias caudatus · Lilac-breasted roller

La postal de África: pecho lila, garganta azul y alas turquesa que estallan al volar. Se posa a la vista, en un poste o una rama seca.

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Cálao de pico amarillo sureño

Tockus leucomelas · Southern yellow-billed hornbill

Pico grande, curvo y **amarillo**. Confiado y muy presente en los campamentos, donde vigila las mesas del desayuno.

ETOSHA En los tres campamentos, vigilando las mesas del desayuno.

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Cálao de pico rojo sureño

Tockus rufostris · Southern red-billed hornbill

Idéntico en forma al anterior, pero con el pico **rojo**. Los dos conviven en la misma zona: mira el pico y ya está.

ETOSHA Igual que el amarillo: campamentos y bordes de pista.

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Tejedor republicano

Philetairus socius · Sociable weaver

Se ve **el nido antes que el pájaro**: pajares colectivos gigantes que engullen un árbol o un poste de la luz y que ocupan generaciones enteras.

ETOSHA En Okaukuejo, a diez metros de la charca: hay un nido enorme junto al agua y dos más en el camping. Dentro viven halcones pigmeos y agapornis de cara rosa.

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Águila marcial

Polemaetus bellicosus · Martial eagle

La mayor águila de África: capucha oscura y pecho blanco moteado. Suele estar posada, inmóvil, en lo alto de una acacia.

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Buitre dorsiblanco africano

Gyps africanus · White-backed vulture

El buitre común de la sabana. El dorso pálido que le da nombre solo se le ve bien en vuelo.

Foto: Yathin sk · CC BY-SA 3.0



Flamenco enano

Phoeniconaias minor · Lesser flamingo

Más pequeño y más intensamente rosa que el común, con el pico oscuro de lejos. Todo depende de que haya agua: sin pan inundada, no hay flamencos.

ETOSHA **OJO** En noviembre no están aquí: la pan está seca. Solo crían cuando llueve por encima de 400 mm — pasó **tres veces en cuarenta años**. Los tuyos están en **Walvis Bay**.

Foto: Sumita Roy Dutta · CC BY-SA 4.0



Grulla azul

Grus paradisea · Blue crane

Gris azulada, con la cabeza abultada y unas largas plumas alares que arrastra como una cola. Elegantísima y, aquí, rareza.

ETOSHA Andoni, al norte de Namutoni, es el sitio. Pero quedaban **19 aves en 2021** —eran 138 en los 70—: es la población más aislada del mundo, a 1.200 km de la siguiente.

Foto: Ron Knight from Seaford, East Sussex, United Kingdom · CC BY 2.0



Ganga namaqua

Pterocles namaqua · Namaqua sandgrouse

Cola muy puntiaguda; llega a las charcas en bandos y a horas fijas. El macho **empapa las plumas del vientre** para llevarles agua a los pollos.

Foto: Yathin sk · CC BY-SA 3.0



Sisón negro norteño

Afrotis afraoides · Northern black korhaan

El macho es negro con grandes parches blancos en el ala; se delata con un chillido metálico al levantar el vuelo.

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Azor lagartijero claro

Melierax canorus · Pale chanting goshawk

Gris claro, con patas y cera del pico **rojas**. Casi siempre posado en un poste, oteando el suelo.

Foto: Hans Stieglitz · CC BY-SA 3.0



Alcaudón de pecho carmesí

Laniarius atrococcineus · Crimson-breasted shrike

Negro por arriba y **rojo intenso** por abajo: imposible de confundir. Se mueve por dentro del matorral espeso.

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0




Búho lácteo de Verreaux

Bubo lacteus · Verreaux's eagle-owl

El búho más grande de África, con **párpados rosados** que se le ven al parpadear. En los árboles grandes de los campamentos.

ETOSHA En los árboles grandes **dentro de los campamentos** — mira arriba al volver de cenar.

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 3.0




Abejaruco europeo

Merops apiaster · European bee-eater

El mismo que cría en España y pasa aquí el invierno nuestro: verde, castaño y amarillo, con antifaz negro. Caza al vuelo desde una rama seca y vuelve al mismo posadero.

ETOSHA **Sí está en vuestras fechas:** llega en octubre y en noviembre se registra en el parque. Caza al vuelo desde ramas secas y postes.

Foto: Andy Morffew from Itchen Abbas, Hampshire, UK · CC BY 2.0



Cigüeña de Abdim

Ciconia abdimii · Abdim's stork

Cigüeña pequeña y oscura, de patas grises con las «rodillas» rojas. La llaman la cigüeña de la lluvia porque sigue a los frentes — aquí eso significa **bien entrada la temporada**, no noviembre.

ETOSHA **OJO** En noviembre, no. En Etosha es ave de **febrero y marzo**: en noviembre su tasa de registro es cero. Va aquí para que no la busquéis en balde.

Foto: Gediminas · CC BY-SA 3.0




Estornino brillante del Cabo

Lamprotornis nitens · Cape starling

Azul verdoso metálico con el ojo naranja. En los campamentos, siempre atento a las migas de la mesa.

ETOSHA En los campamentos, a por las migas.

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Pigargo vocinglero

Ichthyophaga vocifer · African fish eagle

Cabeza blanca y pecho castaño; su reclamo es, literalmente, el sonido de África. Necesita agua abierta, así que aquí depende del pan y de las charcas grandes.

ETOSHA Depende de que haya agua abierta: la zona de **Fischer's Pan**, en el este, es donde tiene sentido buscarlo.

Foto: Derek Keats from Johannesburg, South Africa · CC BY 2.0




Pelícano blanco común

Pelecanus onocrotalus · Great white pelican

Enorme y blanco, con el pico de bolsa amarillenta. Pesca en grupo en la laguna de **Walvis Bay**, y en el muelle se posan a un metro de la gente.

ETOSHA No en Etosha: en la **laguna de Walvis Bay** (D5-D6), donde pesca en grupo.

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Águila volatinera o bateleur

Terathopius ecaudatus · Bateleur

En vuelo **no se le ve cola**: es una tabla negra con la cabeza roja, y se balancea de lado a lado planeando. De los rapaces más reconocibles del parque.

ETOSHA Se cita sobre **Kalkheuwel**, junto con el milano. Etosha reúne unas 40 rapaces, casi el 70 % de las de Namibia.

Foto: Derek Keats from Johannesburg, South Africa · CC BY 2.0



Buitre orejudo

Torgos tracheliotos · Lappet-faced vulture

El buitre grande y feo, de **cabeza rosada desnuda** y pico enorme: es el que abre la piel del cadáver y deja comer al resto. Manda en la carroña.

Foto: Yathin sk · CC BY-SA 3.0




Flamenco común

Phoenicopterus roseus · Greater flamingo

Más grande y más pálido que el enano, con el pico rosa de punta negra —el del enano se ve oscuro entero—. Los dos comparten la laguna de Walvis Bay.

ETOSHA **OJO** Lo mismo: **la pan está seca en noviembre**. En cambio en **Walvis Bay el máximo va de junio a noviembre** — allí sí, y en cantidad.

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Cormorán del Cabo

Phalacrocorax capensis · Cape cormorant

Azulado oscuro con la cara amarilla. Vuela en **cintas larguísimas a ras del agua** frente a la costa; en Walvis Bay hay plataformas construidas para su guano.

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 4.0




Charrán damara

Sternula balaenarum · Damara tern

Charrán pequeño con **gorra negra completa** y pico negro. Cría casi solo en la costa namibia y es **especie amenazada**: si veis un nido en la grava de la costa, ni acercarse.

Foto: Ron Knight from Seaford, East Sussex, United Kingdom · CC BY 2.0



Ostrero africano

Haematopus moquini · African oystercatcher

Negro entero con **pico y patas rojo intenso**. De la costa rocosa; no llega a diez mil individuos en el mundo entero.

Foto: Dane Pajmans] · CC BY-SA 3.0



Francolín de pico rojo

Pternistis adspersus · Red-billed spurfowl

El «pollo» ruidoso de los campamentos: pardo con **pico y patas rojos**. Os despertará al amanecer, sin falta.

ETOSHA En los campamentos. **Os despertará al amanecer**, sin falta.

Foto: Yathin sk · CC BY-SA 3.0

Las tres primeras son seguridad, no coleccionismo. Dormís once noches en tienda y andáis por Sossusvlei y Damaraland: lo útil no es distinguirlas de lejos, es **saber qué NO hacer**. Nunca metas la mano donde no ves, **mira dónde pisas al anochecer** —que es cuando salen a la pista tibia—, linterna para ir al baño, y si te encuentras una, **quédate quieto y retrocede**: casi todas las mordeduras pasan al intentar matarlas o cogerlas.

Las otras ocho son de las que apetece ver: el **camaleón que corre**, el **gecko translúcido** de las dunas y el **agama naranja** de las rocas de Damaraland.



Víbora bufadora

Bitis arietans · Puff adder

Gruesa, corta y con galones en uve por el lomo. **No huye: se queda quieta confiando en su camuflaje**, y de ahí que se le atribuyan la mayoría de mordeduras graves del continente. Mira dónde pisas al anochecer y nada de andar descalzo por el campamento.

Foto: Danny S. · CC BY-SA 4.0



Cobra escupidora cebra

Naja nigricincta · Zebra spitting cobra

Del suroeste africano, con bandas oscuras. **Escupe el veneno a los ojos** a varios metros y con puntería. Si levanta el cuerpo y abre la capucha, retrocede despacio: nunca la acorrales.

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 3.0




Mamba negra

Dendroaspis polylepis · Black mamba

Larga, delgada y **gris oliva** —lo negro es el interior de la boca, no la piel—. Rapidísima y nerviosa, pero esquiva: lo normal es no verla. La peor fama de África, y en buena parte merecida.

Foto: TimVickers · Public domain




Víbora de Péringuey

Bitis peringueyi · Perringuey's adder

Diminuta, de la arena del Namib. **Se entierra dejando fuera solo los ojos** y se desplaza de lado. Suya es la huella en zigzag que aparece en las dunas por la mañana.

Foto: Jay Iwasaki · CC BY 2.0



Víbora cornuda

Bitis caudalis · Horned adder

Un «cuerno» escamoso sobre cada ojo. Se entierra en la arena o la grava del desierto y espera. Pequeña, pero con veneno de verdad.

Foto: Chantelle Bosch · CC BY-SA 4.0



Camaleón del Namib

Chamaeleo namaquensis · Namaqua chameleon

El camaleón que **corre por el suelo del desierto** en vez de trepar. Cambia de color para regular su temperatura: oscuro de mañana para calentarse, pálido al mediodía. La estrella de los tours de «desierto vivo» de Swakopmund.

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 3.0



Gecko palmeado del Namib

Pachydactylus rangei · Web-footed gecko

Translúcido, con **membranas entre los dedos** que le hacen de raqueta sobre la arena y unos ojos enormes de nocturno. No tiene párpados: se limpia los ojos con la lengua.

Foto: Stefan.Kuemmell at German Wikipedia
(Original text: Stefan Kümmel) · CC BY-SA 3.0



Agama de roca de Namibia

Agama planiceps · Namibian rock agama

El macho no se puede pasar por alto: **cabeza y cuello naranja encendido** sobre cuerpo azul violáceo. Toma el sol en lo alto de los peñascos de granito.

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Varano de roca

Varanus albigularis · Rock monitor

Lagarto grande y robusto, de lengua bífida, que se ve cruzando pistas o rondando las charcas. Inofensivo si no lo arrinconas.

Foto: Bernard DUPONT from FRANCE · CC BY-SA 2.0



Tortuga leopardo

Stigmochelys pardalis · Leopard tortoise

La tortuga terrestre grande del sur de África, con el caparazón moteado como un felino. **Cruza las carreteras muy despacio**: es de lo que más se atropella, así que ojo al asfalto.

Foto: Bernard DUPONT from FRANCE · CC BY-SA 2.0



Lagarto de nariz de pala

Meroles anchietae · Shovel-snouted lizard

El lagarto de las dunas. El hocico en forma de pala le sirve para «**nadar**» **dentro de la arena**, y hace el baile térmico: levanta las patas por parejas para no quemarse.

Foto: Ryan van Huyssteen · CC BY-SA 4.0

La costa, la roca y la arena

4 especies

Etosha no es toda la fauna del viaje. Esto es lo que veréis **fuera del parque**: en **Cape Cross** (D7), en la laguna de **Walvis Bay** (D5-D6), en los roquedos de Damaraland y en la arena del Namib — incluidos los tres bichos pequeños que explican cómo se sobrevive en un desierto de niebla.



Lobo marino del Cabo

Arctocephalus pusillus · Cape fur seal

En **Cape Cross** hay una de las mayores colonias del mundo: decenas de miles a la vista y oyéndose desde lejos. Aviso serio: **el olor es parte de la visita** — llevad pañuelo.

ETOSHA Cape Cross, D7. Una de las mayores colonias del mundo.

Foto: JJ Harrison (<https://www.jjharrison.com.au/>) · CC BY-SA 3.0



Delfín de Heaviside

Cephalorhynchus heavisidii · Heaviside's dolphin

Pequeño y rechoncho, con el dorso oscuro en forma de cono. **Endémico de la corriente de Benguela**: no vive en ninguna otra parte del mundo. Salta girando sobre sí mismo.

ETOSHA Frente a Walvis Bay, en las salidas en barco (D5-D6).

Foto: Joachim Huber from Switzerland · CC BY-SA 2.0



Damán roquero

Procavia capensis · Rock hyrax

Parece un roedor gordo, pero su pariente vivo más cercano es **el elefante**. En colonias sobre los roquedos, tomando el sol a primera hora.

Foto: Naturedata · CC0



Ardilla terrestre del Cabo

Xerus inauris · Cape ground squirrel

En el suelo, con la **cola en abanico sobre el lomo haciendo de sombrilla**. Vive en colonias junto a sus madrigueras y es de lo más visible en las llanuras de Etosha.

Foto: Derek Keats from Johannesburg, South Africa · CC BY 2.0

Bichos: los que de verdad te vas a encontrar

9 especies

En un viaje de camping, **estos los ves seguro** — más que al leopardo. Van aquí por tres motivos distintos: los que hay que **respetar** (escorpión), los que dan un susto y son **inofensivos** (solífugo, shongololo), y los que explican cómo funciona este desierto (el escarabajo que bebe niebla, la termita que construye).

Y uno que no es anécdota: el mosquito. Es, de largo, el animal más peligroso de la ruta — la profilaxis y el repelente están en **`03`**.



Escarabajo de la niebla

Onymacris unguicularis · Fog-basking beetle

El bicho que **bebe niebla**: sube a lo alto de la duna de madrugada y **hace el pino** para que la humedad condense en su caparazón y le resbale hasta la boca.

Foto: Виктор Пинчук · CC BY-SA 4.0



Escorpión de cola gruesa

Parabuthus villosus · Black hairy thick-tailed scorpion

Grande y negro, con la **cola gruesa**. Regla de oro: cola gruesa y pinzas finas = veneno potente; pinzas grandes y cola fina = poco peligro. **Sacude las botas cada mañana** y no dejes ropa en el suelo.

Foto: RichardMcJimsey · CC BY-SA 4.0



Araña blanca del Namib

Leucorchestris arenicola · Dancing white lady spider

Araña blanca y grande de las dunas, cazadora nocturna. El macho recorre cientos de metros por la noche buscando hembra y **«tamborilea» en la arena** para comunicarse — de ahí lo de *dancing white lady*.

Foto: Frank Jeurissen Tcf0908 · CC BY-SA 4.0



Termita constructora

Macrotermes michaelseni · Termita

No la verás a ella: verás **su edificio**. Los termiteros de metros de alto salpican toda la ruta, orientados para ventilarse solos. Son también las sospechosas del misterio de los **círculos de hadas** (*están en el cuaderno de joyas ocultas*).

Foto: Andrew Deacon · CC0



Escarabajo pelotero

Scarabaeus satyrus · Dung beetle

Modela una bola de estiércol más grande que él y la empuja **de espaldas y en línea recta**. Esta especie se orienta de noche **por la Vía Láctea** — se le comprobó tapándole la vista del cielo.

Foto: Udo Schmidt from Deutschland · CC BY-SA 2.0



Solífugo o araña camello

Solifugae · Sun spider / camel spider

Ni araña ni escorpión: parece las dos cosas y **no es venenoso**. Corre como una bala hacia tu linterna —no hacia ti— y por eso asusta tanto en el campamento. Muerde si lo agarras: no lo agarras.

Foto: NathanScientific · CC0



Gusano de mopane

Gonimbrasia belina · Mopane worm

La oruga a rayas que devora los mopanes... y que en el norte se come **frita con tomate y chili**: es proteína seria y la venden en los mercados (*ver el manual de intendencia*).

Foto: SAplants · CC BY-SA 4.0



Milpiés gigante o shongololo

Archispirostreptus gigas · Giant African millipede

Milpiés negro y brillante del grosor de un dedo. **Inofensivo**: se enrosca en espiral si lo tocas. Aparece a montones tras las primeras lluvias.

Foto: Bjørn Christian Tørrissen · CC BY-SA 3.0



Mosquito anofeles

Anopheles · Anopheles mosquito

Se posa con **el cuerpo inclinado**, en ángulo con la piel, y pica de noche. Sin dramatismo: **es el animal más peligroso del viaje** — Etosha es zona de malaria (*profilaxis, en la guía de preparación*). Repelente al anochecer y manga larga.

Foto: Jim Gathany · Public domain

Créditos de las fotografías

Todas las imágenes proceden de **Wikimedia Commons** y se reproducen bajo licencia libre **CC BY** o **CC BY-SA**, que exigen citar autor y licencia — es lo que hace esta lista. Los textos de licencia: creativecommons.org/licenses/by/2.0 · creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0 · creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

- **Elefante africano de sabana** — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · http://commons.wikimedia.org/wiki/File:178_Male_African_bush_elephant_in_Etosha_National_Park_Photo_by_Giles_Laurent.jpg
- **Rinoceronte negro** — AfricanConservation, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Rhino_at_Working_with_Wildlife.jpg
- **Rinoceronte blanco** — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:109_Male_White_rhinoceros_walking_in_the_Kalahari_Desert_of_Namibia_Photo_by_Giles_Laurent.jpg
- **León** — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:020_The_lion_king_Snyggve_in_the_Serengeti_National_Park_Photo_by_Giles_Laurent.jpg
- **Leopardo** — Sumeet Moghe, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:African_leopard_male_\(cropped\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:African_leopard_male_(cropped).jpg)
- **Guepardo** — AfricanConservation, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Male_cheetah_facing_left_in_South_Africa.jpg
- **Jirafa angoleña** — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:106_Angolan_giraffe_walking_in_the_Kalahari_Desert_of_Namibia_Photo_by_Giles_Laurent.jpg
- **Cebra de Burchell** — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equus_quagga_burchellii_-_Etosha,_2014.jpg
- **Cebra de montaña de Hartmann** — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equus_zebra_hartmannae_-_Etosha_2015.jpg
- **Órix o gemsbok** — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gemsbok_\(Oryx_gazella\)_male.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gemsbok_(Oryx_gazella)_male.jpg)
- **Springbok** — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:174_Male_Springbok_in_Etosha_National_Park_Photo_by_Giles_Laurent.jpg
- **Gran kudú** — L0k1m0nk33 at English Wikipedia, *CC BY-SA 3.0* · http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Male_greater_kudu.jpg
- **Eland común** — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taurotragus_oryx_-_young_bull_-_Etosha_2015.jpg
- **Ñu azul** — Muhammad Mahdi Karim, *GFDL 1.2* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blue_Wildebeest,_Ngorongoro.jpg
- **Impala de cara negra** — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Impala_\(Aepyceros_melampus\)_male_Kruger.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Impala_(Aepyceros_melampus)_male_Kruger.jpg)
- **Dik-dik de Damara** — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 3.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Madoqua_kirkii_-_male_\(Namutoni\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Madoqua_kirkii_-_male_(Namutoni).jpg)
- **Hiena manchada** — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spotted_hyena_\(Crocuta_crocuta\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spotted_hyena_(Crocuta_crocuta).jpg)
- **Hiena parda** — Bernard DUPONT from FRANCE, *CC BY-SA 2.0* · [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brown_Hyena_\(Hyaena_brunnea\)_leaving_waterhole_..._\(50915531592\)_crop.jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brown_Hyena_(Hyaena_brunnea)_leaving_waterhole_..._(50915531592)_crop.jpg)
- **Chacal de lomo negro** — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:135_Black-backed_jackal_hunting_for_fod_at_Cape_cross_Photo_by_Giles_Laurent.jpg
- **Ratel o tejón de la miel** — Sumeet Moghe, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Honey_Badger.jpg
- **Facóquero** — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Southern_warhog_\(Phacochoerus_africanus_sundevallii\)_male.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Southern_warhog_(Phacochoerus_africanus_sundevallii)_male.jpg)
- **Suricata** — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meerkat_\(Suricata_suricatta\)_Tswalu.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meerkat_(Suricata_suricatta)_Tswalu.jpg)
- **Alcélafo rojo** — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 3.0* · <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2011-Red-Hartebeest.jpg>
- **Steenbok** — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 3.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raphicerus_campestris_male_\(Etosha,_2012\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raphicerus_campestris_male_(Etosha,_2012).jpg)
- **Zorro orejado** — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otocyon_megalotis_-_Etosha_2014.jpg
- **Jineta de manchas pequeñas** — Frédéric SALEIN, *CC BY-SA 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_female_common_genet_in_the_dining_room,_Satao_Camp,_Tsavo_East.jpg
- **Puercoespín del Cabo** — Steven Lek, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hystrix_africaeauralis_Blijdorp_Rotterdam.JPG
- **Liebre saltadora** — Bernard DUPONT from FRANCE, *CC BY-SA 2.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spring_Hare_\(Pedetes_capensis\)__\(6042009463\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spring_Hare_(Pedetes_capensis)__(6042009463).jpg)
- **Klipspringer o saltarrocas** — Munificent, *CC BY 2.5* · <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klipspringer.jpg>
- **Mangosta amarilla** — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:082_Yellow_mongoose_in_Khomas_Region_Photo_by_Giles_Laurent.jpg
- **Oricteropo o cerdo hormiguero** — Kelly Abram, *CC BY 4.0* · http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orycteropus_afer_175359469.jpg
- **Avestruz común** — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Struthio_camelus_-_Etosha_2014_\(3\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Struthio_camelus_-_Etosha_2014_(3).jpg)
- **Avutarda kori** — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kori_bustard_\(Ardeotis_kori_kori\)_male.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kori_bustard_(Ardeotis_kori_kori)_male.jpg)
- **Secretario** — Sumeet Moghe, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Secretary_bird_Mara_for_WC.jpg
- **Carraca lila** — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:143_Lilac-breasted_roller_in_Etosha_National_Park_Photo_by_Giles_Laurent.jpg
- **Cálao de pico amarillo sureño** — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:155_Southern_yellow-billed_hornbill_in_Etosha_National_Park_Photo_by_Giles_Laurent.jpg
- **Cálao de pico rojo sureño** — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Southern_red-billed_hornbill_\(Tockus_rufirostris\)_male,_crop.jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Southern_red-billed_hornbill_(Tockus_rufirostris)_male,_crop.jpg)
- **Tejedor republicano** — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sociable_weaver_\(Philetairus_socius\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sociable_weaver_(Philetairus_socius).jpg)
- **Águila marcial** — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martial_eagle_\(Polemaetus_belllicosus\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martial_eagle_(Polemaetus_belllicosus).jpg)
- **Buitre dorsiblanco africano** — Yathin sk, *CC BY-SA 3.0* · <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-white-backed-vulture.jpg>
- **Flamenco enano** — Sumita Roy Dutta, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flock_of_Lesser_Flamingo_along_with_juvenile_near_Jamnagar_railway_stationDSCN1798_1.jpg
- **Grulla azul** — Ron Knight from Seaford, East Sussex, United Kingdom, *CC BY 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grus_pardisea_Etosha_1.jpg
- **Ganga namaqua** — Yathin sk, *CC BY-SA 3.0* · <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-namaqua-sandgrouse-male.jpg>
- **Sisón negro norteño** — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Northern_black_korhaan_\(Afrotis_afraoides\)_male.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Northern_black_korhaan_(Afrotis_afraoides)_male.jpg)

- **Azor lagartijero claro** — Hans Stieglitz, *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Melierax_canorus-01.jpg
- **Alcaudón de pecho carmesí** — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · http://commons.wikimedia.org/wiki/File:161_Crimson-breasted_shrike_in_Otjondjupa_Region_Photo_by_Giles_Laurent.jpg
- **Búho lácteo de Verreaux** — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 3.0* · <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-giant-eagle-owl.jpg>
- **Abejaruco europeo** — Andy Morffew from Itchen Abbas, Hampshire, UK, *CC BY 2.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bee-eater_\(19270331108\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bee-eater_(19270331108).jpg)
- **Cigüeña de Abdim** — Gediminas, *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ciconia_abdimii_London_Zoo-8a.jpg
- **Estornino brillante del Cabo** — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · http://commons.wikimedia.org/wiki/File:159_Cape_starling_in_Etoshanational_Park_Photo_by_Giles_Laurent.jpg
- **Pigargo vocinglero** — Derek Keats from Johannesburg, South Africa, *CC BY 2.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:African_fish_eagle,_Haliaeetus_vocifer,_at_Chobe_National_Park,_Botswana_\(33516612831\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:African_fish_eagle,_Haliaeetus_vocifer,_at_Chobe_National_Park,_Botswana_(33516612831).jpg)
- **Pelícano blanco común** — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Great_white_pelican_\(Pelecanus_onocrotalus\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Great_white_pelican_(Pelecanus_onocrotalus).jpg)
- **Águila volatinera o bateleur** — Derek Keats from Johannesburg, South Africa, *CC BY 2.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bat_aleur_-_Kruger_National_park_\(37161617713\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bat_aleur_-_Kruger_National_park_(37161617713).jpg)
- **Buitre orejudo** — Yathin sk, *CC BY-SA 3.0* · <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-lappet-faced-vulture.jpg>
- **Flamenco común** — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:010_Greater_flamings_male_and_female_in_the_Camargue_during_mating_season_Photo_by_Giles_Laurent.jpg
- **Cormorán del Cabo** — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phalacrocorax_capensis_-_Namib_2013.jpg
- **Charrán damara** — Ron Knight from Seaford, East Sussex, United Kingdom, *CC BY 2.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Damar_a_Tern_\(8077271589\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Damar_a_Tern_(8077271589).jpg)
- **Ostrero africano** — Dane Pajmans], *CC BY-SA 3.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:African_Black_Oystercatcher_\(2\).JPG](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:African_Black_Oystercatcher_(2).JPG)
- **Francolín de pico rojo** — Yathin sk, *CC BY-SA 3.0* · <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2011-red-billed-francolin.jpg>
- **Víbora bufadora** — Danny S., *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bitis_arietans_by_Danny_S._1.JPG
- **Cobra escupidora cebra** — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Naja_nigricincta_nigricincta.jpg
- **Mamba negra** — TimVickers, *Public domain* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dendroaspis_polylepis_\(14\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dendroaspis_polylepis_(14).jpg)
- **Víbora de Péringuey** — Jay Iwasaki, *CC BY 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Namibian_Sidewinder_Bitis_peringueyi.jpg
- **Víbora cornuda** — Chantelle Bosch, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bitis_caudalis00a.jpg
- **Camaleón del Namib** — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 3.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chamaeleo_namaquensis_\(Walvis_Bay\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chamaeleo_namaquensis_(Walvis_Bay).jpg)
- **Gecko palmeado del Namib** — Stefan Kuemmel at German Wikipedia (Original text: Stefan Kummel), *CC BY-SA 3.0* · <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pachydactylus-rangei.jpg>
- **Agama de roca de Namibia** — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Namib_rock_agama_\(Agama_planiceps\)_male.jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Namib_rock_agama_(Agama_planiceps)_male.jpg)
- **Varano de roca** — Bernard DUPONT from FRANCE, *CC BY-SA 2.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:White-throated_Monitor_\(Varanus_albigularis\)_32184691034.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:White-throated_Monitor_(Varanus_albigularis)_32184691034.jpg)
- **Tortuga leopardo** — Bernard DUPONT from FRANCE, *CC BY-SA 2.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leopard_Tortoise_\(Stigmochelys_pardalis\)_17331907085.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leopard_Tortoise_(Stigmochelys_pardalis)_17331907085.jpg)
- **Lagarto de nariz de pala** — Ryan van Huyssteen, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Merole_anchietae_345390261.jpg
- **Lobo marino del Cabo** — JJ Harrison (<https://www.jjharrison.com.au/>), *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arctocephalus_pusillus_-_SE_Tasmania.jpg
- **Delfín de Heaviside** — Joachim Huber from Switzerland, *CC BY-SA 2.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dolphins_at_L%C3%BCderitz,_Namibia_\(3144863196\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dolphins_at_L%C3%BCderitz,_Namibia_(3144863196).jpg)
- **Damán roquero** — Naturedata, *CC0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rock_hyrax_Serengeti_National_Park.jpg
- **Ardilla terrestre del Cabo** — Derek Keats from Johannesburg, South Africa, *CC BY 2.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cape_ground_squirrel,_Xerus_inauris,_at_Krugerdsorp_Game_Reserve,_Gauteng,_South_Africa_\(27410204561\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cape_ground_squirrel,_Xerus_inauris,_at_Krugerdsorp_Game_Reserve,_Gauteng,_South_Africa_(27410204561).jpg)
- **Escarabajo de la niebla** — Виктор Пинчук, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Onymacris_unguicularis_\(Sudan\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Onymacris_unguicularis_(Sudan).jpg)
- **Escorpión de cola gruesa** — RichardMcJmsey, *CC BY-SA 4.0* · http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parabuthus_villosus.jpg
- **Araña blanca del Namib** — Frank Jeurissen Tcf0908, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leucorchestris_arenicola.jpg
- **Termita constructora** — Andrew Deacon, *CC0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macrotermes_michaelseni.jpg
- **Escarabajo pelotero** — Udo Schmidt from Deutschland, *CC BY-SA 2.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scarabaeus_satyrus_\(Boheman,_1860\)_3847992837_\(2\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scarabaeus_satyrus_(Boheman,_1860)_3847992837_(2).jpg)
- **Solífugo o araña camello** — NathanScientific, *CC0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solifuge_in_Trinidad,_Colorado,_July_2026.jpg
- **Gusano de mopane** — SAPlants, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colophospermum_mopane_50D_0486.jpg
- **Milpiés gigante o shongololo** — Bjørn Christian Tørrissen, *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archispirostreptus_gigas-Amphitheatre.jpg
- **Mosquito anofeles** — Jim Gathany, *Public domain* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anopheles_stephensi.jpeg

Fuentes de lo específico de Etosha

- **Horarios de puerta:** tabla oficial *Etosha National Park Gates Opening & Closing Time* (3–9 nov 06:13–19:06 · 10–16 nov 06:10–19:10). Cambian cada semana y están puestas en cada puerta.
- **Reglamento del parque** (60 km/h, 20 en campamentos, prohibido bajar del coche fuera de los campamentos, prohibido salir de las pistas): *Park Regulations* de NWR/MEFT.
- **Rinoceronte negro:** MEFT (ficha de Etosha) y NWR confirman león, elefante y rinoceronte negro de noche en Okaukuejo. Lo de «mayor población mundial» es de la *subespecie suroccidental*: WWF sitúa el 72 % de la población nacional en Etosha.
- **Impala de cara negra:** UICN (Vulnerable, endémica de Kaokoveld y suroeste de Angola) y Matson 2006 — cinco subpoblaciones que coinciden con los cinco puntos de suelta de los años 70.
- **Grulla azul:** Craig 2017 (*Bull. B.O.C.*) y el Namibia Crane Working Group — 19 aves en el censo de noviembre de 2021, y 1.200 km hasta la población sudafricana.
- **Flamencos:** NASA Earth Observatory (la pan seca en diciembre, inundada en enero), Simmons 1996 (tres eventos de cría en 40 años) y BirdLife (umbral de 400 mm). Máximos de Walvis Bay de junio a noviembre: SABAP1.
- **Migradores:** tasas de registro mensuales de SABAP2 / African Bird Atlas filtradas a Etosha. Ahí se ve que el abejaruco carmesí tiene *cero* registros en el parque y que la cigüeña de Abdim es de febrero-marzo.
- **Cebra de montaña:** |Uiseb 2024 — en Etosha está restringida a las lomas de dolomita del oeste; la de llanura, por todo el parque.

- **Dik-dik:** Travel News Namibia (Dik-dik Drive) y registros de GBIF: ~206 en la cuadrícula de Namutoni frente a 4 en Okaukuejo.
- **Obras de la carretera:** nota de prensa del MEFT de abril de 2025 y seguimiento de prensa de 2026. **Sin nota oficial posterior: hay que llamar a NWR antes de ir.**
- **Charcas:** Expert Africa, etosha.org, Roxanne Reid y etoshanationalpark.co.za — secundarias, pero coincidentes entre sí.
- **Sin dato (y no se rellena):** la hora punta nocturna del rinoceronte en Okaukuejo, el número absoluto de rinocerontes del parque, la orientación solar de cada charca y la frecuencia real de la hiena parda.