

NAMIBIA · 31 DE OCTUBRE – 14 DE NOVIEMBRE DE 2026

# Fauna del viaje

*Guía de campo · 88 especies de toda la ruta*

33 mamíferos · 30 aves · 11 reptiles · 5 la costa, la roca y la arena · 9 bichos

Cuatro noches **dentro del parque**

**Okaukuejo** · 9 nov — **Halali** · 10 nov — **Namutoni** · 11 y 12 nov

Final de la estación seca: la fauna, concentrada en las charcas

Fotografías de Wikimedia Commons, todas con licencia libre:  
autoría y licencia bajo cada foto y en los créditos del final.

Los rasgos de identificación son descriptivos; lo específico de Etosha va con su fuente.

# Cómo se usa esta guía

Cada ficha lleva el nombre en castellano, el científico y el inglés —el de los carteles del parque—, la foto **sin recortar** (*los cuernos, el cuello y la cola se ven enteros, que es lo que sirve para identificar*) y los rasgos que distinguen a la especie *en el campo*. Debajo, dónde y cuándo verla, y cuántas quedan cuando hay una cifra publicada que citar.

La línea de arriba de cada ficha dice qué posibilidades hay. Cuando pone «82 % lo vio» es literal: viajeros que declararon una o más observaciones durante su estancia en el campamento (partes de Expert Africa —Okaukuejo 149 · Halali 48 · Namutoni 16). La unidad es la estancia, no el día ni el viaje: una o dos noches. La cifra grande junta los tres campamentos y detrás va cada uno. Y como aquí se duerme en los tres (*Okaukuejo 1 noche, Halali 1, Namutoni 2*) son tres tiradas: en las cuatro noches la posibilidad real es más alta que cualquiera de estos números. Cuánto más, no lo dicen estos datos, así que no se dice.

Eso solo existe para trece especies. Para las otras setenta y cinco va un índice de registros de GBIF: cuánto pesa la especie dentro de los registros de su grupo en la zona en octubre y noviembre —4.529 de mamífero y 69.600 de ave solo en Etosha—. Mide lo que se registra, no lo que se ve: por eso dice frecuente o escasa, nunca «lo vas a ver».

Los dos sesgos, por delante: los partes los rellenan viajeros y hay confusiones —un 14 % declara antílope sable en Okaukuejo, y en Etosha no hay sable—; y a GBIF nadie sube el chacal número doscientos ni casi nada nocturno, así que la liebre saltadora sale con cero registros siendo de lo que más enseñan los guías en el nocturno. Cada cifra lleva detrás su muestra: con cuatro registros no se afirma nada.

## Cómo funciona el parque

El safari, en corto: dormís dentro las cuatro noches. Las puertas siguen al sol y cambian cada semana: para vuestras fechas, 06:13–19:06 del 3 al 9 y 06:10–19:10 del 10 al 16 —trece horas de parque al día, casi dos más que en invierno. Dentro, 60 km/h (20 en los campamentos) y solo se puede bajar del coche dentro de los campamentos.

La táctica que funciona no es conducir: es esperar. Elegid una charca, apagad el motor, bajad la voz y dadle tiempo —la fauna llega por turnos. En seca, mediodía es bueno para elefante y primera y última hora para león. De noche no se circula: la única forma es el safari nocturno guiado de NWR (N\$750 ≈ €38 p.p.), pero las tres charcas iluminadas se ven andando desde la

parcela. Y de día, en esta ruta la salida de mañana se hace guiada desde cada campamento (N\$650 ≈ €33 p.p., decidido el 08/08): los traslados entre campamentos van con el 4x4 propio.

**OBRAS** Aviso de obras — confirmado que os afecta: están asfaltando la pista Okaukuejo–Halali–Namutoni y la nota oficial del MEFT de 2026 fija un desvío OBLIGATORIO por la pista de Gembokvlakte del 2 de junio de 2026 a julio de 2027 — vuestra ventana cae de lleno. Las charcas accesibles del tramo son Gembokvlakte, Sueda y Salvadora —el mejor borde de pan para guepardo y león—; Nebrownii y Kapupuhedi quedan fuera por la obra. Son ~108 km en vez de ~70. Reconfirmad con NWR al reservar (+264 67 229 800).

## La ropa

El día tiene dos climas y hay que vestir para los dos. Okaukuejo en noviembre promedia 37,1 °C de máxima y 18,9 °C de mínima ● (NOAA GHCN, serie completa — está en el 01): se sale de la tienda con forro a las cinco y media y a las once sobran las capas. Por capas y sin discusión.

- **Colores apagados** ○ — caqui, oliva, arena, gris. El blanco se ve a un kilómetro y a la media hora es beige del polvo calcáreo del pan; los colores fuertes cantan en una charca donde todo es ocre.
- **Manga larga y pantalón largo al anochecer** ● — no es por elegancia: Etosha es zona de malaria y el anofeles pica de noche (*profilaxis y repelente, en el 04*).
- **Sombrero de ala ancha y gafas de sol** ○, que se usan los quince días. Y un **buff**: en la pista de gravilla el polvo entra por todas partes.
- **Calzado cerrado** ○ fuera de la parcela. Las sandalias son para la ducha y para la silla, no para andar por el campamento al anochecer.
- **Nada que cruja**. ○ Un chubasquero rígido dentro de un coche en silencio se oye más que la conversación.

La lista de equipaje completa, con cantidades y casillas para tachar, está en el 17. Esto de aquí es solo lo del safari.

## Lo que va a mano, no en el maletero

En una charca no se sale del coche. Todo lo que haga falta en las tres horas siguientes tiene que estar dentro del habitáculo antes de aparcar.

- ☐ **Prismáticos, uno por persona** ○ — compartir unos prismáticos en una charca es pelearse.

- ☐ **4 L de agua por persona y día, en el habitáculo** ● (regla del 06) — no en el maletero de atrás, que es donde no se llega.
- ☐ **Esta guía y un lápiz.** Marcar lo que se ve, en el momento: al tercer día no te acuerdas.
- ☐ **Frontal con luz roja** ○ — para el campamento de noche. La luz blanca deslumbra y atrae bichos a la cara.
- ☐ **Trapo de microfibra** ○: el polvo del pan se pega al objetivo y a los prismáticos en cuanto abres la ventanilla.
- ☐ **Efectivo** para las tasas de parque, y **bolsa de basura:** en las charcas no hay papeleras.
- ☐ **Cargador de 12 V y batería externa.** Una jornada de charca con el móvil haciendo de cámara se come la batería antes de comer.

## Cómo se caza un avistamiento

### La táctica no es conducir. Es esperar.

El error del primer día es hacer kilómetros buscando animales. En seca la fauna **viene al agua:** quien se queda quieto en una charca ve más que quien recorre el parque entero. La regla de la casa: **elegid una charca y dadle tres cuartos de hora** ○ antes de decidir que no pasa nada.

- **Salid con la puerta** — con el guiado de la mañana o por vuestra cuenta en los traslados. Las dos primeras horas y las dos últimas concentran casi todo lo que merece la pena; a mediodía, en cambio, es cuando llega el **elefante** a bañarse.
- **Motor apagado, ventanillas abajo, voz baja.** ○ Media hora sin ruido cambia lo que se acerca. Y el motor parado quita la vibración de las fotos.
- **Aparcad de lado y sin tapar.** ○ El coche de al lado lleva media hora esperando: no le cruces por delante ni te pares donde le tapes.
- **Mirad a los demás animales.** ○ Cebras y springboks quietos mirando todos al mismo punto, o un chillido de francolín, valen más que rastrear el horizonte: el depredador lo delatan ellos.
- **De noche, las tres charcas iluminadas.** Okaukuejo, Halali y Namutoni las tienen a un paseo de la parcela, y son gratis: la del rinoceronte es la de Okaukuejo.

## Y esto no es consejo: es norma

- **60 km/h en el parque y 20 en los campamentos.** ●

- **Solo se puede bajar del coche dentro de los campamentos.** ● En una charca, ni un pie fuera — tampoco para la foto.
- **Prohibido salirse de las pistas.** ●
- **Dentro antes de que cierre la puerta.** ● Los horarios siguen al sol y cambian cada semana; para estas fechas, **06:13–19:06** del 3 al 9 de noviembre y **06:10–19:10** del 10 al 16. Están puestos en cada puerta.
- **No se da de comer a nada.** ● Ni al chacal del campamento, ni al cálao del desayuno.

*Reglamento de NWR/MEFT — las fuentes, al final de esta guía.*

## Fotos sin trípode

- **Apoya en la ventanilla,** con una sudadera doblada haciendo de saco. ○ El trípode dentro del coche no sirve para nada.
- **Dispara al amanecer y al atardecer** ○: a mediodía la luz es plana y el aire caliente sobre la costra del pan tiembla y desenfoca a distancia.
- **No pidas la foto perfecta el primer día.** ○ Son cuatro noches dentro del parque: la jirafa abriéndose de patas para beber llega sola.

## Lo que da sustos y lo que de verdad hace daño

Trece noches en tienda. Lo que hay que interiorizar cabe en cuatro líneas: **sacude las botas cada mañana** ○, **mira dónde pisas al anochecer** —la pista tibia es donde se ponen las serpientes—, **linterna para ir al baño**, y si te encuentras una, **quieto y hacia atrás:** casi todas las mordeduras pasan al intentar matarla o cogerla.

Y el orden real de peligro no es el que uno se imagina: el animal más peligroso de la ruta es el **mosquito**, y el segundo, el **kudú cruzando la carretera al anochecer**. El león no está en la lista.

Treinta y tres fichas, de lo que se ve en todas las charcas a lo que hay que tener suerte para cruzarse. El orden no es alfabético: es el de siempre — primero los grandes.



**Elefante africano de sabana**  
*Loxodonta africana* · African bush elephant

**96 % LO VIO** Okaukuejo 97 % · Halali 93 % · Namutoni 94 % · 205 estancias

El mayor animal terrestre. Orejas enormes con forma de África y dos «dedos» en la punta de la trompa. Los de Etosha se ven blanquecinos: se rebozan en el polvo calcáreo del pan.

**DÓNDE** Olifantsbad, Kalkheuwel, Tsumcor y Homob (*Nebrownii*, su clásica, queda cerrada por las obras en vuestras fechas), y a mediodía, que es cuando llegan a bañarse. Los de aquí tienen los colmillos gastados de cavar buscando agua.

**CUÁNTOS** 2.911 ± 697 en el parque en el censo aéreo de 2015, y creciendo ~1,75 % al año desde 1998. 🕒

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



**Rinoceronte negro**  
*Diceros bicornis* · Black rhinoceros

**82 % LO VIO** Okaukuejo 87 % · Halali 73 % · Namutoni 55 % · 192 estancias

El labio superior es puntiagudo y prensil —ramonea arbustos—, la cabeza va alta y lleva dos cuernos. Solitario y de genio corto. Se distingue del blanco por el labio, nunca por el color.

**DÓNDE** Charca iluminada de Okaukuejo, de noche: seguramente el mejor sitio de África para verlo. También en Halali. Etosha tiene la mayor población del mundo de la subespecie suroccidental.

**CUÁNTOS** Namibia tiene ~2.200 (2023), más de un tercio de todos los de África, y más del 70 % de los namibios están aquí: es la mayor población de rinoceronte negro de un solo espacio protegido del mundo. 🕒 El número exacto del parque no se publica, y es a propósito: furtivismo. 🕒

Foto: AfricanConservation · CC BY-SA 4.0



**Rinoceronte blanco**  
*Ceratotherium simum* · White rhinoceros

**39 % LO VIO** Okaukuejo 40 % · Halali 38 % · Namutoni 31 % · 175 estancias

Labio ancho y cuadrado para pacer hierba, cabeza baja y joroba en la nuca. Más grande y más sociable que el negro. Lo de «blanco» viene de *wijd* (ancho) en afrikáans.

**DÓNDE** Se extinguió aquí y lo reintrodujeron en 1995: hoy es apenas una docena. Se cita de vez en cuando en Springbokfontein. 🕒 El 39 % de los partes que dice haberlo visto no cuadra con una docena de animales en 22.000 km²: la mayor parte tiene que ser rinoceronte negro mal identificado. Mira el labio, no el color. No cuentes con verlo.

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



## León

*Panthera leo* · Lion


**70 % LO VIO** Okaukuejo 68 % · Halali 75 % · Namutoni 64 % · 191 estancias

Melena en el macho, pardo uniforme. Con calor pasa el día tumbado a la sombra: la actividad es al alba, al anochecer y de noche.

**DÓNDE** Okondeka es la mejor (manada residente), y luego Chudop, Rietfontein y Ombika (*Nebrownii*, *cerrada por las obras en vuestras fechas*). Primera y última hora. Ojo: **usan las pistas como caminos**.

**CUÁNTOS** 335 en el censo de 2018; entre 300 y 400 de forma estable desde los noventa. Fueron 500 en 1980 y 150 en 1952. 🟡

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



## Leopardo

*Panthera pardus* · Leopard

**12 % LO VIO** Okaukuejo 5 % · Halali 31 % · Namutoni 15 % · 163 estancias

Rosetas **sin punto central**, cuerpo bajo y macizo, cola larguísima. Nocturno y arborícola: el más difícil de ver de los grandes.

**DÓNDE** Halali/Moringa y Goas son las dos mejores apuestas del parque; también Ngobib, Kalkheuwel y Klein Namutoni. La charca iluminada de Halali es famosa por él.

Foto: Sumeet Moghe · CC BY-SA 4.0



## Guepardo

*Acinonyx jubatus* · Cheetah

**19 % LO VIO** Okaukuejo 18 % · Halali 10 % · Namutoni 50 % · 169 estancias

Manchas **simples**, no rosetas, y dos «lágrimas» negras del ojo a la boca. Silueta esbelta de galgo con cabeza pequeña. Caza de día, a plena luz.

**DÓNDE** Llanura abierta del borde de la pan: **Salvadora, Sueda, Charitsaub, Batia y Okerfontein**. De día, que es cuando caza — su presa aquí es el springbok.

Foto: AfricanConservation · CC BY-SA 4.0



## Jirafa angoleña

*Giraffa giraffa angolensis* · Angolan giraffe

**98 % LO VIO** Okaukuejo 99 % · Halali 93 % · Namutoni 100 % · 208 estancias

La subespecie del suroeste, de manchas irregulares que se desvanecen hacia las patas. Al beber tiene que abrir las patas en compás: su momento más vulnerable, y el mejor para la foto.

**DÓNDE** En cualquier charca abierta y, de noche, en la iluminada de Okaukuejo. Batia y Kalkheuwel la tienen habitual.

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



## Cebra de Burchell

*Equus quagga burchellii* · Burchell's zebra

**98 % LO VIO** Okaukuejo 97 % · Halali 98 % · Namutoni 100 % · 208 estancias

La cebra de llanura: rayas **anchas** que siguen hasta la barriga, con «rayas de sombra» pardas intercaladas. Es la que forma manadas en las charcas.

**DÓNDE** Por todo el parque, en las llanuras del borde de la pan. **En noviembre siguen concentradas**: no vuelven al oeste hasta finales de diciembre. (*La cebra de montaña de Hartmann vive solo en las lomas del extremo oeste — fuera de vuestro eje: la que vedis es esta.*)

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 3.0



## Órix o gemsbok

*Oryx gazella* · Gemsbok

**96 % LO VIO** Okaukuejo 97 % · Halali 93 % · Namutoni 100 % · 203 estancias

Cuernos rectos como lanzas —en el macho y en la hembra— y máscara facial en blanco y negro. Aguanta sin beber; es el emblema del país y sale en el escudo de Namibia.

**DÓNDE** Charcas abiertas: Olifantsbad, Kalkheuwel, King Nehale. Aguanta el calor mejor que nadie, así que se ve a horas en que el resto se esconde.

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



### Springbok

*Antidorcas marsupialis* · Springbok

**MUY FRECUENTE** 16,2 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (733 de 4.529)

Banda castaña que separa el lomo del vientre blanco, y una cresta de pelo blanco en la grupa que abre al saltar. Da botes rígidos con el lomo arqueado: el *pronking*.

**DÓNDE** Por todas partes en llanura abierta, y en Okaukuejo llegan en manada por la tarde. Es la presa principal del guepardo.

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



### Eland común

*Taurotragus oryx* · Common eland

**45 % LO VIO** Okaukuejo 47 % · Halali 33 % · Namutoni 73 % · 175 estancias

El antílope más grande y pesado, de aspecto casi bovino: papada colgante y cuernos rectos con una espiral en la base.

**DÓNDE** Chudop es la charca donde se cita. Escaso y arisco: no es un avistamiento fácil.

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 4.0



### Impala de cara negra

*Aepyceros melampus petersi* · Black-faced impala

**MUY FRECUENTE** 3,0 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (137 de 4.529)

**Subespecie endémica** del noroeste de Namibia y el suroeste de Angola: como la impala común, pero con una franja negra bien marcada en la cara. Escasa y protegida.

**DÓNDE** Lo primero que se ve entrando por Von Lindequist. Klein Namutoni, Chudop, Kalkheuwel, Goas y Olifantsbad — están donde las soltaron en los 70 y en 30 años se han movido 31 km.

**CUÁNTOS** Quedan menos de 4.000 en el mundo —las estimaciones bailan entre 1.000 y 4.300— y la mayoría está aquí, de los ~200 que soltaron en los años setenta. UICN: Vulnerable. 🟡

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



### Gran kudú


*Tragelaphus strepsiceros* · Greater kudu

**MUY FRECUENTE** 4,8 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (218 de 4.529)

El macho lleva cuernos en espiral y una uve blanca entre los ojos; el costado, rayas verticales finas. Salta vallas altísimas: es el gran peligro de la carretera al anochecer.

**DÓNDE** Zonas arboladas y charcas con monte alrededor: Chudop, Rietfontein, Groot Okevi. Al anochecer, ojo en la carretera.

Foto: L0k1m0nk33 at English Wikipedia · CC BY-SA 3.0



### Ñu azul

*Connochaetes taurinus* · Blue wildebeest

**94 % LO VIO** Okaukuejo 94 % · Halali 91 % · Namutoni 100 % · 204 estancias

Morro cuadrado, crin y barba oscuras, cuernos que bajan y vuelven a subir. Silueta desconcertante: toro por delante, caballo por detrás.

**DÓNDE** Grandes manadas mixtas con cebra en Goas y Batia.

Foto: Buiobuione · CC BY-SA 4.0



### Dik-dik de Damara

*Madoqua damarensis* · Damara dik-dik

**FRECUENTE** 1,6 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (72 de 4.529)

Antílope diminuto, a la altura de la rodilla, con trompita móvil y un penacho de pelo en la frente. Casi siempre en pareja y pegado al monte espeso.

**DÓNDE** El sitio fiable es el Dik-dik Drive, el bucle nada más entrar por Von Lindequist (~206 registros frente a 4 en Okaukuejo), y Klein Namutoni. Primera hora de la mañana y última de la tarde.

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 3.0



### Hiena manchada

*Crocuta crocuta* · Spotted hyena

**55 % LO VIO** Okaukuejo 54 % · Halali 56 % · Namutoni 62 % · 176 estancias

Pelaje moteado, cuello grueso, **orejas redondas** y lomo caído hacia atrás. Es la que se oye de noche desde la tienda.

**DÓNDE** Charcas iluminadas, y al amanecer en King Nehale y Chudop (*Nebrownii*, cerrada por obras). Es la hiena por defecto: ~340 en el sistema Etosha-Kunene.

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



### Chacal de lomo negro


*Lupulella mesomelas* · Black-backed jackal

**MUY FRECUENTE** 4,5 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (203 de 4.529)

La «silla de montar» negra y plateada sobre el lomo, y orejas grandes. Omnipresente en las charcas y desvergonzado en los campamentos.

**DÓNDE** En todas las charcas, y merodeando los campamentos al anochecer a por las sobras.

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



### Alcélafo rojo

*Alcelaphus buselaphus caama* · Red hartebeest

**MUY FRECUENTE** 3,2 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (144 de 4.529)

Cara larguísima y estrecha, cuernos en forma de arpa montados sobre un pedúnculo, y grupa muy caída. Color rojizo brillante al sol.

**DÓNDE** Llanuras abiertas del este; se cita en la charca de King Nehale, en Namutoni.

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 3.0



### Hiena parda

*Parahyaena brunnea* · Brown hyena

**18 % LO VIO** Okaukuejo 22 % · Halali 8 % · Namutoni 14 % · 165 estancias

Melena larga y desgredada de pelo oscuro y **orejas puntiagudas**. Mucho más rara y esquiva que la manchada; verla es un premio.

**DÓNDE** Está en el parque, pero dala por improbable: nocturna, solitaria y sin densidad publicada. Cruza desde Ongava a buscar comida. Que un 18 % de los partes diga haberla visto choca con eso: **orejas puntiagudas y melena** o es la manchada.

Foto: Bernard DUPONT from FRANCE · CC BY-SA 2.0



### Ratel o tejón de la miel

*Mellivora capensis* · Honey badger

**REGULAR** 0,4 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (18 de 4.529)

Manto gris claro desde la cabeza hasta la cola sobre cuerpo negro. Pequeño, bajo, y con una fama de temerario que se ha ganado a pulso.

Foto: Sumeet Moghe · CC BY-SA 4.0



### Steenbok

*Raphicerus campestris* · Steenbok

**FRECUENTE** 2,3 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (105 de 4.529)

Pequeño, rojizo y con orejas enormes; solo el macho lleva cuernos, cortos y rectos. Se queda clavado mirándote y sale disparado en zigzag.

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 3.0



### Facóquero

*Phacochoerus africanus* · Common warthog

**FRECUENTE** 1,4 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (65 de 4.529)

Verrugas en la cara y colmillos curvos hacia arriba. Corre con la cola tiesa como una antena y se arrodilla sobre los codos para pacer.

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



### Zorro orejudo

*Otocyon megalotis* · Bat-eared fox

**REGULAR** 0,5 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (21 de 4.529)

Orejas descomunales que usa de radar para oír insectos bajo tierra. En pareja o en grupillo familiar, trotando por la llanura al amanecer y al atardecer.

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 3.0



### Jineta de manchas pequeñas

*Genetta genetta* · Small-spotted genet

**APENAS REGISTRADA** 4 registros en Etosha en oct-nov: muestra corta para decir más

Cuerpo alargado de gato, pelaje moteado y cola anillada larguísima. Nocturna y trepadora: la típica sombra que cruza el foco del campamento cuando cenáis.

Foto: Frédéric SALEIN · CC BY-SA 2.0



### Puercoespín del Cabo

*Hystrix africaeaustralis* · Cape porcupine

**APENAS REGISTRADA** 1 registro en Damaraland en oct-nov: muestra corta para decir más

El roedor grande de África, cubierto de púas blancas y negras. Nocturno; a menudo se ven solo las púas que va perdiendo por el camino.

**DÓNDE** De noche, en la charca iluminada de Halali: las guías del parque lo citan entre los visitantes habituales junto con el leopardo — GBIF, en cambio, apenas lo registra: es nocturno, como la liebre saltadora.

Foto: Steven Lek · CC BY-SA 4.0



### Liebre saltadora

*Pedetes capensis* · Springhare

**SIN REGISTROS** ninguno de los 4.529 registros de su grupo en Etosha en oct-nov es suyo

Ni liebre ni canguro, pero lo parece: salta a dos patas y sus ojos devuelven un reflejo rojo intenso a la linterna. Los guías la enseñan casi cada nocturno — aunque GBIF ni la registre: nada nocturno se sube.

Foto: Bernard DUPONT from FRANCE · CC BY-SA 2.0



### Klipspringer o saltarrocas

*Oreotragus oreotragus* · Klipspringer

**APENAS REGISTRADA** 4 registros en Damaraland en oct-nov: muestra corta para decir más

Antilopito de los roquedos: se sostiene de puntillas, sobre las pezuñas, en piedras imposibles. Casi siempre en pareja y quieto, mirándote desde arriba. Damaraland y Twyfelfontein.

Foto: Munificent · CC BY 2.5




### Mangosta amarilla

*Cynictis penicillata* · Yellow mongoose

**REGULAR** 0,7 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (31 de 4.529)

Rojiza-amarillenta, con la punta de la cola blanca y aire de zorrillo. De día y pegada a sus madrigueras — es la solitaria de las dos mangostas diurnas del parque: la rayada, en tropa, es hoy la más registrada.

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



### Babuino chacma

*Papio ursinus* · Chacma baboon

**MUY FRECUENTE** 7,8 % de los registros de su grupo en Damaraland en oct-nov (17 de 219)

El primate grande de los miradores y las áreas de descanso: hocico de perro, tropa jerárquica y cola quebrada en «L». En esta ruta vive en la escarpa y el roquedo; en Etosha apenas figura (9 registros GBIF). Nada comestible a la vista: donde hay turistas es un ladrón profesional.

**DÓNDE** En esta ruta, los miradores y áreas de descanso de la escarpa (D1–D2) y de Damaraland (D8) — en Etosha apenas figura. Ventanillas arriba si os alejáis con comida a la vista.

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



### Mangosta rayada

*Mungos mungo* · Banded mongoose

**FRECUENTE** 2,2 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (101 de 4.529)

La mangosta social: tropas de decenas, rayas transversales en el lomo y parloteo constante. Diurna y descarada — la contraria exacta de la amarilla, que va sola.

**DÓNDE** De día, por el suelo de los campamentos y claros del este — Namutoni es su zona: las tropas cruzan la pista en fila y parloteando (400 registros en el parque).

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



### Zorro del Cabo

*Vulpes chama* · Cape fox

**ESCALA** 0,2 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (10 de 4.529)

El único zorro verdadero del sur de África: pequeño, gris plata, con la cola tupida de punta negra. Estrictamente nocturno: es objetivo del safari nocturno, no del día.

**DÓNDE** Solo en el safari nocturno guiado (D12): de noche está prohibido circular por libre, y él no sale de día.

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 3.0



### Gato montés africano

*Felis lybica* · African wildcat

**APENAS REGISTRADA** 8 registros en Etosha en oct-nov: muestra corta para decir más

Como un atigrado espigado de patas largas, con el dorso de las orejas rojizo — esa es la seña frente al gato doméstico. Nocturno y discretísimo: verlo es premio.

**DÓNDE** El nocturno guiado (D12), y con suerte: es discretísimo. De día, como mucho, unos ojos en un matorral desde la charca.

Foto: Bernard DUPONT from FRANCE · CC BY-SA 2.0



### Lobo de tierra

*Proteles cristata* · Aardwolf

**APENAS REGISTRADA** 1 registro en Etosha en oct-nov: muestra corta para decir más

Parece una hiena en miniatura, con crin eréctil y franjas verticales, pero cena termitas. Nocturno estricto: su cifra de GBIF infrarrepresenta, como la de la liebre saltadora.

**DÓNDE** El nocturno guiado (D12), en las llanuras con termiteros — que son su despensa.

Foto: kevinatbrakputs · CC BY 4.0

## Aves

30 especies

Con el coche parado en una charca, las aves llenan las esperas. Estas son las que se ven sin ser ornitólogo: grandes, ruidosas o de color imposible.



### Avestruz común

*Struthio camelus* · Common ostrich

**FRECUENTE** 2,2 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (1501 de 69.600)

El ave más grande del mundo. El macho, negro y blanco; la hembra, parda. En Etosha se ven cruzando la llanura abierta.

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 4.0



### Avutarda kori

*Ardeotis kori* · Kori bustard

**FRECUENTE** 2,1 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (1495 de 69.600)

Una de las aves voladoras más pesadas que existen. Camina por la llanura con paso solemne; en exhibición el macho hincha el cuello como un globo blanco.

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



### Secretario

*Sagittarius serpentarius* · Secretarybird

**REGULAR** 0,6 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (440 de 69.600)

Rapaz de patas larguísimas que caza andando y mata serpientes a pisotones. Las plumas negras de la nuca le dan el nombre, como plumas de escribiente tras la oreja.

Foto: Sumeet Moghe · CC BY-SA 4.0



### Carraca lila

*Coracias caudatus* · Lilac-breasted roller

**ESCASA** 0,2 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (107 de 69.600)

La postal de África: pecho lila, garganta azul y alas turquesa que estallan al volar. Se posa a la vista, en un poste o una rama seca.

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



### Cálao de pico amarillo sureño


*Tockus leucomelas* · Southern yellow-billed hornbill

**FRECUENTE** 1,3 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (930 de 69.600)

Pico grande, curvo y amarillo. Confiado y muy presente en los campamentos, donde vigila las mesas del desayuno.

**DÓNDE** En los tres campamentos, vigilando las mesas del desayuno.

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



### Cálao de pico rojo sureño

*Tockus rufirostris* · Southern red-billed hornbill

**REGULAR** 0,5 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (363 de 69.600)

Idéntico en forma al anterior, pero con el pico rojo. Los dos conviven en la misma zona: mira el pico y ya está.

**DÓNDE** Igual que el amarillo: campamentos y bordes de pista.

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



### Tejedor republicano


*Philetairus socius* · Sociable weaver

**REGULAR** 0,8 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (542 de 69.600)

Se ve el nido antes que el pájaro: pajares colectivos gigantes que engullen un árbol o un poste de la luz y que ocupan generaciones enteras.

**DÓNDE** En Okaukuejo, a diez metros de la charca: hay un nido enorme junto al agua y dos más en el camping. Dentro viven halcones pigmeos y agapornis de cara rosa.

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



### Águila marcial

*Polemaetus bellicosus* · Martial eagle

**REGULAR** 0,3 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (210 de 69.600)

La mayor águila de África: capucha oscura y pecho blanco moteado. Suele estar posada, inmóvil, en lo alto de una acacia.

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



### Buitre dorsiblanco africano

*Gyps africanus* · White-backed vulture

**REGULAR** 0,9 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (598 de 69.600)

El buitre común de la sabana. El dorso pálido que le da nombre solo se le ve bien en vuelo.

Foto: Yathin sk · CC BY-SA 3.0



### Flamenco enano

*Phoeniconaias minor* · Lesser flamingo

**FRECUENTE** 2,7 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (1257 de 46.876)

Más pequeño y más intensamente rosa que el común, con el pico oscuro de lejos. Todo depende de que haya agua: sin pan inundada, no hay flamencos.

**DÓNDE** **OJO** En noviembre no están aquí: la pan está seca. Solo crían cuando llueve por encima de 400 mm — pasó tres veces en cuarenta años. Los tuyos están en Walvis Bay.

Foto: Sumita Roy Dutta · CC BY-SA 4.0



### Grulla azul

*Grus paradisea* · Blue crane

**REGULAR** 0,4 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (252 de 69.600)

Gris azulada, con la cabeza abultada y unas largas plumas alares que arrastra como una cola. Elegantísima y, aquí, rareza.

**DÓNDE** Andoni, al norte de Namutoni, es el sitio. Pero quedaban 19 aves en 2021 — eran 138 en los 70—: es la población más aislada del mundo, a 1.200 km de la siguiente.

**CUÁNTOS** 19 aves en el censo de noviembre de 2021. Eran 138 en los setenta. ●

Foto: Ron Knight from Seaford, East Sussex, United Kingdom · CC BY 2.0



### Ganga namaqua

*Pterocles namaqua* · Namaqua sandgrouse

**FRECUENTE** 1,3 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (883 de 69.600)

Cola muy puntiaguda; llega a las charcas en bandos y a horas fijas. El macho empapa las plumas del vientre para llevarles agua a los pollos.

Foto: Yathin sk · CC BY-SA 3.0




### Alcaudón de pecho carmesí

*Laniarius atrococcineus* · Crimson-breasted shrike

**REGULAR** 0,8 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (531 de 69.600)

Negro por arriba y rojo intenso por abajo; imposible de confundir. Se mueve por dentro del matorral espeso.

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



### Cigüeña de Abdim


*Ciconia abdimii* · Abdim's stork

**APENAS REGISTRADA** 2 registros en Etosha en oct-nov: muestra corta para decir más

Cigüeña pequeña y oscura, de patas grises con las «rodillas» rojas. La llaman la cigüeña de la lluvia porque sigue a los frentes — aquí eso significa bien entrada la temporada, no noviembre.

**DÓNDE OJO** En noviembre, no. En Etosha es ave de febrero y marzo: en noviembre su tasa de registro es cero. Va aquí para que no la busquéis en balde.

Foto: Gediminas · CC BY-SA 3.0




### Sisón negro norteño

*Afrotis afraoides* · Northern black korhaan

**FRECUENTE** 1,8 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (1281 de 69.600)

El macho es negro con grandes parches blancos en el ala; se delata con un chillido metálico al levantar el vuelo.

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



### Búho lácteo de Verreaux

*Bubo lacteus* · Verreaux's eagle-owl

**ESCASA** 0,09 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (61 de 69.600)

El búho más grande de África, con párpados rosados que se le ven al parpadear. En los árboles grandes de los campamentos.

**DÓNDE** En los árboles grandes dentro de los campamentos — mira arriba al volver de cenar.

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 3.0



### Estornino brillante del Cabo

*Lamprolornis nitens* · Cape starling

**FRECUENTE** 1,8 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (1251 de 69.600)

Azul verdoso metálico con el ojo naranja. En los campamentos, siempre atento a las migas de la mesa.

**DÓNDE** En los campamentos, a por las migas.

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0




### Azor lagartijero claro

*Melierax canorus* · Pale chanting goshawk

**FRECUENTE** 1,5 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (1076 de 69.600)

Gris claro, con patas y cera del pico rojas. Casi siempre posado en un poste, oteando el suelo.

Foto: Hans Stieglitz · CC BY-SA 3.0



### Abejaruco europeo

*Merops apiaster* · European bee-eater

**FRECUENTE** 1,1 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (789 de 69.600)

El mismo que cría en España y pasa aquí el invierno nuestro: verde, castaño y amarillo, con antifaz negro. Caza al vuelo desde una rama seca y vuelve al mismo posadero.

**DÓNDE** Sí está en vuestras fechas: llega en octubre y en noviembre se registra en el parque. Caza al vuelo desde ramas secas y postes.

Foto: Andy Morffew from Itchen Abbas, Hampshire, UK · CC BY 2.0



### Pigargo vocinglero

*Icthyophaga vocifer* · African fish eagle

**APENAS REGISTRADA** 5 registros en Etosha en oct-nov: muestra corta para decir más

Cabeza blanca y pecho castaño; su reclamo es, literalmente, el sonido de África. Necesita agua abierta, así que aquí depende del pan y de las charcas grandes.

**DÓNDE** Depende de que haya agua abierta: la zona de Fischer's Pan, en el este, es donde tiene sentido buscarlo.

Foto: Derek Keats from Johannesburg, South Africa · CC BY 2.0



### Águila volatinera o bateleur


*Terathopius ecaudatus* · Bateleur

**REGULAR** 0,7 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (474 de 69.600)

En vuelo no se le ve cola: es una tabla negra con la cabeza roja, y se balancea de lado a lado planeando. De los rapaces más reconocibles del parque.

**DÓNDE** Se cita sobre Kalkheuwel, junto con el milano. Etosha reúne unas 40 rapaces, casi el 70 % de las de Namibia.

Foto: Derek Keats from Johannesburg, South Africa · CC BY 2.0



### Cormorán del Cabo

*Phalacrocorax capensis* · Cape cormorant

**MUY FRECUENTE** 4,8 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (2235 de 46.876)

Azulado oscuro con la cara amarilla. Vuela en cintas larguísimas a ras del agua frente a la costa; en Walvis Bay hay plataformas construidas para su guano.

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 4.0



### Pelicano blanco común

*Pelecanus onocrotalus* · Great white pelican

**FRECUENTE** 2,1 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (977 de 46.876)

Enorme y blanco, con el pico de bolsa amarillenta. Pesca en grupo en la laguna de Walvis Bay, y en el muelle se posan a un metro de la gente.

**DÓNDE** No en Etosha: en la laguna de Walvis Bay (D5-D6), donde pesca en grupo.

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



### Buitre orejado

*Torgos tracheliotos* · Lappet-faced vulture

**REGULAR** 0,5 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (337 de 69.600)

El buitre grande y feo, de cabeza rosada desnuda y pico enorme: es el que abre la piel del cadáver y deja comer al resto. Manda en la carroña.

Foto: Yathin sk · CC BY-SA 3.0



### Flamenco común

*Phoenicopterus roseus* · Greater flamingo

**FRECUENTE** 2,7 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (1279 de 46.876)

Más grande y más pálido que el enano, con el pico rosa de punta negra —el del enano se ve oscuro entero—. Los dos comparten la laguna de Walvis Bay.

**DÓNDE** **OJO** Lo mismo: la pan está seca en noviembre. En cambio en Walvis Bay el máximo va de junio a noviembre —allí sí, y en cantidad.

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



### Charrán damara


*Sternula balaenarum* · Damara tern

**FRECUENTE** 1,7 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (795 de 46.876)

Charrán pequeño con gorra negra completa y pico negro. Cría casi solo en la costa namibia y es especie amenazada: si veis un nido en la grava de la costa, ni acercarse.

**CUÁNTOS** La estimación global mínima cayó de 1.001 parejas en 2010 a 773 hacia 2021 —un -23 %— y casi toda la especie cría en la costa namibia. 🐣

Foto: Ron Knight from Seaford, East Sussex, United Kingdom · CC BY 2.0



### Ostrero africano

*Haematopus moquini* · African oystercatcher

**REGULAR** 0,9 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (408 de 46.876)

Negro entero con pico y patas rojo intenso. De la costa rocosa; no llega a diez mil individuos en el mundo entero.

Foto: Dane Paijmans · CC BY-SA 3.0



### Gaviota de Hartlaub

*Chroicocephalus hartlaubii* · Hartlaub's gull

**MUY FRECUENTE** 3,4 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (1591 de 46.876)

La gaviota del Benguela, endémica de esta costa y la sudafricana: pequeña, de capucha apenas grisácea y pico rojo oscuro. La nube blanca detrás de los barcos del muelle.

**DÓNDE** La laguna y el muelle de Walvis Bay (D5–D6): la nube blanca detrás del barco del crucero — el ave más registrada de la costa tras el cormorán.

Foto: Diego Delso · CC BY-SA 4.0



### Avoceta común

*Recurvirostra avosetta* · Pied avocet

**FRECUENTE** 2,3 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (1057 de 46.876)

Inconfundible: blanca y negra, con el pico finísimo curvado hacia arriba, barriendo el agua somera de lado a lado. En la laguna, repartida entre los flamencos.

**DÓNDE** El agua somera de la laguna de Walvis Bay (D5–D6), barriendo con el pico entre los flamencos — mejor con la bajamar de la mañana.

Foto: Christoph Strässler · CC BY-SA 2.0



### Francolín de pico rojo

*Pternistis adspersus* · Red-billed spurfowl

**REGULAR** 0,9 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (658 de 69.600)

El «pollo» ruidoso de los campamentos: pardo con pico y patas rojos. Os despertará al amanecer, sin falta.

**DÓNDE** En los campamentos. Os despertará al amanecer, sin falta.

Foto: Yathin sk · CC BY-SA 3.0

## Reptiles

11 especies

Las tres primeras son seguridad, no coleccionismo. Dormís trece noches en tienda y andáis por Sossusvlei y Damaraland: lo útil no es distinguirlas de lejos, es saber qué NO hacer. Nunca metas la mano donde no ves, mira dónde pisas al anochecer — que es cuando salen a la pista tibia—, linterna para ir al baño, y si te encuentras una, quédate quieto y retrocede: casi todas las mordeduras pasan al intentar matarlas o cogerlas.

Las otras ocho son de las que apetece ver: el camaleón que corre, el gecko translúcido de las dunas y el agama naranja de las rocas de Damaraland.



### Víbora bufadora

*Bitis arietans* · Puff adder

**APENAS REGISTRADA** 7 registros en la costa en oct-nov: muestra corta para decir más

Gruesa, corta y con galones en uve por el lomo. No huye: se queda quieta confiando en su camuflaje, y de ahí que se le atribuyan la mayoría de mordeduras graves del continente. Mira dónde pisas al anochecer y nada de andar descalzo por el campamento.

Foto: Danny S. · CC BY-SA 4.0



### Cobra escupidora cebra

*Naja nigricincta* · Zebra spitting cobra

**APENAS REGISTRADA** 1 registro en Etosha en oct-nov: muestra corta para decir más

Del suroeste africano, con bandas oscuras. Escupe el veneno a los ojos a varios metros y con puntería. Si levanta el cuerpo y abre la capucha, retrocede despacio: nunca la acorrales.

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 3.0



### Mamba negra

*Dendroaspis polylepis* · Black mamba

**SIN REGISTROS** ninguno de los 187 registros de su grupo en Etosha en oct-nov es suyo

Larga, delgada y gris oliva —lo negro es el interior de la boca, no la piel—. Rapidísima y nerviosa, pero esquiva: lo normal es no verla. La peor fama de África, y en buena parte merecida.

Foto: TimVickers · Public domain



### Víbora de Píringuey

*Bitis peringueyi* · Píringuey's adder

**MUY FRECUENTE** 8,5 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (35 de 412)

Diminuta, de la arena del Namib. Se entierra dejando fuera solo los ojos y se desplaza de lado. Suya es la huella en zigzag que aparece en las dunas por la mañana.

Foto: Jay Iwasaki · CC BY 2.0



### Gecko palmeado del Namib

*Pachydactylus rangei* · Web-footed gecko

**MUY FRECUENTE** 20,4 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (84 de 412)

Translúcido, con membranas entre los dedos que le hacen de raqueta sobre la arena y unos ojos enormes de nocturno. No tiene párpados: se limpia los ojos con la lengua.

Foto: Stefan.Kuettel at German Wikipedia (Original text: Stefan Kümmel) · CC BY-SA 3.0



### Tortuga leopardo

*Stigmochelys pardalis* · Leopard tortoise

La tortuga terrestre grande del sur de África, con el caparazón moteado como un felino. Cruza las carreteras muy despacio: es de lo que más se atropella, así que ojo al asfalto.

Foto: Bernard DUPONT from FRANCE · CC BY-SA 2.0



### Víbora cornuda

*Bitis caudalis* · Horned adder

**MUY FRECUENTE** 5,8 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (24 de 412)

Un «cuerno» escamoso sobre cada ojo. Se entierra en la arena o la grava del desierto y espera. Pequeña, pero con veneno de verdad.

Foto: Chantelle Bosch · CC BY-SA 4.0



### Agama de roca de Namibia

*Agama planiceps* · Namibian rock agama

**MUY FRECUENTE** 21,4 % de los registros de su grupo en Damaraland en oct-nov (40 de 187)

El macho no se puede pasar por alto: cabeza y cuello naranja encendido sobre cuerpo azul violáceo. Toma el sol en lo alto de los peñascos de granito.

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



### Lagarto de nariz de pala

*Merolus anchietae* · Shovel-snouted lizard

**MUY FRECUENTE** 4,9 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (20 de 412)

El lagarto de las dunas. El hocico en forma de pala le sirve para «nadar» dentro de la arena, y hace el baile térmico: levanta las patas por parejas para no quemarse.

Foto: Ryan van Huyssteen · CC BY-SA 4.0



### Camaleón del Namib

*Chamaeleo namaquensis* · Namaqua chameleon

**MUY FRECUENTE** 9,5 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (39 de 412)

El camaleón que corre por el suelo del desierto en vez de trepar. Cambia de color para regular su temperatura: oscuro de mañana para calentarse, pálido al mediodía. La estrella de los tours de «desierto vivo» de Swakopmund.

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 3.0



### Varano de roca

*Varanus albigularis* · Rock monitor

**APENAS REGISTRADA** 8 registros en Etosha en oct-nov: muestra corta para decir más

Lagarto grande y robusto, de lengua bífida, que se ve cruzando pistas o rondando las charcas. Inofensivo si no lo arrinconas.

Foto: Bernard DUPONT from FRANCE · CC BY-SA 2.0

Etosha no es toda la fauna del viaje. Esto es lo que veréis **fuera del parque**: en **Cape Cross** (D7), en la laguna de **Walvis Bay** (D5–D6), en los roquedos de Damaraland y en la arena del Namib. La **ardilla terrestre** es la excepción a caballo: campa igual por dentro de Etosha —de ahí sale su banda— que por los campamentos del oeste.



### Lobo marino del Cabo

*Arctocephalus pusillus* · Cape fur seal

**MUY FRECUENTE** 39,9 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (220 de 552)

En **Cape Cross** hay una de las mayores colonias del mundo: decenas de miles a la vista y oyéndose desde lejos. Aviso serio: el olor es parte de la visita — llevad pañuelo.

**DÓNDE** Cape Cross, D7. Una de las mayores colonias del mundo.

**CUÁNTOS** 80.000–100.000 de forma habitual en Cape Cross y hasta ~210.000 en el pico de cría, que es **noviembre y diciembre**: llegáis justo cuando se llena.



Foto: JJ Harrison (<https://www.jjharrison.com.au/>) · CC BY-SA 3.0



### Delfín de Heaviside

*Cephalorhynchus heavisidii* · Heaviside's dolphin

**MUY FRECUENTE** 4,7 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (26 de 552)

Pequeño y rechoncho, con el dorso oscuro en forma de cono. **Endémico de la corriente de Benguela**: no vive en ninguna otra parte del mundo. Salta girando sobre sí mismo.

**DÓNDE** Frente a Walvis Bay, en las salidas en barco (D5–D6).

**CUÁNTOS** 508 individuos (intervalo de confianza del 95 %: 461–833) en la zona de uso intenso de Walvis Bay, contados por foto-identificación. ●

Foto: Joachim Huber from Switzerland · CC BY-SA 2.0




### Damán roquero

*Procavia capensis* · Rock hyrax

**MUY FRECUENTE** 5,9 % de los registros de su grupo en Damaraland en oct-nov (13 de 219)

Parece un roedor gordo, pero su pariente vivo más cercano es el **elefante**. En colonias sobre los roquedos, tomando el sol a primera hora.

Foto: Naturedata · CC0



### Ardilla terrestre del Cabo

*Xerus inauris* · Cape ground squirrel

**FRECUENTE** 1,8 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (82 de 4.529)

En el suelo, con la **cola en abanico sobre el lomo haciendo de sombrilla**. Vive en colonias junto a sus madrigueras y es de lo más visible en las llanuras de Etosha.

Foto: Derek Keats from Johannesburg, South Africa · CC BY 2.0



### Ballena jorobada

*Megaptera novaeangliae* · Humpback whale

**MUY FRECUENTE** 10,0 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (55 de 552)

Aletas pectorales enormes y casi blancas —un tercio del cuerpo— y el salto más famoso del océano. **Migra frente a esta costa de junio a noviembre**: el crucero de Walvis Bay cae en temporada.

**DÓNDE** Desde el **crucero de Walvis Bay (D6)**: la migración pasa frente a esta costa de junio a noviembre, y vuestro día cae aún en temporada.

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0

Los vecinos de cada braai — en un viaje de camping **se dejan ver más que el leopardo**, aunque en los registros ni salgan: a GBIF nadie sube termitas, y la banda de abajo mide registros, no presencia. Van aquí por tres motivos distintos: los que hay que **respetar** (escorpión), los que dan un susto y son **inofensivos** (solífugo, shongololo), y los que explican cómo funciona este desierto (el escarabajo que bebe niebla, la termita que construye).

**Y uno que no es anécdota:** el mosquito. Es, de largo, el animal más peligroso de la ruta — la profilaxis está en **04**.



### Escarabajo de la niebla

*Onymacris unguicularis* · Fog-basking beetle

**APENAS REGISTRADA** 9 registros en la costa en oct-nov: muestra corta para decir más

El bicho que **bebe niebla**: sube a lo alto de la duna de madrugada y **hace el pino** para que la humedad condense en su caparazón y le resbale hasta la boca.

Foto: Виктор Пинчук · CC BY-SA 4.0



### Araña blanca del Namib

*Leucorchestris arenicola* · Dancing white lady spider

**APENAS REGISTRADA** 2 registros en la costa en oct-nov: muestra corta para decir más

Araña blanca y grande de las dunas, cazadora nocturna. El macho recorre cientos de metros por la noche buscando hembra y «tamborilea» en la arena para comunicarse — de ahí lo de *dancing white lady*.

Foto: Frank Jeurissen Tcf0908 · CC BY-SA 4.0



### Escarabajo pelotero

*Scarabaeus satyrus* · Dung beetle

**SIN REGISTROS** ninguno de los 166 registros de su grupo en Etosha en oct-nov es suyo

Modela una bola de estiércol más grande que él y la empuja **de espaldas y en línea recta**. Esta especie se orienta de noche **por la Vía Láctea** — se le comprobó tapándole la vista del cielo.

Foto: Udo Schmidt from Deutschland · CC BY-SA 2.0



### Escorpión de cola gruesa

*Parabuthus villosus* · Black hairy thick-tailed scorpion

**MUY FRECUENTE** 24,7 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (36 de 146)

Grande y negro, con la **cola gruesa**. Regla de oro: cola gruesa y pinzas finas = veneno potente; pinzas grandes y cola fina = poco peligro. **Sacude las botas cada mañana** y no dejes ropa en el suelo.

Foto: RichardMcJimsey · CC BY-SA 4.0



### Termita constructora

*Macrotermes michaelseni* · Termite

**SIN REGISTROS** ninguno de los 166 registros de su grupo en Etosha en oct-nov es suyo

No la verás a ella: verás su edificio. Los termiteros de metros de alto salpican toda la ruta, orientados para ventilarse solos. Son también las sospechosas del misterio de los **círculos de hadas** (*están en el cuaderno de joyas ocultas*).

Foto: Andrew Deacon · CC0



### Solífugo o araña camello

*Solifugae* · Sun spider / camel spider

**SIN REGISTROS** ninguno de los 146 registros de su grupo en la costa en oct-nov es suyo

Ni araña ni escorpión: parece las dos cosas y **no es venenoso**. Corre como una bala hacia tu linterna —no hacia ti— y por eso asusta tanto en el campamento. Muerde si lo agarras: no lo agarres.

Foto: NathanScientific · CC0



### Gusano de mopane

*Gonimbrasia belina* · Mopane worm

**SIN REGISTROS** ninguno de los 166 registros de su grupo en Etosha en oct-nov es suyo

La oruga a rayas que devora los mopanes... y que en el norte se come **frita con tomate y chili**: es proteína seria y la venden en los mercados (*ver el manual de intendencia*).

Foto: S4plants · CC BY-SA 4.0



### Milpiés gigante o shongololo

*Archispirostreptus gigas* · Giant African millipede

Milpiés negro y brillante del grosor de un dedo. **Inofensivo**: se enrosca en espiral si lo tocas. Aparece a montones tras las primeras lluvias.

Foto: Bjørn Christian Tørrissen · CC BY-SA 3.0



### Mosquito anopheles

*Anopheles* · Anopheles mosquito

**APENAS REGISTRADA** 1 registro en Damaraland en oct-nov: muestra corta para decir más

Se posa con el cuerpo inclinado, en ángulo con la piel, y pica de noche. Sin dramatismo: **es el animal más peligroso del viaje** — Etosha es zona de malaria (*profilaxis, en la guía de preparación*). Repelente al anochecer y manga larga.

Foto: Jim Gathany · Public domain

# Créditos de las fotografías

Todas las imágenes proceden de **Wikimedia Commons** con licencia libre (CC BY, CC BY-SA, CC0 o dominio público), que exige citar autor y licencia.

**Abejaruco europeo** — Andy Morffew from Itchen Abbas, Hampshire, UK, *CC BY 2.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bee-eater\\_\(19270331108\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bee-eater_(19270331108).jpg)

**Agama de roca de Namibia** — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Namib\\_rock\\_agama\\_\(Agama\\_planiceps\)\\_male.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Namib_rock_agama_(Agama_planiceps)_male.jpg)

**Alcaudón de pecho carmesí** — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:161\\_Crimson-breasted\\_shrike\\_in\\_Otjozondjupa\\_Region\\_Photo\\_by\\_Giles\\_Laurent.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:161_Crimson-breasted_shrike_in_Otjozondjupa_Region_Photo_by_Giles_Laurent.jpg)

**Alcélafo rojo** — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 3.0* · <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2011-Red-Hartebeest.jpg>

**Araña blanca del Namib** — Frank Jeurissen Tcf0908, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leucorchestris\\_arenicola.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leucorchestris_arenicola.jpg)

**Ardilla terrestre del Cabo** — Derek Keats from Johannesburg, South Africa, *CC BY 2.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cape\\_ground\\_squirrel,\\_Xerus\\_inauris,\\_at\\_Krugersdorp\\_Game\\_Reserve,\\_Gauteng,\\_South\\_Africa\\_\(27410204561\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cape_ground_squirrel,_Xerus_inauris,_at_Krugersdorp_Game_Reserve,_Gauteng,_South_Africa_(27410204561).jpg)

**Avestruz común** — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Struthio\\_camelus\\_-\\_Etosha\\_2014\\_\(3\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Struthio_camelus_-_Etosha_2014_(3).jpg)

**Avoceta común** — Christoph Strässler, *CC BY-SA 2.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pied\\_Avocet\\_at\\_Walvis\\_Bay,\\_Namibia.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pied_Avocet_at_Walvis_Bay,_Namibia.jpg)

**Avutarda kori** — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kori\\_bustard\\_\(Ardeotis\\_kori\\_kori\)\\_male.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kori_bustard_(Ardeotis_kori_kori)_male.jpg)

**Azor lagartijero claro** — Hans Stieglitz, *CC BY-SA 3.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Melierax\\_canorus-01.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Melierax_canorus-01.jpg)

**Babuino chacma** — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chacma\\_baboon\\_\(Papio\\_ursinus-griseipes\)\\_male\\_head.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chacma_baboon_(Papio_ursinus-griseipes)_male_head.jpg)

**Ballena jorobada** — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:001\\_Humpback\\_whale\\_breaching\\_in\\_Ballena\\_Marine\\_National\\_Park\\_Photo\\_by\\_Giles\\_Laurent.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:001_Humpback_whale_breaching_in_Ballena_Marine_National_Park_Photo_by_Giles_Laurent.jpg)

**Buitre dorsiblanco africano** — Yathin sk, *CC BY-SA 3.0* · <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-white-backed-vulture.jpg>

**Buitre orejudo** — Yathin sk, *CC BY-SA 3.0* · <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-lappet-faced-vulture.jpg>

**Búho lácteo de Verreaux** — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 3.0* · <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-giant-eagle-owl.jpg>

**Camaleón del Namib** — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 3.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chamaeleo\\_namaquensis\\_\(Walvis\\_Bay\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chamaeleo_namaquensis_(Walvis_Bay).jpg)

**Carraca lila** — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:143\\_Lilac-breasted\\_roller\\_in\\_Etosha\\_National\\_Park\\_Photo\\_by\\_Giles\\_Laurent.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:143_Lilac-breasted_roller_in_Etosha_National_Park_Photo_by_Giles_Laurent.jpg)

**Cebra de Burchell** — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 3.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equus\\_quagga\\_burchellii\\_-\\_Etosha,\\_2014.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equus_quagga_burchellii_-_Etosha,_2014.jpg)

**Chacal de lomo negro** — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:135\\_Black-backed\\_jackal\\_hunting\\_for\\_food\\_at\\_Cape\\_cross\\_Photo\\_by\\_Giles\\_Laurent.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:135_Black-backed_jackal_hunting_for_food_at_Cape_cross_Photo_by_Giles_Laurent.jpg)

**Charrán damara** — Ron Knight from Seaford, East Sussex, United Kingdom, *CC BY 2.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Damara\\_Tern\\_\(8077271589\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Damara_Tern_(8077271589).jpg)

**Cigüeña de Abdim** — Gediminas, *CC BY-SA 3.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ciconia\\_abdimii\\_London\\_Zoo-8a.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ciconia_abdimii_London_Zoo-8a.jpg)

**Cobra escupidora cebra** — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 3.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Naja\\_nigricincta\\_nigricincta.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Naja_nigricincta_nigricincta.jpg)

**Cormorán del Cabo** — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phalacrocorax\\_capensis\\_-\\_Namib\\_2013.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phalacrocorax_capensis_-_Namib_2013.jpg)

**Cálao de pico amarillo sureño** — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:155\\_Southern\\_yellow-billed\\_hornbill\\_in\\_Etosha\\_National\\_Park\\_Photo\\_by\\_Giles\\_Laurent.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:155_Southern_yellow-billed_hornbill_in_Etosha_National_Park_Photo_by_Giles_Laurent.jpg)

**Cálao de pico rojo sureño** — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Southern\\_red-billed\\_hornbill\\_\(Tockus\\_ufirostris\)\\_male,\\_crop.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Southern_red-billed_hornbill_(Tockus_ufirostris)_male,_crop.jpg)

**Damán roquero** — Naturedata, *CC0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rock\\_hyrax\\_Serengeti\\_National\\_Park.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rock_hyrax_Serengeti_National_Park.jpg)

**Delfín de Heaviside** — Joachim Huber from Switzerland, *CC BY-SA 2.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dolphins\\_at\\_L%C3%BCderitz,\\_Namibia\\_\(3144863196\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dolphins_at_L%C3%BCderitz,_Namibia_(3144863196).jpg)

**Dik-dik de Damara** — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 3.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Madoqua\\_kirkii\\_-\\_male\\_\(Namutoni\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Madoqua_kirkii_-_male_(Namutoni).jpg)

**Eland común** — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taurotragus\\_oryx\\_-\\_young\\_bull\\_-\\_Etosha\\_2015.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taurotragus_oryx_-_young_bull_-_Etosha_2015.jpg)

**Elefante africano de sabana** — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:178\\_Male\\_African\\_bush\\_elephant\\_in\\_Etosha\\_National\\_Park\\_Photo\\_by\\_Giles\\_Laurent.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:178_Male_African_bush_elephant_in_Etosha_National_Park_Photo_by_Giles_Laurent.jpg)

**Escarabajo de la niebla** — Виктор Пинчук, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Onymacris\\_unguicularis\\_\(Sudan\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Onymacris_unguicularis_(Sudan).jpg)

**Escarabajo pelotero** — Udo Schmidt from Deutschland, *CC BY-SA 2.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scarabaeus\\_satyrus\\_\(Bohemann,\\_1860\).\(3847992837\).\(2\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scarabaeus_satyrus_(Bohemann,_1860).(3847992837).(2).jpg)

**Escorpión de cola gruesa** — RichardMcJimsey, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parabuthus\\_villosus.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parabuthus_villosus.jpg)

**Estornino brillante del Cabo** — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:159\\_Cape\\_starling\\_in\\_Etosha\\_National\\_Park\\_Photo\\_by\\_Giles\\_Laurent.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:159_Cape_starling_in_Etosha_National_Park_Photo_by_Giles_Laurent.jpg)

**Facóquero** — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Southern\\_warthog\\_\(Phacochoerus\\_africanus\\_sundevallii\)\\_male.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Southern_warthog_(Phacochoerus_africanus_sundevallii)_male.jpg)

**Flamenco común** — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:010\\_Greater\\_flamings\\_male\\_and\\_female\\_in\\_the\\_Camargue\\_during\\_mating\\_season\\_Photo\\_by\\_Giles\\_Laurent.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:010_Greater_flamings_male_and_female_in_the_Camargue_during_mating_season_Photo_by_Giles_Laurent.jpg)

**Flamenco enano** — Sumita Roy Dutta, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flock\\_of\\_Lesser\\_Flamingo\\_along\\_with\\_juvenile\\_near\\_Jamnagar\\_railway\\_stationDSCN1798\\_1.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flock_of_Lesser_Flamingo_along_with_juvenile_near_Jamnagar_railway_stationDSCN1798_1.jpg)

**Francolín de pico rojo** — Yathin sk, *CC BY-SA 3.0* · <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2011-red-billed-francolin.jpg>

**Ganga namaqua** — Yathin sk, *CC BY-SA 3.0* · <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-namaqua-sandgrouse-male.jpg>

**Gato montés africano** — Bernard DUPONT from FRANCE, *CC BY-SA 2.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:African\\_Wildcat\\_\(Felis\\_lybica\).\(51659798835\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:African_Wildcat_(Felis_lybica).(51659798835).jpg)

**Gaviota de Hartlaub** — Diego Delso, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaviota\\_de\\_Hartlaub\\_\(Chroicocephalus\\_hartlaubi\),\\_Walvis\\_Bay,\\_Namibia,\\_2018-08-05,\\_DD\\_31.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaviota_de_Hartlaub_(Chroicocephalus_hartlaubi),_Walvis_Bay,_Namibia,_2018-08-05,_DD_31.jpg)

**Gecko palmeado del Namib** — Stefan Kuemmel at German Wikipedia (Original text: Stefan Kümmel), *CC BY-SA 3.0* · <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pachydactylus-rangei.jpg>

**Gran kudú** — L0k1m0nk33 at English Wikipedia, *CC BY-SA 3.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Male\\_greater\\_kudu.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Male_greater_kudu.jpg)

**Grulla azul** — Ron Knight from Seaford, East Sussex, United Kingdom, *CC BY 2.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grus\\_paradisea\\_Etosha\\_1.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grus_paradisea_Etosha_1.jpg)

**Guepardo** — AfricanConservation, *CC BY-SA 4.0* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Male\\_cheetah\\_facing\\_left\\_in\\_South\\_Africa.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Male_cheetah_facing_left_in_South_Africa.jpg)

**Gusano de mopane** — SAplants, CC BY-SA 4.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colophospermum\\_mopane\\_50D\\_0486.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colophospermum_mopane_50D_0486.jpg)

**Hiena manchada** — Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spotted\\_hyena\\_\(Crocuta\\_crocuta\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spotted_hyena_(Crocuta_crocuta).jpg)

**Hiena parda** — Bernard DUPONT from FRANCE, CC BY-SA 2.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brown\\_Hyena\\_\(Hyaena\\_brunnea\)\\_leaving\\_waterhole\\_....\\_\(50915531592\),\\_crop.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brown_Hyena_(Hyaena_brunnea)_leaving_waterhole_...._(50915531592),_crop.jpg)

**Impala de cara negra** — Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Impala\\_\(Aepyceros\\_melampus\)\\_male\\_Kruger.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Impala_(Aepyceros_melampus)_male_Kruger.jpg)

**Jineta de manchas pequeñas** — Frédéric SALEIN, CC BY-SA 2.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A\\_female\\_common\\_genet\\_in\\_the\\_dining\\_room,\\_Satao\\_Camp,\\_Tsavo\\_East.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_female_common_genet_in_the_dining_room,_Satao_Camp,_Tsavo_East.jpg)

**Jirafa angoleña** — Giles Laurent, CC BY-SA 4.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:106\\_Angolan\\_giraffe\\_walking\\_in\\_the\\_Kalahari\\_Desert\\_of\\_Namibia\\_Photo\\_by\\_Giles\\_Laurent.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:106_Angolan_giraffe_walking_in_the_Kalahari_Desert_of_Namibia_Photo_by_Giles_Laurent.jpg)

**Klipspringer o saltarrocas** — Munificent, CC BY 2.5 · <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klipspringer.jpg>

**Lagarto de nariz de pala** — Ryan van Huyssteen, CC BY-SA 4.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meroles\\_anchietae\\_345390261.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meroles_anchietae_345390261.jpg)

**Leopardo** — Sumeet Moghe, CC BY-SA 4.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:African\\_leopard\\_male\\_\(cropped\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:African_leopard_male_(cropped).jpg)

**León** — Giles Laurent, CC BY-SA 4.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:020\\_The\\_lion\\_king\\_Snyggve\\_in\\_the\\_Serengeti\\_National\\_Park\\_Photo\\_by\\_Giles\\_Laurent.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:020_The_lion_king_Snyggve_in_the_Serengeti_National_Park_Photo_by_Giles_Laurent.jpg)

**Liebre saltadora** — Bernard DUPONT from FRANCE, CC BY-SA 2.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spring\\_Hare\\_\(Pedetes\\_capensis\)\\_6042009463\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spring_Hare_(Pedetes_capensis)_6042009463).jpg)

**Lobo de tierra** — kevinatbrakputs, CC BY 4.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aardwolf,\\_Namaqua\\_National\\_Park,\\_South\\_Africa\\_1.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aardwolf,_Namaqua_National_Park,_South_Africa_1.jpg)

**Lobo marino del Cabo** — JJ Harrison (<https://www.jjharrison.com.au/>), CC BY-SA 3.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arctocephalus\\_pusillus\\_-\\_SE\\_Tasmania.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arctocephalus_pusillus_-_SE_Tasmania.jpg)

**Mamba negra** — TimVickers, *Public domain* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dendroaspis\\_polylepis\\_\(14\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dendroaspis_polylepis_(14).jpg)

**Mangosta amarilla** — Giles Laurent, CC BY-SA 4.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:082\\_Yellow\\_mongoose\\_in\\_Khomas\\_Region\\_Photo\\_by\\_Giles\\_Laurent.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:082_Yellow_mongoose_in_Khomas_Region_Photo_by_Giles_Laurent.jpg)

**Mangosta rayada** — Giles Laurent, CC BY-SA 4.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:168\\_Banded\\_mongoose\\_in\\_Etosha\\_National\\_Park\\_Photo\\_by\\_Giles\\_Laurent.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:168_Banded_mongoose_in_Etosha_National_Park_Photo_by_Giles_Laurent.jpg)

**Milpiés gigante o shongololo** — Bjørn Christian Tørrissen, CC BY-SA 3.0 · <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archispirostreptus-Gigas-Amphitheatre.jpg>

**Mosquito anofeles** — Jim Gathany, *Public domain* · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anopheles\\_stephensi.jpeg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anopheles_stephensi.jpeg)

**Ostrero africano** — Dane Paijmans], CC BY-SA 3.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:African\\_Black\\_Oystercatcher\\_\(2\).JPG](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:African_Black_Oystercatcher_(2).JPG)

**Pelícano blanco común** — Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Great\\_white\\_pelican\\_\(Pelecanus\\_onocrotalus\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Great_white_pelican_(Pelecanus_onocrotalus).jpg)

**Pigargo vocinglero** — Derek Keats from Johannesburg, South Africa, CC BY 2.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:African\\_fish\\_eagle,\\_Haliaeetus\\_vocifer,\\_at\\_Chobe\\_National\\_Park,\\_Botswana\\_\(33516612831\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:African_fish_eagle,_Haliaeetus_vocifer,_at_Chobe_National_Park,_Botswana_(33516612831).jpg)

**Puercoespín del Cabo** — Steven Lek, CC BY-SA 4.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hystrix\\_africaeauralis\\_Blijdorp\\_Rotterdam.JPG](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hystrix_africaeauralis_Blijdorp_Rotterdam.JPG)

**Ratel o tejón de la miel** — Sumeet Moghe, CC BY-SA 4.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Honey\\_Badger.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Honey_Badger.jpg)

**Rinoceronte blanco** — Giles Laurent, CC BY-SA 4.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:109\\_Male\\_White\\_rhinoceros\\_walking\\_in\\_the\\_Kalahari\\_Desert\\_of\\_Namibia\\_Photo\\_by\\_Giles\\_Laurent.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:109_Male_White_rhinoceros_walking_in_the_Kalahari_Desert_of_Namibia_Photo_by_Giles_Laurent.jpg)

**Rinoceronte negro** — AfricanConservation, CC BY-SA 4.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black\\_Rhino\\_at\\_Working\\_with\\_Wildlife.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Rhino_at_Working_with_Wildlife.jpg)

**Secretario** — Sumeet Moghe, CC BY-SA 4.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Secretary\\_bird\\_Mara\\_for\\_WC.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Secretary_bird_Mara_for_WC.jpg)

**Sisón negro norteño** — Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Northern\\_black\\_korhaan\\_\(Afrotis\\_afraoides\)\\_male.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Northern_black_korhaan_(Afrotis_afraoides)_male.jpg)

**Solifugo o araña camello** — NathanScientific, CC0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solifuge\\_in\\_Trinidad,\\_Colorado,\\_July\\_2026.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solifuge_in_Trinidad,_Colorado,_July_2026.jpg)

**Springbok** — Giles Laurent, CC BY-SA 4.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:174\\_Male\\_Springbok\\_in\\_Etosha\\_National\\_Park\\_Photo\\_by\\_Giles\\_Laurent.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:174_Male_Springbok_in_Etosha_National_Park_Photo_by_Giles_Laurent.jpg)

**Steenbok** — Yathin S Krishnappa, CC BY-SA 3.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raphicerus\\_capestris\\_male\\_\(Etosha,\\_2012\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raphicerus_capestris_male_(Etosha,_2012).jpg)

**Tejedor republicano** — Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sociable\\_weaver\\_\(Philetairus\\_socius\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sociable_weaver_(Philetairus_socius).jpg)

**Termita constructora** — Andrew Deacon, CC0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macrotermes\\_michaelseni.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macrotermes_michaelseni.jpg)

**Tortuga leopardo** — Bernard DUPONT from FRANCE, CC BY-SA 2.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leopard\\_Tortoise\\_\(Stigmochelys\\_pardalis\)\\_17331907085\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leopard_Tortoise_(Stigmochelys_pardalis)_17331907085).jpg)

**Varano de roca** — Bernard DUPONT from FRANCE, CC BY-SA 2.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:White-throated\\_Monitor\\_\(Varanus\\_albigularis\)\\_32184691034\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:White-throated_Monitor_(Varanus_albigularis)_32184691034).jpg)

**Víbora bufadora** — Danny S., CC BY-SA 4.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bitis\\_arietans\\_by\\_Danny\\_S.\\_1.JPG](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bitis_arietans_by_Danny_S._1.JPG)

**Víbora cornuda** — Chantelle Bosch, CC BY-SA 4.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bitis\\_caudalis00a.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bitis_caudalis00a.jpg)

**Víbora de Péringuey** — Jay Iwasaki, CC BY 2.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Namibian\\_Sidewinder\\_Bitis\\_peringueyi.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Namibian_Sidewinder_Bitis_peringueyi.jpg)

**Zorro del Cabo** — Yathin S Krishnappa, CC BY-SA 3.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vulpes\\_chama\\_\(Etosha\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vulpes_chama_(Etosha).jpg)

**Zorro orejudo** — Yathin S Krishnappa, CC BY-SA 3.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otocyon\\_megalotis\\_-\\_Etosha\\_2014.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otocyon_megalotis_-_Etosha_2014.jpg)

**Águila marcial** — Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martial\\_eagle\\_\(Polemaetus\\_bellicosus\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martial_eagle_(Polemaetus_bellicosus).jpg)

**Águila volatinera o bateleur** — Derek Keats from Johannesburg, South Africa, CC BY 2.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bateleur\\_-\\_Kruger\\_National\\_park\\_\(37161617713\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bateleur_-_Kruger_National_park_(37161617713).jpg)

**Ñu azul** — Buiobuione, CC BY-SA 4.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wildebeest\\_of\\_Etosha\\_National\\_Park.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wildebeest_of_Etosha_National_Park.jpg)

**Órix o gemsbok** — Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0 · [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gemsbok\\_\(Oryx\\_gazella\)\\_male.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gemsbok_(Oryx_gazella)_male.jpg)

## Fuentes de lo específico de Etosha

**Horarios de puerta:** tabla oficial *Etosha National Park Gates Opening & Closing Time* (3–9 nov 06:13–19:06 · 10–16 nov 06:10–19:10). Cambian cada semana y están puestas en cada puerta.

**Reglamento del parque** (60 km/h, 20 en campamentos, prohibido bajar del coche fuera de los campamentos, prohibido salir de las pistas): *Park Regulations* de NWR/MEFT.

**Rinoceronte negro:** MEFT (ficha de Etosha) y NWR confirman león, elefante y rinoceronte negro de noche en Okaukuejo. Lo de «mayor población mundial» es de la *subespecie suroccidental*: WWF sitúa el 72 % de la población nacional en Etosha.

**Impala de cara negra:** UICN (Vulnerable, endémica de Kaokoveld y suroeste de Angola) y Matson 2006 — cinco subpoblaciones que coinciden con los cinco puntos de suelta de los años 70.

**Grulla azul:** Craig 2017 (*Bull. B.O.C.*) y el Namibia Crane Working Group — 19 aves en el censo de noviembre de 2021, y 1.200 km hasta la población sudafricana.

**Flamencos:** NASA Earth Observatory (la pan seca en diciembre, inundada en enero), Simmons 1996 (tres eventos de cría en 40 años) y BirdLife (umbral de 400 mm). Máximos de Walvis Bay de junio a noviembre: SABAP1.

**Migradores:** tasas de registro mensuales de SABAP2 / African Bird Atlas filtradas a Etosha. Ahí se ve que el abejaruco carmesí tiene *cero* registros en el parque y que la cigüeña de Abdim es de febrero-marzo.

**Cebra de montaña:** |Uiseb 2024 — en Etosha está restringida a las lomas de dolomita del oeste; la de llanura, por todo el parque.

**Dik-dik:** Travel News Namibia (Dik-dik Drive) y registros de GBIF: ~206 en la cuadrícula de Namutoni frente a 4 en Okaukuejo.

**Obras de la carretera:** nota oficial del MEFT de 2026 —«Traffic deviation via Gembokvlakte road from Okaukuejo to Halali», meft.gov.na/news/335, con aviso paralelo de NWR—: desvío obligatorio del 2 jun 2026 al jul 2027. La página devuelve 403; las fechas convergen en cinco secundarias (•). Reconfirmar con NWR (+264 67 229 800).

**Charcas:** Expert Africa, etosha.org, Roxanne Reid y etoshanationalpark.co.za — secundarias, pero coincidentes entre sí.

**Sin dato (y no se rellena):** la hora punta nocturna del rinoceronte en Okaukuejo, el número absoluto de rinocerontes del parque, la orientación solar de cada charca y la frecuencia real de la hiena parda.

## Fuentes de las posibilidades y de los recuentos

**Porcentaje de viajeros que vio cada especie:** partes de avistamiento publicados por *Expert Africa* para los tres campamentos — Okaukuejo (149 viajeros desde May-2018) · Halali (48 viajeros desde Jun-2018) · Namutoni (16 viajeros desde Sep-2018). [expertafrica.com/namibia/etosha-national-park](http://expertafrica.com/namibia/etosha-national-park). La unidad es **una estancia en ese campamento** con una o más observaciones, no un día ni un viaje. Los rellenan los propios viajeros: el 14 % que declara antílope sable en Okaukuejo es la medida del ruido que traen.

**Índice de registros:** GBIF, recuento de ocurrencias dentro del polígono de cada zona y filtrado a octubre y noviembre [api.gbif.org/v1/occurrence/search](http://api.gbif.org/v1/occurrence/search). El polígono de Etosha es el límite real del parque en OpenStreetMap; las otras tres zonas son cajas sobre la costa, el Namib y Damaraland. Lo baja y lo cachea [fuente/avistamientos.py](#), y las cifras de este PDF salen de ese fichero: 4 zonas, 88 especies.

**Elefante:** censo aéreo del MEFT de 2015 (2.911 ± 697) y serie desde 1998, recogidos en *Namibia's elephants — population, distribution and trends (Pachyderm)* y en el resumen de Conservation Namibia [conservationnamibia.com/blog/b2021-elephant-numbers.php](http://conservationnamibia.com/blog/b2021-elephant-numbers.php).

**Rinoceronte negro:** Save the Rhino y WWF para las cifras nacionales (~2.200 en 2023, más de un tercio de África, >70 % en Etosha) [savetherhino.org/programmes/ministry-of-environment-and-tourism](http://savetherhino.org/programmes/ministry-of-environment-and-tourism) y [wwf.panda.org/?uProjectID=NA0016](http://wwf.panda.org/?uProjectID=NA0016). El dato por parque no lo publica nadie.

**León:** *The Lions of Etosha National Park: A Brief History*, Conservation Namibia, sobre Heydinger, Packer y Funston [conservationnamibia.com/blog/etosha-lions-2023.php](http://conservationnamibia.com/blog/etosha-lions-2023.php).

**Impala de cara negra:** UICN (Vulnerable) y las fichas de US Fish & Wildlife Service y del atlas de biodiversidad de Namibia [biodiversity.org.na/taxondisplay.php?nr=2077](http://biodiversity.org.na/taxondisplay.php?nr=2077).

**Grulla azul:** Craig 2017 (*Bull. B.O.C.*) y el Namibia Crane Working Group.

**Lobo marino:** varias fuentes secundarias concordantes sobre la colonia de Cape Cross; el rango es ancho porque la colonia se llena para la cría de noviembre y diciembre.

**Delfín de Heaviside:** Elwen et al., estimación por foto-identificación de la zona de uso intenso de Walvis Bay (508; IC 95 % 461-833).

**Charrán damara:** evaluación de BirdLife South Africa [birdlife.org.za/red-list/damara-tern](http://birdlife.org.za/red-list/damara-tern). Las estimaciones globales de adultos (12.000-13.500) y las de parejas reproductoras no cuadran entre sí: se da la de parejas, que es la que tiene serie temporal.