NAMIBIA · 30 DE OCTUBRE – 15 DE NOVIEMBRE DE 2026

Fauna de Namibia

Guía de campo · 159 especies de vuestra ruta

6 felinos · **32** mamíferos · **40** aves rapaces · **46** aves · **16** reptiles · **10** la costa, la roca y la arena · **9** bichos

Cada ficha dice **en qué zona del viaje cae**, y en qué días

Cuatro noches en Etosha · dos **dentro del parque**

Okaukuejo · 9 nov — **Halali** · 10 nov — **Onguma** · 11 y 12 nov

Final de la estación seca: la fauna, concentrada en las charcas

Fotografías de Wikimedia Commons, todas con licencia libre:
autoría y licencia bajo cada foto y en los créditos del final.
Los rasgos de identificación son descriptivos; lo específico de Etosha va con su fuente.
El reparto por zonas sale de GBIF sobre los polígonos del viaje: se mide, no se dice a ojo.

Cómo se usa esta guía

Cada ficha lleva el nombre en castellano, el científico y el inglés —el de los carteles del parque—, la foto **sin recortar** *(los cuernos, el cuello y la cola se ven enteros, que es lo que sirve para identificar)* y los rasgos que distinguen a la especie *en el campo*. Debajo, dónde y cuándo verla, cuántas quedan cuando hay una cifra publicada que citar, y **en qué zona del viaje cae**, con los días al lado.


Y aquí solo hay fauna de sitios a los que se va. Las 159 fichas caen en los **2.798 km de este viaje** y en ninguna otra parte: cada una tiene registros de GBIF dentro de alguna de las cuatro zonas de la ruta. *(El 29/08 se probó lo contrario —una segunda parte con el hipopótamo, el licaón y el sable del Zambeze y del Okavango, rotulada «lo que este viaje no pisa»— y se deshizo el mismo día: rotularlo no arregla nada, en la guantera ocupa sitio una guía de un viaje que no se hace.)**

La línea de arriba de cada ficha dice qué posibilidades hay. Cuando pone *«82 % lo vio»* es literal: viajeros que declararon **una o más observaciones durante su estancia en el campamento** (partes de Expert Africa — **Okaukuejo** 149 · **Halali** 48 · **Namutoni** 16). **La unidad es la estancia, no el día ni el viaje**: una o dos noches. La cifra grande junta los tres campamentos de NWR y detrás va cada uno. Aquí se duerme en dos de ellos *(Okaukuejo y Halali; las dos últimas noches, en Onguma, ya fuera de la puerta)* y el tercero, Namutoni, se cruza de paso — son **dos tiradas y media**: en las cuatro noches la posibilidad real es más alta que cualquiera de estos números. Cuánto más, no lo dicen estos datos, así que no se dice.

Eso solo existe para trece especies. Para las otras ciento cuarenta y seis va un **índice de registros de GBIF**: cuánto pesa la especie dentro de los registros de su grupo en la zona **en octubre y noviembre** —4.529 de mamífero y 69.600 de ave solo en Etosha—. Mide *lo que se registra*, no *lo que se ve*: por eso dice **frecuente** o **escasa**, nunca «lo vas a ver».

Los dos sesgos, por delante: los partes los rellenan viajeros y hay confusiones —un 14 % declara antílope sable en Okaukuejo, y en Etosha no hay sable—; y a GBIF nadie sube el chacal número doscientos ni casi nada nocturno, así que la liebre saltadora sale con cero registros siendo de lo que más enseñan los guías en el nocturno. Cada cifra lleva detrás su muestra: con cuatro registros no se afirma nada.

Dónde se mide cada ficha



La última línea de cada ficha —«En la ruta»— reparte sus registros entre las cuatro zonas del viaje, y con el día al lado. Este mapa es dónde caen esas zonas: son los *mismos* polígonos con los que se cuenta en GBIF —el límite real del parque para Etosha y tres cajas para el resto—, así que lo que dice la ficha y lo que dibuja el mapa no pueden separarse. El número de cada zona es cuántas de estas 159 fichas tienen ahí *el grueso* de sus registros: **Etosha** se lleva 97, y eso es tanto porque hay más fauna como porque es donde más mira todo el mundo — el sesgo está en el dato y se dice. **Fuera de estas cuatro zonas no se afirma nada**: este viaje no va a más sitios, y una guía que hable de donde no se va sobra en la guantera.

Cómo funciona el parque

El safari, en corto: dormís **dentro** dos de las cuatro noches —Okaukuejo y Halali—; las otras dos, en **Onguma Tamboti**, 3,4 km pasada la puerta de Von Lindequist, así que **el D12 y el D13 hay que estar fuera antes del cierre.** Las puertas siguen al sol y cambian cada semana: para vuestras fechas, **06:13–19:06** del 3 al 9 y **06:10–19:10** del 10 al 16 *(la tabla de 2025: la de 2026 está en la puerta) — trece horas de parque al día*, casi dos más que en invierno.

Dentro, **60 km/h** (20 en los campamentos) y **solo se puede bajar del coche dentro de los campamentos.**

La táctica que funciona no es conducir: es esperar. Elegid una charca, apagad el motor, bajad la voz y dadle tiempo — la fauna llega por turnos. En seca, **mediodía es bueno para elefante** y primera y última hora para león. De noche no se circula por libre: lo que hay son las **dos charcas iluminadas de Okaukuejo y Halali**, que se ven andando desde la parcela, y **el nocturno guiado de NWR (N$750 ≈ €38 p.p.)**, que se compra en recepción durmiendo en el campamento — **el D10 en Okaukuejo y el**

D11 en Halali, sin decidir todavía *(el dossier lo dio por perdido del 24/08 al 28/08; no lo está: se vende en los tres campamentos)*. Y ya en Onguma, su **Sundowner Drive (3 h, N$980 ≈ €49 p.p.)**, que sale al atardecer y vuelve de noche con foco y campo a través, y un **paseo guiado a pie (1½ h, N$980)**: las dos cosas, prohibidas dentro del parque, y que complementan al nocturno de NWR, no lo sustituyen. Y de día, en esta ruta **la salida de mañana se hace guiada desde cada campamento (N$650 ≈ €33 p.p., decidido el 08/08)**: los traslados entre campamentos van con el 4x4 propio.

OBRAS **Aviso de obras — confirmado que os afecta:** están asfaltando la pista Okaukuejo–Halali–Namutoni, y en 2026 hay **desvío OBLIGATORIO**: desde el 26 de febrero por la pista de Sueda, Salvadora y Charitsaub hasta el km 47, y de ahí por el bypass y el Rhino Drive hacia Halali — la nota oficial del MEFT es de la fase de 2025; la de 2026 la cuentan namibian.org y Tourism Update ◐, y la fecha de fin, «julio de 2027», solo las secundarias. Vuestra ventana cae de lleno. Las charcas accesibles del tramo son **Gemsbokvlakte, Sueda y Salvadora** —el mejor borde de pan para guepardo y león—; **Nebrownii y Kapupuhedi quedan fuera** por la obra. Son ~108 km en vez de ~70. **Preguntadlo en recepción de Okaukuejo** (+264 67 229 800) — si el tramo hubiera reabierto, volverían las dos charcas.

El safari nocturno: qué se puede ver

Dentro de Etosha hay dos formas de ver fauna de noche, y son muy distintas entre sí. Fuera del parque, unas pocas reservas privadas vecinas venden una tercera que Etosha no puede dar: guía al volante recorriendo terreno real, no solo esperando junto a una charca.

Dentro del parque

- **Charca iluminada, gratis, a pie desde la parcela** — Okaukuejo, Halali y Namutoni tienen la suya — y desde el 24/08 solo se pisan las dos primeras, porque en Namutoni ya no se duerme. La que de verdad importa es **Okaukuejo**: MEFT y NWR confirman **león, elefante y rinoceronte negro** de noche en ella ● — «seguramente el mejor sitio de África» para el rinoceronte negro. En **Halali**, la propia NWR cita el **puercoespín** entre los habituales de su charca ●. En los muros y recintos de Okaukuejo, de noche sale a cazar el **gecko de Fischer**. *Norma de la plataforma: todo apagado, ni linterna ni pantalla — la única luz es la del recinto.*
- **Nocturno guiado de NWR (N$750 ≈ €38 p.p.)** — se compra en recepción durmiendo en el campamento, así que cabe **dos veces: el D10 en Okaukuejo y el D11 en Halali**, y está **sin decidir** *(del 24/08 al 28/08 el dossier lo dio por perdido «porque se compraba desde Namutoni»; NWR lo vende en los tres campamentos)*. Es un circuito corto en grupo cerca del campamento y la única forma legal de circular de noche dentro del parque. Su objetivo declarado son tres especies que de día casi no se dejan ver: **zorro del Cabo, gato montés africano y lobo de tierra**. Los guías enseñan además la **liebre saltadora** casi todas las noches, aunque no figure como objetivo oficial — es tan nocturna que ni un registro suyo llega a GBIF.
- **De oído y de paso, sin necesidad de safari** — la **hiena manchada** se oye desde la tienda casi cualquier noche; el **chacal de lomo negro** ronda los campamentos al anochecer a por las sobras; la **jineta** es la sombra que cruza el foco de luz mientras se cena.

Lo que no hay: dato de la **hora punta nocturna del rinoceronte** en Okaukuejo, ni de la **frecuencia real de la hiena parda** —cruza alguna vez desde Ongava, sin densidad publicada ∅.

Y en las reservas privadas de al lado

Fuera de Etosha, sin el límite del circuito corto junto al campamento, el guía puede recorrer más terreno o bajar a rastrear a pie — algo que dentro del parque no está permitido bajo ninguna circunstancia.

- **Okonjima / AfriCat** *(junto a la B1, ya es parada opcional del D14, sin desvío)* — no es un game drive, es **tracking dirigido por investigadores con collar de radio** ●: leopardo (N$1.600 ≈ €80 p.p.), hiena parda a pie (N$1.600 ≈ €80 p.p.) y hasta pangolín (N$2.900 ≈ €145 p.p., mínimo 2 noches) — tres especies que dentro de Etosha son casi fantasma o ni llegan a tener ficha en esta guía.
- **Hobatere Lodge** *(linda con el oeste del parque, pero exige un desvío real vía Kamanjab)* — su nocturno propio (N$798 ≈ €40 p.p.) tiene lista propia de objetivos ●: zorro orejudo, tejón mielero, jineta, gato montés africano, liebre saltadora, búhos, chotacabras y **oso hormiguero** — este último, con 0 % de avistamientos declarados dentro de Etosha, es precisamente el que se quedó sin ficha en esta guía.
- **Onguma** *(pasada la puerta de Von Lindequist)* — **ya no es una alternativa teórica: es donde dormís el D12 y el D13**, y es **lo que añade de noche fuera del parque**, además del nocturno de NWR de dentro. Su tarifa oficial 2027 vende **Sundowner Drive de 3 h (N$980 ≈ €49 p.p.)** —sale al atardecer y vuelve de noche, con foco y campo a través—, **Onkolo Hide de 3 h (N$720 ≈ €36 p.p.)** y **paseo interpretativo a pie de 1½ h (N$980 ≈ €49 p.p., 16+)** ●. Su reserva declara por escrito *«four of the Big Five (lion, leopard, rhino and elephant) roam free»* y suma guepardo en su web ●. OJO Un **«night drive» como tal no figura en esa tarifa** ∅: lo citan

agregadores independientes ◐, sin precio ni horario — pregúntadlo al reservar.

- **Ongava** *(junto a la puerta de Andersson)* — vende nocturno de pago (N$1.400 ≈ €70 p.p.), pero **no publica lista de especies propia** de ese nocturno concreto ⊘.

La ropa

El día tiene dos climas y hay que vestir para los dos. Okaukuejo en noviembre promedia **37,1 °C de máxima y 18,9 °C de mínima** ● *(NOAA GHCN, serie completa — está en el `01`)*: se sale de la tienda con forro a las cinco y media y a las once sobran las capas. Por capas y sin discusión.

- **Colores apagados** ○ — caqui, oliva, arena, gris. El blanco se ve a un kilómetro y a la media hora es beige del polvo calcáreo del pan; los colores fuertes cantan en una charca donde todo es ocre.
- **Manga larga y pantalón largo al anochecer** ● — no es por elegancia: Etosha es zona de malaria y el anofeles pica de noche *(profilaxis y repelente, en el `04`)*.
- **Sombrero de ala ancha y gafas de sol** ○, que se usan los quince días. Y un **buff**: en la pista de gravilla el polvo entra por todas partes.
- **Calzado cerrado** ○ fuera de la parcela. Las sandalias son para la ducha y para la silla, no para andar por el campamento al anochecer.
- **Nada que cruja.** ○ Un chubasquero rígido dentro de un coche en silencio se oye más que la conversación.

La lista de equipaje completa, con cantidades y casillas para tachar, está en el `17`. Esto de aquí es solo lo del safari.

Lo que va a mano, no en el maletero

En una charca no se sale del coche. Todo lo que haga falta en las tres horas siguientes tiene que estar **dentro del habitáculo** antes de aparcar.

- ☐ **Prismáticos, uno por persona** ○ — compartir unos prismáticos en una charca es pelearse.
- ☐ **4 L de agua por persona y día, en el habitáculo** ● *(regla del `06`)* — no en el maletero de atrás, que es donde no se llega.
- ☐ **Esta guía y un lápiz.** Marcar lo que se ve, en el momento: al tercer día no te acuerdas.
- ☐ **Frontal con luz roja** ○ — para el campamento de noche. La luz blanca deslumbra y atrae bichos a la cara.
- ☐ **Trapo de microfibra** ○: el polvo del pan se pega al objetivo y a los prismáticos en cuanto abres la ventanilla.
- ☐ **Efectivo** para las tasas de parque, y **bolsa de basura**: en las charcas no hay papeleras.
- ☐ **Cargador de 12 V y batería externa.** Una jornada de charca con el móvil haciendo de cámara se come la batería antes de comer.

Cómo se caza un avistamiento

> **La táctica no es conducir. Es esperar.**
>
> El error del primer día es hacer kilómetros buscando animales. En seca la fauna **viene al agua**: quien se queda quieto en una charca ve más que quien recorre el parque entero. La regla de la casa: **elegid una charca y dadle tres cuartos de hora** ○ antes de decidir que no pasa nada.

- **Salid con la puerta** — con el guiado de la mañana o por vuestra cuenta en los traslados. Las dos primeras horas y las dos últimas concentran casi todo lo que merece la pena; a mediodía, en cambio, es cuando llega el **elefante** a bañarse.
- **Motor apagado, ventanillas abajo, voz baja.** ○ Media hora sin ruido cambia lo que se acerca. Y el motor parado quita la vibración de las fotos.
- **Aparcad de lado y sin tapar.** ○ El coche de al lado lleva media hora esperando: no le cruces por delante ni te pares donde le tapas.
- **Mirad a los demás animales.** ○ Cebras y springboks quietos mirando todos al mismo punto, o un chillido de francolín, valen más que rastrear el horizonte: el depredador lo delatan ellos.
- **De noche, las charcas iluminadas.** Okaukuejo y Halali las tienen a un paseo de la parcela, y son gratis: la del rinoceronte es la de Okaukuejo. *(La tercera, King Nehale en Namutoni, se perdió al cambiar esa noche por Onguma — era la floja.)* En la plataforma, **todo apagado** ◐ — ni linterna ni pantalla de móvil: la única luz es la del recinto, y el rojo del frontal se queda para el camino.

Y esto no es consejo: es norma

> - **60 km/h** en el parque y **20 en los campamentos.** ●
> - **Solo se puede bajar del coche dentro de los campamentos.** ● En una charca, ni un pie fuera — tampoco para la foto.
> - **Prohibido salirse de las pistas.** ●
> - **Dentro antes de que cierre la puerta.** ● Los horarios siguen al sol y cambian cada semana; para estas fechas, **06:13–19:06** del 3 al 9 de noviembre y **06:10–19:10** del 10 al 16. Están puestos en cada puerta.

- **No se da de comer a nada.** ● Ni al chacal del campamento, ni al cálao del desayuno.

Reglamento de NWR/MEFT — las fuentes, al final de esta guía.

Fotos sin trípode

- **Apoya en la ventanilla**, con una sudadera doblada haciendo de saco. ○ El trípode dentro del coche no sirve para nada.
- **Dispara al amanecer y al atardecer** ○: a mediodía la luz es plana y el aire caliente sobre la costra del pan tiembla y desenfoca a distancia.
- **No pidas la foto perfecta el primer día.** ○ Son cuatro días de parque: la jirafa abriéndose de patas para beber llega sola.

Lo que da sustos y lo que de verdad hace daño

Trece noches en tienda. Lo que hay que interiorizar cabe en cuatro líneas: **sacude las botas cada mañana** ○, **mira dónde pisas al anochecer** —la pista tibia es donde se ponen las serpientes—, **linterna para ir al baño**, y si te encuentras una, **quieto y hacia atrás**: casi todas las mordeduras pasan al intentar matarla o cogerla. El protocolo entero de la picadura de escorpión —qué hacer, qué no, cuándo correr al hospital y cuál— es el documento `22` del dossier.

Y el orden real de peligro no es el que uno se imagina: el animal más peligroso de la ruta es el **mosquito**, y el segundo, el **kudú cruzando la carretera al anochecer**. El león no está en la lista.

Felinos

6 especies

Namibia tiene siete felinos y aquí van seis — el séptimo, el serval, no toca esta ruta: cero registros en las cuatro zonas. Los tres grandes llevan el porcentaje de viajeros que los vio; los tres pequeños son nocturnos y la banda dice lo que hay. El **gato de patas negras** va con un solo registro en toda la historia del polígono: está para saber distinguirlo del gato montés en el nocturno, no porque contéis con verlo.



León

Panthera leo · Lion

70 % LO VIO Okaukuejo 68 % · Halali 75 % · Namutoni 64 % · 191 estancias


Melena en el macho, pardo uniforme. Con calor pasa el día tumbado a la sombra: la actividad es al alba, al anochecer y de noche.

DÓNDE **Okondeka** es la mejor (manada residente), y luego Chudop, Rietfontein y Ombika *(Nebrownii, cerrada por las obras en vuestras fechas)*. Primera y última hora. Ojo: **usan las pistas como caminos**.

CUÁNTOS **335** en el censo de 2018; entre **300 y 400** de forma estable desde los noventa. Fueron **500 en 1980** y **150 en 1952**. ◐

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 160 · **Damaraland (D8–D9)** 3 — de 163 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Leopardo

Panthera pardus · Leopard

12 % LO VIO Okaukuejo 5 % · Halali 31 % · Namutoni 15 % · 163 estancias

Rosetas **sin punto central**, cuerpo bajo y macizo, cola larguísima. Nocturno y arborícola: el más difícil de ver de los grandes.

DÓNDE **Halali y Goas son las dos mejores apuestas** del parque; también Ngobib, Kalkheuwel y Klein Namutoni. La charca iluminada de Halali es famosa por él — NWR lo nombra en su propia ficha del campamento.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 14 · **el Namib (D3–D4)** 1 — de 15 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Sumeet Moghe · CC BY-SA 4.0



Guepardo

Acinonyx jubatus · Cheetah

19 % LO VIO Okaukuejo 18 % · Halali 10 % · Namutoni 50 % · 169 estancias

Manchas **simples**, no rosetas, y dos «lágrimas» negras del ojo a la boca. Silueta esbelta de galgo con cabeza pequeña. Caza **de día**, y ahí está su ventaja frente al león y al leopardo — pero no a cualquier hora: sobre todo **del amanecer a media mañana** y otra vez **antes del ocaso**, y con calor extremo se corre aún más al atardecer ◐.

DÓNDE Llanura abierta del borde de la pan: **Salvadora, Sueda, Charitsaub, Batia y Okerfontein**. De día, que es cuando caza — su presa aquí es el springbok. Y no descartéis la **charca iluminada de Okaukuejo**: uno estuvo bebiendo veinte minutos, de noche, en oct 2025.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 28 · **el Namib (D3–D4)** 2 — de 30 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: AfricanConservation · CC BY-SA 4.0



Caracal

Caracal caracal · Caracal

APENAS REGISTRADA 3 registros en Etosha en oct-nov: muestra corta para decir más

Felino de talla media, **rojizo uniforme y sin manchas**, con **pinceles negros en las orejas** y cara de lince. Solitario y sobre todo nocturno; de día, como mucho, cruzando una pista a primera hora. Es el que salta a por aves al vuelo.

DÓNDE Se ha visto **cruzando la carretera Okaukuejo→Halali** a primera hora (14 nov 2016) y en el **nocturno guiado desde Okaukuejo**, a 20 m del coche (oct 2016). Suerte pura: por eso no hay banda que prometa nada.

Foto: Habib M'henni · CC BY-SA 3.0



Gato montés africano

Felis lybica · African wildcat

APENAS REGISTRADA 8 registros en Etosha en oct-nov: muestra corta para decir más

Como un atigrado espigado de patas largas, con el dorso de las orejas rojizo — esa es la seña frente al gato doméstico. Nocturno y discretísimo: verlo es premio.

DÓNDE El **sundowner de Onguma (D12 o D13)**, y con suerte: es discretísimo. De día, como mucho, unos ojos en un matorral desde la charca.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 8 · **la costa (D5–D7)** 1 · **el Namib (D3–D4)** 1 — de 10 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Bernard DUPONT from FRANCE · CC BY-SA 2.0



Gato de patas negras

Felis nigripes · Black-footed cat

SIN REGISTROS ninguno de los 4.529 registros de su grupo en Etosha en oct-nov es suyo

El felino **más pequeño de África** —menos que un gato doméstico—, moteado y con **bandas negras en las patas**; las plantas de los pies, negras, le dan nombre. Estrictamente nocturno y casi imposible de ver: si en el nocturno veis un «gato» pequeño y muy manchado, es este — el gato montés es más grande, casi liso y con el dorso de las orejas rojizo.

CUÁNTOS **Vulnerable** (UICN) 🟢. De más de 790 registros de investigación con collar y cámara trampa en Etosha, uno solo salió de una cámara 🟢.

Foto: Charles Barilleaux from Cincinnati, Ohio, United States of America · CC BY 2.0

Mamíferos

32 especies

Treinta y dos fichas, de lo que se ve en todas las charcas a lo que hay que tener suerte para cruzarse — los felinos van aparte, justo antes. **El orden no es alfabético: es el de siempre** — primero los grandes.

Y la última entró el 29/08: la **cebra de Hartmann**, que había salido del catálogo el 09/08 por vivir en las lomas del extremo oeste de Etosha, lejos del eje. La ruta cambió y ahora pisa dos sitios donde sí está —la escarpa de Spreetshoogte, donde la propia finca la anuncia, y Damaraland—, y el reparto lo confirma: **23 registros de octubre-noviembre en Etosha, 8 en el Namib y 7 en Damaraland.**



Elefante africano de sabana

Loxodonta africana · African bush elephant

96 % LO VIO Okaukuejo 97 % · Halali 93 % · Namutoni 94 % · 205 estancias

El mayor animal terrestre. Orejas enormes con forma de África y dos «dedos» en la punta de la trompa. Los de Etosha se ven blanquecinos: se rebozan en el polvo calcáreo del pan.

DÓNDE **Olifantsbad, Kalkheuwel, Tsumcor y Homob** *(Nebrownii, su clásica, queda cerrada por las obras en vuestras fechas)*, y a **mediodía**, que es cuando llegan a bañarse. Los de aquí tienen los colmillos gastados de cavar buscando agua.

CUÁNTOS **2.911 ± 697** en el parque en el censo aéreo de 2015, y creciendo **~1,75 % al año** desde 1998. ◐

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 247 · **Damaraland (D8–D9)** 27 — de 274 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Rinoceronte negro

Diceros bicornis · Black rhinoceros

82 % LO VIO Okaukuejo 87 % · Halali 73 % · Namutoni 55 % · 192 estancias

El labio superior es **puntiagudo y prensil** —ramonea arbustos—, la cabeza va alta y lleva dos cuernos. Solitario y de genio corto. Se distingue del blanco por el labio, nunca por el color.

DÓNDE **Charca iluminada de Okaukuejo, de noche**: seguramente el mejor sitio de África para verlo. También en Halali. Etosha tiene la mayor población del mundo de la subespecie suroccidental.

CUÁNTOS Namibia tiene **~2.200** (2023), **más de un tercio de todos los de África**, y más del **70 %** de los namibios están aquí: es la mayor población de rinoceronte negro de un solo espacio protegido del mundo. ◐ El número exacto del parque **no se publica**, y es a propósito: furtivismo. ○

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 117 · **Damaraland (D8–D9)** 2 — de 119 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: AfricanConservation · CC BY-SA 4.0



Rinoceronte blanco

Ceratotherium simum · White rhinoceros

39 % LO VIO Okaukuejo 40 % · Halali 38 % · Namutoni 31 % · 175 estancias

Labio **ancho y cuadrado** para pacer hierba, cabeza baja y joroba en la nuca. Más grande y más sociable que el negro. Lo de «blanco» viene de *wijd* (ancho) en afrikáans.

DÓNDE Se extinguió aquí y lo reintrodujeron en 1995: hoy es **apenas una docena**. Se cita de vez en cuando en Springbokfontein. **OJO** **El 39 % de los partes que dice haberlo visto no cuadra** con una docena de animales en 22.000 km²: la mayor parte tiene que ser rinoceronte **negro** mal identificado. Mira el labio, no el color. No cuentes con verlo.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 18 · **el Namib (D3–D4)** 1 — de 19 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Jirafa angoleña

Giraffa giraffa angolensis · Angolan giraffe

98 % LO VIO Okaukuejo 99 % · Halali 93 % · Namutoni 100 % · 208 estancias

La subespecie del suroeste, de manchas irregulares que se desvanecen hacia las patas. Al beber tiene que abrir las patas en compás: su momento más vulnerable, y el mejor para la foto.

DÓNDE En cualquier charca abierta y, de noche, en la iluminada de Okaukuejo. Batia y Kalkheuwel la tienen habitual.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 341 · **Damaraland (D8–D9)** 13 · **el Namib (D3–D4)** 1 — de 355 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Cebra de Burchell

Equus quagga burchellii · Burchell's zebra

98 % LO VIO Okaukuejo 97 % · Halali 98 % · Namutoni 100 % · 208 estancias

La cebra de llanura: rayas **anchas** que siguen hasta la barriga, con «rayas de sombra» pardas intercaladas. Es la que forma manadas en las charcas.

DÓNDE Por todo el parque, en las llanuras del borde de la pan. **En noviembre siguen concentradas**: no vuelven al oeste hasta finales de diciembre. *(La cebra de montaña de Hartmann vive solo en las lomas del extremo oeste — fuera de vuestro eje: la que veáis es esta.)*

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 534 · **el Namib (D3–D4)** 9 · **Damaraland (D8–D9)** 1 — de 544 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 3.0



Órix o gemsbok

Oryx gazella · Gemsbok

96 % LO VIO Okaukuejo 97 % · Halali 93 % · Namutoni 100 % · 203 estancias

Cuernos rectos como lanzas —en el macho y en la hembra— y máscara facial en blanco y negro. Aguanta sin beber; es el emblema del país y sale en el escudo de Namibia.

DÓNDE Charcas abiertas: Olifantsbad, Kalkheuwel, King Nehale. Aguanta el calor mejor que nadie, así que se ve a horas en que el resto se esconde.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 346 · **el Namib (D3–D4)** 168 · **la costa (D5–D7)** 6 · **Damaraland (D8–D9)** 2 — de 522 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Springbok

Antidorcas marsupialis · Springbok

MUY FRECUENTE 16,2 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (733 de 4.529)

Banda castaña que separa el lomo del vientre blanco, y una cresta de pelo blanco en la grupa que abre al saltar. Da botes rígidos con el lomo arqueado: el *pronking*.

DÓNDE Por todas partes en llanura abierta, y en Okaukuejo llegan **en manada por la tarde**. Es la presa principal del guepardo.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 733 · **el Namib (D3–D4)** 41 · **Damaraland (D8–D9)** 23 · **la costa (D5–D7)** 17 — de 814 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Gran kudú

Tragelaphus strepsiceros · Greater kudu

MUY FRECUENTE 4,8 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (218 de 4.529)

El macho lleva cuernos en espiral y una uve blanca entre los ojos; el costado, rayas verticales finas. **Salta vallas altísimas: es el gran peligro de la carretera al anochecer.**

DÓNDE Zonas arboladas y charcas con monte alrededor: Chudop, Rietfontein, Groot Okevi. Al anochecer, ojo en la carretera.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 218 · **Damaraland (D8–D9)** 10 · **el Namib (D3–D4)** 3 — de 231 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: L0k1m0nk33 at English Wikipedia · CC BY-SA 3.0



Eland común

Taurotragus oryx · Common eland

45 % LO VIO Okaukuejo 47 % · Halali 33 % · Namutoni 73 % · 175 estancias

El antílope más grande y pesado, de aspecto casi bovino: papada colgante y cuernos rectos con una espiral en la base.

DÓNDE Chudop es la charca donde se cita. Escaso y arisco: no es un avistamiento fácil.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 19 · **el Namib (D3–D4)** 4 — de 23 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 4.0



Ñu azul

Connochaetes taurinus · Blue wildebeest

94 % LO VIO Okaukuejo 94 % · Halali 91 % · Namutoni 100 % · 204 estancias

Morro cuadrado, crin y barba oscuras, cuernos que bajan y vuelven a subir. Silueta desconcertante: toro por delante, caballo por detrás.

DÓNDE Grandes manadas mixtas con cebra en **Goas y Batia**.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 389 · **el Namib (D3–D4)** 9 — de 398 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Buiobuione · CC BY-SA 4.0



Impala de cara negra

Aepyceros melampus petersi · Black-faced impala

MUY FRECUENTE 3,0 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (137 de 4.529)

Subespecie endémica del noroeste de Namibia y el suroeste de Angola: como la impala común, pero con una franja negra bien marcada en la cara. Escasa y protegida.

DÓNDE **Lo primero que se ve entrando por Von Lindequist.** Klein Namutoni, Chudop, Kalkheuwel, Goas y Olifantsbad — están donde las soltaron en los 70 y en 30 años se han movido 31 km.

CUÁNTOS Quedan **menos de 4.000 en el mundo** —las estimaciones bailan entre 1.000 y 4.300— y la mayoría está aquí, de los ~200 que soltaron en los años setenta. UICN: **Vulnerable.** ◐

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 137 · **Damaraland (D8–D9)** 2 — de 139 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Dik-dik de Damara

Madoqua damarensis · Damara dik-dik

FRECUENTE 1,6 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (72 de 4.529)

Antílope diminuto, a la altura de la rodilla, con trompita móvil y un penacho de pelo en la frente. Casi siempre en pareja y pegado al monte espeso.

DÓNDE **El sitio fiable es el Dik-dik Drive**, el bucle nada más entrar por Von Lindequist *(~206 registros frente a 4 en Okaukuejo)*, y Klein Namutoni. Primera hora de la mañana y última de la tarde.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 72 · **Damaraland (D8–D9)** 1 — de 73 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 3.0



Hiena manchada

Crocuta crocuta · Spotted hyena

55 % LO VIO Okaukuejo 54 % · Halali 56 % · Namutoni 62 % · 176 estancias

Pelaje moteado, cuello grueso, **orejas redondas** y lomo caído hacia atrás. Es la que se oye de noche desde la tienda.

DÓNDE Charcas iluminadas, y al amanecer en King Nehale y Chudop *(Nebrownii, cerrada por obras)*. Es la hiena por defecto: ~340 en el sistema Etosha–Kunene.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 158 · **Damaraland (D8–D9)** 1 — de 159 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Hiena parda

Parahyaena brunnea · Brown hyena

18 % LO VIO Okaukuejo 22 % · Halali 8 % · Namutoni 14 % · 165 estancias

Melena larga y desgreñada de pelo oscuro y **orejas puntiagudas**. Mucho más rara y esquiva que la manchada; verla es un premio.

DÓNDE Está en el parque, pero **dala por improbable**: nocturna, solitaria y sin densidad publicada. Cruza desde Ongava a buscar comida. Que un 18 % de los partes diga haberla visto choca con eso: **orejas puntiagudas y melena** o es la manchada.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 7 · **la costa (D5–D7)** 4 · **el Namib (D3–D4)** 4 · **Damaraland (D8–D9)** 1 — de 16 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Bernard DUPONT from FRANCE · CC BY-SA 2.0



Chacal de lomo negro

Lupulella mesomelas · Black-backed jackal

MUY FRECUENTE 4,5 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (203 de 4.529)

La «silla de montar» negra y plateada sobre el lomo, y orejas grandes. Omnipresente en las charcas y desvergonzado en los campamentos.

DÓNDE En todas las charcas, y merodeando los campamentos al anochecer a por las sobras.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 203 · **la costa (D5–D7)** 57 · **el Namib (D3–D4)** 16 · **Damaraland (D8–D9)** 2 — de 278 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Ratel o tejón de la miel

Mellivora capensis · Honey badger

REGULAR 0,4 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (18 de 4.529)

Manto gris claro desde la cabeza hasta la cola sobre cuerpo negro. Pequeño, bajo, y con una fama de temerario que se ha ganado a pulso.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 18 — de 18 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Sumeet Moghe · CC BY-SA 4.0



Facóquero

Phacochoerus africanus · Common warthog

FRECUENTE 1,4 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (65 de 4.529)

Verrugas en la cara y colmillos curvos hacia arriba. Corre con la cola tiesa como una antena y **se arrodilla sobre los codos** para pacer.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 65 · **el Namib (D3–D4)** 9 · **Damaraland (D8–D9)** 2 — de 76 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Steenbok

Raphicerus campestris · Steenbok

FRECUENTE 2,3 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (105 de 4.529)

Pequeño, rojizo y con orejas enormes; solo el macho lleva cuernos, cortos y rectos. Se queda clavado mirándote y sale disparado en zigzag.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 105 · **Damaraland (D8–D9)** 13 · **la costa (D5–D7)** 1 — de 119 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 3.0



Jineta de manchas pequeñas

Genetta genetta · Small-spotted genet

APENAS REGISTRADA 4 registros en Etosha en oct-nov: muestra corta para decir más

Cuerpo alargado de gato, pelaje moteado y **cola anillada larguísima**. Nocturna y trepadora: la típica sombra que cruza el foco del campamento cuando cenáis.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 4 · **el Namib (D3–D4)** 1 — de 5 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Frédéric SALEIN · CC BY-SA 2.0



Alcélafo rojo

Alcelaphus buselaphus caama · Red hartebeest

MUY FRECUENTE 3,2 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (144 de 4.529)

Cara larguísima y estrecha, cuernos en forma de arpa montados sobre un pedúnculo, y grupa muy caída. Color rojizo brillante al sol.

DÓNDE Llanuras abiertas del este; se cita en la charca de King Nehale, en Namutoni.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 144 · **el Namib (D3–D4)** 2 · **Damaraland (D8–D9)** 1 — de 147 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 3.0



Zorro orejudo

Otocyon megalotis · Bat-eared fox

REGULAR 0,5 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (21 de 4.529)

Orejas descomunales que usa de radar para **oír insectos bajo tierra**. En pareja o en grupillo familiar, trotando por la llanura al amanecer y al atardecer.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 21 · **el Namib (D3–D4)** 8 — de 29 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 3.0



Puercoespín del Cabo

Hystrix africaeaustralis · Cape porcupine

APENAS REGISTRADA 1 registro en Damaraland en oct-nov: muestra corta para decir más

El roedor grande de África, cubierto de **púas blancas y negras**. Nocturno; a menudo se ven solo las púas que va perdiendo por el camino.

DÓNDE **De noche, en la charca iluminada de Halali:** las guías del parque lo citan entre los visitantes habituales junto con el leopardo — GBIF, en cambio, apenas lo registra: es nocturno, como la liebre saltadora.

Foto: Steven Lek · CC BY-SA 4.0



Liebre saltadora

Pedetes capensis · Springhare

SIN REGISTROS ninguno de los 4.529 registros de su grupo en Etosha en oct-nov es suyo

Ni liebre ni canguro, pero lo parece: **salta a dos patas** y sus ojos devuelven un reflejo rojo intenso a la linterna. Los guías la enseñan casi cada nocturno — aunque GBIF ni la registre: nada nocturno se sube.

Foto: Bernard DUPONT from FRANCE · CC BY-SA 2.0



Klipspringer o saltarrocas

Oreotragus oreotragus · Klipspringer

APENAS REGISTRADA 4 registros en Damaraland en oct-nov: muestra corta para decir más

Antilopito de los roquedos: se sostiene **de puntillas, sobre las pezuñas**, en piedras imposibles. Casi siempre en pareja y quieto, mirándote desde arriba. Damaraland y Twyfelfontein.

EN LA RUTA **Damaraland (D8–D9)** 4 · **Etosha (D10–D13)** 1 — de 5 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Munificent · CC BY 2.5



Mangosta amarilla


Cynictis penicillata · Yellow mongoose

REGULAR 0,7 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (31 de 4.529)

Rojiza-amarillenta, con la **punta de la cola blanca** y aire de zorrillo. De día y pegada a sus madrigueras. De las tres mangostas diurnas de la guía, es la de la cola blanca: la esbelta la lleva negra, y la rayada va en tropa.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 31 — de 31 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Babuino chacma

Papio ursinus · Chacma baboon

MUY FRECUENTE 7,8 % de los registros de su grupo en Damaraland en oct-nov (17 de 219)

El primate grande de los miradores y las áreas de descanso: hocico de perro, tropa jerárquica y cola quebrada en «L». En esta ruta vive en la escarpa y el roquedo; en Etosha apenas figura (9 registros GBIF). **Nada comestible a la vista**: donde hay turistas es un ladrón profesional.

DÓNDE En esta ruta, los miradores y áreas de descanso de la escarpa (D2) y de Damaraland (D8–D9) — en Etosha apenas figura. Ventanillas arriba si os alejáis con comida a la vista.

EN LA RUTA **Damaraland (D8–D9)** 17 · **el Namib (D3–D4)** 10 · **Etosha (D10–D13)** 2 · **la costa (D5–D7)** 1 — de 30 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Mangosta rayada

Mungos mungo · Banded mongoose

FRECUENTE 2,2 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (101 de 4.529)

La mangosta social: tropas de decenas, rayas transversales en el lomo y parloteo constante. Diurna y descarada — la contraria exacta de la amarilla, que va sola.

DÓNDE De día, por el suelo de los campamentos y claros del este — Namutoni es su zona: las tropas cruzan la pista en fila y parloteando (400 registros en el parque).

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 101 — de 101 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Zorro del Cabo

Vulpes chama · Cape fox

ESCASA 0,2 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (10 de 4.529)

El único zorro verdadero del sur de África: pequeño, gris plata, con la cola tupida de punta negra. Estrictamente nocturno: es objetivo del safari nocturno, no del día.

DÓNDE Solo de noche y solo guiado: **el nocturno guiado de NWR (D10 en Okaukuejo, D11 en Halali), que lo lleva como objetivo declarado, o el Sundowner Drive de Onguma (D12 o D13)**, ya fuera del parque. Por libre está prohibido circular a oscuras, y él no sale de día.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 10 · **el Namib (D3–D4)** 3 · **la costa (D5–D7)** 1 — de 14 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 3.0



Lobo de tierra

Proteles cristata · Aardwolf

APENAS REGISTRADA 1 registro en Etosha en oct-nov: muestra corta para decir más

Parece una hiena en miniatura, con crin eréctil y franjas verticales, pero cena termitas. Nocturno estricto: su cifra de GBIF infrarrepresenta, como la de la liebre saltadora.

DÓNDE El **sundowner de Onguma (D12 o D13)**, en las llanuras con termiteros — que son su despensa.

Foto: kevinatbrakputs · CC BY 4.0



Ardilla de matorral de Smith

Paraxerus cepapi · Smith's bush squirrel

FRECUENTE 1,5 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (66 de 4.529)

Parda grisácea, de vientre claro y cola larga poco tupida. Es la ardilla **de los árboles** —anida en los huecos del mopane, de ahí su apodo de «ardilla de los mopanes»— frente a la terrestre de cola en abanico, que es de las llanuras.

DÓNDE **Dentro del recinto de Halali** — restaurante y parcelas, donde roba lo que se deje— y en el de Namutoni. Los informes de mamíferos la dan «común en el campamento de Halali».

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 66 — de 66 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Christoph Strässler · CC BY-SA 2.0



Mangosta esbelta

Galerella sanguinea · Slender mongoose

REGULAR 0,3 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (15 de 4.529)

La solitaria de **punta de cola negra**, que levanta al correr. Baja, alargada y rojiza: cruza la pista como una flecha y se para en alto —un termitero, una rama— a mirar. La amarilla lleva la punta blanca; la rayada va en tropa.

DÓNDE El **Dik-dik Drive de Namutoni** es su circuito fiable, y las pistas del este a primera y última hora, cruzando por delante del coche.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 15 · **la costa (D5–D7)** 1 · **el Namib (D3–D4)** 1 — de 17 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Sara&Joachim · CC BY-SA 2.0



Cebra de montaña de Hartmann

Equus zebra hartmannae · Hartmann's mountain zebra

REGULAR 0,5 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (23 de 4.529)

Cebra de montaña: **sin las rayas de sombra pardas** de la de Burchell, la **panza blanca y sin rayar**, una **papada colgante** bajo la garganta y una parrilla de rayas anchas en la grupa. Sube laderas donde la de llanura no entra.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 23 · **el Namib (D3–D4)** 8 · **Damaraland (D8–D9)** 7 — de 38 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 4.0

Aves rapaces

40 especies

Cuarenta rapaces, diurnas y nocturnas, y el criterio es el del método: entra toda la que GBIF registra **diez veces o más en octubre-noviembre en alguna zona de la ruta.** Las que se quedan por debajo, para que no las echéis en falta: azor lagartijero oscuro (9, en el este de Etosha), gavilán ovambo (8), búho del Cabo (7), buitre del Cabo (6, su casa es Waterberg), cernícalo primilla (5), águila esteparia (4), mochuelo de El Cabo (4), cernícalo patirrojo (3), alimoche (3), buitre encapuchado (2) y el **halcón del Amur** (2): sus bandadas llegan a Etosha en diciembre y el grueso pasa en febrero-marzo *(1 registro en noviembre, 9 en diciembre, 34 en marzo)* — justo después de vosotros.

Cómo se separan, en corto: las **águilas** grandes por la silueta y el pecho (marcial: capucha y pecho blanco moteado; rapaz: parda lisa; cafre: negra con V blanca, solo en roca; bateleur: sin cola); las **culebreras** por los ojos amarillos enormes y las patas desnudas; los **buitres** por la cabeza (dorsiblanco: negra y delgada, en piña; orejudo: rosada y enorme; cabeciblanco: blanca, solitario); los **azores y gavilanes** por las patas rojas o amarillas y el obispillo; los **aguiluchos** por el vuelo bajo y bamboleante; los **halcones** por las alas puntiagudas y el vuelo directo; los **búhos** por el ojo (amarillo, naranja u oscuro) y el tamaño. **Y mirad la fecha:** el ratonero, los aguiluchos, la calzada y la pomerana son europeos que llegan en octubre-noviembre *(en Etosha sus registros arrancan en noviembre)*; la de Wahlberg es africana y llega en agosto-septiembre a criar; los milanos llegan con las lluvias, de noviembre en adelante.



Secretario

Sagittarius serpentarius · Secretarybird


REGULAR 0,6 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (440 de 69.600)

Rapaz de patas larguísimas que **caza andando** y mata serpientes a pisotones. Las plumas negras de la nuca le dan el nombre, como plumas de escribiente tras la oreja.

CUÁNTOS **En Peligro** (UICN, evaluación de 2020) ◐: declive rápido en toda África por la pérdida de llanura abierta. Etosha es un buen sitio: 440 registros en oct-nov.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 440 · **el Namib (D3–D4)** 48 · **Damaraland (D8–D9)** 7 · **la costa (D5–D7)** 1 — de 496 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Sumeet Moghe · CC BY-SA 4.0



Águila marcial

Polemaetus bellicosus · Martial eagle

REGULAR 0,3 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (210 de 69.600)

La mayor águila de África: capucha oscura y pecho blanco moteado. Suele estar posada, inmóvil, en lo alto de una acacia.

CUÁNTOS **En Peligro** (UICN, evaluación de 2020) ◐: la mayor águila de África está en declive en toda su área por electrocución y persecución; los parques grandes como Etosha son los sitios donde todavía se ve.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 210 · **Damaraland (D8–D9)** 18 · **el Namib (D3–D4)** 15 · **la costa (D5–D7)** 8 — de 251 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Águila rapaz

Aquila rapax · Tawny eagle

FRECUENTE 1,1 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (755 de 69.600)

Parda entera, del canela claro al chocolate —cada individuo de un tono—, sin el pecho blanco del águila marcial. Posada **a la vista en lo alto de una acacia o un poste**, y baja a las carroñas junto a la pista: es la gran águila más registrada del parque.

DÓNDE Posada a la vista junto a las charcas — se cita en **Goas**, entre Halali y Namutoni. Los grupos de birding la anotan casi a diario en el eje, de una en una.

CUÁNTOS **Vulnerable** para la UICN desde 2018, reconfirmada en 2021 ● — y en Namibia, **En Peligro**: ~415–563 parejas en el país, un declive del 63 % en 30 años y el rango contraído hacia los parques. Etosha tiene la tasa de registro más alta de Namibia, y aun así su libro rojo avisa: «ya no es común» ni aquí. ●

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 755 · **Damaraland (D8–D9)** 5 · **el Namib (D3–D4)** 2 — de 762 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 3.0



Águila volatinera o bateleur

Terathopius ecaudatus · Bateleur

REGULAR 0,7 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (474 de 69.600)

En vuelo **no se le ve cola**: es una tabla negra con la cabeza roja, y se balancea de lado a lado planeando. De los rapaces más reconocibles del parque.

DÓNDE Se cita sobre **Kalkheuwel**, junto con el milano. Etosha reúne unas 40 rapaces, casi el 70 % de las de Namibia.

CUÁNTOS **En Peligro** (UICN, evaluación de 2020) ◐, tras décadas de veneno y pérdida de hábitat fuera de los parques. Aquí sigue siendo de las águilas más registradas: 474 en oct-nov.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 474 · **Damaraland (D8–D9)** 3 — de 477 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Derek Keats from Johannesburg, South Africa · CC BY 2.0



Águila cafre o de Verreaux

Aquila verreauxii · Verreaux's eagle

REGULAR 0,8 % de los registros de su grupo en Damaraland en oct-nov (80 de 10.069)

Águila grande y **negra entera** con una **V blanca en la espalda** y obispillo blanco; en vuelo, alas estrechas en la base y anchas en la mano, en forma de **hoja**. Águila **de acantilado**: la de la escarpa, los pasos y los roquedos —come damanes—, no la de la llanura.

DÓNDE **El alto del paso de Spreetshoogte / Namibgrens (D2)**: una pareja se cita año tras año (nov 2016, oct 2017, oct 2025). También en el Naukluft camino de Solitaire (sep 2023) y en Khowarib, al norte del paso de Grootberg (oct 2024).

EN LA RUTA **Damaraland (D8–D9)** 80 · **el Namib (D3–D4)** 8 · **Etosha (D10–D13)** 5 — de 93 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Derek Keats from Johannesburg, South Africa · CC BY 2.0



Águila azor africana

Aquila spilogaster · African hawk-eagle

ESCASA 0,1 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (83 de 69.600)

Águila mediana, **negra por arriba y blanca con estrías negras por abajo**, patas emplumadas; en pareja, en el monte arbolado, cazando pintadas y francolines. Los jóvenes son rojizos por abajo, sin nada de blanco: otra ave, a efectos prácticos.

DÓNDE En pareja, **bebiendo en las charcas de Etosha** —tramo Okaukuejo→Halali, oct 2024 y nov 2023—; también cerca de Solitaire (nov 2015).

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 83 · **Damaraland (D8–D9)** 61 · **el Namib (D3–D4)** 3 — de 147 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Bernard DUPONT from FRANCE · CC BY-SA 2.0



Águila de Wahlberg

Hieraaetus wahlbergi · Wahlberg's eagle


MUY ESCASA 0,05 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (33 de 69.600)

Águila mediana, **parda uniforme** con una **cresta corta** que apunta hacia atrás y **cola larga y estrecha**; en vuelo, alas y cola rectas como una cruz. Migrante intraafricana que **llega en agosto-septiembre a criar**: está en vuestras fechas. Hay una forma pálida.

DÓNDE **Al sur de Okaukuejo**, en las llanuras y charcas del entorno del campamento (10 nov 2023; nov 2015).

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 33 — de 33 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Bernard DUPONT from FRANCE · CC BY-SA 2.0



Águila calzada

Hieraaetus pennatus · Booted eagle

MUY ESCASA 0,03 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (22 de 69.600)

La misma que cría en España: pequeña, patas emplumadas, forma clara (cuerpo blanco y alas oscuras, con las «luces» blancas en los hombros) y forma oscura. Aquí es a la vez invernante europea y residente del sur; en el Namib, la de la escarpa.

DÓNDE Fase oscura en Etosha (nov 2019) y en el sur del Namib (oct 2017); sin sitio fijo — cualquier rapaz pequeña planeando sobre la escarpa merece los prismáticos.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 22 · **Damaraland (D8–D9)** 5 — de 27 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Derek Keats from Johannesburg, South Africa · CC BY 2.0



Águila pomerana

Clanga pomarina · Lesser spotted eagle

MUY ESCASA 0,02 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (11 de 69.600)

Águila mediana, parda con la **cabeza y las cubiertas más claras** que las alas —el «águila con chaleco»—; en vuelo, alas anchas y una **mancha blanca en forma de coma** en la base de las primarias por arriba. Migrante del este de Europa que llega en noviembre; muy escasa aquí.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 11 — de 11 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Ron Knight from Seaford, East Sussex, United Kingdom · CC BY 2.0



Culebrera pechinegra

Circaetus pectoralis · Black-chested snake eagle

ESCASA 0,1 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (91 de 69.600)

Águila mediana con **capucha y pecho negros y vientre blanco puro**, **ojo amarillo** grande de culebrera y cabeza redonda; en vuelo, alas blancas por debajo. **Se cierne** —una de las pocas águilas que lo hace— sobre las llanuras y se posa en lo alto de árboles y postes.

DÓNDE El **Namib-Naukluft** (cuatro en un solo viaje, sep 2023) y, en Etosha, las **llanuras de Andoni** (oct 2023) y la pista de Okaukuejo al bosque de fantasmas (dic 2004).

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 91 · **el Namib (D3–D4)** 58 · **Damaraland (D8–D9)** 45 · **la costa (D5–D7)** 18 — de 212 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Culebrera sombría

Circaetus cinereus · Brown snake eagle


MUY ESCASA 0,08 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (55 de 69.600)

Parda oscura entera, con **cabeza grande y redonda de ojos amarillos** enormes y **patas desnudas** grises; en vuelo, las plumas de vuelo blancas contra el cuerpo oscuro. Muy quieta en lo alto de un árbol seco, mirando al suelo horas.

DÓNDE Citas sueltas en la **zona de Namutoni** (oct 2011) y al sur del parque; sin sitio fijo.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 55 · **Damaraland (D8–D9)** 19 · **el Namib (D3–D4)** 1 — de 75 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Bernard DUPONT from FRANCE · CC BY-SA 2.0



Pigargo vocinglero

Icthyophaga vocifer · African fish eagle

APENAS REGISTRADA 5 registros en Etosha en oct-nov: muestra corta para decir más

Cabeza blanca y pecho castaño; su reclamo es, literalmente, el sonido de África. Necesita agua abierta, así que aquí depende del pan y de las charcas grandes.

DÓNDE Depende de que haya agua abierta: la zona de **Fischer's Pan**, en el este, es donde tiene sentido buscarlo.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 5 · **Damaraland (D8–D9)** 1 — de 6 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Derek Keats from Johannesburg, South Africa · CC BY 2.0



Águila pescadora

Pandion haliaetus · Osprey

MUY ESCASA 0,04 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (17 de 46.876)

El águila de las playas del mundo entero: blanca por abajo, parda por arriba, con **antifaz negro** en la cabeza blanca; se cierne sobre el agua y **se zambulle de pies** a por el pez. Invernante europea en la laguna de Walvis Bay.

DÓNDE En la ruta la única cita concreta es **la fuente del fondo de las llanuras de Andoni**, pescando (oct 2012). En la laguna de Walvis Bay la registra GBIF en oct-nov, pero ningún informe de viaje la cita allí: buscadla, sin contar con ella.

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 17 · **Damaraland (D8–D9)** 1 — de 18 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: El Golli Mohamed · CC BY-SA 4.0



Buitre dorsiblanco africano

Gyps africanus · White-backed vulture

REGULAR 0,9 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (598 de 69.600)

El buitre común de la sabana. El dorso pálido que le da nombre solo se le ve bien en vuelo.

CUÁNTOS **En Peligro Crítico** para la UICN (evaluación de 2021) ◐: el buitre común de la sabana ha perdido más del 90 % en tres generaciones por venenos y cebos. Que sea el más visible no quiere decir que vaya bien.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 598 · **el Namib (D3–D4)** 57 · **Damaraland (D8–D9)** 13 — de 668 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Yathin sk · CC BY-SA 3.0



Buitre orejudo

Torgos tracheliotos · Lappet-faced vulture


REGULAR 0,5 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (337 de 69.600)

El buitre grande y feo, de **cabeza rosada desnuda** y pico enorme: es el que abre la piel del cadáver y deja comer al resto. Manda en la carroña.

CUÁNTOS **En Peligro** (UICN, evaluación de 2019) ◐, sobre todo por envenenamiento en cebos puestos para depredadores.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 337 · **el Namib (D3–D4)** 79 · **Damaraland (D8–D9)** 24 — de 440 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Yathin sk · CC BY-SA 3.0



Buitre cabeciblanco

Trigonoceps occipitalis · White-headed vulture

ESCASA 0,2 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (107 de 69.600)

Buitre grande de **cabeza blanca y desnuda con la cara rosada**, pico anaranjado de punta azulada, y **vientre y «calzones» blancos** que en vuelo contrastan con las alas negras. Casi siempre solo o en pareja, no en la piña de los dorsiblancos; suele llegar el primero a la carroña.

DÓNDE En las **carroñas y charcas de Etosha**, uno o dos entre treinta dorsiblancos: camino de Namutoni (oct 2023) y una pareja bebiendo en el tramo Okaukuejo→Halali (oct 2024). Un viaje de nov 2002 lo falló: no es seguro.

CUÁNTOS **En Peligro Crítico** (UICN, evaluación de 2017, reconfirmada en 2021) ◐. Con 107 registros en oct-nov es, tras los dos buitres comunes, el más registrado del parque: Etosha es de sus últimos refugios en el sur.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 107 · **el Namib (D3–D4)** 1 — de 108 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Bernard DUPONT from FRANCE · CC BY-SA 2.0



Azor lagartijero claro

Melierax canorus · Pale chanting goshawk

FRECUENTE 1,5 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (1076 de 69.600)

Gris claro, con patas y cera del pico **rojas** y **obispillo blanco**. Casi siempre posado en un poste, oteando el suelo: la rapaz más registrada de toda la ruta. *(Su hermano oscuro, el azor lagartijero oscuro, de gris más plomizo y obispillo barrado, asoma por el este de Etosha con 9 registros en oct-nov — por debajo del umbral, sin ficha.)*

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 1.076 · **el Namib (D3–D4)** 225 · **Damaraland (D8–D9)** 71 · **la costa (D5–D7)** 66 — de 1.438 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Hans Stieglitz · CC BY-SA 3.0



Gavilán gabar

Micronisus gabar · Gabar goshawk

REGULAR 0,4 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (277 de 69.600)

Gavilán pequeño, gris con el **pecho blanco finamente barrado**, **cera y patas rojas** y **obispillo blanco** al volar; hay una forma negra (melánica) casi entera. Se posa dentro de la copa, no en lo alto como el azor lagartijero, y caza pajarillos en los recintos.

DÓNDE **Las charcas de los campamentos:** emboscando a los pajarillos que bajan a beber en la de Okaukuejo (dic 2004) y un adulto negro (melánico) en la de Halali (sep 2023).

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 277 · **Damaraland (D8–D9)** 16 · **el Namib (D3–D4)** 2 — de 295 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Lip Kee · CC BY-SA 2.0



Gavilán chikra

Accipiter badius · Shikra (little banded goshawk)

MUY ESCASA 0,02 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (13 de 69.600)

Gavilán pequeño y pálido: gris por arriba, **finamente barrado de rojizo** por abajo, **ojo rojo** en el macho y patas amarillas. En el monte y los recintos, con vuelo rápido y directo. Allí es el *little banded goshawk*.

DÓNDE **El campamento de Halali:** tres informes de octubre-noviembre lo sitúan dentro del recinto (2016, 2023 ×2).

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 13 · **Damaraland (D8–D9)** 1 — de 14 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Judy Gallagher · CC BY 2.0



Aguilucho caricalvo común

Polyboroides typus · African harrier-hawk (gymnogene)

MUY ESCASA 0,03 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (21 de 69.600)

Rapaz gris de **cara desnuda amarilla** que se pone roja al excitarse, cola negra con banda blanca y **patas de doble articulación**: mete la pata en huecos y nidos de tejedor a por pollos y trepa por los troncos como un pájaro carpintero torpe.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 21 — de 21 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Aguilucho papialbo

Circus macrourus · Pallid harrier

MUY ESCASA 0,03 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (19 de 69.600)

Aguilucho de llanura, **vuelo bajo y bamboleante** con las alas en V; el macho gris muy pálido con la punta del ala negra en cuña. Invernante europeo: llega en octubre-noviembre a las llanuras del este de Etosha. Hembras y jóvenes, pardos con obispillo blanco — casi imposibles de separar del cenizo en el campo.

DÓNDE Las **llanuras de Andoni** a primera hora (dos machos, nov 2002) y un macho en el tramo Okaukuejo→Halali (16 nov 2023).

CUÁNTOS **Casi Amenazado** (UICN) ◐: cría en las estepas de Rusia y Kazajistán y viene a pasar aquí el verano austral.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 19 — de 19 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Shiv's fotografia · CC BY 4.0



Aguilucho cenizo

Circus pygargus · Montagu's harrier

MUY ESCASA 0,02 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (11 de 69.600)

El otro aguilucho europeo del verano austral: macho gris con **una banda negra en el ala** por arriba y **rayas rojizas** en el vientre; hembras y jóvenes pardos con obispillo blanco. Vuela bajo, a ras de la hierba, ladeándose. En Etosha, de noviembre en adelante.

DÓNDE **Andoni**, un macho a primera hora (nov 2002), y al **borde de la pan** (nov 2018).

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 11 — de 11 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Rohitjahnavi · CC BY 4.0



Elanio común

Elanus caeruleus · Black-winged (black-shouldered) kite

REGULAR 0,3 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (240 de 69.600)

Blanco y gris pálido con los **hombros negros** y el **ojo rojo**; **se cierne** como un cernícalo sobre la hierba y se posa en postes y cables junto a la carretera. Allí lo llaman *black-shouldered kite*.

DÓNDE Citado en Etosha y en los pastizales de Windhoek (nov 2015, nov 2018): postes y cables junto a la carretera, desde el D1.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 240 · **Damaraland (D8–D9)** 20 · **el Namib (D3–D4)** 8 · **la costa (D5–D7)** 6 — de 274 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Milano negro

Milvus migrans · Black kite / yellow-billed kite

MUY ESCASA 0,05 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (34 de 69.600)

Pardo oscuro con **cola ahorquillada** que gira como un timón; vuelo flotante, alas anguladas. Casi todos los de aquí son de **pico amarillo** —el milano piquigualdo, que la mayoría trata como raza suya (*M. aegyptius parasitus*) y GBIF cuenta aparte con menos registros—. Llegan con las lluvias: en Etosha los registros arrancan en noviembre y se disparan de diciembre a febrero. Ronda basureros, campamentos y carreteras.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 34 · **Damaraland (D8–D9)** 5 — de 39 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Tisha Mukherjee · CC BY-SA 4.0



Busardo ratonero (ratonero estepario)

Buteo buteo · Steppe buzzard

MUY ESCASA 0,07 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (52 de 69.600)

El ratonero de Europa en su raza oriental (*vulpinus*), **rojiza y con la cola canela**: pasa aquí el verano austral y llega en octubre-noviembre. Posado en postes junto a la carretera; el ratonero típico, sin nada llamativo — lo que lo distingue es la fecha.

DÓNDE «Habitual en Etosha» en octubre de 2015; en noviembre de 2016, pocos y en cinco días. Sin sitio fijo: postes junto a la pista.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 52 · **Damaraland (D8–D9)** 13 · **el Namib (D3–D4)** 2 — de 67 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Dick Daniels (http://theworldbirds.org/) · CC BY-SA 3.0



Busardo augur

Buteo augur · Augur buzzard

REGULAR 0,4 % de los registros de su grupo en Damaraland en oct-nov (43 de 10.069)

Compacto y contrastado: **negro por arriba, blanco por abajo, cola rojo ladrillo** corta y ancha. Planea con las alas en V y se cierne sobre la escarpa; hay una forma oscura. Es la rapaz de la roca en Damaraland.

DÓNDE **Namibgrens / paso de Spreetshoogte (D2)** —7 nov 2016; 31 oct y 1 nov 2023— y la carretera **Kamanjab→Okaukuejo** (D10); también en Khowarib, al norte de Grootberg (oct 2024).

EN LA RUTA **Damaraland (D8–D9)** 43 · **el Namib (D3–D4)** 9 · **la costa (D5–D7)** 6 · **Etosha (D10–D13)** 3 — de 61 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Busardo augur meridional

Buteo rufofuscus · Jackal buzzard

ESCASA 0,09 % de los registros de su grupo en el Namib en oct-nov (10 de 10.659)

El primo del sur: negro por arriba, **pecho rojo ladrillo** y la misma cola roja. Su reclamo, un ladrido de chacal que le da el nombre inglés. Escarpa y montaña: Spreetshoogte, Naukluft.

DÓNDE **El paso de Spreetshoogte (D2)** —«bastante raro aquí, en el extremo norte de su área», oct 2012— y la carretera Solitaire–Remhoogte (dic 2002).

EN LA RUTA **el Namib (D3–D4)** 10 · **la costa (D5–D7)** 9 — de 19 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Derek Keats from Johannesburg, South Africa · CC BY 2.0



Cernícalo ojiblanco

Falco rupicoloides · Greater kestrel

REGULAR 0,9 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (642 de 69.600)

El cernícalo grande de Etosha: canela con **barras negras finas** por todas partes, sin bigotera, y el **ojo pálido, casi blanco** — de ahí el nombre. Posado en postes y acacias de la llanura; se cierne poco. **El halcón más registrado del parque.**

DÓNDE Las **llanuras al norte de Okaukuejo** —Okondeka, Wolfsnes— (9 nov 2023; una pareja cebando a los pollos con una culebrilla, nov 2018) y entre Halali y Okaukuejo; en el Namib, ocho en un viaje por Sossusvlei (nov 2015).

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 642 · **el Namib (D3–D4)** 147 · **la costa (D5–D7)** 7 · **Damaraland (D8–D9)** 6 — de 802 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Frank Vassen from Brussels, Belgium · CC BY 2.0



Cernícalo africano o roquero

Falco rupicolus · Rock kestrel

ESCASA 0,2 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (112 de 46.876)

El cernícalo vulgar de aquí: **cabeza y cola grises** en los dos sexos, dorso rojizo moteado, bigotera fina, y se **cierne** contra el viento sobre roquedos y dunas. Cañón de Sesriem, escarpa y costa. Lo que en España es cernícalo, aquí es este.

DÓNDE **La parada del paso de Spreetshoogte** (3 nov 2023; 1 nov 2023), el Namib-Naukluft, Swakopmund y la zona de las alondras al norte de Okaukuejo (27 oct 2023).

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 112 · **el Namib (D3–D4)** 107 · **Etosha (D10–D13)** 86 · **Damaraland (D8–D9)** 49 — de 354 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Bernard DUPONT from FRANCE · CC BY-SA 2.0



Alcotán turumti

Falco chicquera · Red-necked falcon

REGULAR 0,4 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (309 de 69.600)

Halcón pequeño y muy elegante: **capucha rojiza (cabeza y nuca canela)**, cuerpo gris finamente barrado y bigotera negra. Caza pajarillos en vuelo bajo y rapidísimo, en pareja; **ligado a las palmeras**.

DÓNDE **Twee Palms, en Fischer's Pan** (dos, dic 2004; oct 2015) y **Namutoni** (nov 2016, oct 2023); también Salvadora, un árbol-nido junto a la pista al norte de Okaukuejo (oct 2023) y cuatro cerca de Halali (oct 2017).

CUÁNTOS **Casi Amenazado** (UICN, evaluación de 2025) ◐: la revisión más reciente de todo el catálogo — la especie ha entrado en la lista de vigilancia este mismo año.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 309 · **el Namib (D3–D4)** 40 · **la costa (D5–D7)** 8 — de 357 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 3.0



Halcón borní

Falco biarmicus · Lanner falcon

ESCASA 0,2 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (136 de 69.600)

Halcón grande de **corona rojiza** y bigotera fina, gris por arriba y crema apenas manchado por abajo; alas más anchas y vuelo menos brusco que el peregrino. Caza en las charcas cuando bajan a beber las gangas y las palomas — buscadlo posado cerca del agua.

DÓNDE Las **llanuras al norte de Okaukuejo** (nov 2018; tres en dos días, nov 2016) y «un árbol solitario en la llanura» entre Okaukuejo y Halali, compartido con el alcotán turumti (oct 2025). En el Namib, cruzando de Namibgrens a Walvis (oct 2011).

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 136 · **el Namib (D3–D4)** 37 · **la costa (D5–D7)** 3 — de 176 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Derek Keats from Johannesburg, South Africa · CC BY 2.0



Halconcito africano

Polihierax semitorquatus · Pygmy falcon

REGULAR 1,0 % de los registros de su grupo en el Namib en oct-nov (104 de 10.659)

La rapaz más pequeña de África —del tamaño de un alcaudón—: blanca por abajo, gris por arriba, la hembra con la **espalda castaña**, patas y cera rojas. Vive **dentro de los pajares del tejedor republicano**: se le busca posado encima de uno, bombeando la cola.

DÓNDE **El campamento de Sesriem, dentro del pajar del tejedor** (dos pollos asomando, 4 nov 2023) y el nido gigante de la **puerta de Sossusvlei** (sep 2023); el paso de Spreetshoogte (1 nov 2023) y el **recinto de Okaukuejo** (oct 2010): mirad el pajar de la charca.

EN LA RUTA **el Namib (D3–D4)** 104 · **Etosha (D10–D13)** 43 · **Damaraland (D8–D9)** 1 — de 148 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Derek Keats from Johannesburg, South Africa · CC BY 2.0



Halcón peregrino

Falco peregrinus · Peregrine falcon


MUY ESCASA 0,03 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (22 de 69.600)

El más rápido: compacto, **capucha y bigotera negras anchas**, gris pizarra por arriba y **densamente barrado** por abajo, alas puntiagudas. La raza africana (*minor*) es pequeña y oscura. Costa y acantilados; en Etosha, sobre todo la europea de paso.

DÓNDE **La laguna de Walvis Bay** —matando un chorlitejo en la orilla, nov 1996; oct 2015— y sobre **Swakopmund** (dic 2002); uno en Etosha (nov 2019).

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 22 · **la costa (D5–D7)** 13 · **el Namib (D3–D4)** 1 — de 36 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Timothy Whitehead · CC BY 4.0



Búho lácteo de Verreaux

Bubo lacteus · Verreaux's eagle-owl

ESCASA 0,09 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (61 de 69.600)

El búho más grande de África, con **párpados rosados** que se le ven al parpadear. En los árboles grandes de los campamentos.

DÓNDE En los árboles grandes **dentro de los campamentos** — mira arriba al volver de cenar.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 61 · **Damaraland (D8–D9)** 7 · **el Namib (D3–D4)** 2 — de 70 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 3.0



Búho manchado

Bubo africanus · Spotted eagle-owl

ESCASA 0,10 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (69 de 69.600)

El búho mediano de **orejas** y **ojos amarillos**, gris moteado; en muros, postes y suelo de los campamentos al anochecer, y en el asfalto de noche a por insectos. El otro búho grande con orejas, el lácteo, tiene los ojos oscuros y es mucho mayor.

DÓNDE **Cerca de Okondeka** (nov 2002), en un pajar de tejedor del suroeste de Etosha (oct 2015, oct 2016), en el **nocturno de Halali** (14 nov 2016) y dos en **Sossusvlei** (nov 2015).

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 69 · **el Namib (D3–D4)** 47 · **la costa (D5–D7)** 9 · **Damaraland (D8–D9)** 7 — de 132 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Dick Daniels (http://theworldbirds.org/) · CC BY-SA 3.0



Autillo cariblanco sureño

Ptilopsis granti · Southern white-faced owl

ESCASA 0,09 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (65 de 69.600)

Pequeño, gris muy claro con **cara blanca enmarcada en negro** y **ojos naranja** intenso; orejas grandes. Estira el cuerpo y entrecierra los ojos para volverse rama cuando lo miran. Campamentos y monte de acacias.

DÓNDE **Halali**, en su dormidero y hasta con nido —un adulto con dos pollos, oct 2011; oct 2010, oct 2012, oct 1996, nov 2002—. En Namutoni, sin cita.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 65 · **Damaraland (D8–D9)** 12 · **el Namib (D3–D4)** 5 — de 82 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Joachim Huber · CC BY-SA 2.0



Lechuza común

Tyto alba · Barn owl

ESCASA 0,2 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (106 de 69.600)

La misma que en casa: **cara blanca en forma de corazón**, ojos negros, dorada por arriba y pálida por abajo. De noche en los recintos y al borde de la luz de las charcas iluminadas; a veces dentro de un pajar de tejedor.

DÓNDE **Halali**: dormidero en el campamento (oct 2010) y cazando en la charca Moringa (oct 2011); las **charcas iluminadas** en general (nov 2018) y el **nocturno de Namutoni** (oct 2025).

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 106 · **el Namib (D3–D4)** 20 · **Damaraland (D8–D9)** 8 · **la costa (D5–D7)** 1 — de 135 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Jens Oldenburg · CC BY 4.0



Autillo africano

Otus senegalensis · African scops owl

ESCASA 0,1 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (82 de 69.600)

Diminuto y **gris corteza**, con orejas, ojos amarillos y un camuflaje que lo convierte en un trozo de rama pegado al tronco. Se delata de noche por su **«prrrp» monótono** cada pocos segundos, como un grillo. Los recintos de los campamentos.

DÓNDE **El dormidero diurno del campamento de Halali**: seis informes de octubre-noviembre lo sitúan en sus árboles (2011, 2012, 2015, 2016 ×2, 2023). Preguntad en recepción por el árbol.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 82 · **Damaraland (D8–D9)** 16 — de 98 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Mochuelo perlado

Glaucidium perlatum · Pearl-spotted owlet

REGULAR 0,3 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (225 de 69.600)

Un puño de plumas, **diurno**, con «perlas» blancas en el dorso y **dos falsos ojos negros en la nuca**. Se posa a la vista de día y silba una escala ascendente que todos los pajarillos vienen a increpar — seguid el escándalo y lo encontráis.

DÓNDE El **recinto de Okaukuejo** —los jardines del campamento, de día y de noche (dic 2004, nov 2016, oct 2012)— y la **charca de Namutoni** (16 nov 2023).

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 225 · **Damaraland (D8–D9)** 82 · **la costa (D5–D7)** 1 · **el Namib (D3–D4)** 1 — de 309 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Búho moro

Asio capensis · Marsh owl

MUY ESCASA 0,03 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (22 de 69.600)

Búho de las **llanuras herbosas**, pardo oscuro con disco facial pálido y ojos oscuros; **caza al atardecer, volando bajo como un aguilucho** sobre la hierba, y se levanta de la cuneta al pasar el coche; de noche ronda la luz de las charcas iluminadas.

DÓNDE Las **charcas iluminadas de Okaukuejo y Halali (Moringa)** —oct 2010, oct 2011, oct 2025—, y el nocturno de Halali (14 nov 2016). En Andoni y Fischer's Pan, sin cita concreta.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 22 — de 22 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Darren Obbard · CC BY 4.0

Aves

46 especies

Con el coche parado en una charca, las aves llenan las esperas. Estas son las que **se ven sin ser ornitólogo**: grandes, ruidosas o de color imposible.

Y seis que se añadieron el 29/08 y que son la razón por la que vienen ornitólogos a Namibia: pájaros que **casi solo existen aquí y en el suroeste de Angola** —el cantor de roca, el papamoscas herero, el alcaudón de cola blanca, el francolín de Hartlaub, el carbonero de Carp— y la **alondra de Gray**, del color exacto de la gravilla del Namib. No son rarezas de otro sitio: los cinco primeros caen en **Damaraland** y la alondra, en la **costa de Swakopmund**, y sus cifras lo dicen.

Y la grulla carunculada entró por la puerta de atrás. Se metió en la guía como fauna del Zambeze —es la grulla del norte mojado— y al medirla resultó tener **18 registros de octubre-noviembre dentro de Etosha**, más que muchas fichas que nadie discute. Así que está aquí, al lado de la grulla azul, que es la otra: *azul*, gris entera con la cabeza abultada; *carunculada*, más grande, con el cuello blanco y dos carúnculas colgando.



Avestruz común

Struthio camelus · Common ostrich

FRECUENTE 2,2 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (1501 de 69.600)

El ave más grande del mundo. El macho, negro y blanco; la hembra, parda. En Etosha se ven cruzando la llanura abierta.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 1.501 · **el Namib (D3–D4)** 389 · **Damaraland (D8–D9)** 103 · **la costa (D5–D7)** 36 — de 2.029 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 4.0



Avutarda kori

Ardeotis kori · Kori bustard

FRECUENTE 2,1 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (1495 de 69.600)

Una de las aves voladoras más pesadas que existen. Camina por la llanura con paso solemne; en exhibición el macho hincha el cuello como un globo blanco.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 1.495 · **Damaraland (D8–D9)** 13 · **el Namib (D3–D4)** 2 · **la costa (D5–D7)** 1 — de 1.511 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Carraca lila

Coracias caudatus · Lilac-breasted roller

ESCASA 0,2 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (107 de 69.600)

La postal de África: pecho lila, garganta azul y alas turquesa que estallan al volar. Se posa a la vista, en un poste o una rama seca.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 107 · **Damaraland (D8–D9)** 7 · **el Namib (D3–D4)** 3 — de 117 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Cálao de pico amarillo sureño

Tockus leucomelas · Southern yellow-billed hornbill


FRECUENTE 1,3 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (930 de 69.600)

Pico grande, curvo y **amarillo**. Confiado y muy presente en los campamentos, donde vigila las mesas del desayuno.

DÓNDE En los tres campamentos, vigilando las mesas del desayuno.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 930 · **Damaraland (D8–D9)** 198 · **el Namib (D3–D4)** 2 — de 1.130 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Cálao de pico rojo sureño

Tockus rufirostris · Southern red-billed hornbill

REGULAR 0,5 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (363 de 69.600)

Idéntico en forma al anterior, pero con el pico **rojo**. Y ojo: aquí «cálao rojo» son DOS especies casi gemelas que conviven en el eje — **ojo amarillo** = el sureño (esta ficha); **ojo oscuro y cara blanca** = el cálao damara, casi endémico. Hacia Namutoni, mayoría de sureños.

DÓNDE Igual que el amarillo: campamentos y bordes de pista. **Mira el ojo, no solo el pico**: en Halali se citan las dos especies de pico rojo el mismo día, y hacia Namutoni domina el sureño (~2,6 a 1 en los registros).

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 363 · **Damaraland (D8–D9)** 19 — de 382 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Tejedor republicano

Philetairus socius · Sociable weaver

REGULAR 0,8 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (542 de 69.600)

Se ve **el nido antes que el pájaro**: pajares colectivos gigantes que engullen un árbol o un poste de la luz y que ocupan generaciones enteras. *(Los nidos pequeños, esféricos y colgantes de los árboles de los campamentos son de otro: el tejedor enmascarado.)*

DÓNDE **En Okaukuejo, a diez metros de la charca**: hay un nido enorme junto al agua y dos más en el camping. Dentro viven halcones pigmeos y agapornis de cara rosa.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 542 · **el Namib (D3–D4)** 448 · **Damaraland (D8–D9)** 3 — de 993 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Flamenco enano

Phoeniconaias minor · Lesser flamingo

FRECUENTE 2,7 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (1257 de 46.876)

Más pequeño y más intensamente rosa que el común, con el pico oscuro de lejos. Todo depende de que haya agua: sin pan inundada, no hay flamencos.

DÓNDE OJO **En noviembre no están aquí:** la pan está seca. Solo crían cuando llueve por encima de 400 mm — pasó **tres veces en cuarenta años**. Los tuyos están en **Walvis Bay**.

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 1.257 · **Etosha (D10–D13)** 47 — de 1.304 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Sumita Roy Dutta · CC BY-SA 4.0



Grulla carunculada

Bugeranus carunculatus · Wattled crane

MUY ESCASA 0,03 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (18 de 69.600)

La grulla más grande de África: **dos carúnculas blancas colgando de la garganta**, cuello blanco y cuerpo pizarra. Siempre en pareja. Su casa es el Okavango, pero también cría en las llanuras inundables de Etosha.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 18 — de 18 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Per Arne Slotte from Trondheim, Norway · CC BY-SA 2.0



Grulla azul

Grus paradisea · Blue crane

REGULAR 0,4 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (252 de 69.600)

Gris azulada, con la cabeza abultada y unas largas plumas alares que arrastra como una cola. Elegantísima y, aquí, rareza.

DÓNDE **Andoni**, al norte de Namutoni, es el sitio. Pero quedaban **19 aves en 2021** — eran 138 en los 70—: es la población más aislada del mundo, a 1.200 km de la siguiente.

CUÁNTOS **19 aves** en el censo de noviembre de 2021. Eran 138 en los setenta.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 252 — de 252 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Ron Knight from Seaford, East Sussex, United Kingdom · CC BY 2.0



Ganga namaqua

Pterocles namaqua · Namaqua sandgrouse

FRECUENTE 1,3 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (883 de 69.600)

Cola muy puntiaguda; llega a las charcas en bandos y a horas fijas. El macho **empapa las plumas del vientre** para llevarles agua a los pollos.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 883 · **el Namib (D3–D4)** 239 · **Damaraland (D8–D9)** 105 · **la costa (D5–D7)** 6 — de 1.233 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Yathin sk · CC BY-SA 3.0



Sisón negro norteño

Afrotis afraoides · Northern black korhaan

FRECUENTE 1,8 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (1281 de 69.600)

El macho es negro con grandes parches blancos en el ala; se delata con un chillido metálico al levantar el vuelo.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 1.281 · **Damaraland (D8–D9)** 13 · **el Namib (D3–D4)** 9 — de 1.303 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Alcaudón de pecho carmesí


Laniarius atrococcineus · Crimson-breasted shrike

REGULAR 0,8 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (531 de 69.600)

Negro por arriba y **rojo intenso** por abajo: imposible de confundir. Se mueve por dentro del matorral espeso.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 531 · **Damaraland (D8–D9)** 87 · **el Namib (D3–D4)** 35 · **la costa (D5–D7)** 1 — de 654 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Abejaruco europeo

Merops apiaster · European bee-eater


FRECUENTE 1,1 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (789 de 69.600)

El mismo que cría en España y pasa aquí el invierno nuestro: verde, castaño y amarillo, con antifaz negro. Caza al vuelo desde una rama seca y vuelve al mismo posadero.

DÓNDE **Sí está en vuestras fechas:** llega en octubre y en noviembre se registra en el parque. Caza al vuelo desde ramas secas y postes.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 789 · **Damaraland (D8–D9)** 11 · **la costa (D5–D7)** 10 · **el Namib (D3–D4)** 4 — de 814 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Andy Morffew from Itchen Abbas, Hampshire, UK · CC BY 2.0



Cigüeña de Abdim

Ciconia abdimii · Abdim's stork

APENAS REGISTRADA 2 registros en Etosha en oct-nov: muestra corta para decir más

Cigüeña pequeña y oscura, de patas grises con las «rodillas» rojas. La llaman la cigüeña de la lluvia porque sigue a los frentes — aquí eso significa **bien entrada la temporada**, no noviembre.

DÓNDE **OJO** **En noviembre, casi no.** En Etosha es ave de **febrero y marzo**: en octubre–noviembre GBIF le da 2 registros de 398 en el parque. Va aquí para que no la busquéis en balde.

Foto: Gediminas · CC BY-SA 3.0



Estornino brillante del Cabo

Lamprotornis nitens · Cape starling

FRECUENTE 1,8 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (1251 de 69.600)

Azul verdoso metálico con el ojo naranja. En los campamentos, siempre atento a las migas de la mesa.

DÓNDE En los campamentos, a por las migas.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 1.251 · **Damaraland (D8–D9)** 250 · **el Namib (D3–D4)** 37 · **la costa (D5–D7)** 8 — de 1.546 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Pelícano blanco común

Pelecanus onocrotalus · Great white pelican

FRECUENTE 2,1 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (977 de 46.876)

Enorme y blanco, con el pico de bolsa amarillenta. Pesca en grupo en la laguna de **Walvis Bay**, y en el muelle se posan a un metro de la gente.

DÓNDE No en Etosha: en la **laguna de Walvis Bay** (D5–D6), donde pesca en grupo.

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 977 · **Etosha (D10–D13)** 8 · **el Namib (D3–D4)** 2 — de 987 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Flamenco común

Phoenicopterus roseus · Greater flamingo


FRECUENTE 2,7 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (1279 de 46.876)

Más grande y más pálido que el enano, con el pico rosa de punta negra —el del enano se ve oscuro entero—. Los dos comparten la laguna de Walvis Bay.

DÓNDE **OJO** Lo mismo: **la pan está seca en noviembre**. En cambio en **Walvis Bay el máximo va de junio a noviembre** — allí sí, y en cantidad.

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 1.279 · **Etosha (D10–D13)** 26 · **el Namib (D3–D4)** 1 — de 1.306 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Cormorán del Cabo

Phalacrocorax capensis · Cape cormorant

MUY FRECUENTE 4,8 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (2235 de 46.876)

Azulado oscuro con la cara amarilla. Vuela en **cintas larguísimas a ras del agua** frente a la costa; en Walvis Bay hay plataformas construidas para su guano.

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 2.235 — de 2.235 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 4.0



Charrán damara

Sternula balaenarum · Damara tern


FRECUENTE 1,7 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (795 de 46.876)

Charrán pequeño con **gorra negra completa** y pico negro. Cría casi solo en la costa namibia y es **especie amenazada**: si veis un nido en la grava de la costa, ni acercarse.

CUÁNTOS La estimación global mínima cayó de **1.001 parejas en 2010 a 773 hacia 2021** —un −23 %— y casi toda la especie cría en la costa namibia. ◐

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 795 — de 795 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Ron Knight from Seaford, East Sussex, United Kingdom · CC BY 2.0



Ostrero africano

Haematopus moquini · African oystercatcher

REGULAR 0,9 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (408 de 46.876)

Negro entero con **pico y patas rojo intenso**. De la costa rocosa; no llega a diez mil individuos en el mundo entero.

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 408 — de 408 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Dane Paijmans] · CC BY-SA 3.0



Gaviota de Hartlaub

Chroicocephalus hartlaubii · Hartlaub's gull

MUY FRECUENTE 3,4 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (1591 de 46.876)

La gaviota del Benguela, endémica de esta costa y la sudafricana: pequeña, de capucha apenas grisácea y pico rojo oscuro. La nube blanca detrás de los barcos del muelle.

DÓNDE La **laguna y el muelle de Walvis Bay (D5–D6)**: la nube blanca detrás del barco del crucero — el ave más registrada de la costa tras el cormorán.

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 1.591 — de 1.591 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Diego Delso · CC BY-SA 4.0



Avoceta común

Recurvirostra avosetta · Pied avocet

FRECUENTE 2,3 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (1057 de 46.876)

Inconfundible: blanca y negra, con el pico finísimo curvado **hacia arriba**, barriendo el agua somera de lado a lado. En la laguna, repartida entre los flamencos.

DÓNDE El **agua somera de la laguna de Walvis Bay (D5–D6)**, barriendo con el pico entre los flamencos — mejor con la bajamar de la mañana.

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 1.057 · **Etosha (D10–D13)** 39 · **el Namib (D3–D4)** 4 · **Damaraland (D8–D9)** 1 — de 1.101 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Christoph Strässler · CC BY-SA 2.0



Francolín de pico rojo

Pternistis adspersus · Red-billed spurfowl

REGULAR 0,9 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (658 de 69.600)

El «pollo» ruidoso de los campamentos: pardo con **pico y patas rojos**. Os despertará al amanecer, sin falta.

DÓNDE En los campamentos. **Os despertará al amanecer**, sin falta.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 658 · **Damaraland (D8–D9)** 159 · **el Namib (D3–D4)** 6 · **la costa (D5–D7)** 2 — de 825 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Yathin sk · CC BY-SA 3.0



Avefría armada

Vanellus armatus · Blacksmith lapwing


FRECUENTE 2,9 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (2010 de 69.600)

De esmoquin: blanco, negro y gris, con el **ojo rojo intenso**. Su reclamo metálico de alarma —«tink, tink», el martillo del herrero en el yunque— le da el nombre inglés de *blacksmith*. Se oye antes de verse.

DÓNDE El borde de casi cualquier charca: **Okaukuejo y Chudop** la tienen fija.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 2.010 · **la costa (D5–D7)** 216 · **Damaraland (D8–D9)** 86 · **el Namib (D3–D4)** 3 — de 2.315 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 3.0



Drongo ahorquillado

Dicrurus adsimilis · Fork-tailed drongo

FRECUENTE 2,3 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (1623 de 69.600)

Negro entero de reflejos azulados, **ojo rojo** y cola ahorquillada de golondrina. Caza al vuelo lo que levantan los herbívoros — y los coches. En el Kalahari se le ha medido robando comida **imitando las llamadas de alarma** de otras especies.

DÓNDE Monte y campamentos por todo el eje — citado en el **bucle de Ngobib**, entre Halali y Namutoni. Buscadlo alrededor de los herbívoros: caza lo que levantan.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 1.623 · **Damaraland (D8–D9)** 171 · **el Namib (D3–D4)** 25 · **la costa (D5–D7)** 8 — de 1.827 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Xenia Ivanoff Erb · CC BY-SA 3.0



Pintada común

Numida meleagris · Helmeted guineafowl

FRECUENTE 1,5 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (1016 de 69.600)

Inconfundible: cuerpo pizarra sembrado de **puntos blancos**, cabeza desnuda azulada y **casco córneo**. Bandadas desordenadas por los arcenes, corriendo antes que volando.

DÓNDE Bandadas junto a las pistas por todo el parque, y **bebiendo en la charca de Halali** al caer la tarde, con las tórtolas.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 1.016 · **Damaraland (D8–D9)** 130 · **la costa (D5–D7)** 129 · **el Namib (D3–D4)** 86 — de 1.361 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Rui Ornelas · CC BY 2.0



Quélea común

Quelea quelea · Red-billed quelea

FRECUENTE 1,0 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (718 de 69.600)

Del tamaño de un gorrión, pardo, con **pico rojo** y antifaz negro en los machos. La gracia no es el individuo: es **el enjambre** — miles bebiendo y girando a la vez como un banco de peces. Considerada el ave silvestre más abundante del mundo.

DÓNDE Los enjambres, en las charcas — citados en **Okaukuejo y Olifantsbad**—; el dormidero, en los **carrizos de la charca de Namutoni**.

CUÁNTOS Considerada **el ave silvestre más abundante del mundo** — así, en el título de un artículo revisado por pares 🟢. Las estimaciones hablan de ~1.500 millones de adultos 🌓: los enjambres de las charcas son la versión local de esa cifra.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 718 · **Damaraland (D8–D9)** 63 · **la costa (D5–D7)** 7 · **el Namib (D3–D4)** 7 — de 795 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Bernard DUPONT from FRANCE · CC BY-SA 2.0



Turaco unicolor

Corythaixoides concolor · Grey go-away-bird

REGULAR 1,0 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (668 de 69.600)

Gris entero, con **cresta despeinada** y cola larga. Se presenta él solo: su reclamo nasal y quejumbroso —«g'waaay»— le vale el nombre inglés de *go-away bird*.

DÓNDE Los árboles de los **recintos** —citado dentro de Namutoni— y en las charcas en grupos familiares, hasta una decena junta.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 668 · **Damaraland (D8–D9)** 184 · **la costa (D5–D7)** 48 · **el Namib (D3–D4)** 17 — de 917 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Toco piquinegro

Lophoceros nasutus · African grey hornbill

REGULAR 0,9 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (614 de 69.600)

El tercer cálao del eje: **gris ceniza** donde los otros dos visten blanco y negro, con ceja clara. El pico delata el sexo — oscuro con una cuña clara el macho, **marfil con la punta rojiza** la hembra (la de la foto).

DÓNDE Por todo el eje con los otros cálaos —en Halali se han citado los cuatro a la vez, los dos de pico rojo incluidos— y dentro del recinto de Okaukuejo.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 614 · **Damaraland (D8–D9)** 75 · **la costa (D5–D7)** 17 · **el Namib (D3–D4)** 7 — de 713 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Bulbul encapuchado

Pycnonotus nigricans · African red-eyed bulbul

FRECUENTE 1,4 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (993 de 69.600)

Capucha negruzca, pecho pardo claro, amarillo bajo la cola — y un **anillo ocular naranja-rojo** carnoso que se ve de lejos y lo distingue de cualquier otro pájaro de campamento.

DÓNDE En los campamentos: citado dentro del recinto de Okaukuejo y en los carrizos de la charca de Namutoni.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 993 · **el Namib (D3–D4)** 366 · **Damaraland (D8–D9)** 340 · **la costa (D5–D7)** 101 — de 1.800 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Turdoide caricalvo

Turdoides gymnogenys · Bare-cheeked babbler

REGULAR 0,3 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (219 de 69.600)

Casi endémico de Namibia: claro por abajo, alas pardas, corona blanca y la **mejilla desnuda y negra** que le da nombre. En cuadrillas ruidosas que rebuscan por el suelo — y hay quien lo ve atacar su reflejo en los retrovisores.

DÓNDE **El campamento de Halali es SU sitio** — «los pájaros habituales del camping», dicen los informes de birding, y ahí cae el grueso de sus registros del eje (~700 de ~770). Con suerte, también en Namutoni.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 219 · **Damaraland (D8–D9)** 107 — de 326 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Ron Knight · CC BY 2.0



Charrán común

Sterna hirundo · Common tern

MUY FRECUENTE 7,6 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (3582 de 46.876)

Esbelto y pálido, de vuelo elástico, con **gorra negra incompleta y frente blanca** en estas fechas *(es su plumaje de invierno)*. No cría aquí: **viene de Europa a pasar el verano austral**, y viene en masa.

DÓNDE La **laguna de Walvis Bay (D5–D6)**, a miles: llegan de Europa en septiembre-octubre, justo antes que vosotros.

CUÁNTOS En Namibia se estimaron **170.000–180.000** en 1998 ◐, y el conteo récord del humedal de Walvis Bay — **242.000 aves** en 2004— llevaba unos **100.000 charranes** ●.

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 3.582 — de 3.582 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Cláudio Dias Timm from Rio Grande do Sul · CC BY-SA 2.0



Gaviota cocinera

Larus dominicanus · Kelp gull

MUY FRECUENTE 3,7 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (1752 de 46.876)

La gaviota **grande, de dorso y alas negras** y pico amarillo con punto rojo. La otra del muelle —pequeña, pálida, de pico oscuro— es la de Hartlaub: verlas juntas es la comparación hecha.

DÓNDE El muelle y la laguna (D5–D6), revoloteando el barco junto a la de Hartlaub.

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 1.752 — de 1.752 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Ragnhild&Neil Crawford from Sweden · CC BY-SA 2.0



Estornino Naburup

Onychognathus nabouroup · Pale-winged starling

MUY FRECUENTE 4,2 % de los registros de su grupo en el Namib en oct-nov (453 de 10.659)

Negro brillante con el **ojo naranja encendido** y una **ventana clara en el ala** que estalla al volar. Confiado hasta el descaro donde hay gente: merodea picnics y parrillas.

DÓNDE Los aparcamientos y picnics de **Sesriem/Sossusvlei (D3–D4)** —unos 200 por viaje cuentan los tours— y los acantilados de Damaraland (D8–D9), donde cría junto a los inseparables.

EN LA RUTA **el Namib (D3–D4)** 453 · **Damaraland (D8–D9)** 312 · **Etosha (D10–D13)** 31 · **la costa (D5–D7)** 12 — de 808 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Sisón de Damaraland

Heterotetrax rueppelii · Rüppell's korhaan

FRECUENTE 2,9 % de los registros de su grupo en el Namib en oct-nov (312 de 10.659)

Sisón pálido del desierto, con **línea negra bajando por el cuello** en el macho. Casi endémico de Namibia y el suroeste de Angola. Anda por la grava **en parejas**, con paso lento — y grita al amanecer.

DÓNDE La llanura de grava de la **carretera Sesriem→Sossusvlei (D3–D4)**: los tours lo anotan «junto a la pista», en parejas y tríos — también en noviembre.

EN LA RUTA **el Namib (D3–D4)** 312 · **Damaraland (D8–D9)** 106 · **la costa (D5–D7)** 5 — de 423 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Avutarda de Namibia

Neotis ludwigii · Ludwig's bustard

FRECUENTE 1,6 % de los registros de su grupo en el Namib en oct-nov (173 de 10.659)

Avutarda grande de **nuca parda y cuello gris**, caminando despacio por las llanuras de grava. **En Peligro:** su gran amenaza son los tendidos eléctricos, con los que choca en vuelo.

DÓNDE Las mismas llanuras del D3–D4, caminando lejos: los tours de noviembre la encuentran en la salida matinal a Sossusvlei.

CUÁNTOS **En Peligro** (UICN 2024) ●. Su gran amenaza son los tendidos eléctricos: la estimación publicada va de **4.000 a 11.900 muertes al año** por colisión ◐.

EN LA RUTA **el Namib (D3–D4)** 173 · **Etosha (D10–D13)** 39 · **Damaraland (D8–D9)** 27 · **la costa (D5–D7)** 9 — de 248 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Hans Hillewaert · CC BY-SA 4.0



Alondra de las dunas

Calendulauda erythrochlamys · Dune lark

REGULAR 0,4 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (177 de 46.876)

Alondra rojiza como su duna, de pecho apenas rayado, correteando entre las matas de hierba de la arena. Sin marcas llamativas — la gracia es otra: **casi toda su especie vive dentro de Namibia**.

DÓNDE Las **dunas con hierba camino de Sossusvlei (D4)**: Elim Dune es el sitio clásico, pero los tours recientes la sacaron más adelante, en las dunas rojas de la pista. Andando y con paciencia.

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 177 · **el Namib (D3–D4)** 134 — de 311 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Ragnhild&Neil Crawford from Sweden · CC BY-SA 2.0



Lorito de Rüppell

Poicephalus rueppellii · Rüppell's parrot

FRECUENTE 1,3 % de los registros de su grupo en Damaraland en oct-nov (134 de 10.069)

Loro pequeño y **gris oscuro** con los hombros amarillos y el ojo rojo — y el dimorfismo al revés: **la del vientre y trasero azules es la hembra**. Se delata por el chillido en los cauces arbolados.

DÓNDE Los **cauces arbolados de Damaraland (D8–D9)**: citado en el propio cauce del Aba Huab, junto al campamento comunitario de Twyfelfontein.

EN LA RUTA **Damaraland (D8–D9)** 134 · **Etosha (D10–D13)** 5 — de 139 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Toco angoleño

Tockus monteiri · Monteiro's hornbill

FRECUENTE 1,3 % de los registros de su grupo en Damaraland en oct-nov (128 de 10.069)

Toco de **pico rojo largo**, cabeza oscura, vientre blanco y alas sembradas de gotas blancas. Casi endémico, y **el único de su familia que come solo insectos**: por eso puede vivir donde no hay fruta.

DÓNDE Su casa es la **escarpa rocosa (D8–D9)**: Twyfelfontein y Grootberg. En Etosha solo asoma por los cerros del oeste — fuera de vuestro eje.

EN LA RUTA **Damaraland (D8–D9)** 128 · **Etosha (D10–D13)** 71 · **el Namib (D3–D4)** 2 — de 201 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Nanosanchez · CC BY-SA 3.0



Inseparable de Namibia

Agapornis roseicollis · Rosy-faced lovebird


FRECUENTE 1,2 % de los registros de su grupo en Damaraland en oct-nov (116 de 10.069)

Loro diminuto **verde con la cara rosa**, en bandadas chillonas por los roquedos. Casi endémico. Anida donde nadie: **dentro de los pajares del tejedor republicano** — el inquilino de la ficha del tejedor.

DÓNDE Roquedos de **Damaraland (D8–D9)**, en colonias junto al estornino Naburup — y en los pajares del tejedor republicano: la ficha del tejedor ya los citaba de inquilinos.

EN LA RUTA **Damaraland (D8–D9)** 116 · **la costa (D5–D7)** 57 · **el Namib (D3–D4)** 44 · **Etosha (D10–D13)** 11 — de 228 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Cantor de roca o rockrunner

Achaetops pycnopygius · Rockrunner

ESCASA 0,2 % de los registros de su grupo en Damaraland en oct-nov (24 de 10.069)

Garganta y pecho moteados de negro sobre blanco, vientre canela, ceja clara y cola larga. Vive entre peñas de granito y canta desde lo alto de una roca. Casi solo existe aquí y en el suroeste de Angola.

EN LA RUTA **Damaraland (D8–D9)** 24 · **Etosha (D10–D13)** 2 — de 26 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Zieger M · CC BY-SA 4.0



Papamoscas herero

Namibornis herero · Herero chat

ESCASA 0,3 % de los registros de su grupo en Damaraland en oct-nov (27 de 10.069)

Pardo arena con **la cola rojiza** y un antifaz oscuro sobre la cara clara. Caza desde una percha baja en la ladera. Endemismo de la escarpa namibia y el suroeste de Angola.

EN LA RUTA **Damaraland (D8–D9)** 27 · **el Namib (D3–D4)** 1 — de 28 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: H.-U. Küenle · CC BY-SA 4.0



Alcaudón de cola blanca

Lanioturdus torquatus · White-tailed shrike

REGULAR 0,7 % de los registros de su grupo en Damaraland en oct-nov (74 de 10.069)

Blanco y negro, sin cuello aparente y con **la cola tan corta que parece una bola**. Anda a saltos por el suelo entre arbustos. Otro endemismo namibio-angoleño.

EN LA RUTA **Damaraland (D8–D9)** 74 · **el Namib (D3–D4)** 7 · **Etosha (D10–D13)** 6 — de 87 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Zieger M · CC BY-SA 4.0



Francolín de Hartlaub

Pternistis hartlaubi · Hartlaub's spurfowl

ESCASA 0,2 % de los registros de su grupo en Damaraland en oct-nov (19 de 10.069)

El francolín pequeño de los cerros de granito. El **macho**, con la **cara y el pecho blanquecinos** y el pico grueso y curvo; la **hembra**, canela con listas. Se le oye al amanecer desde los koppies.

EN LA RUTA **Damaraland (D8–D9)** 19 · **Etosha (D10–D13)** 9 — de 28 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Zieger M · CC BY-SA 4.0



Carbonero de Carp

Melaniparus carpi · Carp's tit

REGULAR 0,8 % de los registros de su grupo en Damaraland en oct-nov (83 de 10.069)

Carbonero **negro entero con una línea blanca en el ala** y el ojo pálido. Sustituye al carbonero cabecinegro en el noroeste; recorre las acacias en bandos ruidosos.

EN LA RUTA **Damaraland (D8–D9)** 83 · **Etosha (D10–D13)** 24 · **la costa (D5–D7)** 2 · **el Namib (D3–D4)** 1 — de 110 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: scaup · CC BY 4.0



Alondra de Gray

Ammomanopsis grayi · Gray's lark

REGULAR 0,4 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (192 de 46.876)

Alondra **pálida casi hasta el blanco**, sin apenas dibujo: es del color exacto de la gravilla en la que vive. **Corre más de lo que vuela** — se la ve moverse antes que verla.

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 192 · **Damaraland (D8–D9)** 5 · **el Namib (D3–D4)** 5 — de 202 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Ragnhild&Neil Crawford from Sweden · CC BY-SA 2.0

Reptiles

16 especies

Las tres primeras son seguridad, no coleccionismo. Dormís trece noches en tienda y andáis por Sossusvlei y Damaraland: lo útil no es distinguirlas de lejos, es **saber qué NO hacer**. Nunca metas la mano donde no ves, **mira dónde pisas al anochecer** — que es cuando salen a la pista tibia—, linterna para ir al baño, y si te encuentras una, **quédate quieto y retrocede**: casi todas las mordeduras pasan al intentar matarlas o cogerlas.

Las otras trece son de las que apetece ver: el **camaleón que corre**, el **gecko translúcido** de las dunas, el **agama naranja** de las rocas de Damaraland, los tres del campamento de Etosha —el **escinco** de los recintos, el **gecko** de las noches de Okaukuejo y el **galápago** que caza quéleas— y los dos diurnos del 11/08: el **gecko que cambió la noche por el día** en la costa de la niebla y el **lagarto de nariz de cuña** de la base de las dunas.



Víbora bufadora

Bitis arietans · Puff adder

APENAS REGISTRADA 7 registros en la costa en oct-nov: muestra corta para decir más

Gruesa, corta y con galones en uve por el lomo. **No huye: se queda quieta confiando en su camuflaje**, y de ahí que se le atribuyan la mayoría de mordeduras graves del continente. Mira dónde pisas al anochecer y nada de andar descalzo por el campamento.

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 7 · **Etosha (D10–D13)** 2 — de 9 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Danny S. · CC BY-SA 4.0



Cobra escupidora cebra

Naja nigricincta · Zebra spitting cobra

APENAS REGISTRADA 1 registro en Etosha en oct-nov: muestra corta para decir más

Del suroeste africano, con bandas oscuras. **Escupe el veneno a los ojos** a varios metros y con puntería. Si levanta el cuerpo y abre la capucha, retrocede despacio: nunca la acorrales.

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 3.0




Mamba negra

Dendroaspis polylepis · Black mamba

SIN REGISTROS ninguno de los 187 registros de su grupo en Etosha en oct-nov es suyo

Larga, delgada y **gris oliva** —lo negro es el interior de la boca, no la piel—. Rapidísima y nerviosa, pero esquiva: lo normal es no verla. La peor fama de África, y en buena parte merecida.

Foto: TimVickers · Public domain



Víbora de Péringuey

Bitis peringueyi · Peringuey's adder

MUY FRECUENTE 8,5 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (35 de 412)

Diminuta, de la arena del Namib. **Se entierra dejando fuera solo los ojos** y se desplaza de lado. Suya es la huella en zigzag que aparece en las dunas por la mañana.

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 35 · **el Namib (D3–D4)** 3 — de 38 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Jay Iwasaki · CC BY 2.0



Víbora cornuda

Bitis caudalis · Horned adder

MUY FRECUENTE 5,8 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (24 de 412)

Un «cuerno» escamoso sobre cada ojo. Se entierra en la arena o la grava del desierto y espera. Pequeña, pero con veneno de verdad.

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 24 · **el Namib (D3–D4)** 5 · **Damaraland (D8–D9)** 2 — de 31 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Chantelle Bosch · CC BY-SA 4.0



Camaleón del Namib

Chamaeleo namaquensis · Namaqua chameleon

MUY FRECUENTE 9,5 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (39 de 412)

El camaleón que **corre por el suelo del desierto** en vez de trepar. Cambia de color para regular su temperatura: oscuro de mañana para calentarse, pálido al mediodía. La estrella de los tours de «desierto vivo» de Swakopmund.

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 39 — de 39 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Yathin S Krishnappa · CC BY-SA 3.0



Gecko palmeado del Namib

Pachydactylus rangei · Web-footed gecko

MUY FRECUENTE 20,4 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (84 de 412)

Translúcido, con **membranas entre los dedos** que le hacen de raqueta sobre la arena y unos ojos enormes de nocturno. No tiene párpados: se limpia los ojos con la lengua.

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 84 · **el Namib (D3–D4)** 4 — de 88 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Stefan.Kuemmel at German Wikipedia (Original text: Stefan Kümmel) · CC BY-SA 3.0



Agama de roca de Namibia

Agama planiceps · Namibian rock agama

MUY FRECUENTE 21,4 % de los registros de su grupo en Damaraland en oct-nov (40 de 187)

El macho no se puede pasar por alto: **cabeza y cuello naranja encendido** sobre cuerpo azul violáceo. Toma el sol en lo alto de los peñascos de granito.

EN LA RUTA **Damaraland (D8–D9)** 40 · **Etosha (D10–D13)** 2 · **la costa (D5–D7)** 2 · **el Namib (D3–D4)** 1 — de 45 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0



Varano de roca

Varanus albigularis · Rock monitor

APENAS REGISTRADA 8 registros en Etosha en oct-nov: muestra corta para decir más

Lagarto grande y robusto, de lengua bífida, que se ve cruzando pistas o rondando las charcas. Inofensivo si no lo arrinconas.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 8 · **Damaraland (D8–D9)** 1 — de 9 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Bernard DUPONT from FRANCE · CC BY-SA 2.0



Tortuga leopardo

Stigmochelys pardalis · Leopard tortoise

La tortuga terrestre grande del sur de África, con el caparazón moteado como un felino. **Cruza las carreteras muy despacio**: es de lo que más se atropella, así que ojo al asfalto.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 6 · **Damaraland (D8–D9)** 1 · **la costa (D5–D7)** 1 — de 8 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Bernard DUPONT from FRANCE · CC BY-SA 2.0



Lagarto de nariz de pala

Meroles anchietae · Shovel-snouted lizard

MUY FRECUENTE 4,9 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (20 de 412)

El lagarto de la **ladera de deslizamiento** de la duna. El hocico en forma de pala le sirve para **«nadar» dentro de la arena**, y hace el baile térmico: levanta las patas por parejas para no quemarse. *(El que veas abajo, entre las matas, es su primo de nariz de cuña — ficha siguiente.)*

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 20 · **el Namib (D3–D4)** 14 — de 34 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Ryan van Huyssteen · CC BY-SA 4.0



Escinco arborícola del Kalahari

Trachylepis spilogaster · Kalahari tree skink

MUY FRECUENTE 20,3 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (38 de 187)

El lagarto diurno de los campamentos: liso, brillante, con **rayas claras** a lo largo del cuerpo moteado. Corretea por troncos, muretes y suelos a plena luz. En el Kalahari es famoso por instalarse en los nidos del tejedor republicano.

DÓNDE Los recintos de los campamentos, de día: hay observaciones georreferenciadas dentro de **Okaukuejo** y **Namutoni**. Troncos, muretes y suelo.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 38 · **el Namib (D3–D4)** 16 — de 54 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Ryan van Huyssteen · CC BY-SA 4.0



Gecko de Fischer

Chondrodactylus laevigatus · Fischer's thick-toed gecko

MUY FRECUENTE 8,6 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (16 de 187)

Nocturno, de **ojos grandes anaranjados** y piel granujienta con bandas pardas. De día, en grietas; de noche sale a la vista sobre rocas y muros a cazar insectos. Inofensivo — déjalo trabajar.

DÓNDE De noche en el **recinto de Okaukuejo**, donde se concentran las observaciones recientes. Su gemelo *C. turneri* no tiene ni un registro en el eje: el gecko grande que veáis es este.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 16 · **el Namib (D3–D4)** 6 · **Damaraland (D8–D9)** 4 · **la costa (D5–D7)** 1 — de 27 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: m_burger · CC0



Galápago africano o tortuga de escudo

Pelomedusa subrufa · African helmeted turtle

La tortuga **de agua** de las charcas: caparazón pardo aplanado y cabeza moteada que asoma como un periscopio. Toma el sol en el borde, y en Etosha está documentada cazando en grupo **quéleas** que bajan a beber — arrastrándolas al fondo.

DÓNDE Las charcas permanentes. La caza de quéleas se documentó en **Nuamses**, al norte de Halali *(unas 30 en dos horas, 26/11/1997)*, y hay observaciones recientes en Halali. Buscad la cabeza-periscopio o el caparazón al sol en el borde.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 27 · **Damaraland (D8–D9)** 4 — de 31 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Marius Burger · CC0



Gecko diurno del Namib

Rhoptropus afer · Namib day gecko

MUY FRECUENTE 12,1 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (50 de 412)

La rareza: un **gecko que cambió la noche por el día** —la diurnidad evolucionó en su género— y corre por las rocas de la costa de la niebla. Pálido, de ojos grandes, siempre al sol.

DÓNDE Las rocas de la **costa de la niebla (D7)**, en las paradas entre Swakopmund y Cape Cross. De día — que es su rareza.

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 50 — de 50 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Ryan van Huyssteen · CC BY-SA 4.0



Lagarto de nariz de cuña

Meroles cuneirostris · Wedge-snouted sand lizard

MUY FRECUENTE 34,4 % de los registros de su grupo en el Namib en oct-nov (55 de 160)

El lagarto que de verdad te cruzas en Sossusvlei: vive **abajo, en la base vegetada de la duna** —donde caminas tú—, esprintando de mata en mata, gris arena con motas claras y flancos punteados. El hocico acaba en cuña, no en pala.

DÓNDE La **base de las dunas de Sossusvlei (D4)**, entre las matas — exactamente por donde se camina hacia Big Daddy y Deadvlei.

EN LA RUTA **el Namib (D3–D4)** 55 · **la costa (D5–D7)** 24 — de 79 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Ryan van Huyssteen · CC BY-SA 4.0

La costa, la roca y la arena

10 especies

Etosha no es toda la fauna del viaje. Esto es lo que veréis **fuera del parque**: en **Cape Cross** (D7) —desde la pasarela: **hay rabia en los lobos marinos de la costa desde junio de 2025**, y no se toca ninguno—, en la laguna de **Walvis Bay** (D5–D6), en los roquedos de Damaraland y en la arena del Namib. La laguna, por cierto, no es una charca cualquiera: **sitio Ramsar desde 1995** y descrita como el humedal costero más importante del África austral en número de aves — el conteo récord, 242.000 en un solo verano. La **ardilla terrestre** es la excepción a caballo: campa igual por dentro de Etosha —de ahí sale su banda— que por los campamentos del oeste.

Los tres últimos son del 29/08 y estaban donde nadie los buscaba: en vuestra propia costa. Se metieron en la guía como fauna del sur —las islas de Lüderitz— y GBIF los devolvió a la caja de Walvis Bay y Swakopmund: **alcatraz del Cabo** (228 registros de octubre-noviembre ahí), **cormorán de las bancas** (65) y **pingüino africano** (65). Entran porque el dato dice que están. La **ballena franca austral** venía con ellos y se quedó fuera el mismo día: cuatro registros, y se va de esta costa antes de que lleguéis.



Lobo marino del Cabo

Arctocephalus pusillus · Cape fur seal

MUY FRECUENTE 39,9 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (220 de 552)

En **Cape Cross** hay una de las mayores colonias del mundo: decenas de miles a la vista y oyéndose desde lejos. Aviso serio: **el olor es parte de la visita** — llevad pañuelo.

DÓNDE **Cape Cross, D7 — y la laguna de Walvis Bay, D5–D6, donde empezó el brote.** Cape Cross es una de las mayores colonias del mundo. **OJO** **Y con rabia desde junio de 2025** 🟢 *(seis lobos positivos y trece exposiciones humanas, siete de turistas, a septiembre de 2026 — The Namibian)*: se mira desde la pasarela, no se toca ninguno, y una mordedura o un arañazo es hospital el mismo día.

CUÁNTOS **80.000–100.000** de forma habitual en Cape Cross y hasta **~210.000** en el pico de cría, que es **noviembre y diciembre**: llegáis justo cuando se llena. 🌓

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 220 — de 220 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/) · CC BY-SA 3.0



Delfín de Heaviside

Cephalorhynchus heavisidii · Heaviside's dolphin

MUY FRECUENTE 4,7 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (26 de 552)

Pequeño y rechoncho, con el dorso oscuro en forma de cono. **Endémico de la corriente de Benguela**: no vive en ninguna otra parte del mundo. Salta girando sobre sí mismo.

DÓNDE Frente a **Walvis Bay**, en las salidas en barco (D5–D6).

CUÁNTOS **508 individuos** (intervalo de confianza del 95 %: 461–833) en la zona de uso intenso de Walvis Bay, contados por foto-identificación. 🟢

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 26 — de 26 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Joachim Huber from Switzerland · CC BY-SA 2.0



Delfín mular

Tursiops truncatus · Bottlenose dolphin

MUY FRECUENTE 5,6 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (31 de 552)

El delfín grande y gris de aleta curvada — 3 metros frente al 1,7 del Heaviside, que la lleva triangular. En la bahía **se reparten el agua por profundidades**: el mular pega a la costa, el Heaviside más afuera.

DÓNDE El propio **crucero de la bahía (D6)**: los operadores lo citan entre los habituales — sin la garantía del Heaviside, que es el fiable. Es la población residente que estudia el Namibian Dolphin Project desde 2008.

CUÁNTOS La bahía tiene una población **residente**, pequeña y única en este litoral: el estudio piloto la estimó en **71–122 individuos** (Namibian Dolphin Project, 2008–09) 🟢; hoy se cita «menos de 100» 🌓.

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 31 — de 31 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Ballena jorobada

Megaptera novaeangliae · Humpback whale

MUY FRECUENTE 10,0 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (55 de 552)

Aletas pectorales enormes y casi blancas —un tercio del cuerpo— y el salto más famoso del océano. **Migra frente a esta costa de junio a noviembre**: el crucero de Walvis Bay cae en temporada.

DÓNDE Desde el **crucero de Walvis Bay (D6)**: la migración pasa frente a esta costa de junio a noviembre, y vuestro día cae aún en temporada.

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 55 — de 55 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Damán roquero

Procavia capensis · Rock hyrax

MUY FRECUENTE 5,9 % de los registros de su grupo en Damaraland en oct-nov (13 de 219)

Parece un roedor gordo, pero su pariente vivo más cercano es **el elefante**. En colonias sobre los roquedos, tomando el sol a primera hora.

EN LA RUTA **Damaraland (D8–D9)** 13 · **el Namib (D3–D4)** 5 · **Etosha (D10–D13)** 4 · **la costa (D5–D7)** 1 — de 23 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Naturedata · CC0



Rata dassie o rata de las rocas

Petromus typicus · Dassie rat

MUY FRECUENTE 5,9 % de los registros de su grupo en Damaraland en oct-nov (13 de 219)

Parece una ardilla a la que la cola no le llegó a plumero — y es **la única especie viva de toda su familia**. Diurna, tomando el sol en las peñas; el cráneo aplanado y las costillas flexibles le dejan **colarse por grietas imposibles**.

DÓNDE **Twyfelfontein (D8)**: las peñas del propio yacimiento, donde se concentran las observaciones — y los roquedos de la escarpa: también está citada en el paso de Spreetshoogte (D2).

EN LA RUTA **Damaraland (D8–D9)** 13 · **Etosha (D10–D13)** 2 · **el Namib (D3–D4)** 2 — de 17 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Giles Laurent · CC BY-SA 4.0



Ardilla terrestre del Cabo


Xerus inauris · Cape ground squirrel

FRECUENTE 1,8 % de los registros de su grupo en Etosha en oct-nov (82 de 4.529)

En el suelo, con la **cola en abanico sobre el lomo haciendo de sombrilla**. Vive en colonias junto a sus madrigueras y es de lo más visible en las llanuras de Etosha.

EN LA RUTA **Etosha (D10–D13)** 82 · **el Namib (D3–D4)** 6 · **Damaraland (D8–D9)** 5 — de 93 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Derek Keats from Johannesburg, South Africa · CC BY 2.0



Pingüino africano

Spheniscus demersus · African penguin

ESCASA 0,1 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (65 de 46.876)

Una sola banda negra en forma de herradura sobre el pecho, y un dibujo de puntos negros que no se repite en dos individuos. Rebuzna igual que un burro.

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 65 — de 65 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Diego Delso · CC BY-SA 4.0



Alcatraz del Cabo


Morus capensis · Cape gannet

REGULAR 0,5 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (228 de 46.876)

Blanco con **la cabeza y la nuca doradas**, un antifaz azul alrededor del ojo y las puntas de las alas negras. Pesca lanzándose en picado desde veinte metros.

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 228 — de 228 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Bernard DUPONT · CC BY-SA 2.0



Cormorán de las bancas

Phalacrocorax neglectus · Bank cormorant

ESCASA 0,1 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (65 de 46.876)

Cormorán **negro entero y mate**, más grande y macizo que el del Cabo, con la cabeza cuadrada. Pesca justo detrás de la rompiente y cría sobre la roca.

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 65 — de 65 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Bernard DUPONT from FRANCE · CC BY-SA 2.0

Bichos

9 especies

Los vecinos de cada braai — en un viaje de camping **se dejan ver más que el leopardo**, aunque en los registros ni salgan: a GBIF nadie sube termitas, y la banda de abajo mide registros, no presencia. Van aquí por tres motivos distintos: los que hay que **respetar** (escorpión), los que dan un susto y son **inofensivos** (solífugo, shongololo), y los que explican cómo funciona este desierto (el escarabajo que bebe niebla, la termita que construye).

Y uno que no es anécdota: el mosquito. Es, de largo, el animal más peligroso de la ruta — la profilaxis está en `04`.



Escarabajo de la niebla

Onymacris unguicularis · Fog-basking beetle

APENAS REGISTRADA 9 registros en la costa en oct-nov: muestra corta para decir más

El bicho que **bebe niebla**: sube a lo alto de la duna de madrugada y **hace el pino** para que la humedad condense en su caparazón y le resbale hasta la boca.

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 9 — de 9 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: Виктор Пинчук · CC BY-SA 4.0



Escorpión de cola gruesa

Parabuthus villosus · Black hairy thick-tailed scorpion

MUY FRECUENTE 24,7 % de los registros de su grupo en la costa en oct-nov (36 de 146)

Grande y negro, con la **cola gruesa**. Regla de oro: cola gruesa y pinzas finas = veneno potente; pinzas grandes y cola fina = poco peligro. **Sacude las botas cada mañana** y no dejes ropa en el suelo.

EN LA RUTA **la costa (D5–D7)** 36 · **Etosha (D10–D13)** 1 · **Damaraland (D8–D9)** 1 · **el Namib (D3–D4)** 1 — de 39 registros de oct-nov en las cuatro zonas

Foto: RichardMcJimsey · CC BY-SA 4.0



Araña blanca del Namib

Leucorchestris arenicola · Dancing white lady spider

APENAS REGISTRADA 2 registros en la costa en oct-nov: muestra corta para decir más

Araña blanca y grande de las dunas, cazadora nocturna. El macho recorre cientos de metros por la noche buscando hembra y **«tamborilea» en la arena** para comunicarse — de ahí lo de *dancing white lady*.

Foto: Frank Jeurissen Tcf0908 · CC BY-SA 4.0



Termita constructora

Macrotermes michaelseni · Termite

SIN REGISTROS ninguno de los 166 registros de su grupo en Etosha en oct-nov es suyo

No la verás a ella: verás **su edificio**. Los termiteros de metros de alto salpican toda la ruta, orientados para ventilarse solos. Son también las sospechosas del misterio de los **círculos de hadas** *(están en el cuaderno de joyas ocultas)*.

Foto: Andrew Deacon · CC0



Escarabajo pelotero

Scarabaeus satyrus · Dung beetle

SIN REGISTROS ninguno de los 166 registros de su grupo en Etosha en oct-nov es suyo

Modela una bola de estiércol más grande que él y la empuja **de espaldas y en línea recta**. Esta especie se orienta de noche **por la Vía Láctea** — se le comprobó tapándole la vista del cielo.

Foto: Udo Schmidt from Deutschland · CC BY-SA 2.0



Solífugo o araña camello

Solifugae · Sun spider / camel spider

SIN REGISTROS ninguno de los 146 registros de su grupo en la costa en oct-nov es suyo

Ni araña ni escorpión: parece las dos cosas y **no es venenoso**. Corre como una bala hacia tu linterna —no hacia ti— y por eso asusta tanto en el campamento. Muerde si lo agarras: no lo agarres.

Foto: NathanScientific · CC0



Gusano de mopane

Gonimbrasia belina · Mopane worm

SIN REGISTROS ninguno de los 166 registros de su grupo en Etosha en oct-nov es suyo

La oruga a rayas que devora los mopanes... y que en el norte se come **frita con tomate y chili**: es proteína seria y la venden en los mercados *(ver el manual de intendencia)*.

Foto: SAplants · CC BY-SA 4.0



Milpiés gigante o shongololo

Archispirostreptus gigas · Giant African millipede

Milpiés negro y brillante del grosor de un dedo. **Inofensivo**: se enrosca en espiral si lo tocas. Aparece a montones tras las primeras lluvias.

Foto: Bjørn Christian Tørrissen · CC BY-SA 3.0



Mosquito anofeles

Anopheles · Anopheles mosquito

APENAS REGISTRADA 1 registro en Damaraland en oct-nov: muestra corta para decir más

Se posa con **el cuerpo inclinado**, en ángulo con la piel, y pica de noche. Sin dramatismo: **es el animal más peligroso del viaje** — Etosha es zona de malaria *(profilaxis, en la guía de preparación)*. Repelente al anochecer y manga larga.

Foto: Jim Gathany · Public domain

Créditos de las fotografías

Todas las imágenes proceden de **Wikimedia Commons** con licencia libre (CC BY, CC BY-SA, CC0 o dominio público), que exige citar autor y licencia.

Abejaruco europeo — Andy Morffew from Itchen Abbas, Hampshire, UK, *CC BY 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bee-eater_(19270331108).jpg

Agama de roca de Namibia — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Namib_rock_agama_(Agama_planiceps)_male.jpg

Aguilucho caricalvo común — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:African_harrier-hawk_(Polyboroides_typus_typus)_taking_off,_crop.jpg

Aguilucho cenizo — Rohitjahnavi, *CC BY 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Montagu%27s_Harrier_Male_(Circus_pygargus)_at_Velavadar_National_Park,_Gujarat,_India_DSCN7503_02.jpg

Aguilucho papialbo — Shiv's fotografia, *CC BY 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pallid_harrier.jpg

Alcatraz del Cabo — Bernard DUPONT, *CC BY-SA 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cape_gannet_(Morus_capensis)_sideview.jpg

Alcaudón de cola blanca — Zieger M, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:White-tailed_Shrike_143ND500_DSC0729.jpg

Alcaudón de pecho carmesí — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:161_Crimson-breasted_shrike_in_Otjozondjupa_Region_Photo_by_Giles_Laurent.jpg

Alcotán turumti — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Falco_chicquera_(Etosha,_2012).jpg

Alcélafo rojo — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2011-Red-Hartebeest.jpg

Alondra de Gray — Ragnhild&Neil Crawford from Sweden, *CC BY 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gray%27s_lark_-4770_-_Flickr_-_Ragnhild_%26_Neil_Crawford.jpg

Alondra de las dunas — Ragnhild&Neil Crawford from Sweden, *CC BY-SA 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dune_lark-3947_-_Flickr_-_Ragnhild_%26_Neil_Crawford.jpg

Araña blanca del Namib — Frank Jeurissen Tcf0908, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leucorchestris_arenicola.jpg

Ardilla de matorral de Smith — Christoph Strässler, *CC BY-SA 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tree_squirrel,_Etosha_National_Park,_Namibia.jpg

Ardilla terrestre del Cabo — Derek Keats from Johannesburg, South Africa, *CC BY 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cape_ground_squirrel,_Xerus_inauris,_at_Krugersdorp_Game_Reserve,_Gauteng,_South_Africa_(27410204561).jpg

Autillo africano — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:African-scops_owl_(Otus_senegalensis)_male.jpg

Autillo cariblanco sureño — Joachim Huber, *CC BY-SA 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ptilopsis_granti-Chobe_River_front,_Botswana-8.jpg

Avefría armada — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vanellus_armatus_-_Etosha_2014.jpg

Avestruz común — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Struthio_camelus_-_Etosha_2014_(3).jpg

Avoceta común — Christoph Strässler, *CC BY-SA 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pied_Avocet_at_Walvis_Bay,_Namibia.jpg

Avutarda de Namibia — Hans Hillewaert, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neotis_ludwigii.jpg

Avutarda kori — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kori_bustard_(Ardeotis_kori_kori)_male.jpg

Azor lagartijero claro — Hans Stieglitz, *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Melierax_canorus-01.jpg

Babuino chacma — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chacma_baboon_(Papio_ursinus_griseipes)_male_head.jpg

Ballena jorobada — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:001_Humpback_whale_breaching_in_Ballena_Marine_National_Park_Photo_by_Giles_Laurent.jpg

Buitre cabeciblanco — Bernard DUPONT from FRANCE, *CC BY-SA 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Day_12_White-headed_Vulture_(Trigonoceps_occipitalis)_(53439819016).jpg

Buitre dorsiblanco africano — Yathin sk, *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-white-backed-vulture.jpg

Buitre orejudo — Yathin sk, *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-lappet-faced-vulture.jpg

Bulbul encapuchado — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:127_African_red-eyed_bulbul_in_Namib-Naukluft_National_Park_Photo_by_Giles_Laurent.jpg

Busardo augur — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:009_Augur_buzzard_in_flight_in_the_Ngorongoro_Crater_Photo_by_Giles_Laurent.jpg

Busardo augur meridional — Derek Keats from Johannesburg, South Africa, *CC BY 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jackal_buzzard,_Buteo_rufofuscus,_at_Kgalagadi_Transfrontier_Park,_Northern_Cape,_South_Africa_(34676042615)_(cropped).jpg

Busardo ratonero (ratonero estepario) — Dick Daniels (http://theworldbirds.org/), *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buteo_buteo_vulpinus_(World_of_Birds,_South_Africa)2.jpg

Búho lácteo de Verreaux — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-giant-eagle-owl.jpg

Búho manchado — Dick Daniels (http://theworldbirds.org/), *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spotted_Eagle-Owl_RWD.jpg

Búho moro — Darren Obbard, *CC BY 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asio_capensis_261246078.jpg

Camaleón del Namib — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chamaeleo_namaquensis_(Walvis_Bay).jpg

Cantor de roca o rockrunner — Zieger M, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rockrunner_143ND500_DSC0869.jpg

Caracal — Habib M'henni, *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caracl_(01),_Paris,_d%C3%A9cembre_2013.jpg

Carbonero de Carp — scaup, *CC BY 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carp%27s_Tit_(Melaniparus_carpi)_in_Namibia.jpg

Carraca lila — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:143_Lilac-breasted_roller_in_Etosha_National_Park_Photo_by_Giles_Laurent.jpg

Cebra de Burchell — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equus_quagga_burchellii_-_Etosha,_2014.jpg

Cebra de montaña de Hartmann — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equus_zebra_hartmannae_-_Etosha_2015.jpg

Cernícalo africano o roquero — Bernard DUPONT from FRANCE, *CC BY-SA 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rock_Kestrel_(Falco_rupicolis)_(32496132591).jpg

Cernícalo ojiblanco — Frank Vassen from Brussels, Belgium, *CC BY 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Falco_rupicoloides_-Etosha_National_Park,_Namibia-8.jpg

Chacal de lomo negro — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:135_Black-backed_jackal_hunting_for_food_at_Cape_cross_Photo_by_Giles_Laurent.jpg

Charrán común — Cláudio Dias Timm from Rio Grande do Sul, *CC BY-SA 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sterna_hirundo_-Bojuru,_Rio_Grande_do_Sul,_Brasil-8.jpg

Charrán damara — Ron Knight from Seaford, East Sussex, United Kingdom, *CC BY 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Damara_Tern_(8077271589).jpg

Cigüeña de Abdim — Gediminas, *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ciconia_abdimii_-London_Zoo-8a.jpg

Cobra escupidora cebra — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Naja_nigricincta_nigricincta.jpg

Cormorán de las bancas — Bernard DUPONT from FRANCE, *CC BY-SA 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bank_Cormorant_(Phalacrocorax_neglectus)_(32414152818).jpg

Cormorán del Cabo — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phalacrocorax_capensis_-_Namib_2013.jpg

Culebrera pechinegra — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black-chested_snake-eagle_(Circaetus_pectoralis).jpg

Culebrera sombría — Bernard DUPONT from FRANCE, *CC BY-SA 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brown_Snake_Eagle_(Circaetus_cinereus)_(39992020273).jpg

Cálao de pico amarillo sureño — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:155_Southern_yellow-billed_hornbill_in_Etosha_National_Park_Photo_by_Giles_Laurent.jpg

Cálao de pico rojo sureño — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Southern_red-billed_hornbill_(Tockus_rufirostris)_male,_crop.jpg

Damán roquero — Naturedata, *CC0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rock_hyrax_Serengeti_National_Park.jpg

Delfín de Heaviside — Joachim Huber from Switzerland, *CC BY-SA 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dolphins_at_L%C3%BCderitz,_Namibia_(3144863196).jpg

Delfín mular — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:010_Atlantic_bottlenose_dolphin_jumping_at_Pelican_point_Photo_by_Giles_Laurent.jpg

Dik-dik de Damara — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Madoqua_kirkii_-_male_(Namutoni).jpg

Drongo ahorquillado — Xenia Ivanoff Erb, *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dicrurus_adsimilis,_Namibia_(144258501).jpg

Eland común — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taurotragus_oryx_-_young_bull_-_Etosha_2015.jpg

Elanio común — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black-shouldered_kite_(Elanus_caeruleus_caeruleus)_young_adult.jpg

Elefante africano de sabana — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:178_Male_African_bush_elephant_in_Etosha_National_Park_Photo_by_Giles_Laurent.jpg

Escarabajo de la niebla — Виктор Пинчук, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Onymacris_unguicularis_(Sudan).jpg

Escarabajo pelotero — Udo Schmidt from Deutschland, *CC BY-SA 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scarabaeus_satyrus_(Bohemann,_1860)_(3847992837)_(2).jpg

Escinco arborícola del Kalahari — Ryan van Huyssteen, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trachylepis_spilogaster_in_South_Africa_118136825.jpg

Escorpión de cola gruesa — RichardMcJimsey, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parabuthus_villosus.jpg

Estornino Naburup — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:142_Pale-winged_starling_in_Twyfelfontein_Photo_by_Giles_Laurent.jpg

Estornino brillante del Cabo — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:159_Cape_starling_in_Etosha_National_Park_Photo_by_Giles_Laurent.jpg

Facóquero — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Southern_warthog_(Phacochoerus_africanus_sundevallii)_male.jpg

Flamenco común — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:010_Greater_flamingos_male_and_female_in_the_Camargue_during_mating_season_Photo_by_Giles_Laurent.jpg

Flamenco enano — Sumita Roy Dutta, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flock_of_Lesser_Flamingo_along_with_juvenile_near_Jamnagar_railway_stationDSCN1798_1.jpg

Francolín de Hartlaub — Zieger M, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hartlaub-s_Spurfowl_143ND500_DSC0583.jpg

Francolín de pico rojo — Yathin sk, *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2011-red-billed-francolin.jpg

Galápago africano o tortuga de escudo — Marius Burger, *CC0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pelomedusa_subrufa_188270144.jpg

Ganga namaqua — Yathin sk, *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-namaqua-sandgrouse-male.jpg

Gato de patas negras — Charles Barilleaux from Cincinnati, Ohio, United States of America, *CC BY 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Standing_BFC_(8359398129).jpg

Gato montés africano — Bernard DUPONT from FRANCE, *CC BY-SA 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:African_Wildcat_(Felis_lybica)_(51659798835).jpg

Gavilán chikra — Judy Gallagher, *CC BY 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Little_Banded_Goshawk_-_Accipiter_badius,_Port_Edward,_Kwazulu-Natal,_South_Africa.jpg

Gavilán gabar — Lip Kee, *CC BY-SA 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gabar_Goshawk_(Micronisus_gabar).jpg

Gaviota cocinera — Ragnhild&Neil Crawford from Sweden, *CC BY-SA 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cape_(kelp)_gull-3327_-_Flickr_-_Ragnhild_%26_Neil_Crawford.jpg

Gaviota de Hartlaub — Diego Delso, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaviota_de_Hartlaub_(Chroicocephalus_hartlaubii),_Walvis_Bay,_Namibia,_2018-08-05,_DD_31.jpg

Gecko de Fischer — m_burger, *CC0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chondrodactylus-laevigatus.jpg

Gecko diurno del Namib — Ryan van Huyssteen, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhoptropus_afer_345390145.jpg

Gecko palmeado del Namib — Stefan.Kuemmel at German Wikipedia (Original text: Stefan Kümmel), *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pachydactylus-rangei.jpg

Gran kudú — L0k1m0nk33 at English Wikipedia, *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Male_greater_kudu.jpg

Grulla azul — Ron Knight from Seaford, East Sussex, United Kingdom, *CC BY 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grus_paradisea_Etosha_1.jpg

Grulla carunculada — Per Arne Slotte from Trondheim, Norway, *CC BY-SA 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grus_carunculata,_Linyanti,_Caprivi,_Namibia_1.jpg

Guepardo — AfricanConservation, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Male_cheetah_facing_left_in_South_Africa.jpg

Gusano de mopane — SAplants, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colophospermum_mopane_50D_0486.jpg

Halconcito africano — Derek Keats from Johannesburg, South Africa, *CC BY 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pygmy_Falcon_(Polihierax_semitorquatus),_at_Kgalagadi_Transfrontier_Park,_Northern_Cape,_South_Africa_(34384165391).jpg

Halcón borní — Derek Keats from Johannesburg, South Africa, *CC BY 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lanner_Falcon_Falco_biarmicus,_Kgalagadi_Transfrontier_Park,_Northern_Cape,_South_Africa._(34514634415).jpg

Halcón peregrino — Timothy Whitehead, *CC BY 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Falco_peregrinus_minor,_Cape_Town,_South_Africa_118534019.jpg

Hiena manchada — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spotted_hyena_(Crocuta_crocuta).jpg

Hiena parda — Bernard DUPONT from FRANCE, *CC BY-SA 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brown_Hyena_(Hyaena_brunnea)_leaving_waterhole_..._(50915531592),_crop.jpg

Impala de cara negra — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Impala_(Aepyceros_melampus)_male_Kruger.jpg

Inseparable de Namibia — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:087_Rosy-faced_lovebird_couple_cuddling_in_Damaraland_Photo_by_Giles_Laurent.jpg

Jineta de manchas pequeñas — Frédéric SALEIN, *CC BY-SA 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_female_common_genet_in_the_dining_room,_Satao_Camp,_Tsavo_East.jpg

Jirafa angoleña — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:106_Angolan_giraffe_walking_in_the_Kalahari_Desert_of_Namibia_Photo_by_Giles_Laurent.jpg

Klipspringer o saltarrocas — Munificent, *CC BY 2.5* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klipspringer.jpg

Lagarto de nariz de cuña — Ryan van Huyssteen, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meroles_cuneirostris_345390278.jpg

Lagarto de nariz de pala — Ryan van Huyssteen, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meroles_anchietae_345390261.jpg

Lechuza común — Jens Oldenburg, *CC BY 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tyto_alba_affinis,_Oshana_Region,_Namibia.jpg

Leopardo — Sumeet Moghe, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:African_leopard_male_(cropped).jpg

León — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:020_The_lion_king_Snyggve_in_the_Serengeti_National_Park_Photo_by_Giles_Laurent.jpg

Liebre saltadora — Bernard DUPONT from FRANCE, *CC BY-SA 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spring_Hare_(Pedetes_capensis)_(6042009463).jpg

Lobo de tierra — kevinatbrakputs, *CC BY 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aardwolf,_Namaqua_National_Park,_South_Africa_1.jpg

Lobo marino del Cabo — JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/), *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arctocephalus_pusillus_-_SE_Tasmania.jpg

Lorito de Rüppell — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:R%C3%BCppell%27s_parrot_(Poicephalus_rueppellii)_female.jpg

Mamba negra — TimVickers, *Public domain* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dendroaspis_polylepis_(14).jpg

Mangosta amarilla — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:082_Yellow_mongoose_in_Khomas_Region_Photo_by_Giles_Laurent.jpg

Mangosta esbelta — Sara&Joachim, *CC BY-SA 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slender_Mongoose_Etosha_National_Park_Namibia,_crop.jpg

Mangosta rayada — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:168_Banded_mongoose_in_Etosha_National_Park_Photo_by_Giles_Laurent.jpg

Milano negro — Tisha Mukherjee, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Kite_in_Rabindra_Sarobar_January_2024_by_Tisha_Mukherjee_02.jpg

Milpiés gigante o shongololo — Bjørn Christian Tørrissen, *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archispirostreptus-Gigas-Amphitheatre.jpg

Mochuelo perlado — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pearl-spotted_owlet_(Glaucidium_perlatum_diurnum).jpg

Mosquito anofeles — Jim Gathany, *Public domain* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anopheles_stephensi.jpeg

Ostrero africano — Dane Paijmans], *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:African_Black_Oystercatcher_(2).JPG

Papamoscas herero — H.-U. Küenle, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Namibornis_herero_K1.jpg

Pelícano blanco común — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Great_white_pelican_(Pelecanus_onocrotalus).jpg

Pigargo vocinglero — Derek Keats from Johannesburg, South Africa, *CC BY 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:African_fish_eagle,_Haliaeetus_vocifer,_at_Chobe_National_Park,_Botswana_(33516612831).jpg

Pingüino africano — Diego Delso, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ping%C3%BCino_de_El_Cabo_(Spheniscus_demersus),_Playa_de_Boulders,_Simon%27s_Town,_Sud%C3%A1frica,_2018-07-23,_DD_11.jpg

Pintada común — Rui Ornelas, *CC BY 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Numida_meleagris_-Etosha_National_Park,_Namibia-8.jpg

Puercoespín del Cabo — Steven Lek, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hystrix_africaeaustralis_Blijdorp_Rotterdam.JPG

Quélea común — Bernard DUPONT from FRANCE, *CC BY-SA 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red-billed_Queleas_(Quelea_quelea)_(6040852957).jpg

Rata dassie o rata de las rocas — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:141_Dassie_rat_in_Twyfelfontein_Photo_by_Giles_Laurent.jpg

Ratel o tejón de la miel — Sumeet Moghe, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Honey_Badger.jpg

Rinoceronte blanco — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:109_Male_White_rhinoceros_walking_in_the_Kalahari_Desert_of_Namibia_Photo_by_Giles_Laurent.jpg

Rinoceronte negro — AfricanConservation, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Rhino_at_Working_with_Wildlife.jpg

Secretario — Sumeet Moghe, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Secretary_bird_Mara_for_WC.jpg

Sisón de Damaraland — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:R%C3%BCppell%27s_korhaan_(Eupodotis_rueppellii_rueppellii)_male.jpg

Sisón negro norteño — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Northern_black_korhaan_(Afrotis_afraoides)_male.jpg

Solífugo o araña camello — NathanScientific, *CC0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solifuge_in_Trinidad,_Colorado,_July_2026.jpg

Springbok — Giles Laurent, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:174_Male_Springbok_in_Etosha_National_Park_Photo_by_Giles_Laurent.jpg

Steenbok — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raphicerus_campestris_male_(Etosha,_2012).jpg

Tejedor republicano — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sociable_weaver_(Philetairus_socius).jpg

Termita constructora — Andrew Deacon, *CC0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macrotermes_michaelseni.jpg

Toco angoleño — Nanosanchez, *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tockus_monteiri_(606),_crop.jpg

Toco piquinegro — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:African_Grey_Hornbill_(Lophoceros_nasutus_epirhinus)_female.jpg

Tortuga leopardo — Bernard DUPONT from FRANCE, *CC BY-SA 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leopard_Tortoise_(Stigmochelys_pardalis)_(17331907085).jpg

Turaco unicolor — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grey_go-away-bird_(Corythaixoides_concolor_pallidiceps).jpg

Turdoide caricalvo — Ron Knight, *CC BY 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bare-cheeked_Babbler.jpg

Varano de roca — Bernard DUPONT from FRANCE, *CC BY-SA 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:White-throated_Monitor_(Varanus_albigularis)_(32184691034).jpg

Víbora bufadora — Danny S., *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bitis_arietans_by_Danny_S._1.JPG

Víbora cornuda — Chantelle Bosch, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bitis_caudalis00a.jpg

Víbora de Péringuey — Jay Iwasaki, *CC BY 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Namibian_Sidewinder_Bitis_peringueyi.jpg

Zorro del Cabo — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vulpes_chama_(Etosha).jpg

Zorro orejudo — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otocyon_megalotis_-_Etosha_2014.jpg

Águila azor africana — Bernard DUPONT from FRANCE, *CC BY-SA 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Day_15_African_Hawk-Eagle_(Aquila_spilogaster)_(53235171227).jpg

Águila cafre o de Verreaux — Derek Keats from Johannesburg, South Africa, *CC BY 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Verreaux%27s_Eagle_(Black_Eagle),_Aquila_verreauxii,_at_Walter_Sisulu_National_Botanical_Garden,_Gauteng,_South_Africa_(28825016213).jpg

Águila calzada — Derek Keats from Johannesburg, South Africa, *CC BY 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Booted_eagle,_Hieraaetus_pennatus,_at_Kgalagadi_001_(32334023978).jpg

Águila de Wahlberg — Bernard DUPONT from FRANCE, *CC BY-SA 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wahlberg%27s_Eagle_(Hieraaetus_wahlbergi)_(46772007751).jpg

Águila marcial — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martial_eagle_(Polemaetus_bellicosus).jpg

Águila pescadora — El Golli Mohamed, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Balbuzard_pecheur_Lac_de_Tunis.jpg

Águila pomerana — Ron Knight from Seaford, East Sussex, United Kingdom, *CC BY 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clanga_pomarina,_Belarus_1.jpg

Águila rapaz — Yathin S Krishnappa, *CC BY-SA 3.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-tawny-eagle-0.jpg

Águila volatinera o bateleur — Derek Keats from Johannesburg, South Africa, *CC BY 2.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bataleur_-_Kruger_National_park_(37161617713).jpg

Ñu azul — Buiobuione, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wildebeest_of_Etosha_National_Park.jpg

Órix o gemsbok — Charles J. Sharp, *CC BY-SA 4.0* · https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gemsbok_(Oryx_gazella)_male.jpg

Fuentes del «dónde y cuándo»

Felinos y rapaces (añadidos el 15/08): informes de viaje de birding con fecha y lugar, de octubre-noviembre y de esta misma ruta, leídos enteros: Birding Ecotours (2–20 nov 2023 y 7–22 nov 2023, birdingecotours.com/trip-report/complete-namibia-set-departure-birding), Field Guides (nov 2015, oct 2017, nov 2018, nov 2019, sep y oct-nov 2023, fieldguides.com/triplists/nam23c.html), Wise Birding (6–22 nov 2016, PDF en mammalwatching.com), Birdquest (sep-oct 2017, oct 2023, oct 2025), Rockjumper (oct 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 y oct-nov 2023), Royle Safaris (oct 2016), Batis Birding (oct 2024) y birdtours.co.uk (Vermeulen oct-nov 1996, Benstead nov-dic 2002, Rae dic 2004). Lo que ningún informe cita en la ruta se queda sin línea: gato de patas negras, águila pomerana, aguilucho caricalvo y milano; el águila pescadora en Walvis Bay solo la sostiene GBIF, y así se dice.

Horarios de puerta: tabla *Etosha National Park Gates Opening & Closing Time* — la que se tenía es la de **2025** (3–9 nov 06:13–19:06 · 10–16 nov 06:10–19:10); en 2026 los tramos semanales caen en 2–8 y 9–15 nov, a un minuto o dos. Cambian cada semana y están puestas en cada puerta: manda la puerta.

Reglamento del parque (60 km/h, 20 en campamentos, prohibido bajar del coche fuera de los campamentos, prohibido salir de las pistas): *Park Regulations* de NWR/MEFT.

Rinoceronte negro: MEFT (ficha de Etosha) y NWR confirman león, elefante y rinoceronte negro de noche en Okaukuejo. Lo de «mayor población mundial» es de la *subespecie suroccidental*: WWF sitúa el 72 % de la población nacional en Etosha.

Impala de cara negra: UICN (Vulnerable, endémica de Kaokoveld y suroeste de Angola) y Matson 2006 — cinco subpoblaciones que coinciden con los cinco puntos de suelta de los años 70.

Grulla azul: Craig 2017 (*Bull. B.O.C.*) y el Namibia Crane Working Group — 19 aves en el censo de noviembre de 2021, y 1.200 km hasta la población sudafricana.

Flamencos: NASA Earth Observatory (la pan seca en diciembre, inundada en enero), Simmons 1996 (tres eventos de cría en 40 años) y BirdLife (umbral de 400 mm). Máximos de Walvis Bay de junio a noviembre: SABAP1.

Migradores: tasas de registro mensuales de SABAP2 / African Bird Atlas filtradas a Etosha. Ahí se ve que el abejaruco carmesí tiene *cero* registros en el parque y que la cigüeña de Abdim es de febrero-marzo.

Cebra de montaña: |Uiseb 2024 — en Etosha está restringida a las lomas de dolomita del oeste; la de llanura, por todo el parque.

Dik-dik: Travel News Namibia (Dik-dik Drive) y registros de GBIF: ~206 en la cuadrícula de Namutoni frente a 4 en Okaukuejo.

Obras de la carretera: nota oficial del MEFT de 2026 —«Traffic deviation via Gemsbokvlakte road from Okaukuejo to Halali», meft.gov.na/news/335, con aviso paralelo de NWR—: desvío obligatorio del 2 jun 2026 al jul 2027. La página devuelve 403; las fechas convergen en cinco secundarias (◐). Reconfirmar con NWR (+264 67 229 800).

Charcas: Expert Africa, etosha.org, Roxanne Reid y etoshanationalpark.co.za — secundarias, pero coincidentes entre sí.

Cálaos de pico rojo: el sureño y el damara son especies separadas (Kemp & Delport 2002) con zona de contacto en los montes de Otavi, pegados al SE del parque; el rasgo es el ojo —amarillo el sureño, oscuro el damara— y en la banda de Namutoni el sureño saca ~2,6:1 en registros: Delport, Kemp & Ferguson 2004, *The Auk* 121:565–586, y GBIF.

Águila rapaz: anotada en el eje por los tours de Field Guides (oct 2017 y sep 2023, cinco por viaje, de una en una) y en las charcas de Goas y Sonderkop; acude a carroña junto a las pistas (Simmons 2015, *Birds to watch in Namibia*).

Las añadidas el 10/08 (avefría, pintada, quélea, turaco, drongo, toco piquinegro, bulbul, turdoide): informes de campo con fecha y lugar en el propio eje —birds4africa.org (oct 2021, las fechas del viaje), Field Guides, travelgumbo (recinto de Namutoni), faansiepeacock.com (Okaukuejo)— y registros de GBIF del eje; el turdoide caricalvo concentra ~700 de sus ~770 registros del eje en la banda de Halali. La historia del drongo ladrón es de esta especie pero medida en el Kalahari sudafricano (Flower et al. 2011 y 2014): por eso la ficha dice «en el Kalahari» y no «aquí».

Galápago africano: Robel 2008, *Lanioturdus* 41:13–15 (Namibia Bird Club) — unas 30 quéleas cazadas por galápagos en dos horas en la charca de Nuamses, 26/11/1997 — y Jarvis 1986 (*Lanioturdus* 22) junto a Namutoni; tras la revisión del género (Petzold et al. 2014, *Zootaxa*), la población namibia sigue siendo *P. subrufa*.

Escinco, gecko, ardilla y mangosta esbelta: observaciones georreferenciadas research-grade dentro de los recintos (iNaturalist, 2015–2026); la ardilla, «common in HAL camp», y la mangosta, fiable en el Dik-dik Drive (informes de mammalwatching.com, 2012). El escinco y los nidos de tejedor: Rymer, Thomson & Whiting 2014, *Austral Ecology* — estudio del Kalahari, no de Etosha, y así se cuenta.

Las de las otras zonas (añadidas el 11/08): mular, «regularly seen» en los cruceros (namibiancharters.com) y estudiado por el Namibian Dolphin Project (seasearch.co.za); sisón de Damaraland «a pair near the road at Sossusvlei» y estornino Naburup «about 200» (listas de tour de Field Guides 2017/2023); avutarda de Namibia y alondra de las dunas, en el informe de noviembre de 2023 de Birding Ecotours; lorito de Rüppell y toco angoleño en el cauce del Aba Huab y Twyfelfontein (birdtours.co.uk, «Namibia's endemics»); rata dassie fiable en Twyfelfontein y Spreetshoogte (Rockjumper, «The Dassie Rat»; 38 obs. iNaturalist a <5 km del yacimiento); inseparable anidando en nidos de tejedor (Animal Diversity Web y *Ostrich* 78, 2007).

Los dos lagartos de la duna: la partición de hábitat —anchietae en la ladera de deslizamiento, cuneirostris en la base vegetada— está medida en la tesis de Iiyambo (Univ. de Pretoria, 2018, dir. Chimimba), con el 49–50 % de los cuneirostris en la base con matas. El gecko diurno: la vuelta a la diurnidad de *Rhoptropus* está publicada en Gamble et al. 2015 (*Biol. J. Linn. Soc.* 115) y Birn-Jeffery & Higham 2016 (*J. Exp. Biol.* 219), con ejemplares de Swakopmund.

La laguna de Walvis Bay: Ramsar desde 1995 y «el humedal costero más importante del África austral en número de aves» (Simmons et al. 1998); conteos desde 1983, con récord de 242.000 aves en 2004 — Bridgeford 2013, *Mitteilungen* 54 (PDF en the-eis.com).

Sin dato (y no se rellena): la hora punta nocturna del rinoceronte en Okaukuejo, el número absoluto de rinocerontes del parque, la orientación solar de cada charca y la frecuencia real de la hiena parda.

El safari nocturno: el trío del nocturno guiado de NWR y el rinoceronte/león/elefante de la charca de Okaukuejo, ya citados arriba. El de las reservas privadas, verificado el 12/08/2026 abriendo la tarifa propia de cada operador: Okonjima/AfriCat (okonjima.com, PDF Rack Rates 2026), Hobatere Lodge (hobatere-lodge.com, PDF RACK Rates 2026) y Ongava (ongava.com, PDF de tarifas 2026).

Fuentes de las posibilidades y de los recuentos

Porcentaje de viajeros que vio cada especie: partes de avistamiento publicados por *Expert Africa* para los tres campamentos — Okaukuejo (149 viajeros desde May-2018) · Halali (48 viajeros desde Jun-2018) · Namutoni (16 viajeros desde Sep-2018). expertafrica.com/namibia/etosha-national-park. La unidad es **una estancia en ese campamento** con una o más observaciones, no un día ni un viaje. Los rellenan los propios viajeros: el 14 % que declara antílope sable en Okaukuejo es la medida del ruido que traen.

Índice de registros: *GBIF*, recuento de ocurrencias dentro del polígono de cada zona y filtrado a octubre y noviembre api.gbif.org/v1/occurrence/search. El polígono de Etosha es el límite real del parque en OpenStreetMap; las otras tres zonas son cajas sobre la costa, el Namib y Damaraland. Lo baja y lo cachea `fuente/avistamientos.py`, y las cifras de este PDF salen de ese fichero: 4 zonas, 159 especies.

Categorías UICN de rapaces y felinos (añadidas el 15/08): Lista Roja de la UICN, leída a través de la infobox de Wikipedia EN —que cita la evaluación con su año— porque la web de la Lista Roja no se deja leer sin JavaScript: por eso van con ◐ y no con ✅. El gato de patas negras: Sliwa et al. 2016/2020 (UICN) y el Libro Rojo de carnívoros de Namibia (NCE/LCMAN/MEFT 2022), ya citados en el `09`.

Elefante: censo aéreo del MEFT de 2015 (2.911 ± 697) y serie desde 1998, recogidos en *Namibia's elephants — population, distribution and trends* (*Pachyderm*) y en el resumen de Conservation Namibia conservationnamibia.com/blog/b2021-elephant-numbers.php.

Rinoceronte negro: Save the Rhino y WWF para las cifras nacionales (~2.200 en 2023, más de un tercio de África, >70 % en Etosha) savetherhino.org/programmes/ministry-of-environment-and-tourism y wwf.panda.org/?uProjectID=NA0016. El dato por parque no lo publica nadie.

León: *The Lions of Etosha National Park: A Brief History*, Conservation Namibia, sobre Heydinger, Packer y Funston conservationnamibia.com/blog/etosha-lions-2023.php.

Impala de cara negra: UICN (Vulnerable) y la ficha del US Fish & Wildlife Service. *(El atlas biodiversity.org.na, citado aquí hasta agosto de 2026, ha desaparecido de la red — todo el dominio devuelve HTTP 410.)*

Grulla azul: Craig 2017 (*Bull. B.O.C.*) y el Namibia Crane Working Group.

Lobo marino: varias fuentes secundarias concordantes sobre la colonia de Cape Cross; el rango es ancho porque la colonia se llena para la cría de noviembre y diciembre.

Delfín de Heaviside: Elwen et al., estimación por foto-identificación de la zona de uso intenso de Walvis Bay (508; IC 95 % 461–833).

Charrán damara: evaluación de BirdLife South Africa birdlife.org.za/red-list/damara-tern. Las estimaciones globales de adultos (12.000–13.500) y las de parejas reproductoras no cuadran entre sí: se da la de parejas, que es la que tiene serie temporal.

Águila rapaz: UICN 2021 (Vulnerable, evaluación del 28/06/2021) iucnredlist.org/species/22696033/203852137 y Simmons 2015, *Birds to watch in Namibia*, pp. 127–129 (En Peligro nacional, 415–563 parejas, −63 % en 30 años, 21 nidos conocidos en Etosha = 0,2 parejas/100 km²) the-eis.com/elibrary/search/10459.

Quélea: el «world's most abundant wild bird» va en el propio título de un artículo revisado por pares pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7403380 y lo respalda Audubon; la cifra de ~1.500 millones de adultos es estimación secundaria, sin censo detrás.

Delfín mular: Namibian Dolphin Project — proyecto de foto-identificación de la bahía desde 2008 seasearch.co.za/namibian-dolphin-project; la estimación 71–122 es de su informe de 2009 (PDF en the-eis.com).

Charrán común: Tree 1998 (170.000–180.000 en Namibia), recogido por BirdLife South Africa birdlife.org.za/red-list/common-tern — que avisa de la antigüedad del dato —, y Bridgeford 2013, *Mitteilungen* 54 (el conteo de 242.000 aves de 2004, PDF en the-eis.com).

Avutarda de Namibia: BirdLife South Africa (EN global 2024 y regional 2025; los tendidos como amenaza principal) birdlife.org.za/red-list/ludwigs-bustard; la horquilla de muertes por colisión, 4.000–11.900/año, es estimación secundaria.