

Poznámky k seminářům z obecné chemie

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz
is.muni.cz/www/moravec/c1040/

13. září 2026

Obsah

1	Úvod	4
2	Názvosloví	5
2.1	Podvojně soli	6
2.2	Iso- a heteropolyionty	6
2.3	Funkční deriváty kyseliny	8
2.4	Názvoslovná rozcvička	8
3	Platné číslice	9
4	Základní chemické zákony	10
4.1	Ekvivalence hmoty a energie	10
4.2	Slučovací zákony	10
4.3	Relativní atomová hmotnost	10
4.4	Molekulová hmotnost	10
4.5	Látkové množství	11
4.6	Stechiometrický vzorec	11
5	Chemické rovnice	13
5.1	Neredoxní rovnice	13
5.2	Redoxní rovnice	13
5.3	Iontové rovnice	13
5.4	Stechiometrické výpočty	14
6	Atomové jádro a elektronový obal	16
6.1	Atomové jádro	16
6.2	Elektronový obal	18
7	VSEPR	19
7.1	Formální náboj	19
7.2	Rezonanční struktury	19
7.3	Molekulové orbitály	19
7.4	Řád vazby	20
7.5	Hybridizace	20
7.6	VSEPR	21
7.7	Symetrie	22
7.8	Dipólový moment	22
8	Izomerie a NMR	23
8.1	Izomerie	23
8.2	NMR – počet a intenzita signálů	23
9	Koncentrace a titrace	25
9.1	Koncentrace	25
9.2	Titrace	27
10	Ideální plyn	28
10.1	Standardní podmínky	28

10.2 Stavová rovnice	28
10.3 Molární objem	29
10.4 Boyleův zákon	29
10.5 Daltonův zákon	29
10.6 Izobarický a izochorický děj	29
10.7 Parciální tlak	29
11 Krystaly	30
12 Termodynamika	31
12.1 Zákony termodynamiky	31
12.2 Objemová práce	31
12.3 Vnitřní energie	31
12.4 Gibbsova energie	32
12.5 Termochemie – Hessův zákon	32
13 Chemická rovnováha	35
13.1 Příklady	36
13.2 Le-Chatelierův princip	36
14 pH	37
14.1 Aktivita	37
14.2 Iontový součin vody	38
14.3 Vzorce	38
14.4 Silné kyseliny a zásady	38
14.5 Slabé kyseliny a zásady	39
14.6 Konjugované kyseliny a zásady	40
14.7 Soli	40
14.8 Neutralizace	41
14.9 Pufry	42
15 Součin rozpustnosti	43
15.1 Rozpustnost	43
15.2 Součin rozpustnosti	43
16 Elektrochemie	46
16.1 Beketovova řada kovů	46
16.2 Elektrodové potenciály	46
16.3 Elektrody a elektrodový potenciál	47
16.4 Galvanický článek	48
16.5 Elektrolýza	49

1 Úvod

Tento text slouží jako pomůcka pro výuku semináře z obecné chemie. Postupně doplňuji jednotlivé kapitoly.

Vše lze používat dle libosti, budu rád za upozornění na chyby.

Zdeněk Moravec

hugo@chemi.muni.cz

<https://is.muni.cz/www/moravec/c1040/>

2 Názvosloví

- Periodická tabulka prvků – **promítnout**, základní orientace
- Číselné předpony
- Oxidační číslo – definice, ukázka
- Koncovky oxidačních čísel

Bohrium, Bh	Curium, Cm	Darmstadtium, Ds	Einsteinium, Es
Flerovium, Fl	Hassium, Hs	Kalifornium, Cf	Kopernicium, Cn
Livermorium, Lv	Lutecium, Lu	Meitnerium, Mt	Promethium, Pm
Rhenium, Re	Rhodium, Rh	Roentgenium, Rg	Ruthenium, Ru
Rutherfordium, Rf	Seaborgium, Sg	Tellur, Te	Thallium, Tl
Thulium, Tm	Ytterbium, Yb	Yttrium, Y	

$\frac{1}{2}$	hemi	5	penta	10	deka
1	mono	6	hexa	11	undeka
2	di	7	hepta	12	dodeka
3	tri	8	okta	13	trideka
4	tetra	9	nona	14	tetradeka

Modrá skalice, zelená skalice, sádra

I	HCl, HBr, HClO, NaCl, KBr, K ₂ SO ₄
II	CaO, MnCl ₂ , FeBr ₂ , CaSO ₄ , NiCl ₂ , BaO ₂
III	NH ₃ , AsH ₃ , SbH ₃ , HClO ₂ , MnF ₃ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ (SO ₄) ₃
IV	SiH ₄ , GeH ₄ , H ₂ CO ₃ , GeO ₂ , GeCl ₄ , SnBr ₄ , Mn(SO ₄) ₂
V	PH ₅ , SbF ₅ , HNO ₃ , H ₃ PO ₄ , N ₂ O ₅ , PCl ₅ , AsBr ₅
VI	SeO ₃ , CrO ₃ , H ₂ CrO ₄ , H ₆ TeO ₆ , Na ₂ CrO ₄ , K ₂ FeO ₄ , WF ₆
VII	IF ₇ , Mn ₂ O ₇ , HClO ₄ , H ₅ IO ₆ , KMnO ₄ , KClO ₄ , NaTcO ₄
VIII	OsO ₄ , H ₂ OsO ₅
0	Fe(CO) ₅ , Ni(CO) ₄

Určování oxidačního čísla: O₂, H₂O, NH₃, CaH₂, K₂O, K₂O₂, KO₂, KO₃, HCl, HNO₃, H₂SO₄, H₃PO₄, H₇IO₇

Příklady iontů: Na⁺, Al³⁺, Mn⁴⁺, Hg²⁺, Hg₂²⁺, Cl⁻, ClO⁻, ClO₃⁻

Hydridy: NaH, CaH₂, BH₃, B₂H₆, AlH₃, PH₃, PH₅

Hydroxidy, oxidy, peroxidy, superoxidy, ozonidy, sulfidy, disulfidy, sírany, hydrogensírany, kyseliny fosforu, dusičnany, dusitany

Karbidy: acetylidy (CaC₂), odvozené od methanu (WC)

Kyseliny a soli (neutralizace), hydrogensoli

Kyseliny síry: sírová, siřičitá, disírová, kyselina thiosírová, dithionan, tetrathionan

Kyseliny fosforu: metafosforečná – (HPO₃)_n, trihydrogenfosforečná, pyrofosforečná (difosforečná), fosforitá, fosforná a jejich soli a organické deriváty – fosfonáty a fosfináty.

Ionty odvozené od amoniaku: NH_3 , NH_4^+ , NH_2^- , NH^{2-} , N^{3-} a azoimidu, N_3^- . Pyridinium, anilinium, acetacidium, methyllumonium, fenylammonium.

2.1 Podvojně soli

Ve vzorcích podvojných solí se kationty uvádějí v pořadí rostoucích oxidačních čísel, v případě stejného oxidačního čísla v abecedním pořadí (uvažujeme značky prvků). *Víceatomové kationty*, např. NH_4^+ nebo PH_4^+ se uvádějí poslední ve skupině kationtů stejného náboje. V názvu se oddělují pomlčkou a pořadí je dáno pořadím ve vzorci.


$\text{K}_2\text{NH}_4\text{PO}_4$	fosforečnan didraselno-amonný
$\text{CaMg}(\text{SO}_4)_2$	síran vápenato-hořečnatý
NH_4MgPO_4	fosforečnan hořečnato-amonný
$\text{Na}(\text{NH}_4)\text{SO}_4$	síran sodno-amonný
$\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12 \text{H}_2\text{O}$	dodekahydrát síranu draselno-hlinitého
NaNbO_3	oxid sodno-niobičný (trioxid)
$\text{KCr}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12 \text{H}_2\text{O}$	dodekahydrát síranu draselno-chromitého
LiFePO_4	fosforečnan lithno-železnatý
$\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$	uhličitan vápenato-hořečnatý
CuFeS_2	sulfid mědnato-železnatý
NaMgF_3	fluorid sodno-hořečnatý
BaTiO_3	oxid barnato-titaničitý

Anionty se uvádějí v abecedním pořadí značek prvků, příp. centrálních atomů. V případě více-prvkových aniontů se používají číselné předpony bis, tris, ...


$\text{BiCl}(\text{O})$	chlorid-oxid bismutitý
$\text{AlO}(\text{OH})$	oxid-hydroxid hlinitý
$\text{Ca}_5\text{F}(\text{PO}_4)_3$	fluorid-trisfosforečnan pentavápentý
$\text{Na}_6\text{ClF}(\text{SO}_4)_2$	chlorid-fluorid-bis(síran) hexasodný
$\text{Na}_4\text{ClF}(\text{S}_2\text{O}_7)$	chlorid-fluorid-disíran tetrasodný
$\text{Ca}_3(\text{CO}_3)_2\text{F}_2$	bis(uhličitan)-difluorid trivápenatý
PbBrCl	bromid-chlorid olovnatý
LaOCl	chlorid-oxid lanthanitý

2.2 Iso- a heteropolyionty


Síran, disíran, disiřičitan!, fosforečnan, difosforečnan (*odvození pomocí dehydratace*), katena-trifosforečnan, *cyklo*-trifosforečnan, chroman, dichroman.




kyselina disírová




kyselina peroxodisírová






kyselina disiřičitá




kyselina dithioničitá



kyselina difosforečná

kyselina *katena*-trifosforečnákyselina *cyklo*-trifosforečná

chroman



dichroman

2.3 Funkční deriváty kyseliny

Vznik, halogenidy, amidy a estery

Kationtové skupiny:

OH	hydroxyl	SeO	seleninyl
CO	karbonyl	SeO ₂	selenonyl
NO	nitrosyl	CrO ₂	chromyl
NO ₂	nitryl	UO ₂	uranyl
PO	fosforyl	ClO	chlorosyl
VO	vanadyl	ClO ₂	chloryl
SO	thionyl	ClO ₃	perchloryl
SO ₂	sulfuryl	S ₂ O ₅	disulfuryl

Thiokyseliny, dithionan, trithionan, tetrathionan.

SO₂(NH₂)₂, SO(NH₂), CO(NH₂)₂ (močovina), OP(OEt)₃, ethylester kyseliny octové, kyselina nitrido-tris(sírová) N(SO₃H)₃

2.4 Názvoslovná rozcvička

Al ₂ S ₃	disulfid sodný
Mo(SO ₄) ₂	kyanid draselný
NaNO ₂	thiokyanatan amonný
NaI ₃	thiosíran draselný
CaO ₂	oxid selenový
NaO ₂	oxid osmičelý
NaClO	dodekahydrát síranu draselno-hlinitého
RbClO ₂	bromitan vápenatý
KBrO ₃	trimethylester kyseliny borité
CsClO ₄	oxid křemičitý
K ₂ Cr ₂ O ₇	křemičitan sodný
CrPO ₄	arseničnan hořečnatý
K ₅ P ₃ O ₁₀	fluorid jodistý
K ₃ P ₃ O ₉	tetrathionan draselný
Na ₂ H ₃ P ₃ O ₁₀	disíran barnatý
CuSO ₄ · 5 H ₂ O	síran tetrafenylfosfonia
(NEt ₄) ₂ SO ₄	alan
KNH ₂	wolframan železnatý
H ₅ IO ₆	peroxid rubidný
KSO ₃ F	kyanatan sodný
COCl ₂	hydrogenuhlíčitan vápenatý
KOCN	trichlorid vanadylu
Na ₂ S ₂ O ₃	chlorid měďný
Hg ₂ Cl ₂	hydrogensulfid hlinitý

3 Platné číslice

Platné číslice jsou číslice odečtené z měřicí stupnice přístroje, vč. posledního odhadnutého místa.¹

Počáteční nuly nejsou platné číslice. Koncové nuly za desetinnou čárkou jsou platné číslice. U celých čísel bez desetinné čárky nemusí být počet platných číslic zřejmý, proto se doporučuje vědecký zápis.

$$25,23 \text{ cm} = 252300 \text{ } \mu\text{m} = 2,523 \times 10^5 \text{ } \mu\text{m}$$

Změna jednotek nemění počet platných číslic. Platné jsou vždy čtyři číslice, vyznačený tučnou sazbou.

Zápis	Počet platných číslic
0,00253	3
2,53	3
2,530	4
2,5300	5
2500	nejednoznačné
2,500.10 ³	4

Při **sčítání a odečítání** má výsledek tolik *desetinných míst* jako číslo s nejmenším počtem desetinných míst:

$$2,5 \text{ cm} + 5,236 \text{ cm} = \mathbf{7,7 \text{ cm}}$$

$$15,6 + 2,35 + 0,5 = 18,45 = \mathbf{18,5}$$

$$2,5 \text{ cm} + 3,3 \text{ } \mu\text{m} = 2,50000 + 0,00033 = 2,50033 = \mathbf{2,5 \text{ cm}}$$

Při **násobení a dělení** má výsledek tolik *platných číslic* jako číslo s nejmenším počtem platných číslic (platné číslice jsou vyznačeny tučně):

$$n = c \cdot V = 0,050 \cdot 0,01\mathbf{235} = 0,000\mathbf{6175} \text{ mol} = 6,2 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$12,458 \cdot 4,25 = 52,9465 = \mathbf{52,9}$$

Při **výpočtech se vždy zaokrouhluje až poslední výsledek. Zaokrouhlování mezivýpočtů zvyšuje chybu výpočtu.**

Příklady zaokrouhlování:

- $2,34 \rightarrow 2,3$ (na 2 platné číslice)
- $2,35 \rightarrow 2,4$ (na 2 platné číslice)
- $0,00496 \rightarrow 0,0050$ (na 2 platné číslice)

Příklad výpočtu:

$$\frac{2,53 \times 4,1}{1,23} = 8,43$$

Správný počet platných číslic je 2, proto je **výsledek 8,4**.

¹Chyby měření

4 Základní chemické zákony

4.1 Ekvivalence hmoty a energie

Připomenout zákon zachování hmoty a energie

$$E = mc^2$$

4.2 Slučovací zákony

Zákon stálých poměrů slučovacích

Hmotnostní poměr prvků či součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávislý na způsobu přípravy dané sloučeniny.

Zákon násobných poměrů slučovacích

Tvoří-li dva prvky spolu více dvouprvkových sloučenin, pak hmotnosti jednoho prvku, který se slučuje se stále stejným množstvím prvku druhého, jsou v poměru malých celých čísel.

NO _x :	Oxid	N	O
	N ₂ O	2	1
	NO	1	1
	N ₂ O ₃	2	3
	NO ₂	1	2
	N ₂ O ₅	2	5

Bertholidy: sloučeniny, které neodpovídají výše uvedenému zákonu, např. FeO, který je ve skutečnosti Fe_xO (x = 0,84-0,95).

4.3 Relativní atomová hmotnost

Atomová hmotnostní jednotka: m_u = 1,66053.10⁻²⁷ kg

$$A_r(^{50}\text{V}) = \frac{8,29368 \cdot 10^{-26}}{1,66053 \cdot 10^{-27}} = 49,946$$

Relativní atomová hmotnost prvku je rovna *váženému průměru hmotností jednotlivých izotopů*.

Brom se v přírodě nachází ve formě dvou izotopů: ⁷⁹Br (50,65 %) a ⁸¹Br (49,35 %):

$$A_r(\text{Br}) = 0,5065 \cdot 78,9183 + 0,4935 \cdot 80,9163 = 79,9043$$

4.4 Molekulová hmotnost

- H₂SO₄
- CuSO₄ · 5 H₂O

4.5 Látkové množství


Množství částic v systému. Základem je Avogadrova konstanta:

$$N_A = 6,022\,140\,76 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

Původně byla definována jako množství částic ve 12 gramech nuklidu $^{12}_6\text{C}$, od roku 2019 je její hodnota zafixována.

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M} = \frac{V}{V_m}$$

4.6 Stechiometrický vzorec




4.6.1 Výpočet procentuálního složení



- H: $\frac{2 \cdot H}{H_2SO_4} = \frac{2 \cdot 1,01}{98,08} = 0,0206$
- S: $\frac{S}{H_2SO_4} = \frac{32,06}{98,08} = 0,3268$
- O: $\frac{4 \cdot O}{H_2SO_4} = \frac{4 \cdot 16}{98,08} = 0,6525$

KClO ₄	138,55	Ce(SO ₄) ₂	332,24	Au ₂ (SeO ₄) ₃	822,81
K	39,10 – 28,22	Ce	140,12 – 42,17	Au	196,97 – 47,88
Cl	35,45 – 25,59	S	32,06 – 19,30	Se	78,96 – 28,79
O	16 – 46,19	O	16 – 38,52	O	16 – 23,33

4.6.2 Výpočet stechiometrického vzorce



$$\begin{array}{ccc} \frac{38,78}{40,08} & : & \frac{19,97}{30,97} & : & \frac{41,26}{16,00} \\ 0,967 & : & 0,645 & : & 2,58 \\ 3 & : & 2 & : & 8 \end{array}$$

Analýzou bylo zjištěno složení neznámé látky: Mg 24,21 % a Si 27,98 % (O: 47,81 %). Vypočítejte stechiometrický vzorec látky. Jaký bude sumární vzorec, pokud víme, že 0,4 molu váží 80,31 g.

Mg	24,30
Si	28,09
O	16,00
Mg ₂ Si ₂ O ₆	200,78

Mezi běžné minerály mědi patří chalkopyrit (CuFeS) a malachit (CuCO₃ · Cu(OH)₂). Určete, který z nich obsahuje větší podíl mědi.

Cu,63	55	% Cu
CuFeS,151	46	41,96
CuCO ₃ · Cu(OH) ₂ ,221	12	57,48

Určete stechiometrický vzorec sloučeniny jejíž složení je: 35,85 % K; 0,46 % H; 34,35 % As a 29,34 % O. (K_2HAsO_4)

K	39,10
H	1,01
As	74,92
O	16

Určete stechiometrický vzorec sloučeniny jejíž složení je: 27,93 % Fe; 24,06 % Fe; 48,01 % S. ($\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$)

Fe	55,84
S	32,06
O	16

Určete stechiometrický vzorec sloučeniny jejíž složení je: 8,24 % K; 5,69 % Al; 13,52 % S; H 5,10 %. ($\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$)

K	39,10
Al	26,98
S	32,06
H	1,01
O	16

Určete stechiometrický vzorec sloučeniny jejíž složení je: 40,90 % K; 7,33 % N; 16,20 % P; H 2,11 %. ($\text{K}_2(\text{NH}_4)\text{PO}_4$)

K	39,10
N	14,01
P	30,97
H	1,01
O	16

5 Chemické rovnice

5.1 Neredoxní rovnice

Ukázat algebraický způsob vyčíslování!

- $\text{CaCl}_2 + \text{Na}_3\text{PO}_4 \longrightarrow \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + \text{NaCl} \quad (3 + 2 \longrightarrow 1 + 6)$
- $\text{POCl}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{PO}_4 + \text{HCl} \quad (1 + 3 \longrightarrow 1 + 3)$
- $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 + \text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{BO}_3 + \text{NaCl} \quad (1 + 2 + 5 \longrightarrow 4 + 2)$
- $\text{NaOH} + \text{H}_3\text{PO}_4 \longrightarrow \text{Na}_3\text{PO}_4 + \text{H}_2\text{O} \quad (3 + 1 \longrightarrow 1 + 3)$
- $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Al}(\text{OH})_3 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \quad (1 + 6 + 6 \longrightarrow 2 + 3)$
- $\text{HClO}_4 + \text{P}_4\text{O}_{10} \longrightarrow \text{Cl}_2\text{O}_7 + \text{H}_3\text{PO}_4 \quad (12 + 1 \longrightarrow 6 + 4)$
- $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 + \text{Li} \longrightarrow \text{Mg} + \text{LiNO}_3 \quad (1 + 2 \longrightarrow 1 + 2)$

5.2 Redoxní rovnice

- $\text{HgO} \longrightarrow \text{Hg} + \text{O}_2 \quad (2 \longrightarrow 2 + 1)$
- $\text{FeSO}_4 + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} \quad (6 + 1 + 7 \longrightarrow 3 + 1 + 1 + 7)$
- $\text{Cu}_2\text{O} + \text{Cu}_2\text{S} \longrightarrow \text{Cu} + \text{SO}_2 \quad (2 + 1 \longrightarrow 6 + 1)$
- $\text{CrCl}_3 + \text{F}_2 \longrightarrow \text{CrF}_3 + \text{Cl}_2 \quad (2 + 3 \longrightarrow 2 + 3)$
- $\text{NH}_3 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{NO} + \text{H}_2\text{O} \quad (4 + 5 \longrightarrow 4 + 6)$
- $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \longrightarrow \text{Cr}_2\text{O}_3 + \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O} \quad (1 \longrightarrow 1 + 1 + 4)$

5.2.1 Disproporcionace

- $\text{Cl}_2 + \text{NaOH} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{NaClO}_3 + \text{H}_2\text{O} \quad (3 + 6 \longrightarrow 1 + 5 + 3)$
- $\text{AuCl} \longrightarrow \text{Au} + \text{AuCl}_3 \quad (3 \longrightarrow 2 + 1)$
- $\text{H}_3\text{PO}_4 \longrightarrow \text{H}_3\text{PO}_3 + \text{PH}_3 \quad (4 \longrightarrow 3 + 1)$

5.2.2 Komproporcionace

- $\text{Pb} + \text{PbO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{PbSO}_4 + \text{H}_2\text{O} \quad (1 + 1 + 2 \longrightarrow 2 + 2)$
- $\text{Se} + \text{SeCl}_4 + \text{AlCl}_3 \longrightarrow \text{Se}_8[\text{AlCl}_4]_2 \quad (15 + 1 + 4 \longrightarrow 2)$
- $\text{H}_2\text{S} + \text{SO}_2 \longrightarrow \text{S} + \text{H}_2\text{O} \quad (2 + 1 \longrightarrow 3 + 2)$

5.3 Iontové rovnice


- $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{I}_2 \longrightarrow \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + \text{I}^- \quad (2 + 1 \longrightarrow 1 + 2)$
- $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{Br}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{SO}_4^{2-} + \text{Br}^- + \text{H}^+ \quad (1 + 2 + 5 \longrightarrow 2 + 4 + 10)$
- $\text{HNO}_2 + \text{H}^+ + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \longrightarrow \text{NO}_3^- + \text{Cr}^{3+} + \text{H}_2\text{O} \quad (3 + 5 + 1 \longrightarrow 3 + 2 + 4)$

5.4 Stechiometrické výpočty

$$\frac{n}{\nu} = konst$$


Výtěžky: praktický a relativní

Reakcí 3,00 g oxidu chromitého s nadbytkem hydroxidu draselného a kyslíku vzniklo 5,62 g chromanu draselného. Jaký je relativní výtěžek reakce? [7,66 g]




Cr_2O_3	151,99
K_2CrO_4	194,19

Kolik zelené skalice (heptahydrátu síranu železnatého) vznikne reakcí 50,0 g železa o čistotě 87,0 % s nadbytkem zředěné kyseliny sírové? [216,85 g]




Fe	55,84
FeSO_4	151,91
$\text{FeSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$	278,01

Tavbou oxidu vápenatého s koksem vzniká acetylid vápenatý (CaC_2). Jaký je relativní výtěžek, pokud reakcí 20 tun oxidu vápenatého o čistotě 93 % vzniklo 19,3 t acetylidu? [90,78 %]



CaO	56,08
CaC_2	64,10


Vypočítejte navážky pro přípravu 500,0 g jodidu olovnatého. Výtěžek reakce je 92,0 %. [$\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 = 390,45 \text{ g}$; $\text{KI} = 391,39 \text{ g}$]



$\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$	331,2
KI	166,00
PbI_2	461,01


5.4.1 Limitní reagent

Kolik uhličitanu praseodymitého vznikne reakcí 30 g hexahydrátu dusičnanu praseodymitého se 100 gramy 10% roztoku uhličitanu sodného?



$\text{Pr}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$	435,01
Na_2CO_3	105,99
$\text{Pr}_2(\text{CO}_3)_3$	461,84


Kolik chloridu hlinitého vznikne reakcí 50 g práškového hliníku s 50 dm³ chloru (měřeno za standardních podmínek)? [197,34 g]



Al	26,98
Al_2Cl_6	266,68


5.4.2 Plyny v reakcích

Kolik litrů oxidu uhličitého (měřeno za standardních podmínek) vznikne tepelným rozkladem 15,0 kg vápence (uhličitanu vápenatého)? [3359 dm³]




CaCO ₃	100,09
-------------------	--------

Kolik litrů kyslíku (měřeno za standardních podmínek) vznikne tepelným rozkladem 50,0 g chloranu draselného o čistotě 87,2 %? Jaký bude výtěžek reakce, pokud jsme izolovali 24,47 g KCl? [11,96 dm³; 92,26 %]




KClO ₃	122,55
KCl	74,55

Kolik litrů vodíku (měřeno za standardních podmínek) a kolik gramů ZnCl₂ vznikne reakcí kyseliny chlorovodíkové se 100 g zinku (čistota 93,25 %)? Chlorid zinečnatý byl izolován jako tetrahydrát, jaká byla jeho hmotnost? [31,98 dm³; 194,91 g ZnCl₂; 297,95 g ZnCl₂ · 4 H₂O]




Zn	63,35
ZnCl ₂	136,30
ZnCl ₂ · 4 H ₂ O	208,36

Vypočítejte atomovou hmotnost hliníku, pokud jste reakcí 15,00 g hliníku s nadbytkem hydroxidu sodného získali 18,692 dm³ vodíku (měřeno za standardních podmínek). [26,98]



Kolik manganistanu draselného potřebujeme na přípravu 50,00 dm³ chloru (měřeno za standardních podmínek). Relativní výtěžek reakce je 85 %. [165,84 g]



KMnO ₄	158,03
-------------------	--------

6 Atomové jádro a elektronový obal

6.1 Atomové jádro

- Na stabilitu má vliv velikost vazebné energie jádra a poměr mezi počtem protonů a neutronů. U lehkých jader je poměr zhruba 1:1, se vzrůstajícím protonovým číslem dochází ke zvyšování přebytku neutronů.
- Vazebná energie je energie, která se uvolní při vzniku jádra z volných nukleonů
- Nejvíce stabilních jader má protonové i neutronové číslo sudé: ${}^{12}_6\text{C}$, ${}^{16}_8\text{O}$
- Naopak kombinace lichého protonového a neutronového čísla je u stabilních jader vzácná, známe pouze čtyři: ${}^1_1\text{H}$, ${}^6_3\text{Li}$, ${}^{10}_5\text{B}$, ${}^{14}_7\text{N}$

Přeměna α – uvolňuje se *jádro helia*, ${}^4_2\text{He}^{2+}$, lze jej odstínit vrstvou vzduchu nebo listem papíru

- ${}^{226}_{88}\text{Ra} \longrightarrow {}^{222}_{86}\text{Rn} + {}^4_2\alpha$
- ${}^{238}_{92}\text{U} \longrightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^4_2\alpha ({}^{234}_{90}\text{Th})$
- ${}^{241}_{95}\text{Am} \longrightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^4_2\alpha ({}^{237}_{93}\text{Np})$

Přeměna β^- – rozpadem neutronu vzniká elektron, má větší pronikavost než α -záření. Odstíní je hliník, plexisklo, atd.

$${}^1_0\text{n} \longrightarrow {}^1_1\text{p} + {}^0_{-1}\beta^-$$

- ${}^{14}_6\text{C} \longrightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^0_{-1}\beta ({}^{14}_7\text{N})$
- ${}^{241}_{94}\text{Pu} \longrightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^0_{-1}\beta ({}^{241}_{95}\text{Am})$
- ${}^{239}_{93}\text{Np} \longrightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^0_{-1}\beta ({}^{239}_{94}\text{Pu})$


Přeměna β^+ – rozpadem protonu vzniká pozitron

$${}^1_1\text{p} \longrightarrow {}^1_0\text{n} + {}^0_1\beta^+$$

- ${}^{23}_{12}\text{Mg} \longrightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^0_1\beta ({}^{23}_{11}\text{Na})$
- ${}^{11}_6\text{C} \longrightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^0_1\beta ({}^{11}_5\text{B})$
- ${}^{18}_9\text{F} \longrightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^0_1\beta ({}^{18}_8\text{O})$

Elektronový záchyt

Vnitřní elektron (slupka K) je pohlcen protonem v jádře a vzniká neutron.



Přeměna γ – nejpronikavější, k odstínění je potřeba olovo nebo beton

- ${}^{60m}_{27}\text{Co} \longrightarrow {}^{60}_{27}\text{Co} + \gamma$
- ${}^{60m}_{28}\text{Ni} \longrightarrow {}^{60}_{28}\text{Ni} + \gamma$
- ${}^{99m}_{43}\text{Tc} \longrightarrow {}^{99}_{43}\text{Tc} + \gamma$

6.1.1 Poločas rozpadu

Statistická veličina, doba za kterou se rozpadne polovina jader v systému.

Rozpadová konstanta - λ - rychlostní konstanta rozpadu

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N$$

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \tau \ln 2$$

^8Be	$6,7 \times 10^{-17} \text{ s}$
^{212}Po	$0,3 \text{ } \mu\text{s}$
^{223}Fr	22 min
^3H	12,36 let
^{235}U	$7,04 \times 10^8 \text{ let}$
^{209}Bi	$1,9 \times 10^{19} \text{ let}$

Poločas rozpadu ^{131}I je 8,02 dne, jaká část vzorku tohoto nuklidu zůstane nerozpadnutá po 12 dnech?

$$\lambda = \frac{\ln 2}{8,02} = 0,0864 \text{ d}^{-1}$$

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t} = 100 \times e^{-0,0864 \times 12} = 0,354 \Rightarrow 35,4 \%$$

Po 12 dnech zůstane 35,4 % nuklidu.

6.2 Elektronový obal

- **Hlavní kvantové číslo** (n) – číslo slupky: 1, 2, 3, ...
 - **Vedlejší kvantové číslo** (l) – tvar orbitalu: 0 – $n-1$
 - **Magnetické kvantové číslo** (m) – orientaci orbitalu: $< -l; +l >$
 - **Spinové kvantové číslo** (s) – popisuje orientaci spinu elektronu: $\pm \frac{1}{2}$
- 1s: $n = 1$; $l = 0$; $m = 0$
- 2s: $n = 2$; $l = 0$; $m = 0$
- 2p: $n = 2$; $l = 1$; $m = -1 \ 0 \ +1$
- 3d: $n = 3$; $l = 2$; $m = -2 \ -1 \ 0 \ +1 \ +2$
- **Pauliho princip výlučnosti** - v atomu nemohou existovat dva elektrony, které by měly shodná všechna čtyři kvantová čísla, musí se lišit alespoň spinem, tzn. že do jednoho atomového orbitalu se vejdou maximálně dva elektrony.
 - **Výstavbový (Aufbau) princip** - elektrony zaplňují orbitály od energeticky nejnižších. První jsou zaplňovány volné orbitály s nejnižším součtem $n+l$.
 - Orbitály jsou zaplňovány v pořadí: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p
 - d-orbitály se zaplňují až po zaplnění s-orbitalu s hlavním kvantovým číslem $(n+1)$, např. 3d orbital se začne plnit až po 4s

Zápis elektronové konfigurace vodíku, helia, lithia, sodíku; zkrácený zápis

Tvorba kationtů a aniontů

H	1s ¹	H ⁺	1s ⁰	B	1s ² 2s ² 2p ¹	B ³⁺	1s ² 2s ⁰ 2p ⁰ (He)
He	1s ²	H ⁻	1s ²	N	1s ² 2s ² 2p ³	N ³⁻	1s ² 2s ² 2p ⁶ (Ne)
Li	1s ² 2s ¹	Li ⁺	1s ²	O	1s ² 2s ² 2p ⁴	O ²⁻	1s ² 2s ² 2p ⁶ (Ne)
Be	1s ² 2s ²	Be ²⁺	1s ²	F	1s ² 2s ² 2p ⁵	F ⁻	1s ² 2s ² 2p ⁶ (Ne)
Na	[Ne] 3s ¹	Na ⁺	[Ne] 3s ⁰	Si	[Ne] 3s ² 3p ²	Si ⁴⁻	[Ne] 3s ² 3p ⁶

Přechodné kovy: Ca $\longrightarrow$ Sc, energie 3d orbitalu; konfigurace Cr a Cu

- K: [Ar] 4s¹ (3d⁰)
- Ca: [Ar] 4s² (3d⁰)
- Sc: [Ar] 3d¹ 4s²
- Ti: [Ar] 3d² 4s²
- Mn: [Ar] 3d⁵ 4s²


Vyšší stabilita zpola a zcela zaplněných d-orbitalů:

- Cr: [Ar] 3d⁵ 4s¹
- Cu: [Ar] 3d¹⁰ 4s¹

7 VSEPR


7.1 Formální náboj

- Rozdíl mezi počtem valenčních elektronů ve volném atomu a valenčních elektronů ve vázaném atomu.
- Záporný náboj je umístěn na nejelektronegativnějším atomu.
- Součet formálních nábojů všech atomů v molekule je roven jejímu náboji.
- H_3O^+ : H: 0; O: $6-5=+1$
- CH_3^+ : H: 0; C: $4-3=+1$



7.2 Rezonanční struktury

- Popisují polohu elektronů v molekulách.
- Vyjadřují jednotlivé limitní stavy.




7.3 Molekulové orbitály

- Teorie LCAO-MO - Linear Combination of Atomic Orbitals - Molecular Orbital.
- Molekulové orbitály vznikají lineární kombinací atomových orbitalů.
- Kombinací dvou AO vznikají dva MO - vazebný a protivazebný. Protivazebné orbitály se označují hvězdičkou, např. σ^* .
- Aby byl překryv úspěšný musí mít vlnové funkce orbitalů v místě překryvu stejná znaménka.


- Protivazebný orbital má o jednu nodální plochu více než vazebný a pokud je obsazen elektronovým párem, snižuje řád vazby o jedna. Obsazený vazebný orbital naopak řád vazby zvyšuje.
- Vazba σ - vzniká osovým překryvem orbitalů.
- Vazba π - vzniká bočným překryvem orbitalů, je přítomna v násobných vazbách.
- Vazba δ - vzniká překryvem všech čtyř laloků d-orbitalu, je přítomna ve čtverné vazbě např. v $[\text{Re}_2\text{Cl}_8]^{2-}$.

7.4 Řád vazby

- Řád vazby popisuje počet elektronových párů, které tvoří vazbu mezi atomy.
- Lze jej odvodit z Lewisovského vzorce molekuly nebo z diagramu MO.



- Řád vazby lze spočítat z počtu elektronů ve vazebných a protivazebných orbitalech.
- $$RV = \frac{\text{vazebne elektrony} - \text{protivazebne elektrony}}{2}$$
- Neobsazené molekulové orbitály neovlivňují ani řád vazby, ani energii systému.
- Nepřechodné prvky se snaží vytvářet chemické vazby tak, aby měly ve valenční slupce osm elektronů, čímž dosáhnou na elektronovou konfiguraci vzácného plynu.
- Elektrony, které atomy sdílí v kovalentních vazbách se započítávají pro každý atom zvlášť. Např. v molekule CO_2 jsou kyslíky obklopeny čtyřmi nevazebnými elektrony a čtyřmi vazebnými, centrální uhlík je pak obklopen celkem osmi elektrony ze čtyř kovalentních vazeb.



- Existuje několik výjimek z oktetového pravidla, u nekovů z třetí a vyšší periody se setkáváme s tzv. *elektronovým dodecetem*, kdy má atom ve valenční slupce 12 elektronů. Toho může dosáhnout díky nezaplněným d-orbitalům.
 - Příkladem je molekula ICl_5 , kde má jód dva nevazebné elektrony a celkem 10 elektronů z pěti kovalentních vazeb.
 - Podobně síra v molekule SF_6 má ve valenční slupce celkem 12 elektronů ze šesti kovalentních vazeb S–F.

7.5 Hybridizace

- Hybridizace atomových orbitalů — proces energetického mísení a směrového vyrovnání atomových orbitalů daného atomu.
- Počet hybridních orbitalů odpovídá počtu mísených atomových orbitalů.

Hybridizace	Geometrie molekuly
sp	lineární
sp ²	rovnostranný trojúhelník
sp ³	tetraedr
d ² sp ³	oktaedr
dsp ²	čtverec
dsp ³	trigonální bipyramida čtvercová pyramida

7.6 VSEPR

- **Valence Shell Electron Pair Repulsion**
- Tvar molekuly určíme na základě rozmístění elektronových párů v okolí centrálního atomu tak, aby jejich vzájemné odpuzování bylo co nejmenší.
- Tento model je vhodný převážně pro sloučeniny nepřechodných prvků.
- Uvažujeme pouze nevazebné elektronové páry - n a vazebné elektronové páry σ .
- **Základní pravidla VSEPRu**
 1. Elektronové páry centrálního atomu se v prostoru rozmístí tak, aby byly co nejdále od sebe a měly minimální energii.
 2. Nevazebný elektronový pár odpuzuje ostatní elektronové páry nejvíce, odpuzování vazebných elektronových párů je slabší a klesá v pořadí:
 - trojná vazba > dvojná vazba > jednoduchá vazba.
 3. Tvar molekuly je dán pouze polohou vazebných elektronových párů.

Počet el. párů	Notace	Tvar	Úhel	Příklad
2	AX2	Lineární	180	CO ₂
3	AX3	Rovnostranný trojúhelník	120	BCl ₃
	AX2E	Lomenný	<120	SO ₂
	AXE2	Lineární	180	O ₂
4	AX4	Tetraedr	109,5	CH ₄ , SO ₄ ²⁻
	AX3E	Trigonální pyramida	<109,5	NH ₃
	AX2E2	Lomenný	<109,5	H ₂ O
5	AX5	Trigonální bipyramida	90 a 120	AsF ₅ , PCl ₅
	AX4E	Houpačka	<90 a <120	SeH ₄
	AX3E2	Tvar T	90	ICl ₃
	AX2E3	Lineární	180	IF ₂ ⁻
6	AX6	Oktaedr	90	SF ₆ , SCl ₆
	AX5E	Čtvercová pyramida	90	IF ₅
	AX4E2	Čtverec	90	XeF ₄


7.7 Symetrie

- **Operace symetrie** - geometrická operace, jejímž provedením dostaneme objekt do polohy nerozlišitelné od výchozí.
- **Prvek symetrie** - body, jejichž poloha se v průběhu provádění operace symetrie nemění.
- U molekul existuje pět prvků symetrie.

Operace symetrie	Symbol	Prvek symetrie
Identita	E	Celý objekt
Rotace	C_n	Rotační osa
Zrcadlení	σ	Rovina symetrie
Inverze	i	Střed symetrie
Nevlastní osa	S_n	Rotačně-reflexní osa

7.8 Dipólový moment

- Vektor popisující rozložení elektrického náboje v molekule.
- Výsledný dipólmoment získáme vektorovým součtem dipólmomentů jednotlivých vazeb.



8 Izomerie a NMR

8.1 Izomerie

Sloučeniny mají stejný sumární vzorec, ale rozdílnou strukturu.

Konstituční (strukturní) izomery se liší polohou jednotlivých atomů v molekule:


- **Polohové izomery** se liší polohou funkční skupiny v molekule: 1-chlorpropan a 2-chlorpropan.
- **Funkční izomery** se liší typem funkční skupiny, např. ethanol a dimethylether.
- **Tautomery** se liší polohou vodíku a dvojně vazby, např. izomery acetylacetonu.

Stereoizomery se liší prostorovou geometrií:

- **Cis–trans izomerie**
- **Konformery**
- **Enantiomery neboli optické izomery**, chirální látky lišící se rovinou stáčení polarizovaného světla

8.2 NMR – počet a intenzita signálů

- Stručně princip NMR, jaderný spin, supravodivé magnety
- Důležitá jádra, ^1H , ^{13}C , ^{19}F




1,2-dimethylbenzen

^1H : 3 signály

Poměr: 1:1:3

^{13}C : 4 signály



1,3-dimethylbenzen


^1H : 4 signály


Poměr: 1:2:6:1

^{13}C : 5 signálů

Deriváty benzeny se liší svou symetrií, zatímco 1,2-derivát má zrcadlovou rovinu půlící vazbu C-C mezi methylovými substituenty, naproti tomu u 1,3-derivátu prochází tato rovina vazbou C-H mezi methyly.

Chemicky ekvivalentní jádra ^1H jsou označena stejnou barvou.





9 Koncentrace a titrace

9.1 Koncentrace

9.1.1 Molární koncentrace

Podíl látkového množství rozpuštěné látky a celkového objemu roztoku.

$$c = \frac{n}{V} = \frac{m}{M \cdot V} \quad [mol \cdot dm^{-3}]$$

Ukázat odměrnou baňku a pipetu, kalibrace EX a IN.

9.1.2 Molální koncentrace

Podíl látkového množství rozpuštěné látky a hmotnosti rozpouštědla.

$$c_M = \frac{n}{m_S} = \frac{m}{M \cdot m_S} \quad [mol \cdot kg^{-1}]$$

9.1.3 Hmotnostní zlomek

Podíl hmotnosti složky směsi a celkové hmotnosti směsi. Bezrozměrná veličina.

$$w_i = \frac{m_i}{\sum m_i}$$

9.1.4 Molární zlomek

Podíl látkového množství složky směsi a součtu látkových množství všech složek směsi. Bezrozměrná veličina.

$$X_i = \frac{n_i}{\sum n_i}$$

9.1.5 Ředění – směšovací rovnice

$$m_1 w_1 + m_2 w_2 = m w$$

$$c_1 V_1 + c_2 V_2 = c V$$

9.1.6 Převody mezi koncentracemi

Jaký je hmotnostní zlomek roztoku NaCl o koncentraci 2 M a hustotě 1,117 g.cm⁻³


V 1 litru roztoku máme 2 moly NaCl, tzn. 116,88 g. Výpočet hmotnostního zlomku je jednoduchý:

$$w = \frac{m}{V \cdot \rho} = \frac{116,88}{1117} = 0,1045$$

Hmotnostní zlomek 2 M roztoku NaCl je 0,1045

9.1.7 Disociace

Jaké jsou molární koncentrace draselného a železnatého iontu v roztoku, který vznikne rozpuštěním 45,0g K₂Fe(SO₄)₂ · 6 H₂O ve 100 cm³ odměrné baňce a doplněním po rysku?



- $M(K_2Fe(SO_4)_2 \cdot 6H_2O) = 434,26 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

- $n = 0,102 \text{ mol}$
- $c(\text{Fe}^{2+}) = \mathbf{1,02 \text{ M}}$
- $c(\text{K}^+) = \mathbf{2,04 \text{ M}}$

9.2 Titrace

0,1315 g monohydrátu šfavelanu vápenatého bylo titrováno v prostředí kyseliny sírové 0,02 M roztokem KMnO_4 , jehož průměrná spotřeba činila 17,90 cm^3 . Vypočítejte čistotu šfavelanu.






- $n(\text{KMnO}_4) = c \cdot V = 0,02 \cdot 0,01790 = 0,000358 \text{ mol}$
- $n/2 = 0,000179$
- $n(\text{CaC}_2\text{O}_4) = 0,000895 \text{ mol}$
- $M(\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}) = 146,11 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $m(\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}) = 0,1308 \text{ g}$
- $w = \frac{0,1308}{0,1315} = 0,9945$

Čistota šfavelanu je 99,45 %.

Z navážky 0,6239 g znečištěného K_2CrO_4 bylo v odměrné baňce připraveno 100 cm^3 roztoku. Z tohoto roztoku bylo odpipetováno 20,0 cm^3 , přidána destilovaná voda, KI, zředěná HCl a roztok škrobu. Vyloučený jod byl titrován 0,1 M roztokem $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$, jehož spotřeba na titraci činila 18,90 cm^3 . Vypočítejte procentuální obsah K_2CrO_4 v navázce.

Jde o nepřímou titraci:



- $M(\text{K}_2\text{CrO}_4) = 194,19 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $n(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = c \cdot V = 0,1 \cdot 0,01890 = 0,00189 \text{ mol}$
- $n/6 = 0,000315$
- $n(\text{K}_2\text{CrO}_4) = 0,000315 \cdot 2 = 0,00063 \text{ mol}$
- $m(\text{K}_2\text{CrO}_4) = 0,00063 \cdot 194,19 = 0,1223 \text{ g}$
- Zředovací faktor: $m = 0,1223 \cdot 5 = 0,6117 \text{ g K}_2\text{CrO}_4$
- $w = \frac{0,6117}{0,6239} = 0,9804$

Obsah chromanu byl 98,04 %.

10 Ideální plyn

- Částice plynu lze považovat za hmotné body, tzn. plyn lze stlačit na nulový objem, ale nelze jej zkapalnit
- Částice spolu neinteragují, pouze se srážejí
- Částice se při srážkách chovají jako dokonale pružná tělesa, tzn. nevyměňují si energii
- 1 mol ideálního plynu má objem 22,414 dm³
(molární objem V_m , $T = 273,15$ K, $p = 101\,325$ Pa)
- $n = \frac{V}{V_m}$ [mol]

Plyn	Objem 1 molu plynu [dm ³]
Ideální plyn	22,414
Ar	22,09
CO ₂	22,26
N ₂	22,40
O ₂	22,40
H ₂	22,43

10.1 Standardní podmínky

- IUPAC definuje standardní podmínky pro plyny:
 - Teplota: 273,15 K (0 °C)
 - Tlak: 10⁵ Pa = 100 kPa
- Dříve používaný standardní tlak 1 atmosféry, tj. 101 325 Pa je už zastaralý.

10.2 Stavová rovnice

- $p \cdot V = nRT = \frac{m}{M}RT$
- $\rho = \frac{pM}{RT}$
- $M = \frac{\rho RT}{p} = \frac{RT}{V_m}$
- $R = 8,314\,4621(75)$ J.K⁻¹.mol⁻¹; molární plynová konstanta
- Pro změny stavu plynu platí:
- $\frac{p_1 V_1}{n_1 T_1} = \frac{p_2 V_2}{n_2 T_2}$

10.3 Molární objem

- Objem jednoho molu plynu.
- Lze jej vypočítat ze stavové rovnice ideálního plynu:
- $T = 273,15 \text{ K}$; $p = 101\,325 \text{ Pa}$
- $V = \frac{nRT}{p} = \frac{1 \cdot 8,314 \cdot 273,15}{101325} = 0,022414 \text{ m}^3$
- $T = 273,15 \text{ K}$; $p = 100\,000 \text{ Pa}$
- $V = \frac{nRT}{p} = \frac{1 \cdot 8,314 \cdot 273,15}{100000} = 0,022710 \text{ m}^3$

10.4 Boyleův zákon

- Součin tlaku a objemu plynu je konstantní
- Platí pouze pro izotermické děje
- Není závislý na druhu plynu
- $p \cdot V = \text{konst.}$
- $p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$

10.5 Daltonův zákon

- Celkový tlak směsi plynů je roven součtu parciálních tlaků všech složek směsi
- $p_{\text{celk}} = \sum_{i=0}^n p_i$

10.6 Izobarický a izochorický děj

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$


10.7 Parciální tlak

- Tlak komponenty ve směsi
- Složky směsi ideálního plynu se v nádobě chovají, jako by tam byly samy
- Molární zlomek
- $X_i = \frac{n_i}{\sum n_i}$

11 Krystaly


V elementární buňce rozlišujeme čtyři typy poloh:

1. Poloha uvnitř buňky, atom patří celý do jediné buňky
2. Poloha ve středu stěny, atom je sdílen dvěma buňkami. V konkrétní buňce je umístěna polovina atomu.
3. Poloha ve středu hrany, atom je sdílen čtyřmi buňkami. V konkrétní buňce je umístěna čtvrtina atomu.
4. Poloha ve vrcholu buňky, atom je sdílen osmi buňkami. V konkrétní buňce je umístěna osmina atomu.



Obrázek 1: Krystalová struktura chloridu cesného.²

Např. chlorid cesný obsahuje cesný ion ve středu kubické buňky a osm chloridových aniontů v jejích vrcholech. Cesný kation patří do krystalové buňky celý a každý chlorid tam spadá $\frac{1}{8}$, tzn. vzorec je $\text{CsCl}_{8 \times \frac{1}{8}} = \text{CsCl}$.



Obrázek 2: Krystalová struktura oxidu titaničitého.³

1. Ti: šedé, $8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2$
2. O: červené, $2 \times 1 + 4 \times \frac{1}{2} = 4$

²Zdroj: Benjah-bmm27/Commons

³Zdroj: Ben Mills/Commons

12 Termodynamika

12.1 Zákony termodynamiky

Termodynamika je obor fyziky, který se zabývá procesy a vlastnostmi látek a polí spojených s teplem a tepelnými jevy; je součástí termiky. Vychází přitom z obecných principů přeměny energie, které jsou popsány čtyřmi termodynamickými zákony (z historických důvodů číslovány nultý až třetí):

Nultý zákon TD

Jsou-li dvě a více těles v termodynamické rovnováze s tělesem dalším, pak jsou všechna tato tělesa v rovnováze.

První zákon TD

Celkové množství energie (všech druhů) izolované soustavy zůstává zachováno.

Nelze sestavit stroj, který by trvale dodával mechanickou energii, aniž by spotřeboval odpovídající množství energie jiného druhu.

Druhý zákon TD

Teplu nemůže při styku dvou těles různých teplot samovolně přecházet z tělesa chladnějšího na těleso teplejší.

Nelze sestavit periodicky pracující tepelný stroj, který by trvale konal práci pouze tím, že by ochlazoval jedno těleso, a k žádné další změně v okolí by nedocházelo.

Třetí zákon TD

Při absolutní nulové teplotě je entropie čisté látky pevného nebo kapalného skupenství rovna nule.

12.2 Objemová práce

$$W = -p\Delta V = -p(V_2 - V_1)$$

Pokud systém koná práci, je objemová práce záporná.

Jakou práci vykoná plyn, který při tlaku 500 kPa expanduje z objemu 10 dm³ na objem 25 dm³?

Nesmíme zapomenout převést jednotky na základní. $W = -p(V_2 - V_1) = -500000(0,025 - 0,010) = -7500J$

Plyn vykonal práci 7,5 kJ.

12.3 Vnitřní energie

Změna vnitřní energie uzavřeného systému je dána tepelnými toky a objemovou prací.

$$\Delta U = Q + W$$

$$dU = dQ - pdV$$

12.4 Gibbsova energie

Kritérium samovolnosti děje

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$



$\Delta G < 0$	samovolný děj
$\Delta G = 0$	rovnováha
$\Delta G > 0$	nesamovolný děj

12.5 Termochemie – Hessův zákon


Reakční teplo reakce a reakční teplo opačné reakce jsou až na znaménko stejná. Výsledná hodnota reakčního tepla nezávisí na průběhu chemické reakce, ale pouze na počátečním a konečném stavu.

- $\Delta H > 0$ – endotermní reakce
- $\Delta H < 0$ – exotermní reakce
- $\Delta H = 0$ – atermická reakce



Pro správný výpočet reakčního tepla je nutné znát skupenství všech látek v reakci.




Vypočítejte reakční entalpii přeměny grafitu na diamant:



jestliže znáte entalpie reakcí:



Jelikož nás zajímá přeměna grafitu na diamant, vezmeme entalpii spalování grafitu a od ní odečteme entalpii spalování diamantu: **A–B**





Entalpii tedy vypočítáme:

$$\Delta H_r = -393,77 - (-395,65) = 1,88 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Entalpie přeměny grafitu na diamant bude 1,88 kJ.mol⁻¹

Vypočítejte entalpii spalování acetyleny:



Zadanou rovnici získáme následující kombinací známých reakcí:
 $-\text{A} + 2\text{B} + \text{C}$

Entalpii tedy vypočítáme:

$$\Delta H_r = -226,92 - 2 \cdot 393,97 - 285,96 = -1300,82 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

Entalpie zadané reakce bude $-1300,82 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

Standardní slučovací teplo – teplo, při kterém vzniká 1 mol látky přímo z prvků, reakční látky musí být ve standardním stavu. Standardní slučovací tepla prvků jsou rovna nule.

Látka	Skupenství	$\Delta H_f^0 [\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}]$
I_2	s	0
I_2	g	+62
O_2	g	0
O_3	s	+142,7

Standardní spalné teplo – teplo, při kterém se spálí 1 mol látky v nadbytku kyslíku. Spalná tepla prvků jsou nenulová.

K výpočtu reakčního tepla lze využít slučovací i spalné teplo.

$$\Delta H_{298}^0 = \sum (\Delta H_{sp}^0)_{\text{reakt}} - \sum (\Delta H_{sp}^0)_{\text{prod}}$$

$$\Delta H_{298}^0 = \sum (\Delta H_{sl}^0)_{\text{prod}} - \sum (\Delta H_{sl}^0)_{\text{reakt}}$$

Vypočítejte entalpii reakce, pokud znáte spalná tepla jednotlivých látek: $\text{C}_{\text{gr}} + 2 \text{H}_2 \longrightarrow \text{CH}_4$

Látka	Spalné teplo
C_{gr}	-393,97
H_2	-285,96
CH_4	-890,95

$$\Delta H_r = \sum (\Delta H_{sp}^0)_{\text{reakt}} - \sum (\Delta H_{sp}^0)_{\text{prod}}$$

$$\Delta H = (-393,97 + 2 \times -285,96) - (-890,95) = -74,94 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

Reakční entalpie je $-74,94 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

Vypočítejte entalpii reakce, pokud znáte slučovací tepla jednotlivých látek: $\text{CaO} + \text{CO}_2 \longrightarrow \text{CaCO}_3$

CaO	-635,97
CO ₂	-393,97
CaCO ₃	-1207,89

$$\Delta H_{298}^0 = \sum (\Delta H_{sl}^0)_{\text{prod}} - \sum (\Delta H_{sl}^0)_{\text{reakt}}$$

$$\Delta H = -1207,89 - (-635,97 - 393,97) = -177,95 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

Reakční entalpie je $-177,95 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

Vypočítejte entalpii reakce, pokud znáte slučovací tepla jednotlivých látek. Kolik tepla se uvolní při reakci 25 g Na_2O_2 ? $2\text{Na}_2\text{O}_2(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow 4\text{NaOH}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g})$

Na_2O_2	-504,93	$M = 77,98$
H_2O	-285,96	
NaOH	-427,05	

$$\Delta H_{298}^0 = \sum(\Delta H_{sl}^0)_{\text{prod}} - \sum(\Delta H_{sl}^0)_{\text{reakt}}$$

$$\Delta H = 4 \times (-427,05) - (2 \times (-504,93) + 2 \times (-285,96)) = -126,42 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

$$n = \frac{25}{77,98} = 0,32 \text{ mol}$$

$$\frac{n}{2} = 0,16 \text{ mol}$$

$$Q = \frac{n}{2} \times \Delta H = 0,16 \times (-126,42) = -20,265 \text{ kJ}$$

Reakční entalpie je -126,42 kJ.mol⁻¹ a reakcí 25 g peroxidu se uvolní teplo 20,265 kJ

Pokud známe vazebnou energii, můžeme reakční entalpii získat jako rozdíl energií vazeb, které zaniknou a vazeb, které vzniknou.


Vypočítejte entalpii reakce, pokud znáte vazebné energie: $\text{CS}_2(\text{g}) + 3\text{Cl}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CCl}_4(\text{g}) + \text{S}_2\text{Cl}_2(\text{g})$

$\text{C}=\text{S}$	481,48
$\text{Cl}-\text{Cl}$	242,83
$\text{C}-\text{Cl}$	326,57
$\text{S}-\text{Cl}$	255,39
$\text{S}-\text{S}$	205,15

$$\Delta H = (2 \times 481,48 + 3 \times 242,83) - (4 \times 326,57 + 2 \times 255,39 + 205,15) = -330,76 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

Reakční entalpie je -330,76 kJ.mol⁻¹

13 Chemická rovnováha



$$Q = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} \text{ - reakční kvocient}$$

$$\Delta = \Delta G^0 + RT \ln Q$$

$$K_c = \frac{[C]_r^c [D]_r^d}{[A]_r^a [B]_r^b}$$


$$\Delta G^0 = -RT \ln K$$

V rovnováze platí $Q = K$.

$$K = e^{-\frac{\Delta G^0}{RT}}$$


K_c a K_p jsou rovnovážné konstanty pro reakce, kterých se účastní plyny. Využívají buď rovnovážné koncentrace (K_c) nebo rovnovážné tlaky (K_p).

Pro reakce v plynné fázi můžeme místo koncentrace použít tlak.



$$K_p = \frac{p_{NH_3}^2}{p_{N_2} \cdot p_{H_2}^3}$$


U heterogenních systémů je aktivita kondenzovaných fází rovna jedné.



$$K = \frac{a_{Fe_3O_4}^2 \cdot a_{H_2O}}{a_{Fe_2O_3}^3 \cdot a_{H_2}} = \frac{p_{H_2O}}{p_{H_2}}$$

13.1 Příklady

Vypočítejte rovnovážnou konstantu reakce při teplotě 300 °C a tlaku 1.10^5 Pa, pokud víme, že zreagovalo 30 % vodíku.




	n_0	n	X	p
CO	1	0,7	0,292	29 200
H ₂	2	1,4	0,583	58 300
CH ₃ OH	0	0,3	0,125	12 500

$$K = \frac{[\text{CH}_3\text{OH}]}{[\text{CO}][\text{H}_2]^2} = \frac{p_{\text{CH}_3\text{OH}}}{p_{\text{CO}}p_{\text{H}_2}^2} = \frac{12500}{29200 \times 58300^2} = 1,259 \times 10^{-10} \text{ Pa}^{-2}$$

Rovnovážná konstanta reakce je $1,259 \times 10^{-10} \text{ Pa}^{-2}$.

Chlorid fosforečný byl v nádobě o obsahu 12 dm³ zahřát na 250 °C. Po ustavení rovnováhy plynná směs obsahovala 0,21 molů PCl₅, 0,32 molů PCl₃ a 0,32 molů Cl₂. Vypočítejte konstantu K_c pro disociaci PCl₅ při této teplotě.



	n	c
PCl ₅	0,21	0,0175
PCl ₃	0,32	0,0267
Cl ₂	0,32	0,0267

$$K_c = \frac{[\text{PCl}_3][\text{Cl}_2]}{[\text{PCl}_5]} = \frac{0,0267 \times 0,0267}{0,0175} = 4,06 \times 10^{-2}$$

Rovnovážná konstanta K_c je $4,06 \times 10^{-2}$.

13.2 Le-Chatelierův princip

Systém, který je v rovnováze, reaguje na každou změnu tak, aby tuto změnu potlačil.

- Vliv koncentrace – esterifikace
- Exotermní vs endotermní reakce
 - Exotermní: $\text{S(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightleftharpoons \text{SO}_2\text{(g)}$
 - Endotermní: $\text{N}_2\text{(g)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{NO(g)}$
- Reakce s plyny, ovlivnění tlakem
 - $\text{N}_2\text{(g)} + 3\text{H}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{NH}_3\text{(g)}$
 - $\text{H}_2\text{(g)} + \text{I}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{HI(g)}$
 - Přídavek inertního plynu rovnováhu neovlivní – parciální tlak

14 pH

14.1 Aktivita

Bezrozměrná veličina, popisuje reálné chování roztoku. Na rozdíl od ideálního roztoku, se v reálném roztoku částice navzájem ovlivňují. Aktivita jakékoliv čisté látky v kondenzovaném stavu (kapalina nebo pevná látka) je jednotková. Aktivita plynu závisí na jeho parciálním tlaku, obvykle se označuje jako **fugacita**.

$$\mu_i = \mu_i^0 + RT \ln a_i$$

μ_i - chemický potenciál, μ_i^0 - standardní chemický potenciál

Aktivitu lze vyjádřit jako součin molární koncentrace a aktivitního koeficientu:

$$a = \gamma c$$

Aktivitní koeficient je úměrný náboji iontů v roztoku a iontové síle roztoku

14.1.1 Iontová síla roztoku


$$\log \gamma = -0,509 z^2 \sqrt{I}$$

I - iontová síla roztoku - popisuje množství iontů v roztoku

$$I = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n c_i z_i^2$$

c_i - molarita; z_i - náboj; 0,509 - konstanta pro vodné roztoky při 25 °C

Jaké jsou aktivity iontů v roztoku FeCl_3 o koncentraci 0,01 M.



Koncentrace iontů jsou 0,01 M pro Fe^{3+} a 0,03 M pro Cl^- .

$$I = 0,5 \times (0,01 \times 3^2 + 0,03 \times (-1)^2) = 0,06$$

Fe^{3+} :

$$\log \gamma = -0,509 \times 9 \times \sqrt{0,06} = -1,116$$

$$\gamma = 10^{-1,116} = 0,0765$$

$$a = 0,01 \times 0,0765 = 0,000764$$

Cl^- :


$$\log \gamma = -0,509 \times 1 \times \sqrt{0,06} = -0,125$$

$$\gamma = 10^{-0,125} = 0,750$$

$$a = 0,03 \times 0,750 = 0,0225$$

Aktivita železitých iontů je 0,000764 a chloridů je 0,0225.

14.2 Iontový součin vody



$$K = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]}{[\text{H}_2\text{O}]^2}$$

$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$$


$$\text{p}K_w = \text{pH} + \text{pOH} = 14$$

14.3 Vzorce


Silná kyselina	$\text{pH} = -\log c$
Silná zásada	$\text{pH} = 14 + \log c$
Slabá kyselina	$\text{pH} = \frac{1}{2}\text{p}K_A - \frac{1}{2}\log c$
Slabá zásada	$\text{pH} = 14 + \frac{1}{2}\log c - \frac{1}{2}\text{p}K_B$
Sůl slabé k a silné z	$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}\log c + \frac{1}{2}\text{p}K_A$
Sůl silné k a slabé z	$\text{pH} = 7 - \frac{1}{2}\log c - \frac{1}{2}\text{p}K_B$
Sůl slabé k a slabé z	$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}\text{p}K_A - \frac{1}{2}\text{p}K_B$
Pufr – kyselina	$\text{pH} = \text{p}K_A + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$
Pufr – zásada	$\text{pH} = 14 - \text{p}K_B - \log \frac{[\text{B}^+]}{[\text{BOH}]}$

14.4 Silné kyseliny a zásady


Vypočítej pH kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 0,3 M.



Vypočítej pH kyseliny sírové o koncentraci 0,3 M.



Vypočítej pH hydroxidu sodného o koncentraci 0,3 M.



$$\text{pOH} = -\log c = -\log 0,3 = 0,52$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 0,52 = 13,48$$

Vypočítej pH kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 1×10^{-8} M.

Chybný výpočet: $\text{pH} = -\log 1 \cdot 10^{-8} = 8$

Je nutné uvažovat iontový součin vody, pro správný výpočet musíme uvažovat tři podmínky:

1. $[\text{Cl}^-] = c$
2. $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{Cl}^-]$
3. $K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$

Tím získáme kvadratickou rovnici:

$$x^2 - cx - K_w = 0$$


$$c = 1,051 \times 10^{-7}$$

$$\text{pH} = \mathbf{6,978}$$

14.5 Slabé kyseliny a zásady

Kyselina	pKa	Zásada	pKb
H_3BO_3	9,23	NH_3	4,75
H_3PO_4	2,16	AgOH	3,96
	7,21	$\text{Ca}(\text{OH})_2$	1,40
	12,32		2,43
k. octová	4,76	anilin	9,37
HF	3,17		,

Jaké je pH 0,2 M kyseliny octové, $\text{p}K_a = 4,76$?



$$K_a = 10^{-\text{p}K_a} = 10^{-4,76} = 0,000017$$

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{x \cdot x}{0,2-x}$$

Dosadíme za K_a a upravíme získaný výraz, čímž dostaneme kvadratickou rovnici:

$$x^2 + 0,000017x - 0,000034 = 0$$

Kvadratickou rovnici vyřešíme pomocí diskriminantu:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-0,000017 \pm \sqrt{0,000017^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-0,000034)}}{2 \cdot 1}$$

Ze dvou vypočítaných kořenů zvolíme ten kladný, koncentrace nemůže být záporná.

$$x = 0,001835$$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = -\log 0,001835 = \mathbf{2,736}$$

Zjednodušený výpočet

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{x \cdot x}{0,2}$$

Dosadíme za K_a a upravíme získaný výraz, čímž dostaneme kvadratickou rovnici:

$$x^2 - 0,000034 = 0$$


$$x = \pm \sqrt{0,000034} = 0,001844$$

$$\text{pH} = -\log 0,001844 = \mathbf{2,734}$$

Vzorec pro výpočet pH:

$$\text{pH} = \frac{1}{2}\text{p}K_A - \frac{1}{2}\log c = \frac{1}{2} \times 4,76 - \frac{1}{2}\log 0,2 = 2,73$$

Jaké je pH 0,25 M roztoku amoniaku



$$\text{p}K_B = 4,76$$

$$K_B = 1,74 \times 10^{-5}$$

$$K_B = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} = \frac{x^2}{c}$$

$$x = \sqrt{K_B \times c} = \sqrt{1,74 \times 10^{-5} \times 0,25} = 2,09 \times 10^{-3}$$

$$\text{pOH} = -\log 2,09 \times 10^{-3} = 2,68$$



$$\text{pH} = 14 - 2,68 = \mathbf{11,32}$$

Vzorec:


$$\text{pH} = 14 + \frac{1}{2}\log c - \frac{1}{2}\text{p}K_B = 14 + 0,5 \log 0,25 - 0,5 \times 4,76 = 11,32$$

14.6 Konjugované kyseliny a zásady

Konjugovaný pár kyselina–zásada vzniká přesunem proton z kyseliny na zásadu.




- Pokud je kyselina silná, je odpovídající konjugovaná zásada slabá.
- Pokud je kyselina slabá, je odpovídající konjugovaná zásada silná.
- Pokud je kyselina velmi slabá, je odpovídající konjugovaná zásada silná.

14.7 Soli**14.7.1 Sůl silné kyseliny a silné zásady**

Při disociaci nedochází ke vzniku H^+ , ani OH^- iontů, hodnota pH tedy není ovlivněna.


14.7.2 Sůl silné kyseliny a slabé zásady

$$\text{pH} = 7 - \frac{1}{2}(\text{p}K_b + \log c)$$

14.7.3 Sůl slabé kyseliny a silné zásady

$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{p}K_a + \log c)$$

14.7.4 Sůl slabé kyseliny a slabé zásady



$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{pK}_a - \text{pK}_b)$$


$$\text{pK}_a(\text{HF}) = 3,17$$

$$\text{pK}_b(\text{NH}_3) = 4,75$$

$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(3,17 - 4,75) = 6,21$$

14.8 Neutralizace

Jaké pH bude mít roztok připravený rozpuštěním 0,853 g KOH v 200 cm³ roztoku H₂SO₄ o koncentraci 0,015 M?



$$n(\text{KOH}) = \frac{0,853}{56,11} = 0,0152 \text{ mol}$$

$$n(\text{H}_2\text{SO}_4) = c \cdot V = 0,015 \cdot 0,20 = 0,0030 \text{ mol}$$

Na neutralizaci kyseliny sírové budeme potřebovat dvojnásobné látkové množství KOH, tzn. 0,0060 mol. Po reakci nám zbyde:

$$n = 0,0152 - 0,0060 = 0,0092 \text{ mol KOH}$$

$$c = \frac{0,0092}{0,2} = 0,046 \text{ M}$$



$$\text{pH} = 14 + \log c = 12,66$$

pH připraveného roztoku bude 12,66.

14.9 Pufrý

Jde o směs slabé kyseliny a její soli nebo slabé zásady a její soli. Příkladem je např. acetátový pufr - směs kyseliny octové a octanu sodného.

Rovnováhy v pufru lze popsat rovnicemi:



Přídavkem kyseliny vzniknou molekuly kyseliny octové, přídavkem zásady ionty octanu. pH roztoku se nezmění.

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pK}_b + \log \frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]}$$

Pufr	Složení	Rozsah pH
Acetátový	$\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COONa}$	3,8 - 5,8
Fosfátový	$\text{NaH}_2\text{PO}_4/\text{Na}_2\text{HPO}_4$	6,2 - 8,2
Borátový	$\text{H}_3\text{BO}_3/\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$	8,25 - 10,25

Pufr obsahuje ve 100 cm³ 0,25 molu kyseliny octové a 0,7 molu octanu sodného. Jaké bude jeho pH?

$$\text{pK}_a = 4,74$$

$$[\text{HA}] = \frac{0,25}{0,1} = 2,5 \text{ mol.dm}^{-3}$$

$$[\text{A}^-] = \frac{0,7}{0,1} = 7 \text{ mol.dm}^{-3}$$

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = 4,74 + \log \frac{7}{2,5} = 5,18$$

pH pufru bude 5,18.

Pufr obsahuje ve 100 cm³ 0,25 molu amoniaku a 0,7 molu chloridu amonného. Jaké bude jeho pH?

$$\text{pK}_b = 4,74$$

$$[\text{B}] = \frac{0,25}{0,1} = 2,5 \text{ mol.dm}^{-3}$$

$$[\text{BH}^+] = \frac{0,7}{0,1} = 7 \text{ mol.dm}^{-3}$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pK}_b + \log \frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]} = 14 - 4,74 + \log \frac{7}{2,5} = 9,71$$

pH pufru bude 9,71.

15 Součin rozpustnosti

15.1 Rozpustnost

Udává kolik gramů látky se za dané teploty rozpustí ve 100 g rozpouštědla, zpravidla vody. Rozpustnost se zvyšující se teplotou zpravidla roste.

	NH ₄ Cl	NaCl	KCl
0 °C	29,41	35,63	28,14
50 °C	50,42	36,70	43,05
60 °C	55,30	37,08	45,88

- **Nenasycený roztok** – koncentrace látky je nižší, než její rozpustnost za dané teploty.
- **Nasycený roztok** – koncentrace látky je shodná s její rozpustností za dané teploty.
- **Přesycený roztok** – koncentrace látky je vyšší, než její rozpustnost za dané teploty.

Kolik g KCl se vysráží, pokud 100 g nasyceného roztoku ochladíme z 60 na 0 °C

Nejprve si spočítáme hmotnostní zlomky nasycených roztoků při jednotlivých teplotách:

$$w_0 = \frac{28,14}{128,14} = 0,2196$$

$$w_{60} = \frac{45,88}{148,88} = 0,3145$$



$$m_{H_2O,60} = 100 - 31,45 = 68,44 \text{ g H}_2\text{O}$$

Hmotnost nasyceného roztoku při 0 °C je $\frac{68,44}{0,7804}$, což je 87,70 g. Rozdíl oproti původním 100 g odpovídá hmotnosti vyloučeného KCl.

Po ochlazení se vyloučí 12,30 g KCl

15.2 Součin rozpustnosti

Popisuje koncentrace iontů v nasycených roztocích.



Rovnováhu v nasyceném roztoku chloridu stříbrného můžeme popsat pomocí rovnovážné konstanty:

$$K = \frac{[\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]}{[\text{AgCl}]}$$

Z rovnovážné konstanty pak odvodíme *součin rozpustnosti*:

$$K_S = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$$

$$pK_S = -\log K_S$$


Hodnoty součinů rozpustnosti najdeme v chemických tabulkách.

Látka	pK_S	K_S	Látka	pK_S	K_S
AgBr	12,31	$4,90 \cdot 10^{-13}$	CdS	26,10	$7,94 \cdot 10^{-27}$
AgCl	9,75	$1,78 \cdot 10^{-10}$	CoCO ₃	12,84	$1,45 \cdot 10^{-13}$
AgI	16,08	$8,32 \cdot 10^{-17}$	CuBr	8,28	$5,25 \cdot 10^{-9}$
AgSCN	11,97	$1,07 \cdot 10^{-12}$	CuS	35,20	$6,31 \cdot 10^{-36}$
Ag ₂ CrO ₄	11,61	$2,45 \cdot 10^{-12}$	Ni(OH) ₂	15,50	$3,16 \cdot 10^{-16}$
Ag ₂ S	49,20	$6,31 \cdot 10^{-50}$	PbS	26,60	$2,51 \cdot 10^{-27}$
Ag ₂ SO ₄	4,77	$1,70 \cdot 10^{-5}$	Sn(OH) ₄	56,00	$1,00 \cdot 10^{-56}$
BaCO ₃	8,29	$5,13 \cdot 10^{-9}$	Tl ₂ S	20,30	$5,01 \cdot 10^{-21}$
BaCrO ₄	9,93	$1,17 \cdot 10^{-10}$	Zn ₃ (AsO ₄) ₂	27,89	$1,29 \cdot 10^{-28}$

15.2.1 Koncentrace iontů

Vypočítejte koncentraci iontů v nasyceném roztoku AgCl

Chlorid stříbrný v roztoku disociuje podle rovnice:



Součin rozpustnosti vypočítáme:

$$K_S = 10^{-9,75} = 1,78 \times 10^{-10}$$


$$K_S = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = x^2$$

$$x = \sqrt{K_S} = \sqrt{1,78 \times 10^{-10}} = 1,33 \times 10^{-5} \text{ M}$$

Koncentrace stříbrného a chloridového iontu jsou $1,33 \times 10^{-5} \text{ mol.dm}^{-3}$

Vypočítejte koncentraci iontů v nasyceném roztoku Ag₂CrO₄

Chroman stříbrný v roztoku disociuje podle rovnice:



Součin rozpustnosti vypočítáme:

$$K_S = 10^{-11,61} = 2,45 \times 10^{-12}$$

$$K_S = [\text{Ag}^+]^2[\text{CrO}_4^{2-}] = 4x^3$$

$$x = \sqrt[3]{\frac{K_S}{4}} = \sqrt[3]{6,137 \times 10^{-13}} = 8,50 \times 10^{-5} \text{ M CrO}_4^{2-}$$

$$[\text{Ag}^+] = 2x = 1,70 \times 10^{-4} \text{ M}$$


Ukázat video⁴

Koncentrace stříbrného iontu je $1,70 \times 10^{-4}$ a chromanového je $8,50 \times 10^{-5} \text{ mol.dm}^{-3}$

⁴Argentometric titration

Vypočítejte koncentraci iontů v nasyceném roztoku $\text{Sn}(\text{OH})_4$

Hydroxid cíničitý, $\text{pK}_s = 56,00$, v roztoku disociuje podle rovnice:



Součin rozpustnosti vypočítáme:

$$K_S = 10^{-56,00} = 1 \times 10^{-56}$$

$$K_S = [\text{Sn}^{4+}][\text{OH}^-]^4 = x \times (4x)^4 = 256x^5$$

$$x = \sqrt[5]{\frac{K_S}{256}} = \sqrt[5]{\frac{1 \times 10^{-56}}{256}} = 2,08 \times 10^{-12} \text{ M} = c(\text{Sn}^{4+})$$

$$c(\text{OH}^-) = 4 \times 2,08 \times 10^{-12} = 8,33 \times 10^{-12} \text{ M}$$

Koncentrace cíničitých iontů je $2,08 \times 10^{-12} \text{ mol.dm}^{-3}$ a hydroxidových iontů je $8,33 \times 10^{-12} \text{ mol.dm}^{-3}$.

16 Elektrochemie

Elektrochemie je obor chemie, který zkoumá procesy probíhající na rozhraní elektrod a elektrolytu.

- *Elektroda* – kov ponořený do elektrolytu
- *Elektrolyt* – roztok nebo tavenina schopná vést elektrický proud
- *Anoda* – elektroda na které probíhá oxidace
- *Katoda* – elektroda na které probíhá redukce

16.1 Beketovova řada kovů


Pojmenována po ruském chemikovi *N. N. Beketovovi*. Kovy jsou seřazeny podle hodnoty standardního elektrodového potenciálu.

Li/Li ⁺	K/K ⁺	Mg/Mg ²⁺	Zn/Zn ²⁺	Cd/Cd ²⁺	H/H ⁺
−3,04	−2,93	−2,37	−0,761	−0,40	0


Cu/Cu ²⁺	Ag/Ag ⁺	Hg/Hg ²⁺	Pt/Pt ²⁺	Au/Au ³⁺
+0,34	+0,80	+0,85	+1,19	+1,52

Kovy, které mají nižší potenciál než vodík se označují jako *neušlechtilé*, kovy s vyšším potenciálem jsou pak označovány jako *ušlechtilé*.



Neušlechtilé kovy při reakci s minerálními kyselinami uvolňují vodík:



Ušlechtilé kovy nedokáží vodík vytěsnit, rozpouštějí se jen v oxidujících kyselinách:




Kovy s nižším elektrodovým potenciálem dokáží vyredukovat kovy s vyšším elektrodovým potenciálem z jejich solí:



16.2 Elektrodové potenciály

Standardní vodíková elektroda – platinová elektroda, pokrytá platinovou černí, sycená plyným vodíkem pod tlakem 101,325 kPa za teploty 0 °C, ponořená do roztoku s jednotkovou aktivitou vodíkových iontů.



Její potenciál je za všech teplot nulový. Absolutní hodnota potenciálu se odhaduje na 4,44 V.⁵

*Zdrojem hodnot potenciálů je wikipedia.*⁶

⁵THE ABSOLUTE ELECTRODE POTENTIAL: AN EXPLANATORY NOTE

⁶Standard electrode potential (data page)

Neuší. kovy		Ušlechtilé kovy		Redox syst.	
Li^+/Li	-3,04			$\text{Ag}^{2+}/\text{Ag}^+$	1,98
Cs^+/Cs	-3,02			$\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}$	0,95
K^+/K	-2,93			$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$	0,771
Ba^{2+}/Ba	-2,91			$\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}$	0,15
Na^+/Na	-2,71	Bi^{3+}/Bi	0,31	$\text{Ti}^{3+}/\text{Ti}^{2+}$	-0,369
Mg^{2+}/Mg	-2,37	Cu^{2+}/Cu	0,34	$\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}^{2+}$	-0,408
Ce^{3+}/Ce	-2,34	Cu^+/Cu	0,52		
Al^{3+}/Al	-1,66	Tl^{3+}/Tl	0,74		
Zr^{4+}/Zr	-1,45	Ag^+/Ag	0,80		
Ti^{3+}/Ti	-1,37	Hg^{2+}/Hg	0,85		
Ta^{3+}/Ta	-0,60	Pd^{2+}/Pd	0,92		
Fe^{2+}/Fe	-0,44	Pt^{2+}/Pt	1,18		
Sn^{2+}/Sn	-0,13	Au^{3+}/Au	1,52		
Fe^{3+}/Fe	-0,04	Au^+/Au	1,83		

16.3 Elektrody a elektrodový potenciál

$$E = E^0 + \frac{RT}{zF} \ln a = E^0 + \frac{0,0592}{z} \log a$$

$$E = E^0 + \frac{RT}{zF} \ln \frac{a_{\text{red}}}{a_{\text{ox}}} = E^0 + \frac{0,0592}{z} \ln \frac{a_{\text{red}}}{a_{\text{ox}}}$$

Vypočítejte potenciál železné elektrody ponořené do roztoku železnatých iontů o koncentraci 0,85 M.

$$E^0(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44$$

$$E = E^0 + \frac{0,059}{z} \log c = -0,44 + \frac{0,059}{2} \log 0,85 = -0,442 \text{ V}$$


Potenciál elektrody je -0,442 V

Vypočítejte potenciál platínového drátu ponořeného do roztoku o $[\text{Fe}^{2+}] = 0,05 \text{ M}$ a $[\text{Fe}^{3+}] = 0,02 \text{ M}$

$$E = E^0 + \frac{0,059}{z} \log \frac{a_{\text{red}}}{a_{\text{ox}}} = 0,771 + \frac{0,059}{1} \log \frac{0,05}{0,02} = 0,795 \text{ V}$$

Potenciál elektrody je 0,795 V

16.4 Galvanický článek

Obrázek 3: Schéma galvanického článku.⁷

Důležité pojmy

- **Primární články** – nelze je nabíjet
- **Sekundární články** – lze je opakovaně nabíjet, *akumulátory*
- **Elektromotorické napětí** – napětí nezatíženého článku
- **Kapacita** – množství energie uložené v článku
- **Hustota energie** – podíl kapacity a objemu článku
- **Životnost akumulátoru** – počet cyklů nabíjení/vybíjení, které akumulátor vydrží

⁷Zdroj: Maxx/Commons

16.5 Elektrolýza

1. Faradayův zákon

Hmotnost látky vyloučené na elektrodě závisí přímo úměrně na elektrickém proudu, procházejícím elektrolytem, a na čase, po který elektrický proud procházel.

$$m = A \times I \times t$$

2. Faradayův zákon

Látková množství vyloučená stejným nábojem jsou pro všechny látky chemicky ekvivalentní, neboli elektrochemický ekvivalent A závisí přímo úměrně na molární hmotnosti látky.

$$A = \frac{M}{F \times z}$$

Kolik mědi se získá elektrolýzou roztoku modré skalice proudem 1,2 A za dobu dvou hodin?

K redukci měďnatého kationtu jsou potřeba dva elektrony. Elektrochemický ekvivalent vypočítáme:

$$A = \frac{M}{F \times z} = \frac{63,55}{96485 \times 2} = 3,29 \times 10^{-4} \text{ g} \cdot \text{C}^{-1}$$


Nyní můžeme vypočítat i hmotnost vyloučené mědi, čas musíme dosadit v sekundách:

$$m = A \times I \times t = 3,29 \cdot 10^{-4} \cdot 1,2 \cdot 7200 = 2,84 \text{ g}$$

Elektrolýzou získáme 2,84 g mědi.

Navážka 5,0385 g tetrahydrátu chloridu zinečnatého byla kvantitativně rozpuštěna ve vodě a elektrolýzována tak, aby se vyloučil veškerý zinek. Hmotnost získaného zinku byla 1,4300 g. Jaká byla čistota výchozího tetrahydrátu chloridu zinečnatého?

Faradayovy zákony nejsou potřeba, děj lze popsat rovnicí:



Spočítáme si, kolika gramům tetrahydrátu odpovídá výtěžek zinku:

$$w = \frac{65,39}{208,36} = 0,3138$$


$$m(\text{ZnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}) = \frac{1,4300}{0,3138} = 4,5570 \text{ g Zn}$$

Čistota tetrahydrátu je tedy:

$$w = \frac{4,5570}{5,0385} = 0,9044$$

Čistota tetrahydrátu je 90,44 %.

Jaký minimální čas bude potřeba pro vyloučení 40,0 g mědi z roztoku modré skalice proudem 20 A?



$$A = \frac{M}{F \times z} = \frac{63,55}{96485 \times 2} = 3,29 \times 10^{-4} \text{ g} \cdot \text{C}^{-1}$$

$$t = \frac{m}{A \cdot I} = \frac{40}{20 \cdot 3,29 \times 10^{-4}} = 6073,96 \text{ s} = 101,2 \text{ min}$$

Na získání 40,0 g mědi budeme potřebovat minimálně 101,2 minut.