

# Poznámky k seminářům z obecné chemie

Zdeněk Moravec, [hugo@chemi.muni.cz](mailto:hugo@chemi.muni.cz)  
[is.muni.cz/www/moravec/c1040/](http://is.muni.cz/www/moravec/c1040/)

19. října 2025

## Obsah

|           |                                         |           |
|-----------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Úvod</b>                             | <b>4</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Názvosloví</b>                       | <b>5</b>  |
| 2.1       | Podvojně soli . . . . .                 | 6         |
| 2.2       | Iso- a heteropolyionty . . . . .        | 6         |
| 2.3       | Funkční deriváty kyseliny . . . . .     | 6         |
| 2.4       | Názvoslovná rozcvička . . . . .         | 7         |
| <b>3</b>  | <b>Platné číslice</b>                   | <b>8</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Základní chemické zákony</b>         | <b>9</b>  |
| 4.1       | Ekvivalence hmoty a energie . . . . .   | 9         |
| 4.2       | Slučovací zákony . . . . .              | 9         |
| 4.3       | Relativní atomová hmotnost . . . . .    | 9         |
| 4.4       | Molekulová hmotnost . . . . .           | 9         |
| 4.5       | Látkové množství . . . . .              | 10        |
| 4.6       | Stechiometrický vzorec . . . . .        | 10        |
| <b>5</b>  | <b>Chemické rovnice</b>                 | <b>12</b> |
| 5.1       | Neredoxní rovnice . . . . .             | 12        |
| 5.2       | Redoxní rovnice . . . . .               | 12        |
| 5.3       | Iontové rovnice . . . . .               | 12        |
| 5.4       | Stechiometrické výpočty . . . . .       | 13        |
| <b>6</b>  | <b>Atomové jádro a elektronový obal</b> | <b>15</b> |
| 6.1       | Atomové jádro . . . . .                 | 15        |
| 6.2       | Elektronový obal . . . . .              | 16        |
| <b>7</b>  | <b>VSEPR</b>                            | <b>17</b> |
| 7.1       | Formální náboj . . . . .                | 17        |
| 7.2       | Rezonanční struktury . . . . .          | 17        |
| 7.3       | Molekulové orbitály . . . . .           | 17        |
| 7.4       | Řád vazby . . . . .                     | 18        |
| 7.5       | Hybridizace . . . . .                   | 18        |
| 7.6       | VSEPR . . . . .                         | 19        |
| 7.7       | Symetrie . . . . .                      | 19        |
| 7.8       | Dipólový moment . . . . .               | 20        |
| <b>8</b>  | <b>Krystaly</b>                         | <b>21</b> |
| <b>9</b>  | <b>Termodynamika</b>                    | <b>22</b> |
| 9.1       | Zákony termodynamiky . . . . .          | 22        |
| 9.2       | Termochemie . . . . .                   | 23        |
| 9.3       | Hessův zákon . . . . .                  | 25        |
| <b>10</b> | <b>pH</b>                               | <b>26</b> |
| 10.1      | Aktivita . . . . .                      | 26        |
| 10.2      | Vzorce . . . . .                        | 27        |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| 10.3 Iontový součin vody . . . . .               | 28        |
| 10.4 Silné kyseliny a zásady . . . . .           | 28        |
| 10.5 Slabé kyseliny a zásady . . . . .           | 30        |
| 10.6 Konjugované kyseliny a zásady . . . . .     | 31        |
| 10.7 Soli . . . . .                              | 31        |
| 10.8 Neutralizace . . . . .                      | 33        |
| 10.9 Pufry . . . . .                             | 34        |
| <b>11 Součin rozpustnosti</b>                    | <b>36</b> |
| 11.1 Rozpustnost . . . . .                       | 36        |
| 11.2 Součin rozpustnosti . . . . .               | 37        |
| <b>12 Elektrochemie</b>                          | <b>39</b> |
| 12.1 Beketovova řada kovů . . . . .              | 39        |
| 12.2 Elektrodové potenciály . . . . .            | 41        |
| 12.3 Elektrody a elektrodový potenciál . . . . . | 43        |
| 12.4 Galvanický článek . . . . .                 | 44        |
| 12.5 Elektrolýza . . . . .                       | 45        |

## 1 Úvod

Tento text slouží jako pomůcka pro výuku semináře z obecné chemie. Postupně doplňuji jednotlivé kapitoly.

Vše lze používat dle libosti, budu rád za upozornění na chyby.

Zdeněk Moravec

[hugo@chemi.muni.cz](mailto:hugo@chemi.muni.cz)

<https://is.muni.cz/www/moravec/c1040/>

## 2 Názvosloví

- Periodická tabulka prvků – **promítnout**, základní orientace
- Číselné předpony
- Oxidační číslo – definice, ukázka
- Koncovky oxidačních čísel

|                   |                |                  |                 |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
| Bohrium, Bh       | Curium, Cm     | Darmstadtium, Ds | Einsteinium, Es |
| Flerovium, Fl     | Hassium, Hs    | Kalifornium, Cf  | Kopernicium, Cn |
| Livermorium, Lv   | Lutecium, Lu   | Meitnerium, Mt   | Promethium, Pm  |
| Rhenium, Re       | Rhodium, Rh    | Roentgenium, Rg  | Ruthenium, Ru   |
| Rutherfordium, Rf | Seaborgium, Sg | Tellur, Te       | Thallium, Tl    |
| Thulium, Tm       | Ytterbium, Yb  | Yttrium, Y       |                 |

|               |       |   |       |    |           |
|---------------|-------|---|-------|----|-----------|
| $\frac{1}{2}$ | hemi  | 5 | penta | 10 | deka      |
| 1             | mono  | 6 | hexa  | 11 | undeka    |
| 2             | di    | 7 | hepta | 12 | dodeka    |
| 3             | tri   | 8 | okta  | 13 | trideka   |
| 4             | tetra | 9 | nona  | 14 | tetradeka |

Modrá skalice, zelená skalice, sádra

|             |                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>    | HCl, HBr, HClO, NaCl, KBr, K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>                                                                                                                                      |
| <b>II</b>   | H <sub>2</sub> O, MnCl <sub>2</sub> , FeBr <sub>2</sub> , CaSO <sub>4</sub>                                                                                                                    |
| <b>III</b>  | NH <sub>3</sub> , AsH <sub>3</sub> , SbH <sub>3</sub> , HClO <sub>2</sub> , MnF <sub>3</sub> , Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , Al <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub>                |
| <b>IV</b>   | SiH <sub>4</sub> , GeH <sub>4</sub> , H <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> , GeO <sub>2</sub> , GeCl <sub>4</sub> , SnBr <sub>4</sub> , Mn(SO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub>                            |
| <b>V</b>    | PH <sub>5</sub> , SbF <sub>5</sub> , HNO <sub>3</sub> , H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> , PCl <sub>5</sub> , AsBr <sub>5</sub>                                  |
| <b>VI</b>   | SeO <sub>3</sub> , CrO <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> CrO <sub>4</sub> , H <sub>6</sub> TeO <sub>6</sub> , Na <sub>2</sub> CrO <sub>4</sub> , K <sub>2</sub> FeO <sub>4</sub> , WF <sub>6</sub> |
| <b>VII</b>  | IF <sub>7</sub> , Mn <sub>2</sub> O <sub>7</sub> , HClO <sub>4</sub> , H <sub>5</sub> IO <sub>6</sub> , KMnO <sub>4</sub> , KClO <sub>4</sub> , NaTcO <sub>4</sub>                             |
| <b>VIII</b> | OsO <sub>4</sub> , H <sub>2</sub> OsO <sub>5</sub>                                                                                                                                             |
| <b>0</b>    | Fe(CO) <sub>5</sub> , Ni(CO) <sub>4</sub>                                                                                                                                                      |

Určování oxidačního čísla: O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O, NH<sub>3</sub>, CaH<sub>2</sub>, K<sub>2</sub>O, K<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, KO<sub>2</sub>, KO<sub>3</sub>, HCl, HNO<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>, H<sub>7</sub>IO<sub>7</sub>

Příklady kationtů: Na<sup>+</sup>, Al<sup>3+</sup>, Mn<sup>4+</sup>, Hg<sup>2+</sup>, Hg<sub>2</sub><sup>2+</sup>

Příklady aniontů: Cl<sup>-</sup>, ClO<sup>-</sup>, ClO<sub>3</sub><sup>-</sup>

Hydridy, hydroxidy, oxidy, peroxidy, superoxidy, ozonidy, sulfidy, disulfidy, sírany, hydrogensí-rany, kyseliny fosforu, dusičnany, dusitany

Karbidy: acetylidy (CaC<sub>2</sub>), odvozené od methanu (WC)

Kyseliny a soli (neutralizace), hydrogensoli

Kyseliny síry: sírová, siřičitá, disírová, kyselina thiosírová, dithionan, tetrathionan

Kyseliny fosforu: metafosforečná – (HPO<sub>3</sub>)<sub>n</sub>, trihydrogenfosforečná, pyrofosforečná (difosforeč-ná), fosforitá, fosforná a jejich soli a organické deriváty – fosfonáty a fosfináty.

Ionty odvozené od amoniaku: NH<sub>3</sub>, NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, NH<sub>2</sub><sup>-</sup>, NH<sub>2</sub><sup>2-</sup>, N<sup>3-</sup> a azoimidu, N<sub>3</sub><sup>-</sup>.

Pyridinium, anilinium, acetacidium, methyllumonium, fenylammonium.

## 2.1 Podvojn  sol 

Ve vzorc ch podvojn ch sol  se kationty u v d j  v po ad  rostouc ch oxida n ch   sel, v p  pad  stejn ho oxida n ho   s la v abecedn m po ad . *V ceatomov  kationty*, nap .  $\text{NH}_4^+$  nebo  $\text{PH}_4^+$  se u v d j  posledn  ve skupin  kationt  stejn ho n boje. V n zvu se odd luj  pom lkou a po ad  je d no po ad m ve vzorci.

|                                                        |                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| $\text{K}_2\text{NH}_4\text{PO}_4$                     | fosfore nan didraselno-amonn  |
| $\text{CaMg}(\text{SO}_4)_2$                           | s ran v penato-ho e nat       |
| $\text{NH}_4\text{MgPO}_4$                             | fosfore nan ho e nato-amonn   |
| $\text{Na}(\text{NH}_4)\text{SO}_4$                    | s ran sodno-amonn             |
| $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ | s ran draselno-hlinit         |
| $\text{NaNbO}_3$                                       | oxid sodno-niobi n  (trioxid) |

Anionty se u v d j  v abecedn m po ad  zna ek prv k , p  p. cent ln ch atom . V p  pad  v ce-prvkov ch aniont  se pou žív j    seln  p edpony bis, tris, ...

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| $\text{BiCl}(\text{O})$                       | chlorid-oxid bismutit                |
| $\text{AlO}(\text{OH})$                       | oxid-hydroxid hlinit                 |
| $\text{Ca}_5\text{F}(\text{PO}_4)_3$          | fluorid-trisfosfore nan pentav pent  |
| $\text{Na}_6\text{ClF}(\text{SO}_4)_2$        | chlorid-fluorid-bis(s ran) hexasodn  |
| $\text{Na}_4\text{ClF}(\text{S}_2\text{O}_7)$ | chlorid-fluorid-di ran tetrasodn     |
| $\text{Ca}_3(\text{CO}_3)_2\text{F}_2$        | bis(uhli itan)-difluorid triv penat  |

## 2.2 Iso- a heteropolyionty

S ran, di ran, disi i itan!, fosfore nan, difosfore nan (*odvozen  pomoc  dehydratace*), *katena*-trifosfore nan, *cyklo*-trifosfore nan, chroman, dichroman.

## 2.3 Funk n  deriv ty kyseliny

Vznik, halogenidy, amidy a estery

Kationtov  skupiny:

|                 |          |                               |            |
|-----------------|----------|-------------------------------|------------|
| OH              | hydroxyl | SeO                           | seleninyl  |
| CO              | karbonyl | SeO <sub>2</sub>              | selenonyl  |
| NO              | nitrosyl | CrO <sub>2</sub>              | chromyl    |
| NO <sub>2</sub> | nitryl   | UO <sub>2</sub>               | uranyl     |
| PO              | fosforyl | ClO                           | chlorosyl  |
| VO              | vanadyl  | ClO <sub>2</sub>              | chloryl    |
| SO              | thionyl  | ClO <sub>3</sub>              | perchloryl |
| SO <sub>2</sub> | sulfuryl | S <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | disulfuryl |

Thiokyseliny, dithionan, trithionan, tetrathionan.

$\text{SO}_2(\text{NH}_2)_2$ ,  $\text{SO}(\text{NH}_2)$ ,  $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$  (mo ovina),  $\text{OP}(\text{OEt})_3$ , ethylester kyseliny octov 

## 2.4 Názvoslovná rozcvička

|                                                |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| $\text{Al}_2\text{S}_3$                        | disulfid sodný                         |
| $\text{Mo}(\text{SO}_4)_2$                     | kyanid draselný                        |
| $\text{NaNO}_2$                                | thiokyanatan amonný                    |
| $\text{NaI}_3$                                 | thiosíran draselný                     |
| $\text{CaO}_2$                                 | oxid selenový                          |
| $\text{NaO}_2$                                 | oxid osmičelý                          |
| $\text{NaClO}$                                 | dodekahydrát síranu draselno-hlinitého |
| $\text{RbClO}_2$                               | bromitan vápenatý                      |
| $\text{KBrO}_3$                                | trimethylester kyseliny borité         |
| $\text{CsClO}_4$                               | oxid křemičitý                         |
| $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$              | křemičitan sodný                       |
| $\text{CrPO}_4$                                | arseničnan hořečnatý                   |
| $\text{K}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$            | fluorid jodistý                        |
| $\text{K}_3\text{P}_3\text{O}_9$               | tetrathionan draselný                  |
| $\text{Na}_2\text{H}_3\text{P}_3\text{O}_{10}$ | disíran barnatý                        |
| $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$      | síran tetrafenylfosfonia               |
| $(\text{NEt}_4)_2\text{SO}_4$                  | alan                                   |
| $\text{KNH}_2$                                 | wolframan železnatý                    |
| $\text{H}_5\text{IO}_6$                        | peroxid rubidný                        |
| $\text{KSO}_3\text{F}$                         | kyanatan sodný                         |
| $\text{COCl}_2$                                | hydrogenuhlíčitan vápenatý             |
| $\text{KOCN}$                                  | trichlorid vanadylu                    |
| $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$              | chlorid mědný                          |
| $\text{Hg}_2\text{Cl}_2$                       | hydrogensulfid hlinitý                 |

### 3 Platné číslice

**Platné číslice** jsou číslice odečtené z měřicí stupnice přístroje, vč. posledního odhadnutého místa.<sup>1</sup>

Nuly mezi desetinnou čárkou a první nenulovou číslicí nejsou platné číslice:

$$\mathbf{25,23} \text{ cm} = \mathbf{252300} \text{ }\mu\text{m} = \mathbf{2,523} \times 10^5 \text{ }\mu\text{m}$$

Platné jsou vždy čtyři číslice, vyznačený tučnou sazbu.

Při **sčítání a odečítání** má výsledek tolik *desetinných míst* jako číslo s nejmenším počtem desetinných míst:

$$2,5 \text{ cm} + 5,236 \text{ cm} = 7,7 \text{ cm}$$

$$2,5 \text{ cm} + 3,3 \text{ }\mu\text{m} = 2,5 \text{ cm}$$

Při **násobení a dělení** má výsledek tolik *platných číslic* jako číslo s nejmenším počtem platných číslic (platné číslice jsou vyznačeny tučně):

$$n = c \cdot V = 0,0\mathbf{50} \cdot 0,0\mathbf{1235} = 0,000\mathbf{6175} \text{ mol} = 6,2 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

**Při výpočtech se vždy zaokrouhluje až poslední výsledek. Zaokrouhlování mezivýpočtů zvyšuje chybu výpočtu.**

---

<sup>1</sup>Chyby měření



## 4 Základní chemické zákony

### 4.1 Ekvivalence hmoty a energie

Připomenout zákon zachování hmoty a energie

$$E = mc^2$$

### 4.2 Slučovací zákony

#### Zákon stálých poměrů slučovacích

Hmotnostní poměr prvků či součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávislý na způsobu přípravy dané sloučeniny.

#### Zákon násobných poměrů slučovacích

Tvoří-li dva prvky spolu více dvouprvkových sloučenin, pak hmotnosti jednoho prvku, který se slučuje se stále stejným množstvím prvku druhého, jsou v poměru malých celých čísel.

|                   |                               |          |          |
|-------------------|-------------------------------|----------|----------|
|                   | <b>Oxid</b>                   | <b>N</b> | <b>O</b> |
|                   | N <sub>2</sub> O              | 2        | 1        |
|                   | NO                            | 1        | 1        |
| NO <sub>x</sub> : | N <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 2        | 3        |
|                   | NO <sub>2</sub>               | 1        | 2        |
|                   | N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 2        | 5        |

Bertholidy: sloučeniny, které neodpovídají výše uvedenému zákonu, např. FeO, který je ve skutečnosti Fe<sub>x</sub>O (x = 0,84-00,95).

### 4.3 Relativní atomová hmotnost

Atomová hmotnostní jednotka: m<sub>u</sub> = 1,66053.10<sup>-27</sup> kg

$$A_r(^{50}\text{V}) = \frac{8,29368 \cdot 10^{-26}}{1,66053 \cdot 10^{-27}} = 49,946$$

Relativní atomová hmotnost prvku je rovna *váženému průměru hmotností jednotlivých izotopů*.

Brom se v přírodě nachází ve formě dvou izotopů: <sup>79</sup>Br (0,5065 %) a <sup>81</sup>Br (0,4935 %):

$$A_r(\text{Br}) = 0,5065 \cdot 78,9183 + 0,4935 \cdot 80,9163 = 79,9043$$

### 4.4 Molekulová hmotnost

- H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>
- CuSO<sub>4</sub> · 5 H<sub>2</sub>O

## 4.5 Látkové množství


Množství částic v systému. Základem je Avogadrova konstanta:

$$N_A = 6,022\,140\,70 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

Původně byla definována jako množství částic ve 12 gramech nuklidu  $^{12}_6\text{C}$ , od roku 2019 je její hodnota zafixována.

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M} = \frac{V}{V_m}$$

## 4.6 Stechiometrický vzorec



### 4.6.1 Výpočet procentuálního složení



- H:  $\frac{2 \cdot H}{H_2SO_4} = \frac{2 \cdot 1,01}{98,08} = 0,0206$
- S:  $\frac{S}{H_2SO_4} = \frac{32,06}{98,08} = 0,3268$
- O:  $\frac{4 \cdot O}{H_2SO_4} = \frac{4 \cdot 16}{98,08} = 0,6525$

|                   |               |                                   |                |                                                  |                |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|
| KClO <sub>4</sub> | 138,55        | Ce(SO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> | 332,24         | Au <sub>2</sub> (SeO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> | 822,81         |
| K                 | 39,10 – 28,22 | Ce                                | 140,12 – 42,17 | Au                                               | 196,97 – 47,88 |
| Cl                | 35,45 – 25,59 | S                                 | 32,06 – 19,30  | Se                                               | 78,96 – 28,79  |
| O                 | 16 – 46,19    | O                                 | 16 – 38,52     | O                                                | 16 – 23,33     |

### 4.6.2 Výpočet stechiometrického vzorce



$$\begin{array}{ccc} \frac{38,78}{40,08} & : & \frac{19,97}{30,97} & : & \frac{41,26}{16,00} \\ 0,967 & : & 0,645 & : & 2,58 \\ 3 & : & 2 & : & 8 \end{array}$$

Analýzou bylo zjištěno složení neznámé látky: Mg 24,21 % a Si 27,98 % (O: 47,81 %). Vypočítejte stechiometrický vzorec látky. Jaký bude sumární vzorec, pokud víme, že 0,4 molu váží 80,31 g.

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Mg                                             | 24,30  |
| Si                                             | 28,09  |
| O                                              | 16,00  |
| Mg <sub>2</sub> Si <sub>2</sub> O <sub>6</sub> | 200,78 |

Mezi běžné minerály mědi patří chalkopyrit (CuFeS) a malachit (CuCO<sub>3</sub> · Cu(OH)<sub>2</sub>). Určete, který z nich obsahuje větší podíl mědi.

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Cu                                      | 63,55  |
| CuFeS                                   | 151,46 |
| CuCO <sub>3</sub> · Cu(OH) <sub>2</sub> | 221,12 |

Určete stechiometrický vzorec sloučeniny jejíž složení je: 35,85 % K; 0,46 % H; 34,35 % As a 29,34 % O. ( $\text{K}_2\text{HAsO}_4$ )

|    |       |
|----|-------|
| K  | 39,10 |
| H  | 1,01  |
| As | 74,92 |
| O  | 16    |

Určete stechiometrický vzorec sloučeniny jejíž složení je: 27,93 % Fe; 24,06 % Fe; 48,01 % S. ( $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ )

|    |       |
|----|-------|
| Fe | 55,84 |
| S  | 32,06 |
| O  | 16    |

Určete stechiometrický vzorec sloučeniny jejíž složení je: 8,24 % K; 5,69 % Al; 13,52 % S; H 5,10 %. ( $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ )

|    |       |
|----|-------|
| K  | 39,10 |
| Al | 26,98 |
| S  | 32,06 |
| H  | 1,01  |
| O  | 16    |

Určete stechiometrický vzorec sloučeniny jejíž složení je: 40,90 % K; 7,33 % N; 16,20 % P; H 2,11 %. ( $\text{K}_2(\text{NH}_4)\text{PO}_4$ )

|   |       |
|---|-------|
| K | 39,10 |
| N | 14,01 |
| P | 30,97 |
| H | 1,01  |
| O | 16    |

## 5 Chemické rovnice

### 5.1 Neredoxní rovnice

Ukázat algebraický způsob vyčíslování!

- $\text{CaCl}_2 + \text{Na}_3\text{PO}_4 \longrightarrow \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + \text{NaCl} \quad (3 + 2 \longrightarrow 1 + 6)$
- $\text{POCl}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{PO}_4 + \text{HCl} \quad (1 + 3 \longrightarrow 1 + 3)$
- $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 + \text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{BO}_3 + \text{NaCl} \quad (1 + 2 + 5 \longrightarrow 4 + 2)$
- $\text{NaOH} + \text{H}_3\text{PO}_4 \longrightarrow \text{Na}_3\text{PO}_4 + \text{H}_2\text{O} \quad (3 + 1 \longrightarrow 1 + 3)$
- $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Al}(\text{OH})_3 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \quad (1 + 6 + 6 \longrightarrow 2 + 3)$
- $\text{HClO}_4 + \text{P}_4\text{O}_{10} \longrightarrow \text{Cl}_2\text{O}_7 + \text{H}_3\text{PO}_4 \quad (12 + 1 \longrightarrow 6 + 4)$
- $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 + \text{Li} \longrightarrow \text{Mg} + \text{LiNO}_3 \quad (1 + 2 \longrightarrow 1 + 2)$

### 5.2 Redoxní rovnice

- $\text{HgO} \longrightarrow \text{Hg} + \text{O}_2 \quad (2 \longrightarrow 2 + 1)$
- $\text{FeSO}_4 + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} \quad (6 + 1 + 7 \longrightarrow 3 + 1 + 1 + 7)$
- $\text{Cu}_2\text{O} + \text{Cu}_2\text{S} \longrightarrow \text{Cu} + \text{SO}_2 \quad (2 + 1 \longrightarrow 6 + 1)$
- $\text{CrCl}_3 + \text{F}_2 \longrightarrow \text{CrF}_3 + \text{Cl}_2 \quad (2 + 3 \longrightarrow 2 + 3)$
- $\text{NH}_3 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{NO} + \text{H}_2\text{O} \quad (4 + 5 \longrightarrow 4 + 6)$
- $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \longrightarrow \text{Cr}_2\text{O}_3 + \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O} \quad (1 \longrightarrow 1 + 1 + 4)$

#### 5.2.1 Disproporcionace

- $\text{Cl}_2 + \text{NaOH} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{NaClO}_3 + \text{H}_2\text{O} \quad (3 + 6 \longrightarrow 1 + 5 + 3)$
- $\text{AuCl} \longrightarrow \text{Au} + \text{AuCl}_3 \quad (3 \longrightarrow 2 + 1)$
- $\text{H}_3\text{PO}_4 \longrightarrow \text{H}_3\text{PO}_3 + \text{PH}_3 \quad (4 \longrightarrow 3 + 1)$

#### 5.2.2 Komproporcionace

- $\text{Pb} + \text{PbO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{PbSO}_4 + \text{H}_2\text{O} \quad (1 + 1 + 2 \longrightarrow 2 + 2)$
- $\text{Se} + \text{SeCl}_4 + \text{AlCl}_3 \longrightarrow \text{Se}_8[\text{AlCl}_4]_2 \quad (15 + 1 + 4 \longrightarrow 2)$
- $\text{H}_2\text{S} + \text{SO}_2 \longrightarrow \text{S} + \text{H}_2\text{O} \quad (2 + 1 \longrightarrow 3 + 2)$

### 5.3 Iontové rovnice


- $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{I}_2 \longrightarrow \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + \text{I}^- \quad (2 + 1 \longrightarrow 1 + 2)$
- $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{Br}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{SO}_4^{2-} + \text{Br}^- + \text{H}^+ \quad (1 + 2 + 5 \longrightarrow 2 + 4 + 10)$
- $\text{HNO}_2 + \text{H}^+ + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \longrightarrow \text{NO}_3^- + \text{Cr}^{3+} + \text{H}_2\text{O} \quad (3 + 5 + 1 \longrightarrow 3 + 2 + 4)$

## 5.4 Stechiometrické výpočty

$$\frac{n}{\nu} = konst$$


Výtěžky: praktický a relativní

Reakcí 3,00 g oxidu chromitého s nadbytkem hydroxidu draselného a kyslíku vzniklo 5,62 g chromanu draselného. Jaký je relativní výtěžek reakce? [7,66 g]




|                          |        |
|--------------------------|--------|
| $\text{Cr}_2\text{O}_3$  | 151,99 |
| $\text{K}_2\text{CrO}_4$ | 194,19 |

Kolik zelené skalice (heptahydrátu síranu železnatého) vznikne reakcí 50,0 g železa o čistotě 87,0 % s nadbytkem zředěné kyseliny sírové? [216,85 g]




|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Fe                                         | 55,84  |
| $\text{FeSO}_4$                            | 151,91 |
| $\text{FeSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$ | 278,01 |

Tavbou oxidu vápenatého s koksem vzniká acetylid vápenatý ( $\text{CaC}_2$ ). Jaký je relativní výtěžek, pokud reakcí 20 tun oxidu vápenatého o čistotě 93 % vzniklo 19,3 t acetylidu? [90,78 %]



|                |       |
|----------------|-------|
| CaO            | 56,08 |
| $\text{CaC}_2$ | 64,10 |


Vypočítejte navážky pro přípravu 500,0 g jodidu olovnatého. Výtěžek reakce je 92,0 %. [ $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 = 390,45 \text{ g}$ ;  $\text{KI} = 391,39 \text{ g}$ ]



|                            |        |
|----------------------------|--------|
| $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ | 331,2  |
| KI                         | 166,00 |
| $\text{PbI}_2$             | 461,01 |


### 5.4.1 Limitní reagent

Kolik uhličitanu praseodymitého vznikne reakcí 30 g hexahydrátu dusičnanu praseodymitého se 100 gramy 10% roztoku uhličitanu sodného?



|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| $\text{Pr}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$ | 435,01 |
| $\text{Na}_2\text{CO}_3$                              | 105,99 |
| $\text{Pr}_2(\text{CO}_3)_3$                          | 461,84 |


Kolik chloridu hlinitého vznikne reakcí 50 g práškového hliníku s 50 dm<sup>3</sup> chloru (měřeno za standardních podmínek)? [197,34 g]



|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Al                       | 26,98  |
| $\text{Al}_2\text{Cl}_6$ | 266,68 |


### 5.4.2 Plyny v reakcích

Kolik litrů oxidu uhličitého (měřeno za standardních podmínek) vznikne tepelným rozkladem 15,0 kg vápence (uhličitanu vápenatého)? [3359 dm<sup>3</sup>]



|                   |        |
|-------------------|--------|
| CaCO <sub>3</sub> | 100,09 |
|-------------------|--------|

Kolik litrů kyslíku (měřeno za standardních podmínek) vznikne tepelným rozkladem 50,0 g chlorečnanu draselného o čistotě 87,2 %? Jaký bude výtěžek reakce, pokud jsme izolovali 24,47 g KCl? [11,96 dm<sup>3</sup>; 92,26 %]





|                   |        |
|-------------------|--------|
| KClO <sub>3</sub> | 122,55 |
| KCl               | 74,55  |

## 6 Atomové jádro a elektronový obal




### 6.1 Atomové jádro

- Na stabilitu má vliv velikost vazebné energie jádra a poměr mezi počtem protonů a neutronů. U lehkých jader je poměr zhruba 1:1, se vzrůstajícím protonovým číslem dochází ke zvyšování přebytku neutronů.
- Vazebná energie je energie, která se uvolní při vzniku jádra z volných nukleonů
- Nejvíce stabilních jader má protonové i neutronové číslo sudé:  ${}^{12}_6\text{C}$ ,  ${}^{16}_8\text{O}$
- Naopak kombinace lichého protonového a neutronového čísla je u stabilních jader vzácná, známe pouze čtyři:  ${}^1_1\text{H}$ ,  ${}^6_3\text{Li}$ ,  ${}^{10}_5\text{B}$ ,  ${}^{14}_7\text{N}$



**Přeměna  $\alpha$**  – uvolňuje se jádro helia,  ${}^4_2\text{He}^{2+}$



**Přeměna  $\beta^-$**  – rozpadem neutronu vzniká elektron




**Přeměna  $\beta^+$**  – rozpadem protonu vzniká pozitron




**Elektronový záchyt**

Vnitřní elektron (slupka K) je pohlcen protonem v jádře a vzniká neutron.



**Přeměna  $\gamma$**



#### 6.1.1 Poločas rozpadu

Statistická veličina, doba za kterou se rozpadne polovina jader v systému.

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N$$

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \tau \ln 2$$

## 6.2 Elektronový obal

- **Hlavní kvantové číslo** ( $n$ ) – číslo slupky: 1, 2, 3, ...
  - **Vedlejší kvantové číslo** ( $l$ ) – tvar orbitalu: 1 –  $n-1$
  - **Magnetické kvantové číslo** ( $m$ ) – orientaci orbitalu:  $< -l; +l >$
  - **Spinové kvantové číslo** ( $s$ ) – popisuje elektron v orbitalu:  $\pm \frac{1}{2}$
- 1s:  $n = 1$ ;  $l = 0$ ;  $m = 0$
- 2s:  $n = 2$ ;  $l = 0$ ;  $m = 0$
- 2p:  $n = 2$ ;  $l = 1$ ;  $m = -1 \ 0 \ +1$
- 3d:  $n = 3$ ;  $l = 2$ ;  $m = -2 \ -1 \ 0 \ +1 \ +2$
- **Pauliho princip výlučnosti** - v atomu nemohou existovat dva elektrony, které by měly shodná všechna čtyři kvantová čísla, musí se lišit alespoň spinem, tzn. že do jednoho atomového orbitalu se vejdou maximálně dva elektrony.
  - **Výstavbový (Aufbau) princip** - elektrony zaplňují orbitály od energeticky nejnižších. První jsou zaplňovány volné orbitály s nejnižším součtem  $n+l$ .
  - Orbitály jsou zaplňovány v pořadí: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p
  - d-orbitály se zaplňují až po zaplnění s-orbitalu s hlavním kvantovým číslem  $(n+1)$ , např. 3d orbital se začne plnit až po 4s

Zápis elektronové konfigurace vodíku, helia, lithia, sodíku; zkrácený zápis

Tvorba kationtů a aniontů

|    |                                 |                  |                      |    |                                                 |                  |                                                      |
|----|---------------------------------|------------------|----------------------|----|-------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| H  | 1s <sup>1</sup>                 | H <sup>+</sup>   | 1s <sup>0</sup>      | B  | 1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>1</sup> | B <sup>3+</sup>  | 1s <sup>2</sup> 2s <sup>0</sup> 2p <sup>0</sup> (He) |
| He | 1s <sup>2</sup>                 | H <sup>-</sup>   | 1s <sup>2</sup>      | N  | 1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>3</sup> | N <sup>3-</sup>  | 1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>6</sup> (Ne) |
| Li | 1s <sup>2</sup> 2s <sup>1</sup> | Li <sup>+</sup>  | 1s <sup>2</sup>      | O  | 1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>4</sup> | O <sup>2-</sup>  | 1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>6</sup> (Ne) |
| Be | 1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> | Be <sup>2+</sup> | 1s <sup>2</sup>      | F  | 1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>5</sup> | F <sup>-</sup>   | 1s <sup>2</sup> 2s <sup>2</sup> 2p <sup>6</sup> (Ne) |
| Na | [Ne] 3s <sup>1</sup>            | Na <sup>+</sup>  | [Ne] 3s <sup>0</sup> | Si | [Ne] 3s <sup>2</sup> 3p <sup>2</sup>            | Si <sup>4-</sup> | [Ne] 3s <sup>2</sup> 3p <sup>6</sup>                 |

**Přechodné kovy:** Ca → Sc, energie 3d orbitalu; konfigurace Cr a Cu

- K: [Ar] 4s<sup>1</sup> (3d<sup>0</sup>)
- Ca: [Ar] 4s<sup>2</sup> (3d<sup>0</sup>)
- Sc: [Ar] 3d<sup>1</sup> 4s<sup>2</sup>
- Ti: [Ar] 3d<sup>2</sup> 4s<sup>2</sup>
- Mn: [Ar] 3d<sup>5</sup> 4s<sup>2</sup>

Vyšší stabilita zpola a zcela zaplněných d-orbitalů:


- Cr: [Ar] 3d<sup>5</sup> 4s<sup>1</sup>
- Cu: [Ar] 3d<sup>10</sup> 4s<sup>1</sup>



## 7 VSEPR


### 7.1 Formální náboj

- Rozdíl mezi počtem valenčních elektronů ve volném atomu a valenčních elektronů ve vázaném atomu.
- Záporný náboj je umístěn na nejelektronegativnějším atomu.
- Součet formálních nábojů všech atomů v molekule je roven jejímu náboji.
- $\text{H}_3\text{O}^+$ : H: 0; O:  $6-5=+1$
- $\text{CH}_3^+$ : H: 0; C:  $4-3=+1$



### 7.2 Rezonanční struktury

- Popisují polohu elektronů v molekulách.
- Vyjadřují jednotlivé limitní stavy.




### 7.3 Molekulové orbitály

- Teorie LCAO-MO - Linear Combination of Atomic Orbitals - Molecular Orbital.
- Molekulové orbitály vznikají lineární kombinací atomových orbitalů.
- Kombinací dvou AO vznikají dva MO - vazebný a protivazebný. Protivazebné orbitály se označují hvězdičkou, např.  $\sigma^*$ .
- Aby byl překryv úspěšný musí mít vlnové funkce orbitalů v místě překryvu stejná znaménka.


- Protivazebný orbital má o jednu nodální plochu více než vazebný a pokud je obsazen elektronovým párem, snižuje řád vazby o jedna. Obsazený vazebný orbital naopak řád vazby zvyšuje.
- Vazba  $\sigma$  - vzniká osovým překryvem orbitalů.
- Vazba  $\pi$  - vzniká bočním překryvem orbitalů, je přítomna v násobných vazbách.
- Vazba  $\delta$  - vzniká překryvem všech čtyř laloků d-orbitalu, je přítomna ve čtverné vazbě např. v  $[\text{Re}_2\text{Cl}_8]^{2-}$ .

## 7.4 Řád vazby

- Řád vazby popisuje počet elektronových párů, které tvoří vazbu mezi atomy.
- Lze jej odvodit z Lewisovského vzorce molekuly nebo z diagramu MO.



- Řád vazby lze spočítat z počtu elektronů ve vazebných a protivazebných orbitalech.
- $RV = \frac{\text{vazebne elektrony} - \text{protivazebne elektrony}}{2}$
- Neobsazené molekulové orbitály neovlivňují ani řád vazby, ani energii systému.
- Nepřechodné prvky se snaží vytvářet chemické vazby tak, aby měly ve valenční slupce osm elektronů, čímž dosáhnou na elektronovou konfiguraci vzácného plynu.
- Elektrony, které atomy sdílí v kovalentních vazbách se započítávají pro každý atom zvlášť. Např. v molekule  $\text{CO}_2$  jsou kyslíky obklopeny čtyřmi nevazebnými elektrony a čtyři vazebnými, centrální uhlík je pak obklopen celkem osmi elektrony ze čtyř kovalentních vazeb.



- Existuje několik výjimek z oktetového pravidla, u nekovů z třetí a vyšší periody se setkáváme s tzv. *elektronovým dodecetem*, kdy má atom ve valenční slupce 12 elektronů. Toho může dosáhnout díky nezaplňným d-orbitalům.
  - Příkladem je molekula  $\text{ICl}_5$ , kde má jód dva nevazebné elektrony a celkem 10 elektronů z pěti kovalentních vazeb.
  - Podobně síra v molekule  $\text{SF}_6$  má ve valenční slupce celkem 12 elektronů ze šesti kovalentních vazeb S–F.

## 7.5 Hybridizace

- Hybridizace atomových orbitalů — proces energetického mísení a směrového vyrovnání atomových orbitalů daného atomu.
- Počet hybridních orbitalů odpovídá počtu mísených atomových orbitalů.

| Hybridizace                    | Geometrie molekuly                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| sp                             | lineární                                    |
| sp <sup>2</sup>                | rovnostranný trojúhelník                    |
| sp <sup>3</sup>                | tetraedr                                    |
| d <sup>2</sup> sp <sup>3</sup> | oktaedr                                     |
| dsp <sup>2</sup>               | čtverec                                     |
| dsp <sup>3</sup>               | trigonální bipyramida<br>čtvercová pyramida |

## 7.6 VSEPR

- **Valence Shell Electron Pair Repulsion**
- Tvar molekuly určíme na základě rozmístění elektronových párů v okolí centrálního atomu tak, aby jejich vzájemné odpuzování bylo co nejmenší.
- Tento model je vhodný převážně pro sloučeniny nepřechodných prvků.
- Uvažujeme pouze nevazebné elektronové páry -  $n$  a vazebné elektronové páry  $\sigma$ .
- **Základní pravidla VSEPRu**
  1. Elektronové páry centrálního atomu se v prostoru rozmístí tak, aby byly co nejdále od sebe a měly minimální energii.
  2. Nevazebný elektronový pár odpuzuje ostatní elektronové páry nejvíce, odpuzování vazebných elektronových párů je slabší a klesá v pořadí:
    - trojná vazba > dvojná vazba > jednoduchá vazba.
  3. Tvar molekuly je dán pouze polohou vazebných elektronových párů.

| Počet el. párů | Notace | Tvar                     | Úhel       | Příklad                                         |
|----------------|--------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 2              | AX2    | Lineární                 | 180        | CO <sub>2</sub>                                 |
| 3              | AX3    | Rovnostranný trojúhelník | 120        | BCl <sub>3</sub>                                |
|                | AX2E   | Lomenný                  | <120       | SO <sub>2</sub>                                 |
|                | AXE2   | Lineární                 | 180        | O <sub>2</sub>                                  |
| 4              | AX4    | Tetraedr                 | 109,5      | CH <sub>4</sub> , SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> |
|                | AX3E   | Trigonální pyramida      | <109,5     | NH <sub>3</sub>                                 |
|                | AX2E2  | Lomenný                  | <109,5     | H <sub>2</sub> O                                |
| 5              | AX5    | Trigonální bipyramida    | 90 a 120   | AsF <sub>5</sub> , PCl <sub>5</sub>             |
|                | AX4E   | Houpačka                 | <90 a <120 | SeH <sub>4</sub>                                |
|                | AX3E2  | Tvar T                   | 90         | ICl <sub>3</sub>                                |
|                | AX2E3  | Lineární                 | 180        | IF <sub>2</sub> <sup>-</sup>                    |
| 6              | AX6    | Oktaedr                  | 90         | SF <sub>6</sub> , SCl <sub>6</sub>              |
|                | AX5E   | Čtvercová pyramida       | 90         | IF <sub>5</sub>                                 |
|                | AX4E2  | Čtverec                  | 90         | XeF <sub>4</sub>                                |


## 7.7 Symetrie

- **Operace symetrie** - geometrická operace, jejímž provedením dostaneme objekt do polohy nerozlišitelné od výchozí.
- **Prvek symetrie** - body, jejichž poloha se v průběhu provádění operace symetrie nemění.
- U molekul existuje pět prvků symetrie.

| Operace symetrie | Symbol   | Prvek symetrie       |
|------------------|----------|----------------------|
| Identita         | E        | Celý objekt          |
| Rotace           | $C_n$    | Rotační osa          |
| Zrcadlení        | $\sigma$ | Rovina symetrie      |
| Inverze          | i        | Střed symetrie       |
| Nevlastní osa    | $S_n$    | Rotačně-reflexní osa |

## 7.8 Dipólový moment


- Vektor popisující rozložení elektrického náboje v molekule.
- Výsledný dipólmoment získáme vektorovým součtem dipólmomentů jednotlivých vazeb.



## 8 Krystaly


V elementární buňce rozlišujeme čtyři typy poloh:

1. Poloha uvnitř buňky, atom patří celý do jediné buňky
2. Poloha ve středu stěny, atom je sdílen dvěma buňkami. V konkrétní buňce je umístěna polovina atomu.
3. Poloha ve středu hrany, atom je sdílen čtyřmi buňkami. V konkrétní buňce je umístěna čtvrtina atomu.
4. Poloha ve vrcholu buňky, atom je sdílen osmi buňkami. V konkrétní buňce je umístěna osmina atomu.



Obrázek 1: Krystalová struktura chloridu cesného.<sup>2</sup>

Např. chlorid cesný obsahuje cesný ion ve středu kubické buňky a osm chloridových aniontů v jejích vrcholech. Cesný kation patří do krystalové buňky celý a každý chlorid tam spadá  $\frac{1}{8}$ , tzn. vzorec je  $\text{CsCl}_{8 \times \frac{1}{8}} = \text{CsCl}$ .



Obrázek 2: Krystalová struktura oxidu titaničitého.<sup>3</sup>

1. Ti: šedé,  $8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2$
2. O: červené,  $2 \times 1 + 4 \times \frac{1}{2} = 4$

<sup>2</sup>Zdroj: Benjah-bmm27/ Commons

<sup>3</sup>Zdroj: Ben Mills/ Commons

## 9 Termodynamika

### 9.1 Zákony termodynamiky

**Termodynamika** je obor fyziky, který se zabývá procesy a vlastnostmi látek a polí spojených s teplem a tepelnými jevy; je součástí termiky. Vychází přitom z obecných principů přeměny energie, které jsou popsány čtyřmi termodynamickými zákony (z historických důvodů číslovány nultý až třetí):

#### Nultý zákon TD

Jsou-li dvě a více těles v termodynamické rovnováze s tělesem dalším, pak jsou všechna tato tělesa v rovnováze.

#### První zákon TD

Celkové množství energie (všech druhů) izolované soustavy zůstává zachováno.

Nelze sestavit stroj, který by trvale dodával mechanickou energii, aniž by spotřeboval odpovídající množství energie jiného druhu.

#### Druhý zákon TD

Teplo nemůže při styku dvou těles různých teplot samovolně přecházet z tělesa chladnějšího na těleso teplejší.


Nelze sestavit periodicky pracující tepelný stroj, který by trvale konal práci pouze tím, že by ochlazoval jedno těleso, a k žádné další změně v okolí by nedocházelo.

#### Třetí zákon TD



Při absolutní nulové teplotě je entropie čisté látky pevného nebo kapalného skupenství rovna nule.

## 9.2 Termochemie


*Vypočítejte reakční entalpii přeměny grafitu na diamant:*



jestliže znáte entalpie reakcí:



Jelikož nás zajímá přeměna grafitu na diamant, vezmeme entalpii spalování grafitu a od ní odečteme entalpii spalování diamantu: **A–B**







Entalpii tedy vypočítáme:

$$\Delta H_r = -393,77 - (-395,65) = 1,88 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

**Entalpie přeměny grafitu na diamant bude 1,88 kJ·mol<sup>-1</sup>**

---

*Vypočítejte entalpii spalování acetylenu:*



Zadanou rovnici získáme následující kombinací známých reakcí:  
 $-\text{A} + 2\text{B} + \text{C}$

Entalpii tedy vypočítáme:

$$\Delta H_r = -226,92 - 2 \cdot 393,97 - 285,96 = -1300,82 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

**Entalpie zadané reakce bude  $-1300,82 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$**



### 9.3 Hessův zákon

## 10 pH

### 10.1 Aktivita

Popisuje reálné chování roztoku. Na rozdíl od ideálního roztoku, se v reálném roztoku částice navzájem ovlivňují. Aktivita jakékoliv čisté látky v kondenzovaném stavu (kapalina nebo pevná látka) je jednotková. Aktivita plynu závisí na jeho parciálním tlaku, obvykle se označuje jako **fugacita**.

$$\mu_i = \mu_i^0 + RT \ln a_i$$

$\mu_i$  - chemický potenciál,  $\mu_i^0$  - standardní chemický potenciál

Aktivitu lze vyjádřit jako součin molární koncentrace a aktivitního koeficientu:

$$a = \gamma c$$

Aktivitní koeficient je úměrný náboji iontů v roztoku a iontové síle roztoku

#### 10.1.1 Iontová síla roztoku

$$\log \gamma = -0,509 z^2 \sqrt{I}$$

I - iontová síla roztoku - popisuje množství iontů v roztoku

$$I = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^n c_i z_i^2$$

$c_i$  - molalita;  $z_i$  - náboj; 0,509 - konstanta pro vodné roztoky při 25 °C

**Střední aktivitní koeficienty ve vodných roztocích při 25 °C<sup>4</sup>**

| $c_m [\text{mol.kg}^{-1}]$        | 0,1   | 1,0   | 4,0   | 10,0  |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| HCl                               | 0,796 | 0,809 | 1,762 | 10,44 |
| NaOH                              | 0,766 | 0,678 | 0,903 | 3,52  |
| KOH                               | 0,798 | 0,756 | 1,352 | 6,22  |
| H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>    | 0,265 | 0,130 | 0,171 | 0,553 |
| AgNO <sub>3</sub>                 | 0,734 | 0,429 | 0,210 |       |
| Ca(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> | 0,48  | 0,35  | 0,42  |       |

## 10.2 Vzorce

Silná kyselina                       $\text{pH} = -\log c$

Silná zásada                         $\text{pH} = 14 + \log c$

Slabá kyselina                     $\text{pH} = \frac{1}{2}\text{p}K_A - \frac{1}{2}\log c$

Slabá zásada                       $\text{pH} = 14 + \frac{1}{2}\log c - \frac{1}{2}\text{p}K_B$

Sůl slabé k a silné z             $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}\log c + \frac{1}{2}\text{p}K_A$

Sůl silné k a slabé z             $\text{pH} = 7 - \frac{1}{2}\log c - \frac{1}{2}\text{p}K_B$


Sůl slabé k a slabé z             $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}\text{p}K_A - \frac{1}{2}\text{p}K_B$

Pufr – kyselina                    $\text{pH} = \text{p}K_A + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$

Pufr – zásada                       $\text{pH} = 14 - \text{p}K_B - \log \frac{[B^+]}{[BOH]}$

<sup>4</sup>VOHLÍDAL, Jiří. Chemické tabulky. Praha: SNTL, 1982.

### 10.3 Iontový součin vody




$$K = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]}{[\text{H}_2\text{O}]^2}$$

$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$$

$$\text{p}K_w = \text{pH} + \text{pOH} = 14$$


### 10.4 Silné kyseliny a zásady

*Vypočítej pH kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 0,3 M.*




---

*Vypočítej pH kyseliny sírové o koncentraci 0,3 M.*



$$\text{pH} = -\log c = -\log (2 \times 0,3) = 0,22$$

*Vypočítej pH hydroxidu sodného o koncentraci 0,3 M.*



$$\text{pOH} = -\log c = -\log 0,3 = 0,52$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 0,52 = 13,48$$

---

*Vypočítej pH kyseliny chlorovodíkové o koncentraci  $1 \times 10^{-8}$  M.*

Chybný výpočet:  $\text{pH} = -\log 1 \cdot 10^{-8} = 8$

Je nutné uvažovat iontový součin vody, pro správný výpočet musíme uvažovat tři podmínky:

1.  $[\text{Cl}^-] = c$
2.  $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{Cl}^-]$
3.  $K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$

Tím získáme kvadratickou rovnici:


$$x^2 - cx - K_w = 0$$

$$c = 1,051 \times 10^{-7}$$

$$\text{pH} = \mathbf{6,978}$$

## 10.5 Slabé kyseliny a zásady

*Jaké je pH 0,2 M kyseliny octové,  $pK_a = 4,76$ ?*



$$K_a = 10^{-pK_a} = 10^{-4.76} = 0,000017$$

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{x \cdot x}{0,2-x}$$

Dosadíme za  $K_a$  a upravíme získaný výraz, čímž dostaneme kvadratickou rovnici:

$$x^2 + 0,000017x - 0,000034 = 0$$

Kvadratickou rovnici vyřešíme pomocí diskriminantu:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-0,000017 \pm \sqrt{0,000017^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-0,000034)}}{2 \cdot 1}$$

Ze dvou vypočítaných kořenů zvolíme ten kladný, koncentrace nemůže být záporná.

$$x = 0,001835$$

$$\text{pH} = -\log[H^+] = -\log 0,001835 = 2,736$$

### Zjednodušený výpočet

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{x \cdot x}{0,2}$$

Dosadíme za  $K_a$  a upravíme získaný výraz, čímž dostaneme kvadratickou rovnici:

$$x^2 - 0,0000034 = 0$$

$$x = \pm\sqrt{0,0000034}$$


$$x = 0,001844$$

$$\text{pH} = -\log 0,001844 = 2,734$$

### Vzorec pro výpočet pH:

$$\text{pH} = \frac{1}{2}\text{p}K_A - \frac{1}{2}\log c = \frac{1}{2} \times 4,76 - \frac{1}{2}\log 0,2 = 2,73$$

*Jaké je pH 0,25 M roztoku amoniaku*



$$\text{p}K_B = 4,76$$

$$K_B = 1,74 \times 10^{-5}$$

$$K_B = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} = \frac{x^2}{c}$$

$$x = \sqrt{K_B \times c} = \sqrt{1,74 \times 10^{-5} \times 0,25} = 2,09 \times 10^{-3}$$

$$\text{pOH} = -\log 2,09 \times 10^{-3} = 2,68$$



$$\text{pH} = 14 - 2,68 = \mathbf{11,32}$$

### Vzorec:

$$\text{pH} = 14 + \frac{1}{2}\log c - \frac{1}{2}\text{p}K_B = 14 + 0,5\log 0,25 - 0,5 \times 4,76 = 11,32$$

## 10.6 Konjugované kyseliny a zásady


Konjugovaný pár kyselina–zásada vzniká přesunem proton z kyseliny na zásadu.



- Pokud je kyselina silná, je odpovídající konjugovaná zásada slabá.
- Pokud je kyselina slabá, je odpovídající konjugovaná zásada slabá.
- Pokud je kyselina velmi slabá, je odpovídající konjugovaná zásada silná.

## 10.7 Soli

### 10.7.1 Sůl silné kyseliny a silné zásady




Při disociaci nedochází ke vzniku  $\text{H}^+$ , ani  $\text{OH}^-$  iontů, hodnota pH tedy není ovlivněna.

### 10.7.2 Sůl silné kyseliny a slabé zásady




$$\text{pH} = 7 - \frac{1}{2}(\text{p}K_b + \log c)$$

### 10.7.3 Sůl slabé kyseliny a silné zásady



$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{pK}_a + \log c)$$

### 10.7.4 Sůl slabé kyseliny a slabé zásady



$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{pK}_a - \text{pK}_b)$$

$$\text{pK}_a(\text{HF}) = 3,17$$


$$\text{pK}_b(\text{NH}_3) = 4,75$$

$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(3,17 - 4,75) = 6,21$$



## 10.8 Neutralizace

*Jaké pH bude mít roztok připravený rozpuštěním 0,853 g KOH v 200 cm<sup>3</sup> roztoku H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> o koncentraci 0,015 M?*



$$n(\text{KOH}) = \frac{0,853}{56,11} = 0,0152 \text{ mol}$$

$$n(\text{H}_2\text{SO}_4) = c \cdot V = 0,015 \cdot 0,20 = 0,0030 \text{ mol}$$

Na neutralizaci kyseliny sírové budeme potřebovat dvojnásobné látkové množství KOH, tzn. 0,0060 mol. Po reakci nám zbyde:

$$n = 0,0152 - 0,0060 = 0,0092 \text{ mol KOH}$$

$$c = \frac{0,0092}{0,2} = 0,046 \text{ M}$$



$$\text{pH} = 14 + \log c = 12,66$$

**pH připraveného roztoku bude 12,66.**

## 10.9 Pufr

Jde o směs slabé kyseliny a její soli nebo slabé zásady a její soli. Příkladem je např. acetátový pufr - směs kyseliny octové a octanu sodného.

Rovnováhy v pufru lze popsat rovnicemi:



Přídavkem kyseliny vzniknou molekuly kyseliny octové, přídavkem zásady ionty octanu. pH roztoku se nezmění.

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pK}_b + \log \frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]}$$

| Pufr      | Složení                                                 | Rozsah pH    |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Acetátový | $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COONa}$        | 3,8 - 5,8    |
| Fosfátový | $\text{NaH}_2\text{PO}_4/\text{Na}_2\text{HPO}_4$       | 6,2 - 8,2    |
| Borátový  | $\text{H}_3\text{BO}_3/\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ | 8,25 - 10,25 |

*Pufr obsahuje ve 100 cm<sup>3</sup> 0,25 molu kyseliny octové a 0,7 molu octanu sodného. Jaké bude jeho pH?*

$$\text{pK}_a = 4,74$$

$$[\text{HA}] = \frac{0,25}{0,1} = 2,5 \text{ mol.dm}^{-3}$$

$$[\text{A}^-] = \frac{0,7}{0,1} = 7 \text{ mol.dm}^{-3}$$

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = 4,74 + \log \frac{7}{2,5} = 5,18$$

**pH pufru bude 5,18.**

---

*Pufr obsahuje ve 100 cm<sup>3</sup> 0,25 molu amoniaku a 0,7 molu chloridu amonného. Jaké bude jeho pH?*

$$\text{pK}_b = 4,74$$

$$[\text{B}] = \frac{0,25}{0,1} = 2,5 \text{ mol.dm}^{-3}$$

$$[\text{BH}^+] = \frac{0,7}{0,1} = 7 \text{ mol.dm}^{-3}$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pK}_b + \log \frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]} = 14 - 4,74 + \log \frac{7}{2,5} = 9,71$$

**pH pufru bude 9,71.**

## 11 Součin rozpustnosti

### 11.1 Rozpustnost



Udává kolik gramů látky se za dané teploty rozpustí ve 100 g rozpouštědla, zpravidla vody. Rozpustnost se zvyšující se teplotou zpravidla roste.

|       | NH <sub>4</sub> Cl | NaCl  | KCl   |
|-------|--------------------|-------|-------|
| 0 °C  | 29,41              | 35,63 | 28,14 |
| 50 °C | 50,42              | 36,70 | 43,05 |
| 60 °C | 55,30              | 37,08 | 45,88 |

- **Nenasycený roztok** – koncentrace látky je nižší, než její rozpustnost za dané teploty.
- **Nasycený roztok** – koncentrace látky je shodná s její rozpustností za dané teploty.
- **Přesycený roztok** – koncentrace látky je vyšší, než její rozpustnost za dané teploty.

## 11.2 Součin rozpustnosti

Popisuje koncentrace iontů v nasycených roztocích.



Rovnováhu v nasyceném roztoku chloridu stříbrného můžeme popsat pomocí rovnovážné konstanty:

$$K = \frac{[\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]}{[\text{AgCl}]}$$

Z rovnovážné konstanty pak odvodíme *součin rozpustnosti*:

$$K_S = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$$

$$pK_S = -\log K_S$$


Hodnoty součinů rozpustnosti najdeme v chemických tabulkách.

| Látka                            | pK <sub>S</sub> | K <sub>S</sub>         | Látka                                            | pK <sub>S</sub> | K <sub>S</sub>         |
|----------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| AgBr                             | 12,31           | 4,90.10 <sup>-13</sup> | CdS                                              | 26,10           | 7,94.10 <sup>-27</sup> |
| AgCl                             | 9,75            | 1,78.10 <sup>-10</sup> | CoCO <sub>3</sub>                                | 12,84           | 1,45.10 <sup>-13</sup> |
| AgI                              | 16,08           | 8,32.10 <sup>-17</sup> | CuBr                                             | 8,28            | 5,25.10 <sup>-9</sup>  |
| AgSCN                            | 11,97           | 1,07.10 <sup>-12</sup> | CuS                                              | 35,20           | 6,31.10 <sup>-36</sup> |
| Ag <sub>2</sub> CrO <sub>4</sub> | 11,61           | 2,45.10 <sup>-12</sup> | Ni(OH) <sub>2</sub>                              | 15,50           | 3,16.10 <sup>-16</sup> |
| Ag <sub>2</sub> S                | 49,20           | 6,31.10 <sup>-50</sup> | PbS                                              | 26,60           | 2,51.10 <sup>-27</sup> |
| Ag <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>  | 4,77            | 1,70.10 <sup>-5</sup>  | Sn(OH) <sub>4</sub>                              | 56,00           | 1,00.10 <sup>-56</sup> |
| BaCO <sub>3</sub>                | 8,29            | 5,13.10 <sup>-9</sup>  | Tl <sub>2</sub> S                                | 20,30           | 5,01.10 <sup>-21</sup> |
| BaCrO <sub>4</sub>               | 9,93            | 1,17.10 <sup>-10</sup> | Zn <sub>3</sub> (AsO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> | 27,89           | 1,29.10 <sup>-28</sup> |

### 11.2.1 Koncentrace iontů

*Vypočítejte koncentraci iontů v nasyceném roztoku AgCl*

Chlorid stříbrný v roztoku disociuje podle rovnice:



Součin rozpustnosti vypočítáme:

$$K_S = 10^{-9,75} = 1,78 \times 10^{-10}$$


$$K_S = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = x^2$$

$$x = \sqrt{K_S} = \sqrt{1,78 \times 10^{-10}} = 1,33 \times 10^{-5} \text{ M}$$

**Koncentrace stříbrného a chloridového iontu jsou  $1,33 \times 10^{-5} \text{ mol.dm}^{-3}$**

*Vypočítejte koncentraci iontů v nasyceném roztoku Sn(OH)<sub>4</sub>*

Hydroxid cíničitý v roztoku disociuje podle rovnice:



Součin rozpustnosti vypočítáme:

$$K_S = 10^{-56,00} = 1 \times 10^{-56}$$

$$K_S = [\text{Sn}^{4+}][\text{OH}^-]^4 = x \times (4x)^4 = 256x^4$$

$$x = \sqrt[4]{\frac{K_S}{256}} = \sqrt[4]{\frac{1 \times 10^{-56}}{256}} = 2,5 \times 10^{-15} \text{ M} = c(\text{Sn}^{4+})$$

$$c(\text{OH}^-) = 4 \times 2,5 \times 10^{-15} = 1 \times 10^{-14} \text{ M}$$

**Koncentrace cínčitých iontů je  $2,5 \times 10^{-15} \text{ mol.dm}^{-3}$  a hydroxidových iontů je  $1 \times 10^{-14} \text{ mol.dm}^{-3}$ .**

## 12 Elektrochemie

Elektrochemie je obor chemie, který zkoumá procesy probíhající na rozhraní elektrod a elektrolytu.

- *Elektroda* – kov ponořený do elektrolytu
- *Elektrolyt* – roztok nebo tavenina schopná vést elektrický proud
- *Anoda* – elektroda na které probíhá oxidace
- *Katoda* – elektroda na které probíhá redukce

### 12.1 Beketovova řada kovů


Pojmenována po ruském chemikovi *N. N. Beketovovy*. Kovy jsou seřazeny podle hodnoty standardního elektrodového potenciálu.

|                    |                  |                     |                     |                     |                        |
|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Li/Li <sup>+</sup> | K/K <sup>+</sup> | Mg/Mg <sup>2+</sup> | Zn/Zn <sup>2+</sup> | Cd/Cd <sup>2+</sup> | <b>H/H<sup>+</sup></b> |
| −3,04              | −2,93            | −2,37               | −0,761              | −0,40               | <b>0</b>               |


|                     |                    |                     |                     |                     |
|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cu/Cu <sup>2+</sup> | Ag/Ag <sup>+</sup> | Hg/Hg <sup>2+</sup> | Pt/Pt <sup>2+</sup> | Au/Au <sup>3+</sup> |
| +0,34               | +0,80              | +0,85               | +1,19               | +1,52               |

Kovy, které mají nižší potenciál než vodík se označují jako *neušlechtilé*, kovy s vyšším potenciálem jsou pak označovány jako *ušlechtilé*.



Neušlechtilé kovy při reakci s minerálními kyselinami uvolňují vodík:



Ušlechtilé kovy nedokáží vodík vytěsnit, rozpouštějí se jen v oxidujících kyselinách:




Kovy s nižším elektrodovým potenciálem dokáží vyredukovat kovy s vyšším elektrodovým potenciálem z jejich solí:





## 12.2 Elektrodové potenciály

**Standardní vodíková elektroda** – platinová elektroda, pokrytá platinovou černí, sycená plyným vodíkem pod tlakem 101,325 kPa za teploty 0 °C, ponořená do roztoku s jednotkovou aktivitou vodíkových iontů.



Její potenciál je za všech teplot nulový. Absolutní hodnota potenciálu se odhaduje na 4,44 V.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>THE ABSOLUTE ELECTRODE POTENTIAL: AN EXPLANATORY NOTE

*Zdrojem hodnot potenciálů je wikipedie.<sup>6</sup>*

| Neuší. kovy                      | Ušlechtilé kovy                 | Redox syst.                            |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| $\text{Li}^+/\text{Li}$ -3,04    |                                 | $\text{Ag}^{2+}/\text{Ag}^+$ 1,98      |
| $\text{Cs}^+/\text{Cs}$ -3,02    |                                 | $\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}$ 0,95     |
| $\text{K}^+/\text{K}$ -2,93      |                                 | $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 0,771  |
| $\text{Ba}^{2+}/\text{Ba}$ -2,91 |                                 | $\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}$ 0,15   |
| $\text{Na}^+/\text{Na}$ -2,71    | $\text{Bi}^{3+}/\text{Bi}$ 0,31 | $\text{Ti}^{3+}/\text{Ti}^{2+}$ -0,369 |
| $\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}$ -2,37 | $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$ 0,34 | $\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}^{2+}$ -0,408 |
| $\text{Ce}^{3+}/\text{Ce}$ -2,34 | $\text{Cu}^+/\text{Cu}$ 0,52    |                                        |
| $\text{Al}^{3+}/\text{Al}$ -1,66 | $\text{Tl}^{3+}/\text{Tl}$ 0,74 |                                        |
| $\text{Zr}^{4+}/\text{Zr}$ -1,45 | $\text{Ag}^+/\text{Ag}$ 0,80    |                                        |
| $\text{Ti}^{3+}/\text{Ti}$ -1,37 | $\text{Hg}^{2+}/\text{Hg}$ 0,85 |                                        |
| $\text{Ta}^{3+}/\text{Ta}$ -0,60 | $\text{Pd}^{2+}/\text{Pd}$ 0,92 |                                        |
| $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}$ -0,44 | $\text{Pt}^{2+}/\text{Pt}$ 1,18 |                                        |
| $\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}$ -0,13 | $\text{Au}^{3+}/\text{Au}$ 1,52 |                                        |
| $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}$ -0,04 | $\text{Au}^+/\text{Au}$ 1,83    |                                        |

---

<sup>6</sup>Standard electrode potential (data page)

### 12.3 Elektrody a elektrodový potenciál

$$E = E^0 + \frac{RT}{zF} \ln a = E^0 + \frac{0,0592}{z} \log a$$

$$E = E^0 + \frac{RT}{zF} \ln \frac{a_{red}}{a_{ox}} = E^0 + \frac{0,0592}{z} \ln \frac{a_{red}}{a_{ox}}$$

---

Vypočítejte potenciál železné elektrody ponořené do roztoku železnatých iontů o koncentraci 0,85 M.

$$E^0(Fe^{2+}/Fe) = -0,44$$

$$E = E^0 + \frac{0,0592}{z} \log c = -0,44 + \frac{0,0592}{2} \log 0,85 = -0,442V$$

**Potenciál elektrody je -0,442 V**


$$E = E^0 + \frac{0,0592}{z} \ln \frac{a_{red}}{a_{ox}} =$$

---

Vypočítejte potenciál platinového drátu ponořeného do roztoku o  $[Fe^{2+}] = 0,05$  M a  $[Fe^{3+}] = 0,02$  M

**Potenciál elektrody je -0,442 V**

## 12.4 Galvanický člunek



Obrázek 3: Schéma galvanického člunku.<sup>7</sup>

### Důležité pojmy

- **Primární články** – nelze je nabíjet
- **Sekundární články** – lze je opakovaně nabíjet, *akumulátory*
- **Elektromotorické napětí** – napětí nezatíženého člunku
- **Kapacita** – množství energie uložené v člunku
- **Hustota energie** – podíl kapacity a objemu člunku
- **Životnost akumulátoru** – počet cyklů nabíjení/vybíjení, které akumulátor vydrží

---

<sup>7</sup>Zdroj: Maxx/Commons

## 12.5 Elektrolýza

### 1. Faradayův zákon

Hmotnost látky vyloučené na elektrodě závisí přímo úměrně na elektrickém proudu, procházejícím elektrolytem, a na čase, po který elektrický proud procházel.

$$m = A \cdot I \cdot t$$

### 2. Faradayův zákon

Látková množství vyloučená stejným nábojem jsou pro všechny látky chemicky ekvivalentní, neboli elektrochemický ekvivalent  $A$  závisí přímo úměrně na molární hmotnosti látky.

$$A = \frac{M}{F \cdot z}$$

---

*Kolik mědi se získá elektrolýzou roztoku modré skalice proudem 1,2 A za dobu dvou hodin?*

K redukci měďnatého kationtu jsou potřeba dva elektrony. Elektrochemický ekvivalent vypočítáme:

$$A = \frac{M}{F \cdot z} = \frac{63,55}{96485 \cdot 2} = 3,29 \times 10^{-4} \text{ g} \cdot \text{C}^{-1}$$

Nyní můžeme vypočítat i hmotnost vyloučené mědi, čas musíme dosadit v sekundách:

$$m = A \cdot I \cdot t = 3,29 \cdot 10^{-4} \cdot 1,2 \cdot 7200 = 2,84 \text{ g}$$

**Elektrolýzou získáme 2,84 g mědi.**

---