

C2062 – Anorganická chemie II

(Dusík, fosfor,) arsen, antimon, bismut a moscovium

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz

IUPAC Periodic Table of the Elements																		18
1 H hydrogen 1.00794 (7)																		2 He helium 4.002602
3 Li lithium 6.941	4 Be beryllium 9.012182	Key														19 K potassium 39.0983		
		atomic number	6															20 Ca calcium 40.078
		Symbol	C															21 Sc scandium 44.955912
		name	carbon															22 Ti titanium 47.88
		group	14															23 V vanadium 50.9415
		period	2															24 Cr chromium 51.9961
		standard atomic weight	12.011															25 Mn manganese 54.938044
		standard atomic weight	12.011															26 Fe iron 55.845
11 Na sodium 22.98976928	12 Mg magnesium 24.304	13 Al aluminum 26.9815386	14 Si silicon 28.0855836	15 P phosphorus 30.973761508	16 S sulfur 32.06	17 Cl chlorine 35.45	18 Ar argon 39.948	27 Co cobalt 58.933195	28 Ni nickel 58.6934	29 Cu copper 63.546	30 Zn zinc 65.38	31 Ga gallium 69.723	32 Ge germanium 72.630	33 As arsenic 74.9216	34 Se selenium 78.96	35 Br bromine 79.904	36 Kr krypton 83.798	
19 K potassium 39.0983	20 Ca calcium 40.078	21 Sc scandium 44.955912	22 Ti titanium 47.88	23 V vanadium 50.9415	24 Cr chromium 51.9961	25 Mn manganese 54.938044	26 Fe iron 55.845	27 Co cobalt 58.933195	28 Ni nickel 58.6934	29 Cu copper 63.546	30 Zn zinc 65.38	31 Ga gallium 69.723	32 Ge germanium 72.630	33 As arsenic 74.9216	34 Se selenium 78.96	35 Br bromine 79.904	36 Kr krypton 83.798	
37 Rb rubidium 85.4678	38 Sr strontium 87.62	39 Y yttrium 88.90584	40 Zr zirconium 91.224	41 Nb niobium 92.90638	42 Mo molybdenum 95.94	43 Tc technetium 98	44 Ru ruthenium 101.07	45 Rh rhodium 102.90550	46 Pd palladium 106.3678	47 Ag silver 107.8642	48 Cd cadmium 112.411	49 In indium 114.818	50 Sn tin 118.710	51 Sb antimony 121.757	52 Te tellurium 127.6	53 I iodine 126.90547	54 Xe xenon 131.29	
55 Cs cesium 132.90545196	56 Ba barium 137.327	57-71 La-Lu lanthanoids	72 Hf hafnium 178.49	73 Ta tantalum 180.94788	74 W tungsten 183.84	75 Re rhenium 186.207	76 Os osmium 190.23	77 Ir iridium 192.222	78 Pt platinum 195.084	79 Au gold 196.966569	80 Hg mercury 200.59	81 Tl thallium 204.3833	82 Pb lead 207.2	83 Bi bismuth 208.980399	84 Po polonium 209	85 At astatine 210	86 Rn radon 222	
87 Fr francium 223	88 Ra radium 226	89-103 Ac-Lu actinoids	104 Rf rutherfordium 261	105 Db dubnium 262	106 Sg seaborgium 266	107 Bh bohrium 264	108 Hs hassium 277	109 Mt meitnerium 268	110 Ds darmstadtium 271	111 Rg roentgenium 272	112 Cn copernicium 285	113 Nh nihonium 284	114 Fl flerovium 289	115 Mc moscovium 288	116 Lv livermorium 293	117 Ts tennessine 294	118 Og oganeson 294	

57 La lanthanum 138.90547	58 Ce cerium 140.12	59 Pr praseodymium 140.90768	60 Nd neodymium 144.242	61 Pm promethium 144.9127	62 Sm samarium 150.36	63 Eu europium 151.964	64 Gd gadolinium 157.25	65 Tb terbium 158.92534	66 Dy dysprosium 162.50015	67 Ho holmium 164.93032	68 Er erbium 167.259	69 Tm thulium 168.93032	70 Yb ytterbium 173.05468	71 Lu lutetium 174.967
Ac actinium 227	Th thorium 232.0377	Pa protactinium 231.03688	U uranium 238.02891	Np neptunium 237.04817	Pu plutonium 244.0642	Am americium 243.06138	Cm curium 247.07647	Bk berkelium 247.07125	Cf californium 251.0832	Es einsteinium 252.0832	Fm fermium 257.10	Md mendelevium 258.10	No nobelium 259.10	Lr lawrencium 262.10

Dusík


- ▶ Značka N, protonové číslo 7.
- ▶ Za laboratorní teploty je plynný, kapalný dusík se běžně využívá jako ochranná atmosféra a jako chladivo.
- ▶ Molekula N_2 obsahuje trojnou vazbu $\text{N}\equiv\text{N}$, která ji dává vysokou stabilitu a inertnost.
- ▶ Tvoří největší podíl v Zemské atmosféře.
- ▶ Koloběh dusíku na Zemi popisuje fixaci atmosférického dusíku a jeho opětovné uvolňování biologickými systémy.
- ▶ Jednou z nejdůležitějších sloučenin dusíku je amoniak, NH_3 .



Kapalný dusík.¹

¹Zdroj: Cory Doctorow/Commons

Dusík




Koloběh dusíku.²


²Zdroj: Nojhan/Commons

- ▶ **Amoniak**, NH_3 , bezbarvý, toxický plyn.
- ▶ Díky vysoké polaritě se dobře rozpouští ve vodě (31 % při 25 °C).
- ▶ Podobně jako voda má schopnost autoionizace:
- ▶ $\text{NH}_3 + \text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{NH}_2^-$
- ▶ Stupnice pH v kapalném amoniaku má rozsah 0–30 ($K = 10^{-30}$).
- ▶ Roztoky alkalických kovů v kapalném amoniaku poskytují tzv. solvovaný elektron.³
- ▶ Světová produkce amoniaku se blíží množství 200 miliónů tun.
- ▶ Využívá se při výrobě hnojiv a dalších sloučenin dusíku, jako rozpouštědlo, dříve se využíval i v ledničkách.
- ▶ Přímá syntéza z prvků je v průmyslovém měřítku neproveditelná.
- ▶ V roce 1913 byla vyvinuta Haberova–Boschova metoda výroby amoniaku s využitím heterogenních katalyzátorů na bázi oxidů železa.

³Solvated electron




Energetický profil syntézy amoniaku.⁴



Haberova-Boschova syntéza amoniaku.⁵

⁵Zdroj: Francis E Williams/Commons

- ▶ **Jododusík**, NI_3 , je černozeleňá pevná látka.
- ▶ V suchém stavu ho lze velmi snadno přivést k explozi.
- ▶ Připravuje se reakcí roztoku amoniaku s jodem kdy vzniká adukt $\text{NI}_3 \cdot \text{NH}_3$.
- ▶ V roce 1990 byl připraven čistý NI_3 reakcí BN s IF:⁶
- ▶ $\text{BN} + 3 \text{IF} \xrightarrow[-30^\circ\text{C}]{\text{CFCI}_3} \text{NI}_3 + \text{BF}_3$



Struktura aduktu $\text{NI}_3 \cdot \text{NH}_3$.⁷

⁶Nitrogen Triiodide

⁷Zdroj: Ben Mills/Commons

Fosfor


- ▶ Značka P, protonové číslo 15.
- ▶ Pevná látka, vytváří řadu allotropních modifikací.
- ▶ Důležitý biogenní prvek, vyskytuje se např. v kostech, zubech, ATP (ADP, AMP).
- ▶ Fosforečnany jsou součástí hnojiv.



Bílý, červený a fialový fosfor.⁸

⁸Zdroj: Commons


- ▶ *Bílý fosfor* – skládá se z jednotek P_4 , je velmi reaktivní, na vzduchu je samozápalný.
- ▶ *Červený fosfor* – amorfnní modifikace, má polymerní strukturu. Připravuje se zahříváním bílého fosforu v anaerobních podmínkách. Je výrazně méně reaktivní než bílý fosfor.
- ▶ *Černý fosfor* – má kovový lesk, vlastnostmi se blíží kovům. Vzniká zahříváním červeného fosforu pod tlakem.
- ▶ *Fialový (Hittorfův) fosfor* – je tvořen řetězcí fosforu propojenými do polymerní sítě. Poprvé byl připraven krystalizací fosforu z taveniny olova.



Krystalová struktura fialového fosforu.⁹




⁹Zdroj: Benjah-bmm27/Commons

- *Oxid fosforečný* – bílý, hygroskopický prášek. Využívá se jako sušidlo i důležitá výchozí látka pro další sloučeniny fosforu.
- $\text{P}_4\text{O}_{10} + 6 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4 \text{H}_3\text{PO}_4$
- Získává se oxidací bílého fosforu na vzduchu.
- $\text{P}_4 + 5 \text{O}_2 \longrightarrow \text{P}_4\text{O}_{10}$
- Má strukturu adamantanu, šest kyslíků je endocyklických a čtyři exocyklické.
- Známe pět oxidů v rozmezí P_4O_6 až P_4O_{10} , které se liší počtem exocyklických kyslíků.






Oxidy fosforu v oxidačním stavu V.


- ▶ *Oxokyseliny fosforu:*
- ▶ Vždy obsahují skupinu $\text{P}=\text{O}$.
- ▶ Vždy obsahují alespoň jednu skupinu $\text{P}-\text{OH}$, která je ionizovatelná.
- ▶ Vazby $\text{P}-\text{H}$ nejsou ionizovatelné.
- ▶ Řetězení probíhá přes vazby $\text{P}-\text{O}-\text{P}$ nebo $\text{P}-\text{P}$.
- ▶ Pro přípravu sloučenin fosforu jsou důležité jak kyseliny, tak jejich estery.



- *Fosfazeny* – nenasycené sloučeniny fosforu a dusíku.
- Obsahují zpravidla P^V a vazbu $P=N$.
- Monofosfazeny připravil A. V. Kirsanov v roce 1962:
- $\text{Ph}_3\text{PCl}_2 + \text{PhNH}_2 \longrightarrow \text{Ph}_3\text{P}=\text{NPh} + 2 \text{HCl}$
- Polyfosfazeny můžeme připravit reakcí PCl_5 s amoniakem:
- $n \text{PCl}_5 + n \text{NH}_4\text{Cl} \xrightarrow{120-150^\circ\text{C}} (\text{NPCl}_2)_n + 4 n \text{HCl}$



Úvod – arsen, antimon, bismut a moscovium

	<i>Arsen</i>	<i>Antimon</i>	<i>Bismut</i>
El. konfigurace	$3d^{10} 4s^2 4p^3$	$4d^{10} 5s^2 5p^3$	$4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^3$
Teplota tání [°C]	614	631	272
Teplota varu [°C]	817	1635	1564
Objeven	cca 300 př.n.l.	v 9. stol. př.n.l.	v 1. tis. př.n.l.
Vzhled	kovově šedý ¹⁰ 	stříbrnošedý ¹¹ 	stříbrnohnědý ¹² 

¹⁰Zdroj: Stas1995/ Commons

¹¹Zdroj: Commons

¹²Zdroj: Alchemist-hp/ Commons

Moscovium

- ▶ Umělý prvek, protonové číslo 115, Mc.¹³
- ▶ Dřívější název tohoto prvku byl *ununpentium*.
- ▶ Poprvé byl připraven v roce 2004.¹⁴
- ▶ ${}_{95}^{243}\text{Am} + {}_{20}^{48}\text{Ca} \longrightarrow {}_{115}^{288}\text{Mc} + 3 {}_0^1\text{n}$
- ▶ ${}_{95}^{243}\text{Am} + {}_{20}^{48}\text{Ca} \longrightarrow {}_{115}^{287}\text{Mc} + 4 {}_0^1\text{n}$
- ▶ Předpokládaná elektronová konfigurace: $[\text{Rn}] 5f^{14} 6d^{10} 7s^2 7p^3$.

Izotop	Poločas rozpadu	Typ přeměny
${}^{286}\text{Mc}$	20 ms	α
${}^{287}\text{Mc}$	38 ms	α
${}^{288}\text{Mc}$	193 ms	α
${}^{289}\text{Mc}$	250 ms	α
${}^{290}\text{Mc}$	650 ms	α

¹³IUPAC announces the names of the elements 113, 115, 117, and 118

¹⁴Experiments on the synthesis of element 115

Chemické a fyzikální vlastnosti

- ▶ Prvky 15. skupiny patří mezi nejstarší lidstvu známé prvky.
- ▶ Arsen a bismut jsou monoizotopické, díky čemuž jsou jejich atomové hmotnosti známy s vysokou přesností.
- ▶ Antimon má dva stabilní izotopy: ^{121}Sb (57,25 %) a ^{123}Sb (42,75 %).
- ▶ Všechny tři prvky vytvářejí několik *allotropních modifikací*.
- ▶ Elektronová konfigurace valenční slupky všech prvků je $ns^2 np^3$.
- ▶ Běžné oxidační stavy pro arsen a antimon jsou +III a +V.
- ▶ Oxidační stav V není u bismutu příliš běžný, je to dáno vlivem inertního elektronového páru $6s^2$. Vytváří sloučeniny převážně v oxidačním stavu III.
- ▶ U moscovia se očekává, že jako inertní bude vystupovat i orbital $7p$ takže nejstabilnějším oxidačním stavem bude I.¹⁵
- ▶ Nejběžnější *koordinační čísla* ve sloučeninách těchto prvků jsou 3, 4, 5 a 6.

¹⁵Predicted Properties of the Superheavy Elements. III. Element 115, Eka-Bismuth

Chemické a fyzikální vlastnosti

- ▶ Bismut nemá žádný stabilní izotop.
- ▶ Dlouho byl za stabilní (a zároveň nejtěžší stabilní jádro) považován izotop ^{209}Bi , ale v roce 2003 bylo prokázáno, že se rozpadá za uvolnění částice α .¹⁶
- ▶ $^{209}_{83}\text{Bi} \longrightarrow ^{205}_{81}\text{Tl} + ^4_2\alpha$
- ▶ Poločas rozpadu je $2,01 \cdot 10^{19}$ let.
- ▶ Za nejtěžší stabilní jádro je nyní považováno jádro $^{208}_{82}\text{Pb}$.


Izotop	Poločas rozpadu	Typ rozpadu
^{207}Bi	31,55 let	β^+
^{208}Bi	$3,7 \cdot 10^5$ let	β^+
^{209}Bi	$2,01 \cdot 10^{19}$ let	α
^{210}Bi	5,012 dne	β^- / α
^{210m}Bi	$3,04 \cdot 10^6$ let	α

¹⁶Experimental detection of alpha-particles from the radioactive decay of natural bismuth

Chemické a fyzikální vlastnosti

Allotropní modifikace

- ▶ Arsen tvoří tři běžné krystalické modifikace. V plynné fázi je ve formě čtyřatomových molekul As_4 .
 - ▶ Nejběžnější je kovový, šedý arsen (α modifikace). Tato modifikace je nestálější. Je tvořena vrstvami kovalentně vázaného arsenu a má polovodivé vlastnosti.
 - ▶ V rámci vrstvy sousedí každý arsen se třemi dalšími ve vzdálenosti 251,7 pm a s třemi atomy v sousední vrstvě ve vzdálenosti 312 pm.
 - ▶ Žlutý arsen vzniká prudkým ochlazením par arsenu, na světle přechází na šedou modifikaci. Je měkký a voskovitý.¹⁷
 - ▶ Černý arsen vzniká ochlazením par arsenu na teplotu 100 °C a následnou krystalizací amorfního arsenu v přítomnosti par rtuti.¹⁸



Struktura žlutého arsenu.

¹⁷The Chemistry of Yellow Arsenic

¹⁸Black arsenic: a new synthetic method by catalytic crystallization of arsenic glass

Chemické a fyzikální vlastnosti

Allotropní modifikace


- ▶ Antimon tvoří šest allotropních modifikací.
 - ▶ *Kovový antimon* (α -Sb) je stabilní modifikace, izostrukturní s α -As. Má modro-bílou barvu.
 - ▶ *Černý antimon* lze připravit ochlazením par antimonu, je amorfní.
 - ▶ *Žlutý antimon* je stabilní pouze při teplotách pod $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$. Za vyšší teploty se na světle transformuje na stabilnější černý antimon.¹⁹
 - ▶ Elektrolyticky lze připravit tzv. *explosivní antimon*, který je velmi citlivý na náraz a zahřátí. Připravuje se elektrolýzou roztoku chloridu antimonitého (SbCl_3) v kyselině chlorovodíkové. Poprvé byl popsán už roku 1855.²⁰
 - ▶ Další dvě modifikace existují pouze za vysokého tlaku. První se připravuje působením tlaku 5 GPa na α -Sb, dochází ke změně polohy atomů, každý antimon je obklopen šesti stejně vzdálenými atomy. Další zvýšení tlaku (9 GPa) vede ke vzniku modifikace II, která má nejtěsnější hexagonální uspořádání.

¹⁹The Lonely Element Antimony


²⁰On the explosive semiconductor-semimetal transition of antimony

Chemické a fyzikální vlastnosti

Allotropní modifikace



Kovový antimon z Mexika.²¹



Antimonový prášek.²²


²¹Zdroj: James St. John/Commons

²²Zdroj: Ondřej Mangl/Commons

Chemické a fyzikální vlastnosti

Allotropní modifikace

- ▶ Bismut vytváří několik krystalických modifikací.
- ▶ Za standardních podmínek je izostrurní s α -As a α -Sb (Bi-I).
- ▶ Při zvýšení tlaku na 2,5 GPa vzniká monoklinická modifikace (Bi-II).
- ▶ Další zvýšení tlaku na 2,7 GPa vede ke vzniku tetragonálního Bi-III.
- ▶ Pokud modifikaci Bi-III zahřejeme nad teplotu 170 °C získáme orthorombickou modifikaci Bi-IV.²³
- ▶ Zvýšením tlaku na 7,7 GPa získáme kubickou tělesně centrovanou mřížku Bi-V.²⁴



Krystal bismutu.²⁵

²³High-pressure, high-temperature single-crystal study of Bi-IV

²⁴High-pressure phase transition of bismuth

²⁵Zdroj: Alchemist-hp/Commons

Výskyt a získávání prvků

Arsen

- ▶ Koncentrace arsenu v zemské kůře je 1,5–2 ppm.²⁶
- ▶ Je součástí více než 500 minerálů. Nejběžnějším minerálem je arsenopyrit.²⁷
- ▶ Jako zdroj arsenu je nejdůležitější arsenopyrit a další sulfidické minerály.

Minerál	Složení
Realgar	As_4S_4
Auripigment	As_2S_3
Arsenolit	As_2O_3
Loellingit	FeAs_2
Arsenopyrit	FeAsS
Kobaltin	CoAsS
Glaukodot	$(\text{Co}, \text{Fe})\text{AsS}$



Arsen.²⁸

²⁶Distribution of Arsenic in the Environment

²⁷The mineralogy of Arsenic

²⁸Zdroj: Tomihahndorf/ Commons

Arsenopyrit

- ▶ Arsenopyrit, FeAsS , je monoklinický minerál.²⁹
- ▶ Často se vyskytuje v přítomnosti zlata, proto se využívá jako indikátor zlatých žil.³⁰
- ▶ Obsahuje 46 % arsenu, díky tomu je jeho nejdůležitější rudou.



Arsenopyrit, Kutná Hora.³¹



Arsenopyrit, Mexiko.³²

²⁹Arsenopyrite Mineral Data

³⁰Atlas minerálů

³¹Zdroj: Jan Helebrant/ Commons

³²Zdroj: Robert M. Lavinsky/ Commons

Výskyt a získávání prvků

Arsen

Auripigment

- ▶ Auripigment, As_2S_3 , je jednoklonný minerál.^{33,34}
- ▶ Vzniká přeměnou realgaru (As_4S_4) nebo hydrotermálně.
- ▶ Byl využíván už v Římské říši, po staletí byl používán jako pigment.



Auripigment a baryt, Rusko.³⁵



Auripigment, Rusko.³⁶

³³Orpiment Mineral Data

³⁴Atlas minerálů

³⁵Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

³⁶Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

Výskyt a získávání prvků

Arsen

Realgar

- ▶ Realgar, As_4S_4 , je jednoklonný minerál.³⁷
- ▶ Vzniká rozkladem jiných sulfidů, hlavně arsenopyritu.
- ▶ Na světle se pomalu rozkládá na směs auripigmentu (As_2S_3) a oxidu arsenitého.³⁸
- ▶ Je částečně rozpustný v kyselinách a hydroxidů draselném.



Realgar na kalcitu.³⁹

³⁷Realgar Mineral Data

³⁸Atlas minerálů


³⁹Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

Výskyt a získávání prvků

Arsen

Arsenolit

- ▶ Arsenolit, As_2O_3 (As_4O_6), je kubický, vysoce toxický minerál.⁴⁰
- ▶ Vzniká oxidací (zvětráváním) sulfidických minerálů arsenu.
- ▶ Je rozpustný ve vodě.⁴¹



Arsenolit, USA.⁴²



Arsenolit, Německo.⁴³

⁴⁰Arsenolite

⁴¹Atlas minerálů

⁴²Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

⁴³Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

Dobšinait

- ▶ Dobšinait, $\text{Ca}_3[\text{AsO}_4]_2 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$, je minerál objevený roku 2021 na Slovensku.⁴⁴
- ▶ Jedná se 23. původní minerál popsáný na slovenském území.
- ▶ Název je odvozen od města Dobšiná, v jehož blízkosti byl minerál objeven.⁴⁵
- ▶ Na objevu se podíleli i geologové z MU.⁴⁶
- ▶ Má bílou barvu, díky příměsím kobaltu bývá zbarven do světle růžové barvy.⁴⁷

⁴⁴Dobšinait, nově definovaný minerál z území Slovenska

⁴⁵Slovensko dalo svetu nový minerál – dobšinait

⁴⁶Brněnští vědci se podíleli na objevu nového minerálu

⁴⁷Brněnští vědci popsali nový minerál. Dobšinait našli na východním Slovensku

Výskyt a získávání prvků

Arsen

- ▶ Kovový arsen lze připravit žháním FeAs_2 nebo FeAsS bez přístupu vzduchu, arsen sublimuje a lze ho tedy snadno izolovat sublimací ve vakuu nebo ve vodíkové atmosféře.
- ▶ $\text{FeAsS} \xrightarrow{700\text{ }^\circ\text{C}} \text{FeS} + \text{As(g)}$
- ▶ Pražením na vzduchu vzniká přímo arsenik (As_2O_3), který také sublimuje.
- ▶ $\text{FeAsS} + 5\text{O}_2 \longrightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{As}_2\text{O}_3 + \text{SO}_2$
- ▶ Ten lze získat i jako vedlejší produkt při tavení koncentrátů mědi, zlata a olova.⁴⁸
- ▶ Hlavním světovým producentem arseniku je Čína.⁴⁹
- ▶ Tepelným rozkladem arseniku v nepřítomnosti vzduchu lze získat přímo arsen.

⁴⁸Arsenic Statistics and Information

⁴⁹Arsenic Data Sheet - Mineral Commodity Summaries 2020

Výskyt a získávání prvků

Antimon

- ▶ V zemské kůře je jeho koncentrace jen 0,2–0,5 ppm, v mořské vodě $0,3 \mu\text{g.l}^{-1}$.⁵⁰
- ▶ Je součástí více než 280 minerálů.⁵¹
- ▶ Nejdůležitější rudou je antimonit.

Minerál	Složení
Stibnit/Antimonit	Sb_2S_3
Livingstonit	HgSb_4S_8
Ullmanit	NiSbS
Jamesonit	$\text{FePb}_4\text{Sb}_6\text{S}_{14}$
Tetraedit	Cu_3SbS_3
Wolfsbergit	CuSbS_2
Valentinit	Sb_2O_3

⁵⁰Antimony Statistics and Information

⁵¹The mineralogy of Antimony

Výskyt a získávání prvků

Antimon

Antimonit (stibnit)

- ▶ Antimonit, Sb_2S_3 , je kosočtverečný minerál.⁵² Dříve byl označován jako *leštěnec antimonový*.
- ▶ Vzniká na nízkoteplotních hydrotermálních žilách.⁵³
- ▶ Je rozpustný v HNO_3 a horké HCl , v KOH černá.



Antimonit.⁵⁴



Antimonit, Rumunsko.⁵⁵

⁵²Stibnite

⁵³Atlas minerálů

⁵⁴Zdroj: Pepperdjane/Commons

⁵⁵Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

Výskyt a získávání prvků

Antimon


- ▶ Čína vyrábí více než 60 % světové produkce antimonu.⁵⁶
- ▶ V roce 2020 bylo vytěženo 111 000 tun rud antimonu.
- ▶ Sulfidické rudy jsou pražením na vzduchu převedeny na oxid:⁵⁷
- ▶
$$2\text{Sb}_2\text{S}_3 + 9\text{O}_2 \xrightarrow{1000^\circ\text{C}} 2\text{Sb}_2\text{O}_3 + 6\text{SO}_2$$
- ▶ Oxid se poté redukuje uhlím:
- ▶
$$\text{Sb}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \longrightarrow 2\text{Sb} + 3\text{CO}_2$$
- ▶
$$3\text{CO}_2 + 3\text{C} \longrightarrow 6\text{CO}$$
- ▶ Sulfid je možno redukovat i přímo pomocí železa:
- ▶
$$\text{Sb}_2\text{S}_3 + 3\text{Fe} \longrightarrow 2\text{Sb} + 3\text{FeS}$$
- ▶ Vysoce čistý antimon pro polovodičové aplikace se připravuje chemickou redukcí sloučenin s vysokou čistotou, např. SbCl_3 .
- ▶
$$2\text{SbCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{-6\text{HCl}} \text{Sb}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2 \longrightarrow 2\text{Sb} + 3\text{H}_2\text{O}$$

⁵⁶Antimony Statistics and Information

⁵⁷Antimony Production and Commodities

Výskyt a získávání prvků

Antimon



Světová produkce antimonu v letech 1900–2010.⁵⁸

⁵⁸Zdroj: Leyo/ Commons

Výskyt a získávání prvků

Bismut

- ▶ V zemské kůře je jeho koncentrace jen 0,2 ppm, v mořské vodě $0,02 \mu\text{g.l}^{-1}$.⁵⁹
- ▶ Je součástí zhruba 200 minerálů.
- ▶ Nejdůležitějšími rudami jsou bismut (Bi_2O_3) a bismutin (Bi_2S_3).
- ▶ Kovový bismut nacházíme v Německu, Austrálii, Japonsku i v Česku (Jáchymov).⁶⁰

Minerál	Složení
Bismut	Bi
Bismut	Bi_2O_3
Bismutin	Bi_2S_3
Bismutit	$\text{Bi}_2(\text{CO}_3)\text{O}_2$
Galenobismutit	PbBi_2S_4
Bismutocolumbit	$\text{Bi}(\text{Nb, Ta})\text{O}_4$
Francisit	$\text{Cu}_3\text{Bi}(\text{SeO}_3)_2\text{O}_2\text{Cl}$


⁵⁹Bismuth Statistics and Information

⁶⁰Bismuth

Výskyt a získávání prvků

Bismut

- ▶ Hlavním zdrojem bismutu jsou vedlejší produkty výroby olova, zinku a mědi.
- ▶ Ryzí bismut se vyskytuje v Austrálii, Bolívii a Číně.
- ▶ Sulfidické rudy se nejprve praží na vzduchu a poté se redukuje železem nebo uhlíkem (dřevěným uhlím).
- ▶ Důležitým zdrojem je i *recyklace*.
- ▶ V 70. letech 20. století cena bismutu prudce vzrostla, šlo o reakci na zvýšenou poptávku po bismutu jako aditiva do hliníku a ocelí.




Ingot bismutu.⁶¹

⁶¹Zdroj: Unconventional2/ Commons

Výskyt a získávání prvků

Bismut




Světová produkce a cena bismutu.⁶²

⁶²Zdroj: MaterialsScientist/ Commons

Výskyt a získávání prvků

Bismut

- ▶ Rudy bismutu se těží v Bolívii⁶³ a Číně.⁶⁴
- ▶ Hlavním producentem bismutu je Čína, kde se získává jako vedlejší produkt při výrobě wolframu.



Redukce oxidu bismutitého vodíkem.

⁶³Tazna Mine

⁶⁴Fankou Mine

Výskyt a získávání prvků

Bismut

Bismit

- ▶ Bismit, Bi_2O_3 , je jednoklonný, žlutozelený minerál.⁶⁵
- ▶ Vzniká jako oxidační produkt minerálů bismutu.⁶⁶
- ▶ Poprvé byl popsán v roce 1868 v Nevadě.



Bismit, Německo.⁶⁷

⁶⁵Bismite

⁶⁶Bismite Mineral Data

⁶⁷Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

Výskyt a získávání prvků

Bismut

Bismutin

- ▶ Bismutinit (bismutin, leštěnec bismutový), Bi_2S_3 , je kosočtverečný minerál.^{68,69}
- ▶ Vzniká v hydrotermálních žilách.⁷⁰
- ▶ Poprvé byl popsán v roce 1832 v bolívijských dolech.



Bismutin, Bolívie.⁷¹

⁶⁸Bismuthinite

⁶⁹Bismutin

⁷⁰Bismuthinite

⁷¹Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

Heyrovskýit

- ▶ Heyrovskýit, $\text{Pb}_6\text{Bi}_2\text{S}_9$, je cínově bílý, až šedý kosočtverečný minerál.⁷²
- ▶ Vzniká v hydrotermálních žilách.
- ▶ Poprvé byl popsán v západních Čechách.
- ▶ Jedná se o vzácný minerál, proto nemá komerční využití.



Heyrovskýit na křemeni, Rakovník.⁷³


⁷²Heyrovskýite

⁷³Zdroj: Marc Gravel/ Commons

Využití prvků

Arsen

- ▶ Hlavní využití arsenu je v slitinách s olovem a mědí.
- ▶ Malý podíl arsenu v slitině Pb/Sb zlepšuje vlastnosti mřížek používaných v akumulátorech.
- ▶ Arsen (0,5–2,0 %) také zlepšuje kulatost olověných broků.
- ▶ Sloučeniny arsenu se využívají v zemědělství jako herbicidy.
- ▶ Oxid arsenitý se používá k odbarvování lahvového skla.
- ▶ Z arsenitanu sodného se připravovaly lázně na odhmyzování ovcí a hovězího dobytka.



Methylarseničnan monosodný a kyselina dimethylarseničná se využívají jako herbicidy.

- ▶ **GaAs** je polovodič III/V používaný pro konstrukci PN přechodů v různých typech tranzistorů, díky vlastnostem GaAs mohou tyto tranzistory pracovat až do frekvence 250 GHz.
- ▶ Využívá se také při konstrukci fotovoltaických článků s vysokou účinností, např. pro vesmírné sondy.
- ▶ Má strukturu sfaleritu. Vyrábí se několika metodami:
- ▶ VGF (Vertical Gradient Freeze) procesem – tavenina je ve válcovém kelímku postupně ochlazována.⁷⁴
- ▶ Pomocí Czochralskiho metody.⁷⁵
- ▶ MOCVD:⁷⁶
 - ▶ $\text{Ga}(\text{CH}_3)_3 + \text{AsH}_3 \longrightarrow \text{GaAs} + 3 \text{CH}_4$


⁷⁴Control of the Vertical Gradient Freeze crystal growth process via backstepping

⁷⁵Liquid-seal Czochralski growth of gallium arsenide


⁷⁶Mechanism of gallium arsenide MOCVD

Využití prvků

Arsen



Krystalová struktura GaAs.⁷⁷



Zesilovač z GaAs.⁷⁸

⁷⁷Zdroj: Benjah-bmm27/ Commons

⁷⁸Zdroj: Epop/ Commons

- ▶ Antimon se využívá nejvíce jako zpomalovač hoření, dále jako součást slitin pro baterie, ložiska a pájky.
 - ▶ Přídavek antimonu do elektrod olověných akumulátorů zlepšuje jejich pevnost a nabíjecí charakteristiky.
 - ▶ Některé bezolovnaté pájky obsahují antimon.
- ▶ Oxid antimonitý má ve spojení s halogenovanými sloučeninami výrazné zhášecí účinky.
- ▶ Velice čistý antimon se využívá v polovodičovém průmyslu.
 - ▶ ZnSb vykazuje termoelektrické vlastnosti.
 - ▶ GaSb a InSb se využívají pro konstrukci detektorů a emitörů infračerveného záření, např. pro IR LED, tranzistory a LASERY.

Liteřina

- ▶ Liteřina, neboli písmový kov, je snadno tavitelná, ale stále dostatečně tvrdá slitina využívaná k odlévání tiskových písmen pro ruční sazbu.⁷⁹
- ▶ Její přibližné složení je: 50-86 % Pb, 3-20 % Sn a 11-30 % Sb.
- ▶ Využívala se od 15. století, její význam poklesl ve 20. století, s nástupem modernějších technik tisku.



Ligatura
fi odlitá
z liteřiny.⁸⁰



Quelle: Deutsche Fotothek

Výroba liter.⁸¹

⁷⁹Písmový kov

⁸⁰Zdroj: Daniel Ullrich/Commons

⁸¹Zdroj: Deutsche Fotothek/Commons

- ▶ Bismut má pouze několik komerčních aplikací:
- ▶ Díky podobné hustotě a nízké toxicitě ho lze využít jako náhradu olova ve střelivu, rybářských olůvcích a podobných aplikacích.
 - ▶ $\rho(\text{Pb}) = 11,3 \text{ g.cm}^{-3}$
 - ▶ $\rho(\text{Bi}) = 9,8 \text{ g.cm}^{-3}$
- ▶ Chlorid-oxid bismutitý (BiOCl) se využívá jako žlutý pigment v kosmetice.⁸²
- ▶ Oxid bismutitý se využívá ve sklářském a keramickém průmyslu a také při výrobě katalyzátorů a magnetů.⁸³
- ▶ Tellurid bismutitý, Bi_2Te_3 , má termoelektrické vlastnosti, využívá se při konstrukci Peltierových článků pro mobilní ledničky, chladiče CPU a také jako detektor NIR záření.

⁸²Bismuth Oxychloride-A Multifunctional Color Additive

⁸³Review of Bi_2O_3 based glasses for electronics and related applications ▶ ◀ ≡ ▶ ≡

Nízkotající slitiny

Slitina	Obchodní název	Teplota tání [°C]
Bi45Pb23Sn8In19Cd5	Slitina 47	47
Bi49Pb18Sn12In21	Slitina 58	58
Bi50Pb27Sn13Cd	Woodův kov 1	68-72
Bi50Pb25Sn12Cd	Woodův kov 2	60-64
Bi50Sn25Pb	Roseův kov	92-96
Bi55Pb32Sn	Molotův kov	96-98
Bi74Pb7Sn	Biola 1	104-463
Bi50Pb43Cd	Biola 3	80-84
Bi8Sn57Pb	Stabia 1	139-178
Pb45Bi10Sn	Stabia 4	97-169
Pb25Bi25Sn	Stabia 6	97-161
Pb73Bi23Sn3Zn	Plumbia 3	183-224
Pb57Bi8Sn	Plumbia 5	174-214

Hydridy prvků 15. skupiny

Vzorec	Název	T_t [°C]	T_v [°C]	Vzd. E–H [pm]	Úhel H–E–H
NH ₃	Amoniak	–78	–33	101,2	106,7
PH ₃	Fosfan	–133	–88	142,0	93,3
AsH ₃	Arsan	–116	–63	151,1	92,1
SbH ₃	Stiban	–88	–17	170,4	91,6
BiH ₃	Bismutan	-	17	-	90

- ▶ Všechny tři hydridy jsou nestabilní, jedovaté, bezbarvé plyny.
- ▶ Na rozdíl od amoniaku a fosfanu nejeví hydridy tendenci ke tvorbě oniových iontů MH_4^+ .
- ▶ Arsan a stiban jsou podobné fosfanu, ale ochotněji se rozkládají na prvky.
- ▶ Oba jsou extrémně toxické plyny.
- ▶ *Arsan*, AsH_3 , vzniká redukcí sloučenin arsenu nascentním vodíkem, viz As_2O_3 . Nebo redukcí chloridu arsenitého hydridy.⁸⁴
- ▶ $AsCl_3 + 3 LiAlH_4 \xrightarrow{Et_2O} AsH_3 + 3 LiCl + 3 AlH_3$
- ▶ Využívá se k výrobě GaAs.
- ▶ Lze jej přímo oxidovat kyslíkem na oxid arsenitý:
- ▶ $2 AsH_3 + 3 O_2 \longrightarrow As_2O_3 + 3 H_2O$

⁸⁴Synthesis of the hydrides of germanium, phosphorus, arsenic, and antimony by the solid-phase reaction of the corresponding oxide with lithium aluminum hydride

- ▶ *Stiban*, SbH_3 , zapáchá po zkažených vejcích.
- ▶ Připravuje se podobně jako arsan:
- ▶ $4 \text{SbCl}_3 + 3 \text{NaBH}_4 \longrightarrow 4 \text{SbH}_3 + 3 \text{NaCl} + 3 \text{BCl}_3$
- ▶ $\text{SbO}_3^{3-} + 3 \text{Zn} + 9 \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{SbH}_3 + 3 \text{Zn}^{2+} + 12 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Za pokojové teploty se autokatalyticky rozkládá (až explozivně):
- ▶ $2 \text{SbH}_3 \longrightarrow 3 \text{H}_2 + 2 \text{Sb}$
- ▶ Využívá se v polovodičovém průmyslu k dopování křemíku antimonem.
- ▶ *Bismutan*, BiH_3 , je nestabilní, rozkládá se již pod teplotou 0°C .⁸⁵
- ▶ Můžeme jej připravit disproportionací MeBiH_2 nebo Me_2BiH :
- ▶ $3 \text{MeBiH}_2 \xrightarrow{-45^\circ\text{C}} 2 \text{BiH}_3 + \text{BiMe}_3$
- ▶ Redukce pomocí tetrahydridoboritanu není v tomto případě použitelná.

⁸⁵Infrared Spectra of Antimony and Bismuth Hydrides in Solid Matrixes ▶ ◀ ≡ ▶ ≡


- ▶ *Oxid arsenitý*, As_2O_3 , dříve označovaný jako *arsenik* je bílý, toxický prášek. Je to nejdůležitější sloučenina arsenu.
- ▶ Získává se převážně třemi postupy:
 - ▶ Spalováním arsenu na vzduchu:
$$4\text{As} + 3\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{As}_2\text{O}_3$$
 - ▶ Hydrolýzou chloridu:
$$2\text{AsCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{As}_2\text{O}_3 + 6\text{HCl}$$
 - ▶ Pražením sulfidických rud:
$$2\text{As}_2\text{S}_3 + 9\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{As}_2\text{O}_3 + 6\text{SO}_2$$
- ▶ V plynném stavu je tvořen molekulami As_4O_6 .
- ▶ Stejná struktura je přítomna i v krystalickém oxidu v kubické formě.
- ▶ Kromě toho známe i monoklinickou formu tvořenou polymerními jednotkami $\{\text{As}_2\text{O}_3\}$.

Sloučeniny

Oxidy a kyseliny



Oxid arsenitý.⁸⁶



Molekula As_2O_3 .⁸⁷


⁸⁶Zdroj: Walkerma/Commons

⁸⁷Zdroj: Benjah-bmm27/Commons

Sloučeniny

Oxidy a kyseliny

Oxid arsenitý je výchozí sloučeninou pro mnoho dalších sloučenin arsenu.



Sloučeniny

Oxidy a kyseliny

- ▶ Otrava arsenikem se dokazovala pomocí **Marshovy zkoušky**.⁸⁸
- ▶ Autorem testu je britský chemik James Marsh, který tuto metodu publikoval v roce 1836.⁸⁹
- ▶ Ke vzorku se přidá kyselina sírová a zinek (bez stop arsenu).
- ▶ Reakcí zinku s kyselinou vzniká tzv. *nascentní vodík*, který zredukuje oxid arseničný na arsan.
- ▶ $\text{As}_2\text{O}_3 + 6\text{Zn} + 6\text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow 2\text{AsH}_3 + 6\text{ZnSO}_4 + 3\text{H}_2\text{O}$
- ▶ Vzniklý arsan je, po vyčištění a vysušení, veden skleněnou trubicí zahřívanou kahanem, kde se rozkládá za vzniku arsenového zrcátka.



James Marsh, 1794–1846.⁹⁰


⁸⁸Detecting Arsenic - The Marsh-Test

⁸⁹Account of a method of separating small quantities of arsenic from substances with which it may be mixed

⁹⁰Zdroj: W. T. Vincent/Commons

Sloučeniny

Oxidy a kyseliny



Aparatura na Marshovu zkoušku.⁹¹

⁹¹Zdroj: Hugh McMuigan/ Commons

Sloučeniny

Oxidy a kyseliny

- ▶ Tento důkaz byl použit v roce 1840 při soudním řízení s Marií Lafarge, podezřelou z otrávení manžela arsenikem.⁹²
- ▶ Marshův test provedl španělský toxikolog Mathieu Joseph Bonaventure Orfila.⁹³
- ▶ Událost byla zachycena v jednom z dílů seriálu *Dobrodružství kriminalistiky*.⁹⁴



Marie Lafarge.⁹⁵

⁹²Marie Lafarge

⁹³Mathieu Joseph Bonaventure Orfila

⁹⁴Dobrodružství kriminalistiky

⁹⁵Zdroj: Commons


- ▶ Arsen je možno dokázat i *Gutzeitovým testem*.⁹⁶
- ▶ Jeho autorem je německý chemik Max Adolf Gutzeit (1847–1915).
- ▶ Arsan připravíme podobně jako u Marshova testu:
- ▶ $6 \text{Zn} + 12 \text{HCl} + \text{As}_2\text{O}_3 \longrightarrow 2 \text{AsH}_3 + 6 \text{ZnCl}_2 + 3 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Ten je veden na filtrační papír navlhčený koncentrovaným roztokem AgNO_3 :
- ▶ $\text{AsH}_3 + 6 \text{AgNO}_3 \longrightarrow \text{Ag}_3\text{As} \cdot 3 \text{AgNO}_3 + 3 \text{HNO}_3$
- ▶ Vzniklý arsenid následně hydrolyzuje na kovové stříbro:
- ▶ $\text{Ag}_3\text{As} \cdot 3 \text{AgNO}_3 + 3 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 6 \text{Ag} + \text{H}_3\text{AsO}_3 + 3 \text{HNO}_3$

⁹⁶The Gutzeit test for arsenic

Sloučeniny

Oxidy a kyseliny

- ▶ *Oxid arseničný*, As_4O_{10} , je bílá, hygroskopická a silně toxická látka.
- ▶ Na vzduchu se rozplývá a je velmi dobře rozpustný ve vodě (230 g ve 100 g vody při 20 °C).
- ▶ Při 300 °C dochází k rozkladu za uvolnění kyslíku.
- ▶ Struktura je tvořena tetraedrickými a oktaedrickými jednotkami, které jsou propojeny přes vrcholy.
- ▶ Lze jej připravit zahříváním oxidu arsenitého na vzduchu nebo oxidací sulfidových rud.
- ▶ $\text{As}_2\text{O}_3 + \text{O}_2 \rightleftharpoons \text{As}_2\text{O}_5$
- ▶ $2\text{As}_2\text{S}_3 + 11\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{As}_2\text{O}_5 + 6\text{SO}_2$
- ▶ Je anhydridem kyseliny trihydrogenarseničné.




Koordinační polyedry
v As_4O_{10} .⁹⁷

⁹⁷Zdroj: Ben Mills/Commons

Sloučeniny


Oxidy a kyseliny



Krystalová struktura As₄O₁₀.⁹⁸

⁹⁸Zdroj: Ben Mills/Commons




- ▶ *Kyselina trihydrogenarsenitá*, H_3AsO_3 , je slabá kyselina ($\text{p}K_{a1} = 9,2$), která existuje pouze ve vodném roztoku.
- ▶ Vzniká rozpouštěním oxidu arsenitého ve vodě.
- ▶ Na rozdíl od kyseliny fosforité má molekula tvar pyramidy (C_{3v}).
- ▶ Tuto strukturu potvrzují i ^1H NMR spektra.
- ▶ Tautomer $\text{HAsO}(\text{OH})_2$ nebyl dosud izolován, ani charakterizován.



- ▶ *Meyerovou reakcí* vzniká kyselina methylarseničná:⁹⁹
- ▶ $\text{H}_3\text{AsO}_3 + \text{CH}_3\text{I} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{CH}_3\text{AsO}(\text{OH})_2 + \text{NaI} + \text{H}_2\text{O}$

⁹⁹Ueber einige anomale Reaktionen

- ▶ **Kyselina trihydrogenarseničná**, H_3AsO_4 , je bezbarvá, hygroskopická pevná látka.
- ▶ Je to trojsytná kyselina:




- ▶ Připravuje se oxidací As_2O_3 kyselinou dusičnou nebo rozpouštěním oxidu arseničného ve vodě.
- ▶ $\text{As}_2\text{O}_3 + \text{HNO}_3 + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{H}_3\text{AsO}_4 + \text{N}_2\text{O}_3$
- ▶ Krystalizací z vodného roztoku získáme hemihydrát.

- ▶ *Oxid antimonitý*, Sb_2O_3 , je bílá pevná látka.
- ▶ Připravuje se spalováním antimonu na vzduchu.
- ▶ $4\text{Sb} + 3\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{Sb}_2\text{O}_3$
- ▶ Pro výrobu antimonu se získává pražením sulfidu:
- ▶ $2\text{Sb}_2\text{S}_3 + 9\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{Sb}_2\text{O}_3 + 6\text{SO}_2$
- ▶ Je amfoterní, rozpouštěním v alkalických hydroxidech vznikají antimonitany:
- ▶ $\text{Sb}_2\text{O}_3 + 2\text{NaOH} \longrightarrow 2\text{NaSbO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- ▶ V plynném stavu vytváří molekuly Sb_4O_6 s adamantoidní strukturou (podobně jako P_4O_6).
- ▶ *Oxid antimoničný*, Sb_2O_5 , je žlutá pevná látka.
- ▶ Připravuje se hydrolýzou chloridu antimonitého roztokem amoniaku nebo oxidací antimonu koncentrovanou kyselinou dusičnou.
- ▶ Antimoničnany jsou tvořeny oktaedry SbO_6 , často propojenými přes vrcholy.

Sloučeniny

Oxidy a kyseliny

- ▶ Směsný oxid Sb_2O_4 je tvořen antimonem v oxidačním čísle III i V.
- ▶ V přírodě se vyskytuje jako minerál cervantit.¹⁰⁰
- ▶ Můžeme ho připravit buď částečnou oxidací oxidu antimonitého vzduchem nebo tepelným rozkladem oxidu antimoničného:
- ▶ $2\text{Sb}_2\text{O}_3 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{Sb}_2\text{O}_4$
- ▶ $2\text{Sb}_2\text{O}_5 \xrightarrow{800^\circ\text{C}} 2\text{Sb}_2\text{O}_4 + \text{O}_2$



Krystalová struktura Sb_2O_4 .¹⁰¹

¹⁰⁰Cervantite

¹⁰¹Zdroj: MaterialsScientist/ Commons

Sloučeniny

Oxidy a kyseliny

- ▶ *Oxid bismutitý*, Bi_2O_3 , je žlutý prášek.
- ▶ Připravuje se termickým rozkladem bazického dusičnanu nebo hydroxidu bismutitého.
- ▶ $2 [4 \text{BiNO}_3(\text{OH})_2\text{BiO}(\text{OH})] \longrightarrow 5 \text{Bi}_2\text{O}_3 + 8 \text{NO}_2 + 9 \text{H}_2\text{O} + 2 \text{O}_2$
- ▶ Za laboratorní teploty je stabilní monoklinická forma $\alpha\text{-Bi}_2\text{O}_3$ s vrstevnatou strukturou.¹⁰²
- ▶ Při zahřátí nad 717°C přechází na defektní kubickou modifikaci $\delta\text{-Bi}_2\text{O}_3$.
- ▶ β modifikace má strukturu fluoritu a může obsahovat i Bi^{V} , kdy dochází k obsazení vakancí v krystalové struktuře anionty O^{2-} .
- ▶ *Oxid bismutičný*, Bi_2O_5 , je tmavěčervená pevná látka.
- ▶ Je nestabilní, snadno uvolňuje kyslík.
- ▶ Bismutičnany se využívají při stanovení manganu v oceli, kdy mangan oxidují na manganistan. Koncentrace manganistanu se stanovuje kolorimetricky.

¹⁰²On the Structure of Bismuthsesquioxide

Sloučeniny

Sulfidy a další chalkogenidy

- ▶ Sulfidů arsenu známe poměrně velké množství.
- ▶ *Realgar*, As_4S_4 viz minerály arsenu.
- ▶ *Auripigment*, As_2S_3 , je tmavě-žlutá, nerozpustná látka.
- ▶ Dříve se využíval jako pigment (*královská žlutá*).¹⁰³
- ▶ Je to V/VI polovodič typu p, vykazuje i fotorezistivní vlastnosti. Díky velikosti zakázaného pásu (2,7 eV) propouští infračervené záření v oblasti 900–16 000 cm^{-1} .
- ▶ Využívá se pro konstrukci optických prvků pro IR spektrometry.



Auripigment.¹⁰⁴

¹⁰³Žlutě

¹⁰⁴Zdroj: Géry PARENT/ Commons

Sloučeniny

Sulfidy a další chalkogenidy

- ▶ *Sulfid arseničný*, As_2S_5 , je oranžová, nerozpustná látka.
- ▶ Lze ho připravit srážením roztoků arseničných solí sulfanem nebo zahříváním arsenu se sírou.
- ▶ Ve vařící vodě hydrolyzuje za vzniku kyseliny arsenité:
- ▶
$$\text{As}_2\text{S}_5 + 6 \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{100^\circ\text{C}} 2 \text{H}_3\text{AsO}_3 + 2 \text{S} + 3 \text{H}_2\text{S}$$
- ▶ S roztoky alkalických sulfidů poskytuje thioarseničnany:
- ▶
$$2 \text{As}_2\text{S}_5 + 6 \text{Na}_2\text{S} \longrightarrow 4 \text{Na}_3\text{AsS}_4$$




SEM snímek vulkanického $\text{As}_2\text{S}_5^{105}$

¹⁰⁵Zdroj: Ppm61/ Commons

Sloučeniny

Sulfidy a další chalkogenidy

- ▶ *Sulfid antimonitý*, Sb_2S_3 , je šedá až černá pevná látka.
- ▶ V přírodě se vyskytuje jako minerál stibnit.
- ▶ Lze jej připravit zahříváním antimonu se sírou nebo srážením roztoků antimonitých solí sulfanem.
- ▶ Reakce na mokré cestě je využívána jako gravimetrická metoda stanovení antimonu.




Sulfid antimonitý.¹⁰⁶

¹⁰⁶Zdroj: Ondřej Mangl/ Commons

- ▶ Všechny halogenidy MX_3 jsou stabilní a komerčně dostupné.
- ▶ Fluoridy lze snadno připravit reakcí oxidu s HF. V případě arsenu nejlépe v bezvodém prostředí:
- ▶
$$M_2O_3 + 6 HF \xrightarrow{H_2SO_4 / CaF_2} 2 MF_3 + 3 H_2O$$
- ▶ Ostatní halogenidy lze připravit reakcí kovu nebo oxidu s halogenem.

MX_3	$T_t [^{\circ}C]$	$T_v [^{\circ}C]$	MX_3	$T_t [^{\circ}C]$	$T_v [^{\circ}C]$
AsF ₃	-8,5	60,4	SbBr ₃	96,6	288,0
AsBr ₃	-12,2	130,2	SbI ₃	170,5	401,6
AsCl ₃	31,1	221,0	BiF ₃	649,0	-
AsI ₃	146,0	403,0	BiCl ₃	227,0	447,0
SbF ₃	292,0	376,0	BiBr ₃	219,0	462,0
SbCl ₃	73,4	223,5	BiI ₃	408,6	542,0


- ▶ Známe všechny fluoridy a chlorid antimonický.
- ▶ Chlorid arseničný se rozkládá při teplotě $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$. Lze ho připravit oxidací chloridu arsenitého kapalným chlorem při teplotě $-105\text{ }^{\circ}\text{C}$ v přítomnosti UV záření.¹⁰⁷



MX_5	$T_t\text{ [}^{\circ}\text{C]}$	$T_v\text{ [}^{\circ}\text{C]}$
AsF_5	$-79,8$	$-52,8$
AsCl_5	Rozklad při teplotě $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$	
SbF_5	$8,3$	$149,5$
SbCl_5	$2,8$	$140,0$
BiF_5	$151,4$	$230,0$


¹⁰⁷ Arsenic Pentachloride, AsCl_5

- SbCl_5 vratně přechází při ochlazení pod $-55\text{ }^\circ\text{C}$ na dimerní formu:



- Přídavkem chloridu přechází hexachloroantimoničnan:
- $\text{SbCl}_5 + \text{KCl} \longrightarrow \text{KSbCl}_6$
- Reakcí s bezvodým HF vzniká fluorid antimoničný:
- $\text{SbCl}_5 + 5 \text{HF} \longrightarrow \text{SbF}_5 + 5 \text{HCl}$
- Reakcí fluoridu antimoničného s fluorem a kyslíkem vzniká hexafluoroantimoničnan dioxygenylu:
- $2 \text{SbF}_5 + \text{F}_2 + 2 \text{O}_2 \longrightarrow 2 [\text{O}_2]^+ [\text{SbF}_6]^-$



- ▶ Kyselina hexafluoroantimoničná, $[H_2F][SbF_6]$, vzniká reakcí fluoridu antimoničného s fluorovodíkem:
- ▶ $SbF_5 + 2 HF \rightleftharpoons H_2F^+ + SbF_6^-$
- ▶ Je to nejsilnější známá kyselina, označuje se jako *superkyselina*.



Model kyseliny hexafluoroantimoničné.¹⁰⁸

¹⁰⁸Zdroj: DFliyerz/Commons



- Anion SbF_6^- , na rozdíl od SbCl_5 , ochotně vytváří větší částice asociací pomocí fluoridu, např. $[\text{Sb}_2\text{F}_{11}]^-$ nebo $[\text{Sb}_3\text{F}_{16}]^-$.



- ▶ *Magická kyselina* – vzniká reakcí fluoridu antimonického s kyselinou fluorsírovou.¹⁰⁹
- ▶ Dochází ke koordinaci volného elektronového páru kyslíku do volného orbitalu na antimonu.¹¹⁰
- ▶ Tuto reakci lze dobře monitorovat pomocí ^{19}F NMR.
- ▶ Při nižší koncentraci SbF_5 vzniká monoaddukt, při vyšší začíná vznikat adukt 1:2.
- ▶ $\text{SbF}_5 + 2 \text{HSO}_3\text{F} \longrightarrow [\text{SbF}_5 \cdot \text{SO}_3\text{F}]^- + \text{H}_2\text{SO}_3\text{F}^+$
- ▶ $2 \text{SbF}_5 + 2 \text{HSO}_3\text{F} \longrightarrow [2 \text{SbF}_5 \cdot \text{SO}_3\text{F}]^- + \text{H}_2\text{SO}_3\text{F}^+$
- ▶ Kyselost tohoto systému lze zvýšit přidávkem tří molů SO_3 .
- ▶ Roztoky $\text{SbF}_5/\text{HSO}_3\text{F}/\text{SO}_3$ se označují jako superkyselá média.

¹⁰⁹A Basic History of Acid-From Aristotle to Arnold

¹¹⁰Fluorinated superacidic systems



- ▶ *Hammettova kyselostní funkce* (H_0) – používá se k vyjádření kyselosti koncentrovaných roztoků silných kyselin a superkyselin.
- ▶ Lze ji zjistit pomocí interakce kyseliny s velmi slabou bází:
- ▶
$$H_0 = pK_{BH^+} + \log \frac{[B]}{[BH^+]} = -\log(a_{H^+} \frac{\gamma_B}{\gamma_{BH^+}})$$

Kyselina sírová	−12,0
Kyselina chloristá	−12,78
Kyselina trifluormethansulfonová	−14,1
Fluorovodík	−15,1
Kyselina fluorsírová	−15,1
Magická kyselina	−19,2
Kyselina hexafluorantimoničná	−21 – −23

- ▶ **Fluorid bismutičný**, BiF_5 , je jedna z mála sloučenin bismutu v oxidačním stavu V.
- ▶ Je to velmi silné fluorační a oxidační činidlo.
- ▶ Lze ho připravit fluorací BiF_3 pomocí fluoru nebo fluoridu chloritého:¹¹¹
- ▶ $\text{BiF}_3 + \text{F}_2 \xrightarrow{500^\circ\text{C}} \text{BiF}_5$
- ▶ $\text{BiF}_3 + \text{ClF}_3 \xrightarrow{350^\circ\text{C}} \text{BiF}_5 + \text{ClF}$
- ▶ Dokáže velmi účinně fluorovat jiné sloučeniny:¹¹²
- ▶ $\text{BiF}_5 + \text{UF}_4 \xrightarrow{150^\circ\text{C}} \text{BiF}_3 + \text{UF}_6$
- ▶ $3 \text{BiF}_5 + \text{Br}_2 \xrightarrow{180^\circ\text{C}} 3 \text{BiF}_3 + 2 \text{BrF}_3$
- ▶ $3 \text{BiF}_5 + \text{S} \xrightarrow{25^\circ\text{C}} 3 \text{BiF}_3 + \text{SF}_6$
- ▶ Krystalová struktura je tvořena řetězcí oktaedrů BiF_6 spojenými vrcholy v poloze trans.¹¹³

¹¹¹Synthesis and properties of pentavalent antimony and bismuth fluorides

¹¹²Preparation, Properties and Reactions of Bismuth Pentafluoride


¹¹³Zur Kristallstruktur von Wismutpentafluorid

Sloučeniny

Halogenidy MX_5



Řetězec oktaedrů BiF_6 .¹¹⁴



Uspořádání řetězců v krystalu BiF_5 .¹¹⁵

¹¹⁴Zdroj: Ben Mills/Commons

¹¹⁵Zdroj: Ben Mills/Commons

- ▶ Tendence ke tvorbě směsných halogenidů je nižší než u fosforu.
- ▶ Výměna halogenidů mezi AsF_3 a AsCl_3 (za laboratorní teploty) byla prokázána pomocí NMR a Ramanovy spektroskopie.
- ▶ U pentahalogenidů je tvorba směsných sloučenin běžnější.
- ▶ $2 \text{AsCl}_3 + 2 \text{AsF}_3 + \text{Cl}_2 \longrightarrow 2 [\text{AsCl}_4][\text{AsF}_6]$
- ▶ $\text{AsCl}_3 + \text{SbCl}_5 + \text{Cl}_2 \longrightarrow [\text{AsCl}_4][\text{SbCl}_6]$

Sloučeniny

Vanadičnan bismutitý

- ▶ Vanadičnan bismutitý, BiVO_4 .
- ▶ Světle žlutý prášek, je studován jako fotokatalyzátor pro rozklad vody viditelným světlem.¹¹⁶
- ▶ Využívá se jako žlutý pigment, připravuje se srážením nebo reakcí Bi_2O_3 a V_2O_5 v pevné fázi.
- ▶ V přírodě se vyskytuje ve formě vzácných minerálů: dreyeritu,¹¹⁷ clinobisvanitu¹¹⁸ a pucheritu¹¹⁹.



Vanadičnan bismutitý.¹²⁰

¹¹⁶Visible-light driven heterojunction photocatalysts for water splitting – a critical review

¹¹⁷Dreyerite

¹¹⁸Clinobisvanite


¹¹⁹Pucherite

¹²⁰Zdroj: FK1954/Commons

Sloučeniny


Organokovové sloučeniny

- ▶ Všechny tři prvky vytváří organokovové sloučeniny v oxidačních číslech III a V.
- ▶ Stabilita klesá se stoupající hmotností prvku.
- ▶ Sloučeniny antimonu a bismutu nejsou tak široce prostudovány jako sloučeniny arsenu.
- ▶ První organokovovou sloučeninou arsenu byl kakodyl, neboli tetramethyldiarsan.
- ▶ Arsen vytváří arsonové a arsinové kyseliny (podobně jako fosfor).




Sloučeniny


Organokovové sloučeniny



arsabenzen




1-arsanaftalen



9-arsaanthracen

- ▶ Známe řadu aromatických sloučenin, ve kterých má arsen oxidační číslo III a koordinační číslo 2.
- ▶ *Arsabenzen* je bezbarvý plyn, odolný vůči hydrolýze slabými kyselinami a zásadami.
- ▶ Připravuje se z 1,4-pentadiynu:¹²¹




¹²¹Chemistry of heterobenzenes containing group 15 element

Sloučeniny

Organokovové sloučeniny

- Molekula arsabenzenu je planární.
- *Stibabenzen* se připravuje podobně jako arsabenzen.¹²²
- Posledním členem řady je *bismabenzen*, ten je ale nestabilní a dosud nebyl izolován v čistém stavu.
- Byly připraveny jeho deriváty, které jsou stabilnější.¹²³



Délky vazeb a vazebné úhly benzenu a heterobenzenech.¹²⁴


¹²²Stibabenzene

¹²³Chemists create stable bismuth benzene derivative

¹²⁴Zdroj: Sponk/Commons

Sloučeniny


Organokovové sloučeniny



Stabilní derivát bismabenzenu¹²⁵

¹²⁵Chemists create stable bismuth benzene derivative

- ▶ Arsenité sloučeniny jsou toxičtější než arseničné.
- ▶ Atoxyl byl využíván při léčbě spavé nemoci.
- ▶ Některé organické sloučeniny arsenu byly dříve využívány při léčbě syfilidy.
- ▶ Sloučeniny arsenu se využívají při léčbě africké trypanosomiasy.¹²⁶



¹²⁶The development of drugs for treatment of sleeping sickness: a historical review

- ▶ Kovový antimon neovlivňuje lidské zdraví.
- ▶ Oxid antimonitý a další nerozpustné antimonité sloučeniny jsou nebezpečné při vdechování.
- ▶ Otrava antimonitými sloučeninami je podobná otravě arsenikem.
- ▶ Oxid antimonitý je také potenciálně karcinogenní.¹²⁷

¹²⁷Cobalt and antimony: genotoxicity and carcinogenicity

Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec

`hugo@chemi.muni.cz`

`https://is.muni.cz/www/moravec/`