

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz

[illegible]

57 La lanthanum	58 Ce cerium	59 Pr praseodymium	60 Nd neodymium	61 Pm promethium	62 Sm samarium	63 Eu europium	64 Gd gadolinium	65 Tb terbium	66 Dy dysprosium	67 Ho holmium	68 Er erbium	69 Tm thulium	70 Yb ytterbium	71 Lu lutetium
89 Ac actinium	90 Th thorium	91 Pa protactinium	92 U uranium	93 Np neptunium	94 Pu plutonium	95 Am americium	96 Cm curium	97 Bk berkelium	98 Cf californium	99 Es einsteinium	100 Fm fermium	101 Md mendelevium	102 No nobelium	103 Lr lawrencium


For notes and updates to this table, see www.iupac.org. This version is dated 28 November 2016.
Copyright © 2016 IUPAC, the International Union of Pure and Applied Chemistry.

Platinové kovy

- ▶ Ru, Rh, Pd, Os, Ir a Pt
- ▶ Patří k nejvzácnějším prvkům na Zemi.¹
- ▶ *Lehké platinové kovy* mají hustotu okolo 12 g.cm^{-3} : Ru, Rh a Pd.
- ▶ *Těžké platinové kovy* mají hustotu okolo 22 g.cm^{-3} : Os, Ir a Pt.
- ▶ Jejich výroba je vždy spojena s výrobou jiného kovu, protože jsou příměsí rud.

Lehké platinové kovy	Ru	Rh	Pd
Hustota [g.cm^{-3}]	12,41	12,41	12,02
Těžké platinové kovy	Os	Ir	Pt
Hustota [g.cm^{-3}]	22,59	22,56	21,45

¹Platinové kovy

	<i>Ruthenium</i>	<i>Rhodium</i>	<i>Palladium</i>
El. konfigurace	$4d^7 5s^1$	$4d^8 5s^1$	$4d^{10}$
Teplota tání [°C]	2334	1964	1555
Teplota varu [°C]	4150	3695	2963
Objeven	1844	1804	1802
Vzhled	stříbrno-bílý ² 	stříbrno-bílý ³ 	stříbrno-bílý ⁴ 

²Zdroj: Alchemist-hp/Commons

³Zdroj: Alchemist-hp/Commons

⁴Zdroj: Jurii/Commons

Chemické a fyzikální vlastnosti

Ušlechtilé a neušlechtilé kovy

Elektroda	E^0 [V]
Li/Li ⁺	-3,045
Cs/Cs ⁺	-3,026
Rb/Rb ⁺	-2,98
K/K ⁺	-2,931
Ba/Ba ²⁺	-2,912
Sr/Sr ²⁺	-2,899
Na/Na ⁺	-2,714
Mg/Mg ²⁺	-2,363
Al/Al ³⁺	-1,66
Zn/Zn ²⁺	-0,762
Fe/Fe ²⁺	-0,440
Co/Co ²⁺	-0,277
Ni/Ni ²⁺	-0,250
H/H⁺	0,000

Elektroda	E^0 [V]
Bi/Bi ³⁺	0,200
Ru/Ru ²⁺	0,300
Cu/Cu ²⁺	0,337
Cu/Cu ⁺	0,521
W/W ⁶⁺	0,68
Os/Os ²⁺	0,69
Ag/Ag ⁺	0,799
Pb/Pb ⁴⁺	0,800
Hg/Hg ²⁺	0,851
Ir/Ir ³⁺	1,16
Pt/Pt ²⁺	1,200
Au/Au ³⁺	1,498
Au/Au ⁺	1,691

Chemické a fyzikální vlastnosti

Ušlechtilé a neušlechtilé kovy

- ▶ Čím má kov negativnější potenciál, tím se snadněji oxiduje a má silnější redukční schopnosti.
- ▶ Cu/Cu^{2+} : 0,337 V
- ▶ Fe/Fe^{2+} : -0,440 V



Železo v roztoku modré skalice.⁵

⁵Zdroj: H. Hoffmeister/Commons

Ruthenium

- ▶ Krystaluje v nejtěsnějším hexagonálním uspořádání.
- ▶ Má sedm stabilních izotopů a 27 radioizotopů.
 - ▶ ^{96}Ru ; 5,54 %
 - ▶ ^{98}Ru ; 1,87 %
 - ▶ ^{99}Ru ; 12,76 % – využívá se v NMR spektroskopii ($I = \frac{3}{2}$)⁶
 - ▶ ^{100}Ru ; 12,60 %
 - ▶ ^{101}Ru ; 17,06 %
 - ▶ ^{102}Ru ; 31,55 %
 - ▶ ^{104}Ru ; 18,62 %
- ▶ Na vzduchu je stálé.
- ▶ Vytváří sloučeniny v rozmezí oxidačních čísel –II až VIII.
- ▶ Běžné oxidační stavy jsou II, III a IV.
- ▶ Důležitou sloučeninou je černý *chlorid ruthenitý*, RuCl_3 , který je výchozí látkou pro syntézu sloučenin ruthenia.

⁶⁹⁹Ru NMR Spectroscopy of Organometallic and Coordination Complexes of Ruthenium(II)



Chemické a fyzikální vlastnosti

Rhodium

Rhodium

- Krystaluje v nejtěsnějším hexagonálním uspořádání.
- Má jeden stabilní izotop ^{103}Rh a 33 radioizotopů.
- Jeho elektronová konfigurace je $[\text{Kr}] 4d^8 5s^1$.
- Na vzduchu je stálé, je velice odolné vůči působení kyselin, vč. lučavky královské.
- Za červeného žáru reaguje pomalu s kyslíkem a halogeny.
- Vytváří sloučeniny v rozmezí oxidačních čísel 0 až VI.
- Běžným a nejstabilnějším oxidačním stavem je III.

0	$\text{Rh}_4(\text{CO})_{12}$
1	$\text{RhCl}(\text{PH}_3)_2$
2	$\text{Rh}_2(\text{O}_2\text{CCH}_3)_4$
3	$\text{RhCl}_3, \text{Rh}_2\text{O}_3$
4	RhO_2
5	$\text{RhF}_5, \text{Sr}_3\text{LiRhO}_6$
6	RhF_6




Palladium

- ▶ Palladium krystaluje v plošně centrované kubické mřížce (fcc).
- ▶ Přírodní palladium se skládá ze šesti stabilních izotopů a jednoho nestabilního.
 - ▶ ^{102}Pd ; 1,02 %
 - ▶ ^{104}Pd ; 11,14 %
 - ▶ ^{105}Pd ; 22,33 %
 - ▶ ^{106}Pd ; 27,33 %
 - ▶ ^{107}Pd ; stopová množství; $6,5 \times 10^6$ let
 - ▶ ^{108}Pd ; 26,46 %
 - ▶ ^{110}Pd ; 11,72 %
- ▶ Dále známe 23 radioizotopů.
- ▶ Palladium se rozpouští v horké kyselině dusičné i lučavce královské.
- ▶ Reaguje s taveninami alkalických hydroxidů.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Palladium

- ▶ Běžná oxidační čísla jsou II a IV, oxidační stav IV je ale stabilnější u platiny.
- ▶ V oxidačním čísle IV známe řadu komplexů s halogenidy, $[\text{PdX}_6]^{2-}$.
- ▶ Hexachloropalladičité komplexy, $[\text{PdCl}_6]^{2-}$, lze získat rozpouštěním palladia v lučavce královské.
- ▶ Komplexy v oxidačním čísle II mají čtvercovou geometrii a jsou diamagnetické (nízkospinové).
- ▶ Je reaktivnější než platina, za vysokých teplot reaguje s kyslíkem, fluorem a chlorem.
- ▶
$$\text{PdO} \xleftarrow{\text{O}_2, 350^\circ\text{C}} \text{Pd} \xrightarrow{\text{Cl}_2, 500^\circ\text{C}} \text{PdCl}_2$$



Krystalová struktura $\alpha\text{-PdCl}_2$.⁷

Výskyt a získávání

Ruthenium

- ▶ Ruthenium je velmi vzácné, jeho koncentrace v zemské kůře je jen 100 ppt.
- ▶ Vyskytuje se společně s dalšími platinovými kovy.
- ▶ Komerčně významná množství se nacházejí i v minerálu pentlanditu⁸ ($(\text{Fe}, \text{Ni})_9\text{S}_8$) a v pyroxenitech.⁹
- ▶ V roce 2021 byla roční produkce ruthenia 472 tun.¹⁰
- ▶ Světové zásoby jsou odhadovány na 5 000 tun.
- ▶ Stejně jako jiné platinové kovy se získává ruthenium jako vedlejší produkt výroby niklu a mědi.
- ▶ Během elektrolytického čištění přecházejí platinové kovy do anodových kalů.
- ▶ Kovy jsou převáděny do roztoku, nejpoužívanější metoda je mineralizace pomocí peroxidu sodného (Na_2O_2).

⁸Pentlandit

⁹Pyroxenity

¹⁰Platinum-group metals

Výskyt a získávání

Ruthenium


- ▶ Produkt mineralizace se rozpustí v lučavce královské.
- ▶ Ru, Os, Rh a Ir zůstávají nerozpuštěny a jsou separovány.
- ▶ Rhodium se získá reakcí s taveninou hydrogensíranu sodného.
- ▶ Zbylá pevná fáze je rozpuštěna reakcí s oxidem sodným, Na_2O , čímž se získá roztok obsahující Ru a Os a pevná látka obsahující iridium.
- ▶ Oba kovy jsou oxidovány na MO_4 a separovány destilací, extrakcí nebo srážením $(\text{NH}_4)_3\text{RuCl}_6$.¹¹
- ▶ Kovové ruthenium je získáno redukcí vodíkem.

¹¹The Platinum Metals.

Výskyt a získávání

Rhodium

- ▶ Koncentrace rhodia v zemské kůře je jen okolo 0,2 ppb.
- ▶ Koncentrace v meteoritech je vyšší, přibližně 1 ppb.
- ▶ Vyskytuje se společně s dalšími platinovými kovy.
- ▶ Komerčně se získává z platinových rud.
- ▶ Roční celosvětová produkce se pohybuje pod 30 tun, hlavními producenty jsou Jižní Afrika a Rusko.¹²



Vývoj ceny kovového rhodia.¹³

¹²Platinum-group metals

¹³Zdroj: Materialscentist/ Commons

- ▶ Koncentrace palladia v zemské kůře je jen okolo 15 ppb.
- ▶ V přírodě se nachází i v ryzím stavu ve formě slitin se zlatem a platinovými kovy.
- ▶ Hlavním průmyslovým zdrojem jsou rudy niklu a mědi.
- ▶ Celosvětová produkce palladia do roku 2021 byla 214 tun.¹⁴
- ▶ Hlavními výrobci jsou Rusko a Jižní Afrika.
- ▶ Lze ho získat i z vyhořelého jaderného paliva.¹⁵

¹⁴Platinum-group metals

¹⁵Prospects for the Use of Palladium from NPP Spent Nuclear Fuel and Ways to Design the Technology of its Recovery at a Radiochemical Enterprise

- ▶ Hlavní využití nachází ruthenium v elektronice a katalýze.
- ▶ V elektronice se ruthenium používá např. pro konstrukci kondenzátorů MIM (Metal-Insulator-Metal) v nových typech DRAM pamětí.¹⁶
- ▶ Také se slévá s platinou a palladiem, protože zlepšuje jejich vlastnosti.





RAM modul.¹⁷

¹⁶Atomic layer deposition of Ruthenium thin films using oxygen

¹⁷Zdroj: Smial/Commons

- Roztoky chloridu ruthenitého, RuCl_3 , jsou velmi účinné katalyzátory pro metatезi olefinů a hydrogenační reakce.



- ▶ Hlavní využití rhodia je v katalýze.
- ▶ Využívá se jako katalyzátor (trojčinný, nesprávně třícestý) v automobilech, kde zajišťuje rozklad oxidů dusíku, oxidaci CO a uhlovodíků.¹⁸
- ▶ $2 \text{NO}_x \longrightarrow x \text{O}_2 + \text{N}_2$
- ▶ $2 \text{CO} + \text{O}_2 \longrightarrow 2 \text{CO}_2$
- ▶ Dále katalyzuje velké množství průmyslových procesů, např. výrobu kyseliny octové (Monsanto proces, viz další strana).



Automobilový katalyzátor.¹⁹


¹⁸Why Rhodium in Automotive Three-Way Catalysts?

¹⁹Zdroj: Stahlkocher/ Commons

Monsanto proces

- ▶ Průmyslová metoda výroby kyseliny octové z methanolu.
- ▶ Byl vyvinut v roce 1960 společností BASF.
- ▶ Methanol reaguje s oxidem uhelnatým:²⁰
- ▶
$$\text{CH}_3\text{OH} + \text{CO} \xrightarrow[3-6 \text{ MPa}]{150-200^\circ\text{C}} \text{CH}_3\text{COOH}$$
- ▶ Proces je katalyzován komplexy rhodia a jodu.
- ▶ Tento katalyzátor má kromě vysoké ceny nevýhodu i v tom, že katalyzuje vedlejší reakci:
- ▶
$$\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2$$
- ▶ Tím se snižuje koncentrace oxidu uhelnatého v reakční směsi.
- ▶ Methanol se získává buď ze syntézního plynu (CO , CO_2 , H_2) nebo lze využít i zpracování biomasy.


²⁰The Monsanto process



Monsanto proces.²¹


²¹Zdroj: Eschenmoser/Commons

- ▶ Hlavní využití palladia je v katalýze.
- ▶ Společně s rhodiem a platinou je součástí automobilových katalyzátorů.
- ▶ Je součástí Lindlarova katalyzátoru, který se využívá k hydrogenaci alkynů. Produktem je *cis*-alken.²²
- ▶ Katalyzátor se skládá z palladia (5 %), které je immobilizováno na uhličitanu vápenatém. Katalyzátor je otráven malým množstvím octanu olovnatého.



²²Reagent Friday: Lindlar's Catalyst


- ▶ Katalyzátory s palladiem se využívají pro reakce, při kterých dochází ke vzniku vazby C–C .
- ▶ V roce 2010 byla udělena Nobelova cena za chemii za využití katalyzátorů na bázi palladia v organické syntéze.
- ▶ “for palladium-catalyzed cross couplings in organic synthesis”²³




²³The Nobel Prize in Chemistry 2010

Využití

Palladium



²⁴Zdroj: Jonathan.Raybin/Commons




Tris(dibenzylidenacetone)dipalladium(0), příklad katalyzátoru na bázi palladia.²⁵

²⁵Zdroj: Ben Mills/Commons

Herrmanův katalyzátor

- *Heckova reakce* je organická reakce nenasyceného halogenidu s alkenem, za vzniku vazby C–C.²⁶
- Tato reakce je katalyzována organokovovým katalyzátorem obsahujícím palladium.
- Připravuje se reakcí octanu palladnatého s aromatickým fosfinem:²⁷
- $2 \text{Pd}(\text{OAc})_2 + 2 \text{P}(\text{o-tolyl})_3 \longrightarrow \text{Pd}_2(\text{OAc})_2[\text{P}(\text{C}_6\text{H}_4-2\text{-CH}_2)(\text{o-tolyl})_2]_2$




Struktura Herrmanova katalyzátoru.²⁸

²⁶Heck Reaction


²⁷Palladacycles: Efficient New Catalysts for the Heck Vinylation of Aryl Halides

²⁸Zdroj: Smokefoot/ Commons



Heckova reakce.²⁹

- ▶ Další významnou aplikací palladia jsou keramické kondenzátory pro elektroniku.³⁰
- ▶ Palladium, příp. slitina palladia a stříbra se používá ke tvorbě elektrod a přívodních vodičů, tyto kondenzátory se označují jako PME (Precious Metal Electrodes) nebo NME (Noble Metal Electrodes).



Elektrody u SMD součástek.³¹

³⁰Introduction to Ceramic Capacitors

³¹Zdroj: Elcap/Commons

Vodíkové hospodářství

- ▶ Snaha o snížení množství uhlíku v ekonomice.³²
- ▶ Zásoby vodíku na Zemi jsou prakticky nevyčerpatelné.
- ▶ Vodík se následně přeměňuje na ekologicky nezávadnou vodu za uvolnění energie.
- ▶ $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$
- ▶ I když se už vodík v praxi využívá, je stále spousta problémů nevyřešená.



Součásti vodíkového hospodářství.³³

³²Vodík - palivo pro udržitelnou energetiku

³³Zdroj: US Department of energy/Commons

- ▶ Palladium dokáže absorbovat velká množství vodíku za tvorby nestechiometrického hydridu PdH_x ($x < 1$).
- ▶ Tato schopnost byla poprvé popsána už v roce 1866, kdy Thomas Graham zjistil, že palladium dokáže absorbovat vodík o objemu odpovídající více než 900 násobku jeho vlastního objemu.³⁴
- ▶ Tento proces je reverzibilní, proto je palladium využitelné pro skladování vodíku³⁵ v rámci vodíkového hospodářství.³⁶
- ▶ Během absorpce vodíku dochází ke změnám fyzikálních vlastností kovu:
 - ▶ Na rozdíl od jiných kovů neztrácí palladium kujnost.
 - ▶ Vodivost klesá s rostoucí koncentrací vodíku, až do vzniku fáze $\text{PdH}_{0.5}$, kdy se hydrid stává polovodičem.
 - ▶ Susceptibilita se silně mění v závislosti na obsahu vodíku.

³⁴On the relation of hydrogen to palladium


³⁵Thermal Decomposition of the Non-Interstitial Hydrides for the Storage and Production of Hydrogen

³⁶Vodík - palivo pro udržitelnou energetiku


- ▶ Hydrid také vykazuje supravodivost, stechiometrii PdH odpovídá kritická teplota je 9 K.
- ▶ U nestechiometrických fází byla také pozorována vysokoteplotní supravodivost (až 273 K)³⁷ za nízkého tlaku (na rozdíl od hydridů lanthanu).
- ▶ Schopnost absorpce vodíku (H_2 i D_2) je silně specifická, palladium nesorbuje ani helium, proto jej lze použít pro průmyslové čištění plynného vodíku.
- ▶ Pro tyto účely je nutné zabránit tvorbě fáze β , která způsobuje tvrdnutí materiálu a tím silně omezuje difuzi.
- ▶ Obě fáze jsou kubické s plošně centrovanou mřížkou.
- ▶ Při vzniku fáze α dochází jen k malým objemovým změnám, nárůst objemu při vzniku β fáze je až 10 %.

³⁷Possibility of high temperature superconducting phases in PdH

- ▶ Jako další materiály pro skladování vodíku jsou perspektivní např. *grafen* a *MOFy*.
- ▶ Grafen se vodíkem hydrogenuje na grafan, který uvolňuje vodík při teplotě 450 °C.
- ▶ MOF (Metal–Organic Framework) – anorganicko–organické hybridní materiály s porézní strukturou.
- ▶ Jsou tvořeny kovovými ionty propojenými organickými linkery.
- ▶ Např. komplexy zinečnatých iontů s kyselinou tereftalovou.



³⁸Zdroj: Canucksplayer/ Commons



Krystalová struktura MOFu DUT-5.³⁸

- ▶ Spalování vodíku s kyslíkem je technicky obtížně proveditelné, proto se nevyužívá.
- ▶ Častější je využití přeměny vodíku v elektrochemických palivových článcích.
- ▶ Známe mnoho různých typů článků, liší se jak provedením elektrod, tak i samotným mechanismem elektrochemické reakce.




Schéma vodíkového palivového článku.³⁹

³⁹Zdroj: HandigeHarry/Commons

Proton exchange membrane fuel cell





Schéma vodíkového palivového článku.⁴⁰

- ▶ První vodíkový automobil byl v provozu již v roce 1806.
- ▶ Současné vodíkové motory využívají jak spalování vodíku, tak i pali-
vové články.
- ▶ V současnosti se intenzivně řeší přechod automobilové dopravy z fo-
silních paliv na elektřinu nebo vodík.



Vodíkový motor z roku 1806.⁴¹




Mazda RX-8 Hydrogen.⁴²

⁴¹Zdroj: François Isaac de Rivaz/Commons

⁴²Zdroj: IFCAR/Commons

- ▶ Oxidací chloridu ruthenitého získáme *oxid rutheničitý*, RuO_2 . Krys-
taluje ve struktuře rutilu.
- ▶ Ten lze dále oxidovat jodistanem až na RuO_4 .
- ▶ Monokrystaly RuO_2 lze připravit také pomocí CVD těkavých slouče-
nin ruthenia, jako transportní médium slouží kyslík.⁴³



Základní buňka RuO_2 .⁴⁴


⁴³Deposition of Conductive Ru and RuO₂ Thin Films

⁴⁴Zdroj: CCoil/Commons

Sloučeniny

Ruthenium

- ▶ V oxidačním stavu VIII vytváří silně toxický oxid *rutheničelý*, RuO_4 .
- ▶ Je to žlutá, těkavá sloučenina. Přípravuje se oxidací vodného roztoku chloridu ruthenitého iodistanem:⁴⁵
- ▶ $8 \text{Ru}^{3+} + 5 \text{IO}_4^- + 12 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 8 \text{RuO}_4 + 5 \text{I}^- + 24 \text{H}^+$
- ▶ Využívá se jako meziprodukt při výrobě ruthenia a jeho sloučenin.
- ▶ Další využití nachází jako katalyzátor oxidací organických sloučenin, v tomto případě se zpravidla generuje *in-situ*.




Oxidace aromatických substituentů pomocí RuO_4 .⁴⁶

⁴⁵Ruthenium Tetroxide

⁴⁶Zdroj: Alsosaid1987/ Commons

- ▶ Rozpouštěním RuO_4 ve vodě nebo roztocích alkalických hydroxidů se uvolňuje kyslík a vznikají ruthenistany:⁴⁷
- ▶ $4 \text{RuO}_4 + 4 \text{OH}^- \longrightarrow 4 \text{RuO}_4^- + \text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ V koncentrovaných zásadách pokračuje redukce až na ruthenany:
- ▶ $4 \text{RuO}_4^- + 4 \text{OH}^- \longrightarrow 4 \text{RuO}_4^{2-} + \text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Ruthenistany i ruthenany jsou silná oxidační činidla, ale ve vhodném pH jsou stabilní i ve vodných roztocích.
- ▶ $\text{K}_2\text{RuO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ má ve skutečnosti strukturu, kterou lze popsat jako $\text{K}_2[\text{RuO}_3(\text{OH})_2]$.



⁴⁷Ru-based oxidation catalysis

Sloučeniny

Ruthenium


	RuCl_2	RuBr_2	RuI_2
	hnědý	černý	modrý
RuF_3	RuCl_3	RuBr_3	RuI_3
tmavě hnědý	černý/tmavě hnědý	tmavě hnědý	černý
RuF_4			
žlutý			
RuF_5^{48}			
tmavě zelený			
RuF_6			
tmavě hnědý			

⁴⁸The crystal structure of ruthenium pentafluoride

Sloučeniny


Ruthenium

- ▶ Nejvyšším fluoridem ruthenia je fluorid rutheniový, RuF_6 .
- ▶ Je to tmavě hnědá krystalická látka, taje při $54\text{ }^\circ\text{C}$.
- ▶ Lze ho připravit reakcí RuF_5 s fluorem:
- ▶ $2\text{RuF}_5 + \text{F}_2 \xrightarrow{230\text{ }^\circ\text{C}, 5\text{ MPa}} 2\text{RuF}_6$
- ▶ Přímá reakce poskytuje pouze nízké výtěžky, pod 10 %:⁴⁹
- ▶ $\text{Ru} + 3\text{F}_2 \xrightarrow{\text{Ar}, 450\text{ }^\circ\text{C}} \text{RuF}_6$
- ▶ Vytváří oktaedrické molekuly.




Sloučeniny

Ruthenium



Zelený RuF_5 vytváří tetramerní molekuly⁵⁰ Ru_4F_{20} .⁵¹




Krystalová struktura RuF_5 .⁵²

⁵⁰The crystal structure of ruthenium pentafluoride

⁵¹Zdroj: Smokefoot/Commons

⁵²Zdroj: Andif1/Commons



Krystalová struktura RuF_4 .⁵³




- ▶ Fluorid rutheničitý, RuF_4 , je růžová krystalická látka.
- ▶ Připravuje se redukcí fluoridu rutheničného jódem:
$$10 \text{RuF}_5 + \text{I}_2 \xrightarrow{\text{IF}_5} 10 \text{RuF}_4 + 2 \text{IF}_5$$
- ▶ V čistém stavu ho lze připravit redukcí hexafluororutheničnanu fluoridem arseničným v bezvodém fluorovodíku:
$$\text{K}_2\text{RuF}_6 + 2 \text{AsF}_5 \xrightarrow{\text{HF}} \text{RuF}_4 + 2 \text{KAsF}_6$$
- ▶ V krystalickém stavu vytváří polymery, oktaedry RuF_6 sdílejí vrchol, podobně jako u VF_4 .

Sloučeniny

Rhodium

► Rhodium vytváří sloučeniny v oxidačních číslech 0 až 6.

0	$\text{Rh}_4(\text{CO})_{12}$, $\text{Rh}_6(\text{CO})_{16}$
1	$\text{RhCl}(\text{PH}_3)_2$, $\text{Rh}_2\text{Cl}_2(\text{C}_8\text{H}_{12})_2$
2	$\text{Rh}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$, $\text{Rh}_2(\text{CH}_3\text{CO}_2)_4$
3	$\text{Rh}(\text{O}_2\text{C}_5\text{H}_7)_3$, RhF_3
4	RhO_2 , RhF_4
5	RhF_5 , XeRhF_6
6	RhF_6




⁵⁴Zdroj: Ben Mills/Commons

⁵⁵Zdroj: Edgar181/Commons

Sloučeniny

Rhodium

- ▶ Oxid rhoditý, Rh_2O_3 , je šedá nerozpustná látka.
- ▶ Vzniká zahříváním rhodia nebo chloridu rhoditého na $600\text{ }^\circ\text{C}$ v proudu kyslíku.
- ▶ Má strukturu korundu, zahříváním na $750\text{ }^\circ\text{C}$ přechází na orthorombickou strukturu.⁵⁶




Struktura korundu.⁵⁷

⁵⁶Crystal structure of Rh_2O_3

⁵⁷Zdroj: Benjah-bmm27/ Commons

- ▶ Sulfid rhoditý, Rh_2S_3 , je černá nerozpustná látka.
- ▶ Vzniká zahříváním rhodia se sírou na teplotu $900\text{ }^\circ\text{C}$.⁵⁸
- ▶ Krystaly se pěstují pomocí CVD, jako transportní medium se využívá brom.



Struktura sulfidu rhoditého.⁵⁹


⁵⁸A new structure type with octahedron pairs for Rh_2S_3 , Rh_2Se_3 and Ir_2S_3

⁵⁹Zdroj: Smokefoot/ Commons

Sloučeniny

Rhodium

RhF_3	RhCl_3	RhBr_3	RhI_3
červený	červený	červenohnědý	černý
RhF_4			
červený			
RhF_5^{60}	RhF_6		
tmavě červený	černý		
RhF_6			
černý			



RhF_5 vytváří tetramerní molekuly Rh_4F_{20} .⁶¹


⁶⁰Crystal structure of rhodium pentafluoride

⁶¹Zdroj: Smokefoot/Comons



Sloučeniny

Rhodium

- ▶ Dodekakarbyltetrarhodium, $\text{Rh}_4(\text{CO})_{12}$, tvoří červené krystaly.⁶²
- ▶ Správný vzorec je $\text{Rh}_4(\mu\text{-CO})_3(\text{CO})_9$.
- ▶ Je rozpustný v chlorovaných uhlovodících, toluenu a THF.
- ▶ Využívá se jako katalyzátor v organické syntéze.
- ▶ Připravuje se z chloridu rhoditého:



$\text{Rh}_4(\text{CO})_{12}$.⁶³




⁶²Tri(μ -carbonyl)Nonacarbonyltetrarhodium, $\text{Rh}_4(\mu\text{-CO})_3(\text{CO})_9$

⁶³Zdroj: Smokefoot/ Commons

Sloučeniny

Rhodium

- ▶ Hexadekakarbonylhexarhodium, $\text{Rh}_6(\text{CO})_{16}$, tvoří fialovo-hnědé krystaly.⁶⁴
- ▶ Je slabě rozpustný v dichlormethanu a chloroformu.
- ▶ Lze jej připravit reakcí chloridu ruthenitého s pentakarbonylem železa v atmosféře CO.⁶⁵
- ▶ Využívá se jako katalyzátor hydrogenací a hydroformylací.



$\text{Rh}_6(\text{CO})_{16}$.⁶⁶

⁶⁴Hexadecacarbonylhexarhodium

⁶⁵Metal carbonyl chemistry IV. The preparation of cobalt and rhodium carbonyls by reductive carbonylation with pentacarbonyliron

⁶⁶Zdroj: Edgar181/ Commons

- ▶ Rozpouštěním palladia v lučavce královské vzniká hexachloropalladitan draselný:
- ▶
$$\text{Pd} \xrightarrow{\text{HNO}_3/\text{HCl}; \text{KCl}} \text{K}_2[\text{PdCl}_6]$$
- ▶ Černý oxid palladnatý, PdO, se získává zahříváním kovového palladia v proudu kyslíku.
- ▶ Reakcí dusičnanu palladnatého s alkalickými hydroxidy dochází ke srážení žlutého hydratovaného oxidu.
- ▶ Oxid se rozpouští v kyselině chloristé za vzniku diamagnetického čtvercového komplexu $[\text{Pd}(\text{H}_2\text{O})_4](\text{ClO}_4)_2$.
- ▶ Černý sulfid palladnatý vzniká srážením roztoků palladnatých solí sulfanem.
- ▶
$$\text{Pd}^{2+} + \text{H}_2\text{S} \longrightarrow \text{PdS} + 2 \text{H}^+$$
- ▶ Zahříváním PdS s nadbytkem síry vzniká šedý PdS₂.


Sloučeniny

Palladium

PdF_2	PdCl_2	PdBr_2	PdI_2
světle fialový	tmavě červený	červenočerný	černý
PdF_4	Pd_2F_6		
růžový až červený	černý		

- ▶ Pd_2F_6 je stabilním produktem reakce palladia s fluorem.
- ▶ $2\text{Pd} + 3\text{F}_2 \longrightarrow \text{Pd}_2\text{F}_6$
- ▶ Jeho strukturu lze popsat jako $\text{Pd}^{\text{II}}[\text{Pd}^{\text{IV}}\text{F}_6]$.⁶⁷
- ▶ Refluxem Pd_2F_6 s SeF_4 získáme hydrolyticky nestabilní fluorid palladnatý.
- ▶ $\text{Pd}_2\text{F}_6 + \text{SeF}_4 \xrightarrow{100^\circ\text{C}} 2\text{PdF}_2 + \text{SeF}_6$

⁶⁷Preparation, Magnetic Properties, and Pressure-Induced Transitions of Some Complex Fluorides



Krystalová struktura $\text{Pd}[\text{PdF}_6]$.⁶⁸

Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec

`hugo@chemi.muni.cz`

`https://is.muni.cz/www/moravec/`