

subfiles

Exercice I : Gain complexe équivalent

1. Pour la fonction de seuil :

$$y = \begin{cases} 0 & \text{si } |X| \leq \frac{\Delta}{2} \\ x - \frac{\Delta}{2} & \text{si } X > \frac{\Delta}{2} \\ x + \frac{\Delta}{2} & \text{si } X < -\frac{\Delta}{2} \end{cases}$$

On pose

$$N(X) = \frac{P + jQ}{X}$$

avec


$$Q = 0$$

$$\begin{aligned} P &= \frac{4\omega}{\pi} \int_{t_1}^{\frac{\pi}{2\omega}} (X \sin(\omega t) - \frac{\Delta}{2}) \sin(\omega t) dt \\ &= \frac{4\omega}{\pi} \int_{t_1}^{\frac{\pi}{2\omega}} (X \sin^2(\omega t) - \frac{\Delta}{2} \sin(\omega t)) dt \\ &= -\frac{2\Delta}{\pi} \cos(\omega t_1) - \frac{4X\omega}{\pi} \left(\frac{t_1}{2} - \frac{\pi}{4\omega} - \frac{\sin(2t_1\omega)}{4\omega} \right) \\ \text{Or, } X \sin(\omega t_1) &= \frac{\Delta}{2} \Rightarrow t_1 = \frac{1}{\omega} \arcsin\left(\frac{\Delta}{2X}\right) \\ \Rightarrow P &= X \left(1 - \frac{2}{\pi} \left(\arcsin\left(\frac{\Delta}{2X}\right) + \frac{\Delta}{2X} \sqrt{1 - \left(\frac{\Delta}{2X}\right)^2} \right) \right) \end{aligned}$$

On a alors $N(X) = \frac{P}{X}$.

2. Pour le relais avec hystérésis

On pose $X \sin(\omega t_1) = \frac{h}{2}$ donc $t_1 = \frac{1}{\omega} \arcsin\left(\frac{h}{2X}\right)$



$$\begin{aligned} P &= \frac{\omega}{\pi} \int_{[T]} y(t) \sin(\omega t) dt \\ &= 2 \frac{\omega}{\pi} \int_{t_1}^{\frac{\pi}{\omega} + t_1} M \sin(\omega t) dt \end{aligned}$$

$$= 2 \frac{\omega}{\pi} M \cdot \frac{-\cos(\pi + \omega t_1) + \cos(\omega t_1)}{\omega} \quad 1$$

$$P = \frac{4M}{\pi} \sqrt{1 - \left(\frac{h}{2X}\right)^2}$$

$$\begin{aligned}
Q &= \frac{\omega}{\pi} \int_{[T]} y(t) \cos(\omega t) dt \\
&= 2 \frac{\omega}{\pi} \int_{t_1}^{\frac{\pi}{\omega} + t_1} M \cos(\omega t) dt \\
&= 2 \frac{\omega}{\pi} M \cdot \frac{\sin(\pi + \omega t_1) - \sin(\omega t_1)}{\omega} \\
Q &= -\frac{4M}{\pi} \frac{h}{2X}
\end{aligned}$$

$$|N(X)| = \frac{\sqrt{P^2 + Q^2}}{X} = \frac{4M}{\pi X}$$

3. Pour le jeux sans inertie aval

$$y(t) = \begin{cases} x(t) - \alpha & \text{sur } DA \\ M & \text{sur } AB \\ x(t) + \alpha & \text{sur } BC \\ -M & \text{sur } CD \end{cases}$$

$$|N(X)| = \frac{1}{2\pi} \sqrt{(1 + \cos 2\beta)^2 - (\pi + 2\beta + \sin 2\beta)^2} \quad \text{avec} \quad \beta = \arcsin(1 - 2\frac{\alpha}{M})$$

Exercice II : Asservissement avec boucle secondaire

1. Relations entre les différentes variables

$$s(p(1 + T_2 p)) = k_2 w \Rightarrow \frac{ds}{dt} + T_2 \frac{d^2 s}{dt^2} = k_2 w(t)$$

$$w = \phi(x)$$

$$x = r - ks$$

$$r(1 + T_1 p) = -k_1 s \Rightarrow r(t) + T_1 \frac{dr}{dt} = -k_1 s(t)$$

2. On exprime x en fonction de s et s en fonction de x :

$$x = \frac{-k_1}{1 + T_1 p} s - ks$$

$$s = \frac{k_2}{p(1 + T_2 p)} \phi(x)$$

donc

$$p(1 + T_2 p)(1 + T_1 p)x = -(k_1 + k(1 + T_1 p))k_2 \phi(x)$$

$$T_2 T_1 x^{(3)} + (T_1 + T_2)x^{(2)} + x^{(1)} = -k_2(k_1 + k)\phi(x) - k k_2 T_1 \frac{d\phi(x)}{dt}$$

3. On peut appliquer l'approximation du 1er harmonique à la NL car :

- La NL est statique
- Un filtre passe-bas d'ordre relatif > 1 est en aval de la NL Si le filtre est $\frac{p+1}{p^2/\omega^2+2m/\omega p+1}$, on ne peut pas appliquer la méthode du 1er harmonique.

4. On a $Q = 0$ car la NL est impaire.

$$P = \frac{2}{T} \int_0^T y(t) \sin(\omega t) dt = \frac{2}{T} \left(\int_0^{T/2} M \sin(\omega t) dt - \int_{T/2}^T M \sin(\omega t) dt \right) = \frac{4M}{\pi}$$

5. Avec $x(t) = X \sin(\omega t)$, on a donc l'approximation $w(t) = N(X).x(t)$ avec $N(x) = \frac{4M}{\pi X}$.

6. Analyse harmonique en remplaçant $\frac{d}{dt} = j\omega$

$$-T_1 T_2 j \omega^3 - (T_1 + T_2) \omega^2 + j(1 + k k_2 T_1 N(X)) \omega + (k_1 + k) k_2 N(X) = 0$$

On en déduit les équations algébriques du cycle limite en prenant parties réelle et imaginaire :

$$\begin{aligned} (k_1 + k) k_2 N(X) - (T_1 + T_2) \omega^2 &= 0 \\ (1 + k k_2 T_1 N(x)) \omega - T_1 T_2 \omega^3 &= 0 \end{aligned}$$

7. Cycle limite.

Existence du cycle limite On cherche une solution aux équations algébriques :

$$\begin{aligned} Re = 0 &\Rightarrow \omega_0^2 = \frac{(k_1 + k) k_2 N(x)}{T_1 + T_2} \\ Im = 0 &\Rightarrow X_0 = \frac{4M k_2 T_1 (k_1 T_2 - k T_1)}{\pi (T_1 + T_2)} \end{aligned}$$

On peut alors réécrire

$$\omega_0^2 = \frac{k_1 + k}{T_1 (k_1 T_2 - k T_1)}$$

Stabilité du cycle limite

$$\left. \frac{\partial R}{\partial X} \right|_0 \left. \frac{\partial I}{\partial \omega} \right|_0 - \left. \frac{\partial I}{\partial X} \right|_0 \left. \frac{\partial R}{\partial \omega} \right|_0 > 0$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial R}{\partial X}|_0 &= (k + k_1)k_2 \frac{dN}{dX}|_0 < 0 \\
\frac{\partial R}{\partial \omega}|_0 &= -2(T_1 + T_2)\omega_0 < 0 \\
\frac{\partial I}{\partial X}|_0 &= kk_2T_1 \frac{dN}{dX}|_0\omega_0 < 0 \\
\frac{\partial I}{\partial \omega}|_0 &= 1 + kk_2T_1N(X_0) - 3T_1T_2\omega_0 = -2T_1T_2\omega_0^2 < 0
\end{aligned}$$

Le cycle limite est stable si $\frac{\partial R}{\partial X}|_0 \frac{\partial I}{\partial \omega}|_0 - \frac{\partial I}{\partial X}|_0 \frac{\partial R}{\partial \omega}|_0 > 0$

$$-2(k + k_1)k_2 \frac{dN}{dX}|_0 T_1T_2\omega_0^2 + 2(T_1 + T_2)\omega_0^2 kk_2T_1 \frac{dN}{dX}|_0 > 0$$

soit

$$T_2(k + k_1) \frac{dN}{dX}|_0 + (T_1 + T_2)k \frac{dN}{dX}|_0 > 0$$

soit

$$T_1k - T_2k_1 < 0$$

Même condition que celle d'existence du cycle limite.

Exercice III : Contre-exemple

1. Voir Exercice I :

$$N(x) = \frac{4M}{\pi X} \sqrt{1 - \left(\frac{h}{2X}\right)^2} - j \frac{2Mh}{\pi X^2} = N_P(x) + jN_Q(X) \quad \text{et} \quad |N(X)| = \frac{4M}{\pi X}$$

Le lieu critique est défini par

$$-\frac{1}{N(x)} = \frac{-N_P(X) + jN_Q(X)}{|N(X)|^2} = -\frac{\pi X}{4M} \sqrt{1 - \left(\frac{h}{2X}\right)^2} - j \frac{\pi^2 h}{8M}$$

On trace le lieu de Nyquist de la fonction de transfert de $\frac{K}{1+\tau p}$ ainsi que celui de $-\frac{1}{N(X)}$:
Il n'y a pas d'intersection entre les deux : d'après la méthode du 1er harmonique, il n'y a donc pas de cycle limite.

2. $KM > h/2$

L'entrée du filtre du 1er ordre $u = M$

$$y(t) = KM(1 - e^{-t/\tau}) \Rightarrow \exists t_1 \text{ tq } y(t_1) > h/2 \text{ car } KM > h/2$$

$$x(t) = -y(t) < -h/2 \Rightarrow u = -M$$

et avec le même raisonnement,

$$\exists t_2 \text{ tq } y(t_2) < -h/2$$

$$x(t) > h/2$$

donc pour $KM > h/2$, il existe un cycle limite.

3. On obtient une contradiction car le filtre est de degré relatif égal à 1.