

Домашняя утка (лат. *Anas platyrhynchos*, иногда *Anas platyrhynchos f. domestica*, *Anas platyrhynchos domesticus*, *Anas domesticus* или *Anas domestica* (*Anas boschas domestica*); самец — селезень, птенцы — утята) — это водоплавающая птица, разводимая человеком. Она является одним из самых распространённых видов домашней птицы. Домашние утки летают плохо и на короткие расстояния. Они происходят от дикой кряквы. На протяжении долгого времени люди вывели множество пород уток. Их выращивают ради мяса, яиц и жирной печени (фуа-гра), а также получают от них перо и пух. В некоторых случаях уток держат как домашних питомцев.

Происхождение от кряквы

Существуют свидетельства, что уже после трёх поколений содержания в неволе у крякв появляются изменения, характерные для домашних уток, такие как увеличение размеров тела, неуклюжая походка, изменение цвета некоторых перьев и расширение белого ошейника у селезня. Среди всех диких видов рода *Anas* только у селезня кряквы четыре средних хвостовых пера загнуты кверху. Это наблюдение подтверждается и у домашних уток. Все известные породы домашних уток по анатомическим признакам не отличаются от кряквы и легко скрещиваются между собой, давая плодовитое потомство. Поэтому мнение о происхождении всех пород домашних уток от одного вида — кряквы — считается наиболее обоснованным.

Утки в древнем мире

Разведение домашних уток началось около 5000 лет назад в Месопотамии, в Древнем Шумере. На глиняных табличках с хозяйственными документами из Урука конца IV — начала III тыс. до н. э. видны изображения гусей и уток. Древние египтяне домашних уток не знали и разводили только гусей. Аристотель (384—322 гг. до н. э.) также не знал о домашних утках, хотя они были известны грекам ещё в более древние времена. Римские домашние утки могли летать, что говорит о их частичной одомашненности. В Древней Индии около 2000 лет назад была одомашнена порода уток-бегунов, происходящая из Юго-Восточной Азии. По другим данным, одомашнивание уток происходило около тысячи лет до н. э. в Европе, Азии, Северной Африке и Северной Америке.

Продуктивность

Домашние утки характеризуются следующими показателями:

Половая зрелость наступает в 6—7 месяцев.

За цикл яйцекладки (5—6 месяцев) утка откладывает 90—130 яиц.

Линька продолжается около 4 месяцев, при дифференцированном световом режиме — около 2 месяцев, после чего яйцекладка возобновляется.

Масса яиц составляет 85—90 г.

Инкубация яиц длится 27—28 суток.

Живая масса взрослых селезней — 3—4 кг, уток — 2—3,5 кг.