

# **Eine Formalisierung des zweiten Satzes von Sylow aus der Gruppentheorie in Naproche im Vergleich zu einer Implementierung in Lean**

Moritz Hartlieb, Jonas Lippert

14. März 2020

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>1</b>
1.1	Theoretische Grundlagen . . . . .	1
1.2	Vorüberlegungen zur Formalisierung . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Formalisierung in Lean</b>	<b>5</b>
2.1	Quotienten in Lean . . . . .	5
2.2	Endliche Mengen in Lean . . . . .	5
2.3	MOD in Lean . . . . .	7
2.4	Gruppen in Lean . . . . .	9
2.5	Sylow 2 in Lean . . . . .	12
<b>3</b>	<b>Formalisierung in Naproche</b>	<b>15</b>
3.1	Struktur . . . . .	15
3.2	Grundlegende Definitionen . . . . .	15
3.3	Einführung des Gruppenbegriffs . . . . .	16
3.4	Untergruppen . . . . .	17
3.5	Nebenklassen . . . . .	19
3.6	Zahlen . . . . .	21
3.7	Primzahlen . . . . .	24
3.8	Ein Lemma über Potenzen . . . . .	25
3.9	Endliche Mengen . . . . .	26
3.10	Der Satz von Lagrange . . . . .	28
3.11	Gruppenaktionen . . . . .	30
3.12	Stabilisator und Orbit . . . . .	31
3.13	Fixpunkte . . . . .	33
3.14	Eine Gruppenaktion . . . . .	37
3.15	Vorbereitung für den zweiten Satz von Sylow . . . . .	38
3.16	Der zweite Satz von Sylow . . . . .	39
<b>4</b>	<b>Vergleich</b>	<b>41</b>
4.1	Direkte Gegenüberstellung . . . . .	41
4.1.1	Herkömmliche Mathematik . . . . .	41
4.1.2	Lean . . . . .	41
4.1.3	Naproche . . . . .	42
4.2	Beweisführung . . . . .	43
4.3	Algebraische Strukturen . . . . .	43
4.4	Nebenklassen . . . . .	44
4.5	Funktionsdefinitionen . . . . .	44
4.6	Struktur . . . . .	44
4.7	Lesbarkeit . . . . .	45
4.8	Elaborating . . . . .	45
4.9	User Experience . . . . .	46

<b>5</b>	<b>Diskussion</b>	<b>47</b>
5.1	Begriffsbildung . . . . .	47
5.2	Vorschläge zur Weiterentwicklung an Naproche . . . . .	47
5.3	Fazit . . . . .	48

# 1 Einleitung

In der vorliegenden Arbeit stellen wir die Formalisierung des zweiten Sylow-Satzes in der Sprache Lean vor und vergleichen sie mit einer eigenen Formalisierung in Naproche.

Zu Beginn seien die wichtigsten Definitionen und Resultate der Gruppentheorie skizziert auf Basis des Skripts „Eine Einführung in die Algebra (Skript, WS 19/20, Bonn)“ von Prof. Dr. Jan Schröer [1].

## 1.1 Theoretische Grundlagen

Eine **Gruppe** ist eine Menge  $G$  zusammen mit einer Abbildung

$$\circ : G \times G \rightarrow G$$

$$(g, h) \mapsto g \circ h = gh$$

sodass gilt:

- (i)  $\circ$  ist assoziativ.
- (ii) Es gibt ein neutrales Element  $e \in G$ , sodass  $e \circ g = g = g \circ e$  für alle  $g \in G$ .
- (iii) Für alle  $g \in G$  existiert ein inverses Element  $g^{-1} \in G$ , sodass  $g \circ g^{-1} = g^{-1} \circ g = e$ .

Eine **Untergruppe**  $H$  von  $G$ ,  $H \leq G$ , ist eine Teilmenge von  $G$  mit

- (i)  $e \in H$ .
- (ii)  $H$  ist abgeschlossen bzgl.  $\circ$  und Inversenbildung.

Seien  $H \leq G$  gegeben. Für  $g \in G$  ist

$$gH := \{gh \mid h \in H\}$$

die **Nebenklasse** von  $H$  zu  $g$ . Es bezeichne  $G/H$  die Klasse der Nebenklassen von  $H$ . Weiter sei

$$[G : H] := |G/H|$$

der **Index** von  $H$  zu  $G$ .

Zwei Untergruppen  $H_1$  und  $H_2$  von  $G$  sind **konjugiert**, falls es ein  $g \in G$  gibt mit

$$H_1 = gH_2g^{-1} := \{g h g^{-1} \mid h \in H\}.$$

**Lemma 1.1.** Seien  $H \leq G$  gegeben. Für  $g_1, g_2 \in G$  gilt:

$$(i) \quad g_1H \cap g_2H \neq \emptyset \iff g_1H = g_2H \iff g_1^{-1}g_2 \in H$$

(ii) Für alle  $g \in G$  ist die Abbildung

$$H \rightarrow gH$$

$$h \mapsto gh$$

bijektiv. Insbesondere gilt im endlichen Fall  $|H| = |gH|$ .

□

**Lemma 1.2 (Lagrange).** Seien  $H \leq G$  endlich. Dann folgt aus vorherigem Lemma:

$$|G| = [G : H] \cdot |H|.$$

□

Für eine Gruppe  $G$  und eine nichtleere Menge  $X$  ist die Abbildung

$$\phi : G \times X \rightarrow X$$

$$(g, x) \mapsto g.x$$

eine **Gruppenaktion**, falls gilt:

- (i)  $1.x = x$  für alle  $x \in X$ .
- (ii)  $(gh).x = g.(h.x)$  für alle  $g, h \in G$  und  $x \in X$ .

Weiter definieren wir für  $x \in X$ :

- (i) den **Orbit**  $G.x := \{g.x \mid g \in G\}$  von  $x$ ,
- (ii) den **Stabilisator**  $G_x := \{g \in G \mid g.x = x\}$  von  $x$ ,
- (iii) die Menge der **Fixpunkte**  $X^G := \{x \in X \mid g.x = x \text{ für alle } g \in G\}$  von  $X$ .

**Lemma 1.3.** Sei  $G$  eine Gruppe und  $X$  nichtleer. Die Funktion

$$G/G_x \rightarrow G.x$$

$$(g G_x) \mapsto g.x$$

ist bijektiv.

□

Wie wir in Lemma 1.1 gesehen haben, ist eine Gruppe  $G$  disjunkte Vereinigung der Nebenklassen bzgl. einer Untergruppe  $H \leq G$ . Zusammen mit Lemma 1.3 erhalten wir, dass  $X$  disjunkte Vereinigung der Orbits bzgl. einer Gruppenaktion ist und die Kardinalität der Orbits entsprechend Lagrange die Gruppenordnung teilen müssen.

**Lemma 1.4 (Bahnenformel).** Sei  $G$  eine endliche Gruppe, sei  $X \neq \emptyset$  endlich und seien  $x_1, \dots, x_n$  gegeben, sodass  $X$  disjunkte Vereinigung der  $G \cdot x_i$  ist. Dann gilt

$$|X| = \sum_{i=1}^n [G : G_{x_i}] = |X^G| + \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ x_i \notin X^G}} [G : G_{x_i}].$$

□

Falls  $G$  eine  $p$ -Gruppe ist, das heißt  $|G| = p^r$  für eine Primzahl  $p$  und ein  $r \in \mathbb{N}$ , dann folgt:

**Lemma 1.5.**

$$|X| \equiv |X^G| \pmod{p}.$$

□

Für eine Gruppe  $G$  mit  $|G| = p^r m$ , wobei  $p$  prim und  $p \nmid m$ , ist die Menge der  **$p$ -Sylowgruppen** definiert durch

$$\text{Syl}_p(G) := \{P \leq G \mid \}.$$

Wir können nun den zweiten Satz von Sylow formulieren:

**Theorem 1.6.** Sei  $p$  eine Primzahl und  $G$  eine endliche Gruppe mit  $|G| = p^r \cdot m$ , sodass  $p \nmid m$ . Sei  $U \leq G$  eine  $p$ -Untergruppe, und sei  $P \leq G$  eine  $p$ -Sylowgruppe. Dann gilt:

(i) Es gibt ein  $g \in G$  mit

$$gUg^{-1} \subseteq P.$$

(ii) Je zwei  $p$ -Sylowgruppen sind konjugiert.

*Beweis.* (i) Setze  $X := G/P$  und betrachte die Gruppenaktion

$$\phi : U \times X \rightarrow X$$

$$(u, gP) \mapsto ugP.$$

Nach Lemma 1.5 gilt

$$|X| = [G : P] = m \equiv |X^G| \pmod{p}.$$

Da  $p \nmid m$ , gilt  $X^G \neq \emptyset$ . Es existiert also ein  $g \in G$ , sodass  $ugP = gP$  für alle  $u \in U$ . Folglich ist  $g^{-1}Ug \subseteq P$  und damit  $U$  konjugiert zu  $P$  bzgl.  $g^{-1}$ .

(ii) Dies gilt insbesondere im Falle  $U \in \text{Syl}_p(G)$ .

□

## 1.2 Vorüberlegungen zur Formalisierung

Es werden also zunächst Grundbegriffe der Gruppentheorie, endliche Mengen sowie natürliche Zahlen, Primzahlen und Modulo-Rechnung benötigt. Hierzu bieten sich unterschiedliche Herangehensweisen an. Es stellt sich heraus, dass Naproche für kleine Theorien gut geeignet ist, deren Grundlagen axiomatisch eingeführt werden, die ihrerseits in einer eigenen Theorie entwickelt werden (können). Die Implementierung in Lean baut hingegen auf bereits formalisierte Grundlagen auf und ist somit Teil einer einzigen großen Theorie der Mathematik.

Interessant ist die Formalisierung von Nebenklassen. Im Sinne einer kleinen Theorie bietet sich in Naproche eine direkte Konstruktion an:

$$\text{Coset}(g, H, G) := \{ g *^G h \mid h \in H \}.$$

Anschließend ist zu zeigen, dass  $G$  disjunkte Vereinigung von Nebenklassen bzgl. einer beliebigen Untergruppe  $H$  ist. In Lean wird dagegen bzgl. einer Untergruppe  $S$  von  $G$  folgende Äquivalenzrelation auf  $G$  eingeführt:

$$x \sim_S y :\Leftrightarrow x^{-1} * y \in S.$$

Lean erlaubt uns, den Quotient  $G/\sim_S$  zu betrachten. Hier wird Lemma 1.1 implizit verwendet.

Im Folgenden wird zunächst auf die jeweiligen Formalisierungen im Detail eingegangen. Anschließend sollen Vor- und Nachteile der jeweiligen Sprachen verglichen und diskutiert werden.

## 2 Formalisierung in Lean

Die Formalisierung des zweiten Satzes von Sylow in Lean stammt von Chris Hughes[2]. Um mit der aktuellen Version (Stand März 2020) der Leanbibliothek mathlib [3] kompatibel zu sein, musste der Quelltext an einigen Stellen angepasst werden. Die modifizierte Version lässt sich unter <https://github.com/moritz-hl/sylow2> [4] finden.

### 2.1 Quotienten in Lean

Endliche Mengen und Nebenklassen sind in Lean als Quotient formalisiert. In der core-Library von Lean sind folgende Konstanten definiert:

```
constant quot :  $\Pi$  { $\alpha$  : Sort u}, ( $\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{Prop}$ )  $\rightarrow$  Sort u
constant quot.mk :
 $\Pi$  { $\alpha$  : Sort u} (r :  $\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{Prop}$ ),  $\alpha \rightarrow$  quot r
axiom quot.ind :
 $\forall$  { $\alpha$  : Sort u} {r :  $\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{Prop}$ } { $\beta$  : quot r  $\rightarrow$  Prop},
( $\forall$  a,  $\beta$  (quot.mk r a))  $\rightarrow$   $\forall$  (q : quot r),  $\beta$  q
axiom quot.sound :
 $\forall$  { $\alpha$  : Type u} {r :  $\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{Prop}$ } {a b :  $\alpha$ },
r a b  $\rightarrow$  quot.mk r a = quot.mk r b
constant quot.lift :
 $\Pi$  { $\alpha$  : Sort u} {r :  $\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{Prop}$ } { $\beta$  : Sort u} (f :  $\alpha \rightarrow \beta$ ),
( $\forall$  a b, r a b  $\rightarrow$  f a = f b)  $\rightarrow$  quot r  $\rightarrow$   $\beta$ 
```

Die Klasse von a in quot r wird durch quot.mk r a erzeugt. Das Induktionsaxiom stellt sicher, dass alle Elemente von quot r von der Form quot.mk r a sind. Die Lifting-Eigenschaft erlaubt es, geeignete Funktionen auf quot r zu liften.

Ein setoid  $\alpha$  ist ein Typ  $\alpha$  zusammen mit einer Äquivalenzrelation:

```
class setoid ( $\alpha$  : Sort u) :=
(r :  $\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow \text{Prop}$ ) (iseqv : equivalence r)
```

Der quotient s auf einem s : setoid  $\alpha$  ist dann der Quotient bzgl. einer Äquivalenzrelation:

```
def quotient { $\alpha$  : Sort u} (s : setoid  $\alpha$ ) :=
@quot  $\alpha$  setoid.r
```

Die obigen Eigenschaften von quot werden anschließend auf quotient übertragen.

### 2.2 Endliche Mengen in Lean

Endliche Mengen werden auf Basis von Listen definiert. Zunächst erhält man Multimengen als Quotienten, indem Permutationen mit Hilfe der Äquivalenzrelation perm miteinander identi-



fiziert werden:

```
inductive perm : list  $\alpha$  → list  $\alpha$  → Prop
| nil    : perm [] []
| skip   :  $\prod$  (x :  $\alpha$ ) {l1 l2 : list  $\alpha$ },
            perm l1 l2 → perm (x::l1) (x::l2)
| swap   :  $\prod$  (x y :  $\alpha$ ) (l : list  $\alpha$ ), perm (y::x::l) (x::y::l)
| trans  :  $\prod$  {l1 l2 l3 : list  $\alpha$ }, perm l1 l2 → perm l2 l3 → perm l1 l3
```

Unter Verwendung des Beweises `perm.eqv`, dass `perm` eine Äquivalenzrelation ist, wird eine Instanz von `setoid` (`list  $\alpha$` ) eingeführt, welche dann in der Definition der Multimenge Verwendung findet:

```
instance is_setoid ( $\alpha$ ) : setoid (list  $\alpha$ ) :=
  setoid.mk (@perm  $\alpha$ ) (perm.eqv  $\alpha$ )
```

```
def {u} multiset ( $\alpha$  : Type u) : Type u :=
  quotient (list.is_setoid  $\alpha$ )
```

Eine Multimenge wird zur endlichen Menge, wenn sie keine Duplikate beinhaltet:

```
structure finset ( $\alpha$  : Type*) :=
  (val : multiset  $\alpha$ )
  (nodup : nodup val)
```

Die Definition von `nodup` für Multimengen basiert auf `nodup` für Listen.

```
def nodup : list  $\alpha$  → Prop := pairwise (≠)
```

Hierbei prüft `pairwise`, ob die Relation  $\neq$  paarweise gilt.

```
variables (R :  $\alpha$  →  $\alpha$  → Prop)
inductive pairwise : list  $\alpha$  → Prop
| nil {} : pairwise []
| cons :  $\forall$  {a :  $\alpha$ } {l : list  $\alpha$ }, ( $\forall$  a' ∈ l, R a a') → pairwise l →
    pairwise (a::l)
```

Jetzt wird `nodup` für Listen auf Multimengen geliftet. Dazu werden `quot.lift_on` folgende Parameter übergeben: der Quotient `s`, die zu liftende Funktion `nodup` und ein Beweis, dass Permutation keine Duplikate erzeugt: Aus den zwei Listen `s` `t` und dem Beweis `p`, dass diese in Relation bzgl. `perm` zueinander stehen, erzeugt `perm_nodup` die Äquivalenz `nodup s  $\Leftrightarrow$  nodup t`. Dann wird das Lean-interne Axiom `propext` verwendet, nach dem äquivalente Propositionen gleich sind. (Die Rechtsklammerung bei der Funktionseinsetzung wird hier durch `$` gewährleistet.)

```

def nodup (s : multiset  $\alpha$ ) : Prop :=
quot.lift_on s nodup ( $\lambda$  s t p, propext $ perm_nodup p)

def quot.lift_on { $\alpha$  : Sort u} { $\beta$  : Sort v} {r :  $\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow$  Prop}
(q : quot r) (f :  $\alpha \rightarrow \beta$ ) (c :  $\forall$  a b, r a b  $\rightarrow$  f a = f b) :  $\beta$ 

theorem perm_nodup {l1 l2 : list  $\alpha$ } : l1 ~ l2  $\rightarrow$ 
(nodup l1  $\leftrightarrow$  nodup l2)

```

Der Beweis von perm\_nodup kann in perm.lean nachgelesen werden. In der Regel wird nicht finset direkt verwendet, sondern die Typenklasse fintype, sodass der Typ  $\alpha$  selber endlich ist.

```

class fintype ( $\alpha$  : Type*) :=
(elems : finset  $\alpha$ )
(complete :  $\forall$  x :  $\alpha$ , x  $\in$  elems)

```

## 2.3 MOD in Lean

Die Definition von  $x \pmod y$  auf den natürlichen Zahlen basiert auf der Wohlfundiertheit der  $<$ -Relation auf  $\mathbb{N}$ :

```

inductive acc { $\alpha$  : Sort u} (r :  $\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow$  Prop) :  $\alpha \rightarrow$  Prop
| intro (x :  $\alpha$ ) (h :  $\forall$  y, r y x  $\rightarrow$  acc y) : acc x

parameters { $\alpha$  : Sort u} {r :  $\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow$  Prop}

local infix '<':50      := r

inductive well_founded { $\alpha$  : Sort u} (r :  $\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow$  Prop) : Prop
| intro (h :  $\forall$  a, acc r a) : well_founded

class has_well_founded ( $\alpha$  : Sort u) : Type u :=
(r :  $\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow$  Prop) (wf : well_founded r)

```

Ein Element  $x : \alpha$  kann nur die Eigenschaft acc haben, falls ein „kleinstes“ Element bzgl. der Relation R existiert. Entsprechend wird ein Rekursions- und Induktionsprinzip für wohlfundierte Relationen eingeführt, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll. Wichtig ist der Spezialfall, dass sich über wohlfundierte Relationen Funktionen definieren lassen (siehe def fix weiter unten):

```

parameter hwf : well_founded r
variable {C :  $\alpha \rightarrow$  Sort v}

```

```
variable F :  $\prod x, (\prod y, y < x \rightarrow C y) \rightarrow C x$ 
```

```
def fix_F (x :  $\alpha$ ) (a : acc r x) : C x :=  
acc.rec_on a ( $\lambda x_1 ac_1 ih, F x_1 ih$ )
```

Die Konstruktion des Fixpunktes nimmt gemäß `acc.rec_on` einen Beweis `a` für `acc r x` und liefert `C x`, falls folgender Sachverhalt gegeben ist:

$$(\prod (x_1 : \alpha), (\forall (y : \alpha), r y x_1 \rightarrow \text{acc } r y) \rightarrow \\ (\prod (y : \alpha), r y x_1 \rightarrow C y) \rightarrow C x_1)$$

Durch `acc.rec_on` erhalten wir über den Konstruktor `intro`:

```
x1 :  $\alpha$   
ac1 :  $\forall (y : \alpha), r y x_1 \rightarrow \text{acc } r y$   
ih :  $\prod (y : \alpha), r y x_1 \rightarrow C y$ 
```

`F` liefert das Gewünschte. Wir können die Fixpunkteigenschaft nun auf wohlfundierte Relationen übertragen:

```
variables { $\alpha$  : Sort u} {C :  $\alpha \rightarrow$  Sort v} {r :  $\alpha \rightarrow \alpha \rightarrow$  Prop}  
  
def fix (hwf : well_founded r) (F :  $\prod x, (\prod y, r y x \rightarrow C y) \rightarrow C x$ ) (  
  x :  $\alpha$ ) : C x :=  
fix_F F x (apply hwf x)
```

Ist eine Funktion `F` gegeben, welche die Werte `C x` für bekannte Werte `C y` der „kleineren“ Elemente `y < x` liefert, so ist nach `fix` die Funktion `C` für alle `x :  $\alpha$`  definiert. Für `F` setzen wir

```
private def mod.F (x : nat) (f :  $\prod x_1, x_1 < x \rightarrow \text{nat} \rightarrow \text{nat}$ ) (y : nat)  
  : nat :=  
if h : 0 < y  $\wedge$  y  $\leq$  x then f (x - y) (div_rec_lemma h) y else x
```

und damit `C` auf  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ . Hier wurde folgendes Lemma verwendet:

```
div_rec_lemma {x y : nat} : 0 < y  $\wedge$  y  $\leq$  x  $\rightarrow$  x - y < x.
```

Weiter können wir `mod` und damit eine Instanz der Typenklasse `class has_mod` definieren, die bereits in `core.lean` vordefiniert ist. Sie besitzt einzig den Konstruktor `has_mod.mod :  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$` .

```
protected def mod := fix lt_wf mod.F
```

```
instance : has_mod nat :=
⟨nat.mod⟩
```

Die Infixnotation für `has_mod.mod n m` ist `n % m`. Schließlich wird `a ≡ b [MOD n]` definiert:

```
def modeq (n a b : ℕ) := a % n = b % n

notation a ' ≡ '[:50] b ' [MOD '[:50] n ']'[:0] := modeq n a b
```

## 2.4 Gruppen in Lean

Gruppen werden sukzessive durch Erweiterungen von type `classes` definiert:

```
class has_mul (α : Type u) := (mul : α → α → α)

infix * := has_mul.mul

class semigroup (α : Type u) extends has_mul α :=
(mul_assoc : ∀ a b c : α, a * b * c = a * (b * c))

class monoid (α : Type u) extends semigroup α, has_one α :=
(one_mul : ∀ a : α, 1 * a = a) (mul_one : ∀ a : α, a * 1 = a)

class group (α : Type u) extends monoid α, has_inv α :=
(mul_left_inv : ∀ a : α, a-1 * a = 1)
```

Entsprechendes gilt für Untergruppen

```
variables {α : Type*} [monoid α] {s : set α}

class is_submonoid (s : set α) : Prop :=
(one_mem : (1:α) ∈ s)
(mul_mem {a b} : a ∈ s → b ∈ s → a * b ∈ s)

class is_subgroup (s : set α) extends is_submonoid s : Prop :=
(inv_mem {a} : a ∈ s → a-1 ∈ s)
```

und Gruppenaktionen:

```
class has_scalar (α : Type u) (γ : Type v) :=
(smul : α → γ → γ)

infixr ' · '[:73] := has_scalar.smul
```

```

class mul_action ( $\alpha$  : Type u) ( $\beta$  : Type v) [monoid  $\alpha$ ] extends
  has_scalar  $\alpha$   $\beta$  :=
(one_smul :  $\forall$  b :  $\beta$ , (1 :  $\alpha$ ) · b = b)
(mul_smul :  $\forall$  (x y :  $\alpha$ ) (b :  $\beta$ ), (x * y) · b = x · y · b)

```

Es folgen die üblichen Definitionen bzgl. Gruppenaktionen.

```

variables ( $\alpha$ ) [monoid  $\alpha$ ] [mul_action  $\alpha$   $\beta$ ]

def orbit (b :  $\beta$ ) := set.range ( $\lambda$  x :  $\alpha$ , x · b)

variables ( $\alpha$ ) ( $\beta$ )

def stabilizer (b :  $\beta$ ) : set  $\alpha$  :=
{x :  $\alpha$  | x · b = b}

def fixed_points : set  $\beta$  := {b :  $\beta$  |  $\forall$  x, x  $\in$  stabilizer  $\alpha$  b}

```

Nebenklassen werden als Quotient bzgl. der Relation left\_rel definiert:

```

def left_rel [group  $\alpha$ ] (s : set  $\alpha$ ) [is_subgroup s] : setoid  $\alpha$  :=
( $\lambda$  x y,  $x^{-1}$  * y  $\in$  s,
assume x, by simp [is_submonoid.one_mem],
assume x y hxy,
have ( $x^{-1}$  * y) $^{-1}$   $\in$  s, from is_subgroup.inv_mem hxy,
by simpa using this,
assume x y z hxy hyz,
have  $x^{-1}$  * y * ( $y^{-1}$  * z)  $\in$  s, from is_submonoid.mul_mem hxy hyz,
by simpa [mul_assoc] using this)

def left_cosets [group  $\alpha$ ] (s : set  $\alpha$ ) [is_subgroup s] : Type* :=
quotient (left_rel s)

```

Für eine Untergruppe H von G ist dann left\_rel H ein setoid G mit entsprechender Relation und dem zugehörigen Beweis, dass es sich um eine Äquivalenzrelation handelt. Mithilfe dieser Definition wird eine Instanz von fintype bzgl. left\_cosets H erstellt:

```

noncomputable instance [fintype G] (H : set G) [is_subgroup H] :
  fintype (left_cosets H) :=
quotient.fintype (left_rel H)

```

Der Grund dafür, dass die Instanz als noncomputable markiert werden muss, ist die Verwendung von decidable.eq in quotient.fintype. Das geht auf den Umstand zurück,

dass das Bild einer Funktion auf einem endlichen Typ wieder ein endlicher Typ  $\beta$  ist. Hierbei wird das Bild zunächst als Multimenge betrachtet. Anschließend werden eventuelle Duplikate durch den Operator `to_finset` entfernt, was die Entscheidbarkeit der Gleichheitsrelation auf  $\beta$  voraussetzt. Um den 2. Sylowsatz in Lean zu formulieren, fehlen noch die Definitionen des `conjugate_set` und der  $p$ -Sylowgruppen:

```
def conjugate_set (x : G) (H : set G) : set G :=
  (λ n, x⁻¹ * n * x) ⁻¹' H

class is_sylow [fintype G] (H : set G) {p : ℕ} (hp : prime p) extends
  is_subgroup H : Prop :=
  (card_eq : card H = p ^ dlogn p (card G))

lemma sylow_2 [fintype G] {p : ℕ} (hp : nat.prime p)
  (H K : set G) [is_sylow H hp] [is_sylow K hp] :
  ∃ g : G, H = conjugate_set g K
```

`dlogn p (card G)` ist die Vielfachheit von  $p$  in `card G`.

`#print axioms sylow.sylow_2` zeigt, dass `propext`, `quot.sound` und `classical.choice` verwendet wird.

`quot.sound` wird benötigt, um zu beweisen, dass das kanonische Operieren einer Untergruppe  $H$  auf den Nebenklassen einer Untergruppe  $K$  eine Gruppenaktion ist:

```
def mul_left_cosets (L₁ L₂ : set G) [is_subgroup L₂] [is_subgroup L₁]
  (x : L₂) (y : left_cosets L₁) : left_cosets L₁ :=
  quotient.lift_on y (λ y, [(x : G) * y])
  (λ a b (hab : _ ∈ L₁), quotient.sound
    (show _ ∈ L₁, by rwa [mul_inv_rev, ← mul_assoc, mul_assoc (a⁻¹),
      inv_mul_self, mul_one])))
```

Dafür soll die Funktion  $(\lambda y, [(x : G) * y])$  auf Nebenklassen geliftet werden. Für zwei Elemente  $a$  und  $b$ , die bzgl. `left_rel` äquivalent sind, ist also zu zeigen, dass

$$[(x : G) * a] = [(x : G) * b].$$

Mit `quot.sound` genügt dann ein Beweis dafür, dass die erzeugenden Elemente äquivalent sind. Die nötigen Umformungen erledigt `simp`.

Im Beweis von Sylow 2 werden zunächst die vorangegangenen Resultate verwendet, um herzuleiten, dass die Anzahl der Fixpunkte bzgl. obiger Aktion ungleich Null ist. An dieser Stelle liefert `classical.choice` einen solchen Fixpunkt, ohne den die Konstruktion eines geeigneten `conjugate_set` nicht möglich wäre.

## 2.5 Sylow 2 in Lean

Wir wollen nun auf einige Details im Beweis des Satzes eingehen. Die verwendeten Lemmata, die für das sukzessive Umformen via `rw` oder `simp` genutzt werden, sind dabei weder mathematisch noch hinsichtlich des Formalisierungsprozesses besonders interessant. Es werden zahlreiche technische Lemma über natürliche Zahlen, Kardinalitäten, Funktionen, etc. zusammengetragen, deren Beweise für den Menschen trivial und in Lean im Nachhinein teilweise nur sehr schwer verständlich sind. Es ist prinzipiell klar, dass es auf Basis der konstruierten Begriffe und Strukturen möglich ist, entsprechende Beweise für Lean verständlich zu formulieren und es genügt in der Regel zu wissen, dass sie existieren.

Die ersten drei Hilfslemmata liefern uns den gewünschten Fixpunkt.

```
lemma sylow_2 [fintype G] {p : ℕ} (hp : nat.prime p)
(H K : set G) [is_sylow H hp] [is_sylow K hp] :
  ∃ g : G, H = conjugate_set g K :=

have hs : card (left_cosets K) = card G / (p ^ dlogn p (card G)) :=
  (nat.mul_right_inj (pos_pow_of_pos (dlogn p (card G)) hp.pos)).1
$ by rw [← card_sylow K hp, ← card_eq_card_cosets_mul_card_subgroup,
  card_sylow K hp,
  nat.div_mul_cancel (dlogn_dvd _ hp.1)],

have hmodeq : card G / (p ^ dlogn p (card G)) ≡ card (fixed_points H (
  left_cosets K)) [MOD p] :=
eq.subst hs (mul_action.card_modeq_card_fixed_points hp (card_sylow H
  hp)),

have hfixed : 0 < card (fixed_points H (left_cosets K)) :=
nat.pos_of_ne_zero
(λ h, (not_dvd_div_dlogn (fintype.card_pos_iff.2 ⟨(1 : G)⟩) hp.1)
  (by rwa [h, nat.modeq.modeq_zero_iff] at hmodeq)),
```

Zunächst wird in `hs` die Kardinalität der Klasse der Nebenklassen auf Basis der Definition von Sylow-Gruppen umgeformt. Hierbei wird das Lemma von Lagrange unter dem Namen `card_eq_card_cosets_mul_card_subgroup` benutzt.

In `hmodeq` kommt die Lean-Version von Lemma 1.5 zur Anwendung:

```
lemma card_modeq_card_fixed_points [fintype α] [fintype G]
[fintype (fixed_points G α)]
{p n : ℕ} (hp : nat.prime p) (h : card G = p ^ n) :
card α ≡ card (fixed_points G α) [MOD p]
```

Durch Substitution wird das allgemeine Resultat auf den Spezialfall übertragen.

Mit Hilfe von `hmodeq` lässt sich schließlich `hfixed` zeigen, dass nämlich die Kardinalität der Fixpunkte größer Null ist: Nach `nat.pos_of_ne_zero` genügt es zu zeigen, dass die

Kardinalität der Fixpunkte ungleich Null ist. Es wird also ein Beweis von `false` gefordert unter Annahme `h`, die Kardinalität sei gleich Null. Der Widerspruch wird erzeugt, in dem erst

```
lemma not_dvd_div_dlogn {p a : ℕ} (ha : a > 0) (hp : p > 1) :
  ¬p ∣ a / (p ^ dlogn p a)
```

auf `a = card G` angewendet wird. Dass `p` aber ein Teiler der rechten Seite sein muss, folgt aus der Annahme `h` zusammen mit

```
modeq_zero_iff : b ≡ 0 [MOD n] ↔ n ∣ b,
```

wobei `b = card G / (p ^ dlogn p a)`.

Um aus dem abstrakten Kardinalitäts-Argument einen konkreten Fixpunkt zu gewinnen, wird das Axiom `classical.choice` in Form des Lemmas `fintype.card_pos_iff` verwendet:

```
let ⟨x, hx⟩ := fintype.card_pos_iff.1 hfixed in

begin

revert hx
```

Die Taktik `revert` generalisiert den Beweis `hx`, dass `x` ein Fixpunkt ist, sodass nun folgendes Ziel zu beweisen ist:

```
x ∈ fixed_points H (left_cosets K) →
(∃ (g : G), H = conjugate_set g K)
```

Der Grund dafür ist der, dass wir für die weitere Argumentation einen Vertreter `g : G` für die Äquivalenzklasse `x` benötigen. Dies wird möglich durch das Axiom `quot.ind` in Form von `quotient.induction_on`, nachdem es genügt, das Ziel für einen beliebigen Vertreter zu zeigen:

```
refine quotient.induction_on x
(λ g hg, ⟨g, set.eq_of_card_eq_of_subset _ _⟩)
```

Für ein Element `g : G` und unter der Annahme `hg`, dass `[[g]]` ein Fixpunkt ist, bleibt nun die ursprünglich Aussage `∃(g : G), H = conjugate_set g K` zu zeigen. Dem anonymen Konstruktor wurde zur Konstruktion der Existenzaussage das Element `g` und folgendes Lemma übergeben:

```
lemma eq_of_card_eq_of_subset {s t : set α} [fintype s] [fintype t]
(hcard : card s = card t) (hsub : s ⊆ t) : s = t
```



Durch die Verwendung der Taktik `refine` und der zwei Unterstriche anstelle der Beweise `hcard` und `hsub`, werden diese Bedingungen als neue Ziele innerhalb des Taktik-Blocks erstellt, wobei das ursprüngliche Ziel als bewiesen gilt. Die beiden Beweise seien hier der Vollständigkeit halber aufgeführt, auch wenn die technischen Details nicht weiter interessant sind:

```
{
rw [conjugate_set_eq_image, set.card_image_of_injective _
    conj_inj_left,
card_sylow K hp, card_sylow H hp] },
{
assume y hy,
have : (y⁻¹ * g)⁻¹ * g ∈ K :=
quotient.exact ((mem_fixed_points' (left_cosets K)).1 hg [[y⁻¹ * g]]
⟨⟨y⁻¹, inv_mem hy⟩, rfl⟩),
simp [conjugate_set_eq_preimage],
simp only [*, mul_assoc, mul_inv_rev] at *,
simp [*, inv_inv] at *}
end
```

## 3 Formalisierung in Naproche

### 3.1 Struktur

Die Formalisierung in Naproche teilt sich in 8 Dateien auf:

Name	Inhalt	Abschnitt
01basicgrouptheory.ftl	Gruppentheorie	3.2
02numbers.ftl	Zahlen	3.6
03cards.ftl	Kardinalitäten	3.9
04lagrange.ftl	Satz von Lagrange	3.10
05statorb.ftl	Gruppenaktionen	3.11
06fixedpointsmodp.ftl	Fixpunkte	3.13
07grpaction.ftl	SylowGruppenaktion	3.14
08syLOW2.ftl	Der Satz von Sylow	3.15

In jeder Datei werden zu Beginn jeweils die Aussagen und Definitionen der vorangegangenen Dateien eingebunden. Hierfür wurden Hilfsdateien `xxExport.ftl` erstellt, in denen die in der jeweiligen Definitionen und Theoreme in Form von Axiomen ohne Beweise festgehalten wurden. Grundsätzlich wäre es möglich, diese Dateien über den Befehl `[read dateiname.ftl]` einzulesen, da dieser Befehl jedoch in der jetzigen Version von Naproche nicht auf allen Betriebssystemen gleichermaßen funktioniert, haben wir die Dateien manuell kopiert und dies durch Kommentare im Quelltext vermerkt.

Die Formalisierung ließ sich auf einem MacBook Pro (16 GB RAM, Intel i7 2,7 GhZ) von 2018 innerhalb der Isabelle-Naproche Umgebung[5] in rund 5 Minuten verifizieren. Fügt man jedoch alle Dateien aneinander, ohne die Theoreme jeweils durch Axiome zu ersetzen, dann ist Naproche nicht mehr in der Lage, den Beweis vollständig zu verifizieren.

Die Dateien finden sich unter <https://github.com/moritz-hl/sylowftl> [6].

### 3.2 Grundlegende Definitionen

Zunächst führen wir einige grundlegenden Definitionen ein. Interessant ist hier insbesondere der Begriff der `disjunct collection`, den wir einführen, um später über disjunkte Vereinigung "sprechen" zu können.

`Let M, N denote sets.`

`Let x << M` stand for `x` is an element of `M`.

**Definition.**

`Prod(M,N) = { (x,y) | x << M and y << N }.`

**Definition.**

A subset of `M` is a set `N` `such that` every element of `N` is an element of `M`.

**Definition.**

`Let M` be a set.

`M` is empty iff there is no element `x` of `M` `such that` `x = x`.

**Definition.**

Let  $M$  be a set **such that** for all elements  $N$  of  $M$   $N$  is a set.

$\neg / M = \{x \mid \text{There is an element } N \text{ of } M \text{ such that } x \text{ is an element of } N\}.$

**Definition.**

Let  $N_1, N_2$  be sets.

$N_1 \neg / N_2 = \{x \mid x \text{ is an element of } N_1 \text{ or } x \text{ is an element of } N_2\}.$

**Definition.**

Let  $N_1$  be a set.

Let  $N_2$  be a subset of  $N_1$ .

$N_1 \setminus N_2 = \{x \mid x \text{ is an element of } N_1 \text{ and } (x \text{ is not an element of } N_2)\}.$

**Definition.**

Let  $N_1, N_2$  be a sets.

$N_1$  and  $N_2$  are disjunct iff there is no element  $x$  of  $N_1$  **such that**  $x$  is an element of  $N_2$ .

**Definition.**

A disjunct collection is a set  $M$  **such that**

(for all elements  $N$  of  $M$   $N$  is a set) and for all elements  $N_1, N_2$  of  $M$  ( $N_1 = N_2$  or ( $N_1$  and  $N_2$  are disjunct)).

**Definition.**

Let  $f$  be a function. Let  $M, N$  be sets.  $f$  is from  $M$  to  $N$  iff  $\text{Dom}(f) = M$  and for every element  $x$  of  $M$   $f[x]$  is an element of  $N$ .

**Definition.**

Let  $f$  be a function.  $\text{Range}(f) = \{f[x] \mid x \ll \text{Dom}(f)\}.$

**Definition.**

Let  $f$  be a function.  $f$  is injective iff for all elements  $x, y$  of  $\text{Dom}(f)$  **we have** ( $x \neq y \Rightarrow f[x] \neq f[y]$ ).

**Definition.**

Let  $f$  be a function.  $f$  is surjective onto  $M$  iff

( $f$  is from  $\text{Dom}(f)$  to  $M$

and for every  $y \ll M$  there is an element  $x$  of  $\text{Dom}(f)$  **such that**  $f[x]=y$ ).

### 3.3 Einführung des Gruppenbegriffs

Der Gruppenbegriff wird abstrakt als Notion eingeführt. Für diese Notion werden die Existenz einer Trägermenge  $E1(G)$ , die Existenz der Eins, Inversen und Verknüpfung sowie deren Eigenschaften axiomatisch gefordert. Die Verknüpfung  $a \cdot^G b$  muss explizit als Verknüpfung auf der Gruppe  $G$  gekennzeichnet werden.

[synonym group/-s]  
[synonym subgroup/-s]

**Signature.**

A group is a notion.

Let  $G$  denote a group.

**Signature.**

$\text{El}(G)$  is a set.

**Signature.**

$\text{One}(G)$  is an object.

**Axiom.**

$\text{One}(G) \ll \text{El}(G)$ .

**Signature.**

Let  $a, b$  be elements of  $\text{El}(G)$ .

$a *^{\{G\}} b$  is an element of  $\text{El}(G)$ .

**Signature.**

Let  $a$  be an element of  $\text{El}(G)$ .

$\text{Inv}(a, G)$  is an element of  $\text{El}(G)$ .

**Axiom Assoc.**

Let  $x, y, z$  be elements of  $\text{El}(G)$ .  $x *^{\{G\}} (y *^{\{G\}} z) = (x *^{\{G\}} y) *^{\{G\}} z$ .

**Axiom InvOne.**

Let  $x$  be an element of  $\text{El}(G)$ .  $x *^{\{G\}} \text{Inv}(x, G) = \text{One}(G) = \text{Inv}(x, G) *^{\{G\}} x$ .

**Axiom MulOne.**

Let  $x$  be an element of  $\text{El}(G)$ .  $x *^{\{G\}} \text{One}(G) = x = \text{One}(G) *^{\{G\}} x$ .

**Lemma InvUniq.**

Let  $x, y$  be elements of  $\text{El}(G)$ .

If  $x *^{\{G\}} y = \text{One}(G)$  then  $y = \text{Inv}(x, G)$ .

**Lemma OneUniq.**

Let  $x, y$  be elements of  $\text{El}(G)$ .

If  $x *^{\{G\}} y = x$  then  $y = \text{One}(G)$ .

### 3.4 Untergruppen

Untergruppen werden als Teilmengen von  $\text{El}(G)$  eingeführt. Im Beweis des zweiten Satzes von Sylow wird genutzt, dass Untergruppen selbst wieder eine Gruppenstruktur annehmen. Da wir den Begriff der Gruppe abstrakt eingeführt haben, ist es an dieser Stelle nicht möglich,

zu beweisen, dass  $\text{Gr}(U, G)$  eine Gruppe ist, weswegen diese Aussage als Axiom gefordert wird.

**Definition.**

A subgroup of  $G$  is set  $H$  such that  
 $(H \text{ is a subset of } \text{El}(G))$   
and  $(\text{One}(G) \ll H)$   
and (for every  $x \ll H$   $\text{Inv}(x, G) \ll H$ )  
and (for all elements  $x, y$  of  $H$   $x \cdot^G y \ll H$ ).

**Definition.**

Let  $U$  be a subgroup of  $G$ .  
 $\text{Gr}(U, G)$  is a group  $H$  such that  
 $(\text{El}(H) = U)$   
and  $(\text{One}(H) = \text{One}(G))$   
and (for every  $x \ll U$   $\text{Inv}(x, H) = \text{Inv}(x, G)$ )  
and (for all elements  $x, y$  of  $U$   $x \cdot^{\text{Gr}(U, G)} y = x \cdot^G y$ ).

**Lemma.**

Let  $G$  be a group.

Let  $H$  be a subset of  $\text{El}(G)$ .

Assume  $((\text{There is a } x \ll H \text{ such that } x = x) \text{ and } (\text{for all elements } y, z \text{ of } H \text{ } z \cdot^G y \ll H))$ .

$H$  is a subgroup of  $G$ .

**Proof.**

$\text{One}(G) \ll H$ .

**Proof.**

Take  $x \ll H$ .

Then  $\text{One}(G) = x \cdot^G \text{Inv}(x, G)$ .

Thus  $\text{One}(G) \ll H$ .

end.

For every  $x \ll H$   $\text{Inv}(x, G) \ll H$ .

**Proof.**

Let  $x$  be an element of  $H$ .

Then  $\text{Inv}(x, G) = \text{One}(G) \cdot^G \text{Inv}(x, G)$ .

Thus  $\text{Inv}(x, G) \ll H$ .

end.

For all elements  $x, y$  of  $H$   $x \cdot^G y \ll H$ .

**Proof.**

Let  $x, y$  be elements of  $H$ .

Then  $\text{Inv}(x, G) \ll H$ .

$x \cdot^G y = x \cdot^G \text{Inv}(\text{Inv}(y, G), G)$ .

Hence  $x \cdot^G y \ll H$ .

end.

Qed.

### 3.5 Nebenklassen

Wir führen Nebenklassen im Gegensatz zur Formalisierung in Lean nicht über Quotienten ein, sondern über die mengenbasierte Definition. Lemma 1.1 begründet, dass diese Ansätze das gleiche metatheoretische Objekt formalisieren.

**Definition.**

Let  $g$  be an element of  $\text{El}(G)$ .

Let  $H$  be a subgroup of  $G$ .

$\text{Coset}(g, H, G) = \{g *^{\{G\}} h \mid h \ll H\}$ .

**Lemma.**

Let  $H$  be a subgroup of  $G$ .

Let  $g_1, g_2$  be elements of  $\text{El}(G)$ .

Assume  $\text{Coset}(g_1, H, G)$  and  $\text{Coset}(g_2, H, G)$  are not disjoint.

$\text{Inv}(g_2, G) *^{\{G\}} g_1 \ll H$ .

**Proof.**

Take  $y \ll \text{El}(G)$  such that  $(y \ll \text{Coset}(g_1, H, G) \text{ and } y \ll \text{Coset}(g_2, H, G))$ .

Take  $b \ll H$  such that  $y = g_1 *^{\{G\}} b$ .

Take  $c \ll H$  such that  $y = g_2 *^{\{G\}} c$ .

We have  $g_1 = y *^{\{G\}} \text{Inv}(b, G)$ .

$g_2 = y *^{\{G\}} \text{Inv}(c, G)$ .

$\text{Inv}(g_2, G) = c *^{\{G\}} \text{Inv}(y, G)$ .

$\text{Inv}(y, G) *^{\{G\}} g_1 = \text{Inv}(b, G)$ .

Therefore  $\text{Inv}(g_2, G) *^{\{G\}} g_1 = c *^{\{G\}} (\text{Inv}(b, G))$ .

qed.

**Lemma.**

Let  $H$  be a subgroup of  $G$ .

Let  $g_1, g_2$  be elements of  $\text{El}(G)$ .

If  $\text{Inv}(g_2, G) *^{\{G\}} g_1 \ll H$

Then  $\text{Coset}(g_1, H, G) = \text{Coset}(g_2, H, G)$ .

**Proof.**

Assume  $\text{Inv}(g_2, G) *^{\{G\}} g_1 \ll H$ .

Every element of  $\text{Coset}(g_1, H, G)$  is an element of  $\text{Coset}(g_2, H, G)$ .

**Proof.**

Let  $y$  be an element of  $\text{Coset}(g_1, H, G)$ .

Take  $a \ll H$  such that  $y = g_1 *^{\{G\}} a$ .

$(\text{Inv}(g_2, G) *^{\{G\}} g_1) *^{\{G\}} a \ll H$ .

Then  $y = g_1 *^{\{G\}} a = g_2 *^{\{G\}} ((\text{Inv}(g_2, G) *^{\{G\}} g_1) *^{\{G\}} a)$ .

end.

Every element of  $\text{Coset}(g_2, H, G)$  is an element of  $\text{Coset}(g_1, H, G)$ .

**Proof.**

Let  $y$  be an element of  $\text{Coset}(g_2, H, G)$ .  
 Take  $a \in H$  such that  $y = g_2 *_{\{G\}} a$ .  
 $(\text{Inv}(g_2, G) *_{\{G\}} g_1) *_{\{G\}} a \in H$ .  
 Then  $y = g_2 *_{\{G\}} a = g_1 *_{\{G\}} ((\text{Inv}(g_1, G) *_{\{G\}} g_2) *_{\{G\}} a)$ .  
 end.

Therefore  $\text{Coset}(g_1, H, G) = \text{Coset}(g_2, H, G)$ .  
 Qed.

Lemma CosEq.

Let  $H$  be a subgroup of  $G$ .

Let  $g_1, g_2$  be elements of  $\text{El}(G)$ .

If  $\text{Coset}(g_1, H, G)$  and  $\text{Coset}(g_2, H, G)$  are not disjoint  
 then  $\text{Coset}(g_1, H, G) = \text{Coset}(g_2, H, G)$ .

Lemma.

Let  $H$  be a subgroup of  $G$ .

Let  $g_1, g_2$  be elements of  $\text{El}(G)$ .

$\text{Inv}(g_2, G) *_{\{G\}} g_1 \in H$  iff  $\text{Coset}(g_1, H, G) = \text{Coset}(g_2, H, G)$ .

Definition.

Let  $H$  be a subgroup of  $G$ .

$\text{Cosets}(H, G) = \{\text{Coset}(g, H, G) \mid g \in \text{El}(G)\}$ .

[synonym coset/-s]

Let  $a$  coset of  $H$  in  $G$  denote an element of  $\text{Cosets}(H, G)$ .

Lemma.

Let  $U$  be a subgroup of  $G$ .

$\text{El}(G) = \bigcup \text{Cosets}(U, G)$ .

Proof.

Let us show that every element of  $\text{El}(G)$  is an element of  $\bigcup \text{Cosets}(U, G)$ .

Let  $g$  be an element of  $\text{El}(G)$ .

$g$  is an element of  $\text{Coset}(g, U, G)$ .

end.

Let us show that every element of  $\bigcup \text{Cosets}(U, G)$  is an element of  $\text{El}(G)$ .

Let  $h$  be an element of  $\bigcup \text{Cosets}(U, G)$ .

Take an element  $k$  of  $\text{El}(G)$  such that  $h$  is an element of  $\text{Coset}(k, U, G)$ .

$\text{Coset}(k, U, G)$  is a subset of  $\text{El}(G)$ .

Hence  $h$  is an element of  $\text{El}(G)$ .

end.

Therefore  $\text{El}(G) = \bigcup \text{Cosets}(U, G)$ .

Qed.

Lemma.

Let  $G$  be a group.

Let  $U$  be a subgroup of  $G$ .  
 $\text{Cosets}(U, G)$  is a disjunct collection.  
**Proof.**  
Let us show that for every elements  $N1, N2$  of  $\text{Cosets}(U, G)$   $N1 = N2$  or ( $N1$  and  $N2$  are disjunct).  
Let  $N1, N2$  be cosets of  $U$  in  $G$ .  
Take elements  $g1, g2$  of  $\text{El}(G)$  such that  $N1 = \text{Coset}(g1, U, G)$  and  $N2 = \text{Coset}(g2, U, G)$ .  
If  $N1$  and  $N2$  are not disjunct then  $N1 = N2$  (by  $\text{CosEq}$ ).  
Therefore the thesis.  
end.  
Qed.

**Lemma.**  
Let  $G$  be a group.  
Let  $U$  be a subgroup of  $G$ .  
 $U$  is a coset of  $U$  in  $G$ .  
**Proof.**  
We have  $U = \text{Coset}(\text{One}(G), U, G)$ .  
Therefore the thesis.  
Qed.

**Definition.**  
Let  $g$  be an element of  $\text{El}(G)$ .  
Let  $U$  be a subgroup of  $G$ .  
 $\text{Conjugate}(g, U, G) = \{(g *^{\{G\}} (u *^{\{G\}} \text{Inv}(g, G))) \mid u \text{ is an element of } U\}$ .

**Definition.**  
Let  $U, V$  be subgroups of  $G$ .  
 $U$  and  $V$  are conjugates in  $G$  iff there is an element  $g$  of  $\text{El}(G)$  such that  $U = \text{Conjugate}(g, V, G)$ .

## 3.6 Zahlen

Da wir uns mit endlichen Gruppen, also insbesondere mit Kardinalitäten beschäftigen, führen wir nun die ganzen Zahlen ein. Herkömmliche Texte über die Sylowsätze [1] behandeln Fragen der elementaren Zahlentheorie nicht in voller Tiefe, sondern setzen eine gewisse mathematische Vorkenntnis voraus. In diesem Sinne führen auch wir die Zahlen abstrakt ein und fordern dann bekannte Eigenschaften axiomatisch.

[synonym integer/-s]  
[synonym number/-s]

**Signature** Integers. An integer is a notion.

**Signature** Naturals. A natural number is an integer.

Let  $a, b, c, d, e, n, m$  stand for integers.



Signature NatZero.  $0$  is a natural number.  
 Signature NatOne.  $1$  is a natural number.  
  
 Signature IntNeg.  $-a$  is an integer.  
 Signature IntPlus.  $a + b$  is an integer.  
 Signature IntMult.  $a * b$  is an integer.  
  
 Signature NatPot. Let  $b$  be a natural number.  $a ^ b$  is an integer.  
  
 Axiom NatPlus. If  $a$  and  $b$  are natural numbers then  $a + b$  is a natural number.  
 Axiom NatMult. If  $a$  and  $b$  are natural numbers then  $a * b$  is a natural number.  
  
 Signature NatLT.  $a < b$  is an atom.  
  
 Let  $a$  is smaller than  $b$  stand for  $a < b$ .  
  
 Axiom TriCh.  
 $a = b \vee a < b \vee b < a$ .  
  
 Axiom.  
 $a < b$  iff  $a \neq b$ .  
  
 Let  $a - b$  stand for  $a + (-b)$ .  
  
 Axiom NatSub.  
 If  $a < b$  then  $b - a$  is natural number.  
  
 Axiom AddAsso.  $a + (b + c) = (a + b) + c$ .  
 Axiom AddComm.  $a + b = b + a$ .  
 Axiom AddZero.  $a + 0 = a = 0 + a$ .  
 Axiom AddNeg.  $a - a = 0 = -a + a$ .  
  
 Axiom MulAsso.  $a * (b * c) = (a * b) * c$ .  
 Axiom MulComm.  $a * b = b * a$ .  
 Axiom MulOne.  $a * 1 = a = 1 * a$ .  
  
 Axiom Distrib.  $a * (b + c) = (a*b) + (a*c)$  and  
 $(a + b) * c = (a*c) + (b*c)$ .  
  
 Axiom ZeroDiv.  $a \neq 0 \wedge b \neq 0 \Rightarrow a * b \neq 0$ .  
  
 Axiom PotInj. Let  $p$  be an integer. Let  $n, m$  be natural numbers.  $(p ^ n = p ^ m) \Rightarrow n = m$ .  
 Axiom PotAdd. Let  $p$  be an integer. Let  $n, m$  be natural numbers.  $p ^ (n + m) = (p ^ n) * (p ^ m)$ .  
 Axiom PotNotZero. Let  $p$  be an integer. Let  $k$  be a natural number.  $p ^ k \neq 0$ .

**Lemma** MulZero.  $a * 0 = 0 = 0 * a$ .

**Proof.**

$a*(1+(-1)) = (a*1)+(a*(-1))=0$ .

**Qed.**

**Lemma** MulMinOne.  $(-1) * a = -a = a * -1$ .

**Proof.**

$a+(-1 * a) = (1*a)+(-1 * a) = 0$ .

**Qed.**

**Lemma** IntCanc.

$c \neq 0 \wedge a * c = b * c \Rightarrow a = b$ .

**Proof.**

Assume  $c \neq 0 \wedge a * c = b * c$ .

(1)  $(a + (-b)) * c = (a * c) + ((-b) * c) = 0$ .

Therefore  $a - b = 0$  (by ZeroDiv, 1).

**Qed.**

Let  $a$  is nonzero stand for  $a \neq 0$ .

Let  $p, q$  stand for nonzero integers.

[synonym divisor/-s] [synonym divide/-s]

**Definition** Divisor. A divisor of  $b$  is a nonzero integer  $a$  such that for some  $n$  ( $a * n = b$ ).

Let  $a$  divides  $b$  stand for  $a$  is a divisor of  $b$ .

Let  $a \mid b$  stand for  $a$  is a divisor of  $b$ .

**Axiom.**

Let  $k$  be a natural number.

$k \neq 0 \Rightarrow a \mid a^k$ .

**Lemma** DivPlus.

$q \mid a \wedge q \mid b \Rightarrow q \mid (a + b)$ .

**Definition** EquMod.  $a = b \pmod{q}$  iff  $q \mid a - b$ .

**Definition** NeqMod.  $a \neq b \pmod{q}$  iff not ( $a = b \pmod{q}$ ).

**Lemma** EquModRef.  $a = a \pmod{q}$ .

[ontored on]

**Lemma** EquModSym.  $a = b \pmod{q} \Rightarrow b = a \pmod{q}$ .

**Proof.**

Assume `that`  $a = b \pmod{q}$ .  
 (1) Take  $n$  `such that`  $q * n = a - b$ .  
 $q * -n := (-1) * (q * n)$  (by `MulMinOne`, `MulAsso`, `MulComm`, `MulBubble`)  
 $:= (-1) * (a - b)$  (by 1).  
 Therefore  $q \mid b-a$ .  
`qed.`

**Lemma** `EquModTrn`.  $a = b \pmod{q} \wedge b = c \pmod{q} \Rightarrow a = c \pmod{q}$ .  
**Proof.**

Assume `that`  $a = b \pmod{q} \wedge b = c \pmod{q}$ .  
 Take  $n$  `such that`  $q * n = a - b$ .  
 Take  $m$  `such that`  $q * m = b - c$ .  
 We `have`  $q * (n + m) = a - c$ .  
`qed.`

**Lemma** `EquModMul`.  $a = b \pmod{p * q} \Rightarrow a = b \pmod{p} \wedge a = b \pmod{q}$ .  
**Proof.**

Assume `that`  $a = b \pmod{p * q}$ .  
 Take  $m$  `such that`  $(p * q) * m = a - b$ .  
 We `have`  $p * (q * m) = a - b = q * (p * m)$ .  
`qed.`  
`[/ontored]`

### 3.7 Primzahlen

Auch den Begriff der Primzahl führen wir abstrakt ein. Bemerkenswert ist, dass nicht auf die herkömmliche Definition der Primzahlen zurückgegriffen wird, sondern im gesamten Beweis des zweiten Satzes von Sylow nur die durch das folgende Axiom geforderte Eigenschaft benötigt wird.

**Signature** `Prime`.  $a$  is prime is an atom.

**Let**  $a$  prime stand for a prime nonzero integer.

**Axiom.**

**Let**  $n$  be a natural number.

**Let**  $p$  be a prime.

**Let**  $k$  be a natural number.

**If**  $k \mid p^n$  **then**  $k = 1$  or  $p \mid k$ .

### 3.8 Ein Lemma über Potenzen

Das folgende Lemma wird eine zentrale Rolle im Beweis des zweiten Teiles des Satzes einnehmen. Wir liefern einen Beweis, der sich durch ein Symmetrieargument vereinfachen ließe, welches sich jedoch in Naproche nicht abbilden lässt.

**Lemma** DLogN.

**Let**  $p$  be a prime.

**Let**  $a, b$  be natural numbers.

**If**  $n = (p^a)^*c \wedge n = (p^b)^*d$  and  $p$  does not divide  $c$  and  $p$  does not divide  $d$  **then**  $a = b$ .

**Proof.**

Assume  $n = (p^a)^*c$  and  $n = (p^b)^*d$  and  $p$  does not divide  $c$  and  $p$  does not divide  $d$ .

$b$  is not smaller than  $a$ .

**Proof** by Contradiction.

Assume  $b < a$ .

We **have**  $p^a = (p^{a-b})^*(p^b)$ .

$$(1) \quad (p^a)^*c = (p^b)^*d.$$

$$(2) \quad ((p^{a-b})^*(p^b))^*c = (p^b)^*d.$$

$$(3) \quad ((p^b)^*(p^{a-b}))^*c = (p^b)^*d \text{ (by 1, MulComm).}$$

$$(4) \quad (p^b)^*((p^{a-b})^*c) = (p^b)^*d \text{ (by 3, MulAsso).}$$

$$(5) \quad ((p^{a-b})^*c)^*(p^b) = d^*(p^b) \text{ (by 4, MulComm).}$$

$$(6) \quad ((p^{a-b})^*c) = d \text{ (by 5, IntCanc, PotNotZero).}$$

$$a-b \neq 0.$$

$p$  is a divisor of  $p^{a-b}$ .

$p$  is a divisor of  $((p^{a-b})^*c)$ .

$p$  does divide  $d$ .

$p$  does not divide  $d$ .

Contradiction.

**end.**

$a$  is not smaller than  $b$ .

**Proof** by Contradiction.

Assume  $a < b$ .

We **have**  $p^b = (p^{b-a})^*(p^a)$ .

$$(1) \quad (p^b)^*d = (p^a)^*c.$$

$$(2) \quad ((p^{b-a})^*(p^a))^*d = (p^a)^*c.$$

$$(3) \quad ((p^a)^*(p^{b-a}))^*d = (p^a)^*c \text{ (by 1, MulComm).}$$

$$(4) \quad (p^a)^*((p^{b-a})^*d) = (p^a)^*c \text{ (by 3, MulAsso).}$$

$$(5) \quad ((p^{b-a})^*d)^*(p^a) = c^*(p^a) \text{ (by 4, MulComm).}$$

$(6)((p^{(b-a)}) * d) = c$  (by 5, IntCanc, PotNotZero).

$b-a \neq 0$ .

$p$  is a divisor of  $p^{(b-a)}$ .

$p$  is a divisor of  $((p^{(b-a)}) * d)$ .

$p$  does divide  $c$ .

$p$  does not divide  $c$ .

Contradiction.

end.

Therefore the thesis.

qed.

### 3.9 Endliche Mengen

Endliche Mengen führen wir als abstrakten Begriff ein und fordern dann axiomatisch die bekannten Eigenschaften. Interessant sind die Axiome `cardUnion0-2` bezüglich der Vereinigung von endlichen Mengen. Da wir die ganzen Zahlen abstrakt und insbesondere ohne ein Induktionsaxiom eingeführt haben, müssen wir die drei Axiome separat fordern, obwohl sie auf der Metaebene aus `cardUnion0` gefolgert werden können.

Signature.

A finite set is a set.

Axiom.

Let  $M$  be a finite set.

Let  $N$  be a subset of  $M$ .

$N$  is a finite set.

Axiom.

Let  $f$  be a function such that  $\text{Dom}(f)$  is a finite set.

$\text{Range}(f)$  is a finite set.

Axiom.

Let  $M, N$  be finite set.

$\text{Prod}(M, N)$  is a finite set.

Signature.

Let  $M$  be a finite set.

$\text{card}(M)$  is a natural number.

Axiom.

Let  $M$  be a finite set.

Let  $N$  be a subset of  $M$ .  
 If  $\text{card}(M) = \text{card}(N)$  then  $M = N$ .

**Axiom.**  
 Let  $M$  be a set such that for all elements  $N$  of  $M$   $N$  is a finite set.  
 $\backslash - /$   $M$  is a finite set.

**Axiom.**  
 Let  $N_1, N_2$  be finite sets.  
 $N_1 \backslash - / N_2$  is a finite set.

**Axiom cardUnion0.**  
 Let  $N_1, N_2$  be finite sets.  
 If  $N_1$  and  $N_2$  are disjoint then  $\text{card}(N_1 \backslash - / N_2) = \text{card}(N_1) + \text{card}(N_2)$ .

**Axiom cardUnion1.**  
 Let  $M$  be a set.  
 Let  $N$  be an element of  $M$ .  
 If  $M$  is a finite set such that every element of  $M$  is a finite set  
 and  $M$  is a disjoint collection  
 and for all elements  $N_1, N_2$  of  $M$   $\text{card}(N_1) = \text{card}(N_2)$   
 then  $\text{card}(\backslash - / M) = \text{card}(N) * \text{card}(M)$ .

**Axiom cardUnion2.**  
 Let  $M$  be a set.  
 Let  $k$  be an integer.  
 If  $M$  is a finite set such that every element of  $M$  is a finite set  
 and  $M$  is disjoint collection  
 and for all elements  $N$  of  $M$   $k \mid \text{card}(N)$   
 then  $k \mid \text{card}(\backslash - / M)$ .

**Axiom.**  
 Let  $N_1, N_2$  be finite sets.  
 $\text{card}(N_1) = \text{card}(N_2)$  iff there is a function  $f$  such that ( $f$  is from  $N_1$  to  $N_2$  and  $f$  is  
 injective and  $f$  is surjective onto  $N_2$ ).

**Axiom.**  
 Let  $M$  be a finite set.  
 If  $\text{card}(M) \neq 0$  then  $M$  is not empty.

**Axiom.**  
 Let  $M$  be a finite set.  
 $\text{card}(M) = 1$  iff there is  $y \ll M$  such that for all  $x \ll M$   $x = y$ .

**Axiom.**  
 Let  $M$  be a finite set.  
 Assume  $1 < \text{card}(M)$ .  
 Let  $x$  be an element of  $M$ .

There is  $y \in M$  such that  $x \neq y$ .

### 3.10 Der Satz von Lagrange

Der Satz von Lagrange ist ein grundlegender Satz der endlichen Gruppentheorie.

**Definition.**

A finite group is a group  $G$  such that  $\text{El}(G)$  is a finite set.

**Lemma.**

Let  $G$  be a finite group.

Let  $U$  be a subgroup of  $G$ .

$\text{Cosets}(U, G)$  is a finite set.

**Proof.**

Define  $f[g] = \text{Coset}(g, U, G)$  for  $g$  in  $\text{El}(G)$ .

$\text{Cosets}(U, G)$  is a subset of  $\text{Range}(f)$ .

Therefore the thesis.

**Qed.**

**Definition.**

Let  $G$  be a finite group.

Let  $U$  be a subgroup of  $G$ .

$\text{Index}(G, U) = \text{card}(\text{Cosets}(U, G))$ .

**Lemma.**

Let  $G$  be a finite group.

Let  $U, V$  be subgroups of  $G$  such that  $V$  and  $U$  are conjugates in  $G$ .

$\text{card}(U) = \text{card}(V)$ .

**Proof.**

Take an element  $g$  of  $\text{El}(G)$  such that  $V = \text{Conjugate}(g, U, G)$ .

Define  $f[u] = g \cdot u \cdot \text{Inv}(g, G)$  for  $u$  in  $U$ .

Let us show that  $f$  is from  $U$  to  $V$ .

$\text{Dom}(f) = U$ .

Let us show that for all elements  $u$  of  $U$   $f[u]$  is an element of  $V$ .

Let  $u$  be an element of  $U$ .

$f[u]$  is an element of  $V$ .

**end.**

**end.**

Let us show that  $f$  is injective.

Let us show that for all elements  $u_1, u_2$  of  $U$  if  $f[u_1] = f[u_2]$  then  $u_1 = u_2$ .

Let  $u_1, u_2$  be elements of  $U$  such that  $f[u_1] = f[u_2]$ .

We have  $u_1 = (\text{Inv}(g, G) \cdot (g \cdot u_1 \cdot \text{Inv}(g, G))) \cdot g$ .

We have  $u_2 = (\text{Inv}(g, G) \cdot (g \cdot u_2 \cdot \text{Inv}(g, G))) \cdot g$ .

Therefore  $u_1 = (\text{Inv}(g, G) \cdot f[u_1]) \cdot g = (\text{Inv}(g, G) \cdot f[u_2]) \cdot g = u_2$ .

end.  
end.

Let us show that  $f$  is surjective onto  $V$ .

Let us show that for every element  $v$  of  $V$  there is an element  $u$  of  $U$  such that  $f[u] = v$ .

Let  $v$  be an element of  $V$ .

We can take an element  $u$  of  $U$  such that  $v = (g \cdot u) \cdot \text{Inv}(g, G)$ .

Hence  $v = f[u]$ .

end.  
end.  
qed.

**Theorem** Lagrange.

Let  $G$  be a finite group.

Let  $U$  be a subgroup of  $G$ .

$\text{card}(\text{El}(G)) = \text{card}(U) \cdot \text{card}(\text{Cosets}(U, G))$ .

**Proof.**

Let us show that for all elements  $g$  of  $\text{El}(G)$   $\text{card}(\text{Coset}(g, U, G)) = \text{card}(U)$ .

Let  $g$  be an element of  $\text{El}(G)$ .

Define  $f[u] = g \cdot u$  for  $u$  in  $U$ .

$f$  is from  $U$  to  $\text{Coset}(g, U, G)$ .

$f$  is injective.

**Proof.**

Let us show that for all elements  $u_1, u_2$  of  $U$  If  $f[u_1] = f[u_2]$  then  $u_1 = u_2$ .

Let  $u_1, u_2$  be elements of  $U$  such that  $f[u_1] = f[u_2]$ .

We have  $u_1 = \text{Inv}(g, G) \cdot (g \cdot u_1) = \text{Inv}(g, G) \cdot (g \cdot u_2) = u_2$ .

Thus  $u_1 = u_2$ .

end.

Therefore the thesis.

end.

$f$  is surjective onto  $\text{Coset}(g, U, G)$ .

**Proof.**

Let us show that for every element  $y$  of  $\text{Coset}(g, U, G)$  there is an element  $u$  of  $U$  such that  $f[u] = y$ .

Let  $y$  be an element of  $\text{Coset}(g, U, G)$ .

Take an element  $u$  of  $U$  such that  $y = g \cdot u$ .

Then  $f[u] = y$ .

end.

Therefore the thesis.

end.

end.

(1)  $\text{Cosets}(U, G)$  is a disjunct collection and for all elements  $N_1, N_2$  of  $\text{Cosets}(U, G)$   $\text{card}(N_1) = \text{card}(N_2)$ .



- (2)  $\text{Cosets}(U, G)$  is a finite set **such that** for all element  $N1$  of  $\text{Cosets}(U, G)$   $N1$  is a finite set.
- (3)  $U$  is an element of  $\text{Cosets}(U, G)$ .

Therefore  $\text{card}(\bigcup \text{Cosets}(U, G)) = \text{card}(U) * \text{card}(\text{Cosets}(U, G))$  (by  $\text{cardUnion}$ , 1, 2, 3)

**Qed.**

### 3.11 Gruppenaktionen

Gruppenaktionen betrachten wir als Funktionen von  $\text{Prod}(\text{El}(G), M)$  nach  $M$  mit zusätzlichen Eigenschaften.

**Definition.**

**Let**  $M$  be a set.

**Let**  $G$  be a group.

A group action from  $G$  on  $M$  is a function  $f$

**such that**  $f$  is from  $\text{Prod}(\text{El}(G), M)$  to  $M$

and (for every element  $x$  of  $M$   $f[(\text{One}(G), x)] = x$ )

and for every element  $x$  of  $M$  for all elements  $a, b$  of  $\text{El}(G)$

$f[(a * \{G\} b), x] = f[a, f[b, x]]$ .

**Definition.**

**Let**  $M$  be a set.

**Let**  $G$  be a group.

**Let**  $f$  be a function from  $\text{Prod}(\text{El}(G), M)$  to  $M$ .

**Let**  $x$  be an element of  $M$ .

$\text{Orbit}(x, f, M, G) = \{ f[a, x] \mid a \ll \text{El}(G) \}$ .

**Definition.**

**Let**  $M$  be a set.

**Let**  $G$  be a group.

**Let**  $f$  be a group action from  $G$  on  $M$ .

**Let**  $x \ll M$ .

$\text{Stab}(x, f, M, G) = \{ y \mid y \ll \text{El}(G) \text{ and } f[y, x] = x \}$ .

**Lemma.**

**Let**  $M$  be a set.

**Let**  $G$  be a group.

**Let**  $f$  be a group action from  $G$  on  $M$ .

**Let**  $x \ll M$ .

$\text{Stab}(x, f, M, G)$  is a subgroup of  $G$ .

**Proof.**

$\text{One}(G)$  is an element of  $\text{Stab}(x, f, M, G)$ .

Let us show that for all elements  $y, z$  of  $\text{Stab}(x, f, M, G)$   $z \cdot \text{Inv}(y, G) \in \text{Stab}(x, f, M, G)$ .  
 Let  $y, z$  be elements of  $\text{Stab}(x, f, M, G)$ .  
 We have  $f[(z \cdot \text{Inv}(y, G), x)] = x$ .  
 Therefore  $z \cdot \text{Inv}(y, G)$  is an element of  $\text{Stab}(x, f, M, G)$ .  
 end.

Therefore the thesis.  
 Qed.

Lemma.

Let  $M$  be a set.  
 Let  $G$  be a group.  
 Let  $f$  be a group action from  $G$  on  $M$ .  
 Let  $x \in M$ .  
 Let  $g, h$  be elements of  $\text{El}(G)$ .  
 If  $\text{Coset}(g, \text{Stab}(x, f, M, G), G) = \text{Coset}(h, \text{Stab}(x, f, M, G), G)$  then  $f[(g, x)] = f[(h, x)]$ .

### 3.12 Stabilisator und Orbit

Außerhalb von Beweisen lassen sich in Naproche keine Funktionen definieren. In der herkömmlichen Mathematik werden Funktionen oft definiert und erst nachträglich auf "Wohldefiniertheit" bzw. Repräsentantenunabhängigkeit überprüft. Man könnte diesen Vorgang über einen Relationsbegriff und weitere Axiome formalisieren, in diesem Text belassen wir es jedoch dabei – auf Metaebene begründet durch das vorangegangene Lemma – die Existenz der folgenden Funktion als Axiom zu fordern.

Axiom.

Let  $M$  be a set.  
 Let  $G$  be a group.  
 Let  $f$  be a group action from  $G$  on  $M$ .  
 Let  $x \in M$ .  
 There is a function  $h$  such that  
 $h$  is from  $\text{Cosets}(\text{Stab}(x, f, M, G), G)$  to  $\text{Orbit}(x, f, M, G)$   
 and (for all elements  $i$  of  $\text{El}(G)$   $h[\text{Coset}(i, \text{Stab}(x, f, M, G), G)] = f[(i, x)]$ ).

Lemma.

Let  $G$  be a finite group.  
 Let  $f$  be a group action from  $G$  on  $M$ .  
 Let  $x \in M$ .  
 $\text{Orbit}(x, f, M, G)$  is a finite set.

Proof.

Define  $h[g] = f[(g, x)]$  for  $g$  in  $\text{El}(G)$ .  
 $\text{Dom}(h)$  is a finite set.  
 $\text{Orbit}(x, f, M, G)$  is a subset of  $\text{Range}(h)$ .

Proof.

Let us show that every element of  $\text{Orbit}(x, f, M, G)$  is an element of  $\text{Range}(h)$ .

(1) Let  $y$  be an element of  $\text{Orbit}(x, f, M, G)$ .

We can take an element  $g_1$  of  $\text{El}(G)$  such that  $y = f[(g_1, x)]$  (by 1).

Thus  $y$  is an element of  $\text{Range}(h)$ .

end.

end.

Therefore  $\text{Orbit}(x, f, M, G)$  is a finite set.

Qed.

Lemma.

Let  $M$  be a set.

Let  $G$  be a finite group.

Let  $f$  be a group action from  $G$  on  $M$ .

Let  $x \ll M$ .

$\text{Index}(G, \text{Stab}(x, f, M, G)) = \text{card}(\text{Orbit}(x, f, M, G))$ .

Proof.

Take a function  $h$  such that

$h$  is from  $\text{Cosets}(\text{Stab}(x, f, M, G), G)$  to  $\text{Orbit}(x, f, M, G)$

and (for all elements  $i$  of  $\text{El}(G)$   $h[\text{Coset}(i, \text{Stab}(x, f, M, G), G)] = f[(i, x)]$ ).

$h$  is surjective onto  $\text{Orbit}(x, f, M, G)$ .

Proof.

Let us show that for every element  $y$  of  $\text{Orbit}(x, f, M, G)$  there is an element  $z$  of  $\text{Dom}(f)$  such that  $f[z] = y$ .

Let  $y$  be an element of  $\text{Orbit}(x, f, M, G)$ .

Take an element  $i$  of  $\text{El}(G)$  such that  $f[(i, x)] = y$ .

Then we have  $h[\text{Coset}(i, \text{Stab}(x, f, M, G), G)] = y$ .

end.

end.

$h$  is injective.

Proof.

Let us show that for all elements  $h_1, h_2$  of  $\text{Cosets}(\text{Stab}(x, f, M, G), G)$  if  $h[h_1] = h[h_2]$  then  $h_1 = h_2$ .

Let  $h_1, h_2$  be elements of  $\text{Cosets}(\text{Stab}(x, f, M, G), G)$  such that  $h[h_1] = h[h_2]$ .

Take elements  $g_1, g_2$  of  $\text{El}(G)$  such that  $h_1 = \text{Coset}(g_1, \text{Stab}(x, f, M, G), G)$  and  $h_2 = \text{Coset}(g_2, \text{Stab}(x, f, M, G), G)$ .

Then  $f[(g_1, x)] = f[(g_2, x)]$ .

$f[((\text{Inv}(g_2, G) \cdot \{g_1\}), x)] = f[((\text{Inv}(g_2, G) \cdot \{g_2\}), x)] = x$ .

Thus  $\text{Inv}(g_2, G) \cdot \{g_1\}$  is an element of  $\text{Stab}(x, f, M, G)$ .

Therefore  $h_1 = h_2$ .

end.

end.  
qed.

### 3.13 Fixpunkte

Wir führen den Begriff des Fixpunktes und der Menge der Fixpunkte einer Gruppenaktion ein und beweisen ein Lemma.

**Definition.**

Let  $M$  be a set.

Let  $G$  be a group.

Let  $f$  be a group action from  $G$  on  $M$ .

A fixed point of  $f$  on  $M$  on  $G$  is an element  $y$  of  $M$  such that  
for every element  $a$  of  $\text{El}(G)$   $f[(a, y)] = y$ .

**Definition.**

Let  $M$  be a set.

Let  $G$  be a group.

Let  $f$  be a group action from  $G$  on  $M$ .

$\text{fixedPoints}(f, M, G) = \{y \mid y \text{ is a fixed point of } f \text{ on } M \text{ on } G\}$ .

**Lemma.**

Let  $M$  be a finite set.

Let  $G$  be a group.

Let  $f$  be a group action from  $G$  on  $M$ .

$\text{fixedPoints}(f, M, G)$  is a finite set.

**Proof.**

Let us show that every fixed point of  $f$  on  $M$  on  $G$  is an element of  $M$ .

Let  $x$  be a fixed point of  $f$  on  $M$  on  $G$ .

Then  $x$  is an element of  $M$ .

end.

$\text{fixedPoints}(f, M, G)$  is a subset of  $M$ .

Therefore the thesis.

Qed.

**Lemma.**

Let  $M$  be a set.

Let  $G$  be a finite group.

Let  $f$  be a group action from  $G$  on  $M$ .

Let  $x$  be an element of  $M$ .

$x$  is a fixed point of  $f$  on  $M$  on  $G$  iff  $\text{card}(\text{Orbit}(x, f, M, G)) = 1$ .

**Lemma** OrbitsIntersect.

Let  $M$  be a set.

Let  $G$  be a group.

Let  $f$  be a group action from  $G$  on  $M$ .  
Let  $x_1, x_2$  be elements of  $M$  such that  $\text{Orbit}(x_1, f, M, G)$  and  $\text{Orbit}(x_2, f, M, G)$  are not disjoint.  
 $x_1$  is an element of  $\text{Orbit}(x_2, f, M, G)$ .  
**Proof.**  
Take  $y \ll M$  such that  $y \ll \text{Orbit}(x_1, f, M, G)$  and  $y \ll \text{Orbit}(x_2, f, M, G)$ .  
Take  $g_1 \ll \text{El}(G)$  such that  $f[(g_1, x_1)] = y$ .  
Take  $g_2 \ll \text{El}(G)$  such that  $f[(g_2, x_2)] = y$ .  

$$x_1 = f[(\text{Inv}(g_1, G) \cdot \{g_1, x_1\})] = f[(\text{Inv}(g_1, G), y)] = f[(\text{Inv}(g_1, G) \cdot \{g_2, x_2\})].$$

Therefore the thesis.

**Qed.**

**Lemma.**

Let  $M$  be a set.

Let  $G$  be a group.

Let  $f$  be a group action from  $G$  on  $M$ .

Let  $x_1, x_2$  be elements of  $M$  such that  $\text{Orbit}(x_1, f, M, G)$  and  $\text{Orbit}(x_2, f, M, G)$  are not disjoint.

$\text{Orbit}(x_1, f, M, G) = \text{Orbit}(x_2, f, M, G)$ .

**Proof.**

Let us show that every element of  $\text{Orbit}(x_1, f, M, G)$  is an element of  $\text{Orbit}(x_2, f, M, G)$ .

Let  $x_3$  be an element of  $\text{Orbit}(x_1, f, M, G)$ .

$x_1$  is an element of  $\text{Orbit}(x_2, f, M, G)$  (by `OrbitsIntersect`).

Thus  $x_3$  is an element of  $\text{Orbit}(x_2, f, M, G)$ .

**end.**

Let us show that every element of  $\text{Orbit}(x_2, f, M, G)$  is an element of  $\text{Orbit}(x_1, f, M, G)$ .

Let  $x_3$  be an element of  $\text{Orbit}(x_2, f, M, G)$ .

$x_2$  is an element of  $\text{Orbit}(x_1, f, M, G)$  (by `OrbitsIntersect`).

Thus  $x_3$  is an element of  $\text{Orbit}(x_1, f, M, G)$ .

**end.**

**Qed.**

**Definition.**

Let  $M$  be a set.

Let  $G$  be a group.

Let  $f$  be a group action from  $G$  on  $M$ .

$\text{OrbitsNotFix}(f, M, G) = \{\text{Orbit}(x, f, M, G) \mid x \text{ is an element of } M \text{ and } x \text{ is not a fixed point of } f \text{ on } M \text{ on } G\}$ .

**Lemma.**

Let  $M$  be a set.

Let  $G$  be a group.

Let  $f$  be a group action from  $G$  on  $M$ .

OrbitsNotFix( $f, M, G$ ) is a disjunct collection.

**Lemma.**

Let  $M$  be a set.

Let  $G$  be a group.

Let  $f$  be a group action from  $G$  on  $M$ .

$\backslash\text{-/}$  OrbitsNotFix( $f, M, G$ ) =  $M \setminus \text{fixedPoints}(f, M, G)$ .

**Proof.**

Let us show that every element of  $\backslash\text{-/}$  OrbitsNotFix( $f, M, G$ ) is an element of  $M \setminus \text{fixedPoints}(f, M, G)$ .

Let  $x$  be an element of  $\backslash\text{-/}$  OrbitsNotFix( $f, M, G$ ).

Take an element  $y$  of  $M$  such that  $x$  is an element of Orbit( $y, f, M, G$ ) and  $y$  is not an element of  $\text{fixedPoints}(f, M, G)$ .

$x$  is an element of  $M$ .

$x$  is not a fixed point of  $f$  on  $M$  on  $G$ .

$\text{fixedPoints}(f, M, G)$  is a subset of  $M$ .

Therefore  $x$  is an element of  $M \setminus \text{fixedPoints}(f, M, G)$ .

end.

Let us show that every element of  $M \setminus \text{fixedPoints}(f, M, G)$  is an element of  $\backslash\text{-/}$  OrbitsNotFix( $f, M, G$ ).

Let  $x$  be an element of  $M \setminus \text{fixedPoints}(f, M, G)$ .

$x$  is an element of  $M$ .

$x$  is not a fixed point of  $f$  on  $M$  on  $G$ .

Orbit( $x, f, M, G$ ) is an element of OrbitsNotFix( $f, M, G$ ).

$x$  is an element of Orbit( $x, f, M, G$ ).

Therefore  $x$  is an element of  $\backslash\text{-/}$  OrbitsNotFix( $f, M, G$ ).

end.

qed.

**Lemma.**

Let  $M$  be a set.

Let  $G$  be a group.

Let  $f$  be a group action from  $G$  on  $M$ .

$\backslash\text{-/}$  OrbitsNotFix( $f, M, G$ ) and  $\text{fixedPoints}(f, M, G)$  are disjunct.

**Lemma.**

Let  $M$  be a set.

Let  $G$  be a group.

Let  $f$  be a group action from  $G$  on  $M$ .

$(\backslash\text{-/} \text{OrbitsNotFix}(f, M, G)) \cup \text{fixedPoints}(f, M, G) = M$ .

**Lemma.**

Let  $M$  be a finite set.

Let  $G$  be a finite group.

Let  $f$  be a group action from  $G$  on  $M$ .

OrbitsNotFix( $f, M, G$ ) is a finite set.

**Proof.**

Define  $h[x] = \text{Orbit}(x, f, M, G)$  for  $x$  in  $M$ .

$\text{OrbitsNotFix}(f, M, G)$  is a subset of  $\text{Range}(h)$ .

*Qed.*

*Lemma.*

Let  $M$  be a finite set.

Let  $G$  be a finite group.

Let  $f$  be a group action from  $G$  on  $M$ .

$\text{card}(M) = \text{card}(\text{\textbackslash-}/ \text{OrbitsNotFix}(f, M, G)) \text{\textbackslash-}/ \text{fixedPoints}(f, M, G))$   
 $= \text{card}(\text{fixedPoints}(f, M, G)) + \text{card}(\text{\textbackslash-}/ \text{OrbitsNotFix}(f, M, G)).$

*Signature.*

Let  $p$  be a prime.

A group of order  $p$  is a finite group  $H$  *such that*  
(there is a natural number  $n$  *such that*  $\text{card}(\text{El}(H)) = p^n$ ).

*Lemma.*

Let  $M$  be a finite set.

Let  $p$  be a prime.

Let  $G$  be a group of order  $p$ .

Let  $f$  be a group action from  $G$  on  $M$ .

$\text{card}(\text{fixedPoints}(f, M, G)) = \text{card}(M) \pmod{p}$ .

*Proof.*

$\text{\textbackslash-}/ \text{OrbitsNotFix}(f, M, G)$  is a subset of  $M$ .

Let us show that  $p \mid \text{card}(\text{\textbackslash-}/ \text{OrbitsNotFix}(f, M, G))$ .

Let us show that for all elements  $N1$  of  $\text{OrbitsNotFix}(f, M, G)$   $p \mid \text{card}(N1)$ .

Let  $N$  be an element of  $\text{OrbitsNotFix}(f, M, G)$ .

Take an element  $x$  of  $M$  *such that*  $N = \text{Orbit}(x, f, M, G)$ .

Let us show that  $\text{card}(N) \neq 1$ .

Assume the contrary.

$x$  is not a fixed point of  $f$  on  $M$  on  $G$ .

$x$  is an element of  $N$ .

Thus  $x$  is a fixed point of  $f$  on  $M$  on  $G$ .

Contradiction.

*end.*

We have  $\text{card}(N) = \text{Index}(G, \text{Stab}(x, f, M, G))$ .

Hence  $\text{card}(\text{El}(G)) = \text{card}(\text{Stab}(x, f, M, G)) * \text{card}(N)$  and  $\text{card}(N) \mid \text{card}(\text{El}(G))$ .

Therefore  $p \mid \text{card}(N)$ .

end.

(1)  $\text{OrbitsNotFix}(f, M, G)$  is a finite set such that every element of  $\text{OrbitsNotFix}(f, M, G)$  is a finite set.

(2)  $\text{OrbitsNotFix}(f, M, G)$  is a disjoint collection and for all elements  $N$  of  $\text{OrbitsNotFix}(f, M, G)$   $p \mid \text{card}(N)$ .

Therefore  $p \mid \text{card}(\setminus \text{OrbitsNotFix}(f, M, G))$  (by  $\text{cardUnion2}$ , 1, 2).

end.

We have  $\text{card}(M) = \text{card}(\text{fixedPoints}(f, M, G)) + \text{card}(\setminus \text{OrbitsNotFix}(f, M, G))$ .

Therefore  $\text{card}(M) = \text{card}(\text{fixedPoints}(f, M, G)) \pmod{p}$ .

qed.

### 3.14 Eine Gruppenaktion

Um den zweiten Satz von Sylow zu beweisen, muss eine explizite Gruppenaktion definiert werden, die wir als  $\text{Op}(U, P, G)$  bezeichnen.

Lemma.

Let  $P$  be a subgroup of  $G$ .

Let  $U$  be a subgroup of  $G$ .

Let  $u$  be an element of  $U$ .

Let  $x, y$  be elements of  $\text{El}(G)$  such that  $\text{Coset}(x, P, G) = \text{Coset}(y, P, G)$ .

Every element of  $\text{Coset}(u^{*G} x, P, G)$  is an element of  $\text{Coset}(u^{*G} y, P, G)$ .

Proof.

Let  $i$  be an element of  $\text{Coset}(u^{*G} x, P, G)$ .

Take an element  $p$  of  $P$  such that  $i = (u^{*G} x)^{*G} p$ .

Then we have  $\text{Inv}(u, G)^{*G} i = \text{Inv}(u, G)^{*G} ((u^{*G} x)^{*G} p)$

$= ((\text{Inv}(u, G)^{*G} u)^{*G} x)^{*G} p$

$= x^{*G} p$ .

$\text{Inv}(u, G)^{*G} i$  is an element of  $\text{Coset}(x, P, G)$ .

Therefore  $\text{Inv}(u, G)^{*G} i$  is an element of  $\text{Coset}(y, P, G)$

and  $i$  is an element of  $\text{Coset}(u^{*G} y, P, G)$ .

qed.

Lemma.

Let  $P$  be a subgroup of  $G$ .

Let  $U$  be a subgroup of  $G$ .

Let  $u$  be an element of  $U$ .

Let  $x, y$  be elements of  $\text{El}(G)$  such that  $\text{Coset}(x, P, G) = \text{Coset}(y, P, G)$ .

$\text{Coset}(u^{*G} x, P, G) = \text{Coset}(u^{*G} y, P, G)$ .

Proof.

Every element of  $\text{Coset}(u^{*G} x, P, G)$  is an element of  $\text{Coset}(u^{*G} y, P, G)$ .

Every element of  $\text{Coset}(u^{*G} y, P, G)$  is an element of  $\text{Coset}(u^{*G} x, P, G)$ .

Therefore the thesis.



Qed.

Aufgrund des vorangegangenen Lemmas führt die folgende Definition nicht zu Problemen hinsichtlich der Konsistenz der Formalisierung.

**Definition.**

Let  $P$  be a subgroup of  $G$ .

Let  $U$  be a subgroup of  $G$ .

$\text{Op}(U, P, G)$  is a function  $f$

such that  $f$  is from  $\text{Prod}(\text{El}(\text{Gr}(U, G)), \text{Cosets}(P, G))$  to  $\text{Cosets}(P, G)$  and

for all elements  $u$  of  $U$  for all elements  $x$  of  $\text{El}(G)$

$f[(u, \text{Coset}(x, P, G))] = \text{Coset}(u *^{\{G\}} x, P, G)$ .

**Lemma.**

Let  $P$  be a subgroup of  $G$ .

Let  $U$  be a subgroup of  $G$ .

$\text{Op}(U, P, G)$  is a group action from  $\text{Gr}(U, G)$  on  $\text{Cosets}(P, G)$ .

**Proof.**

Take a function  $f$  such that  $f = \text{Op}(U, P, G)$ .

Take a group  $H$  such that  $H = \text{Gr}(U, G)$ .

Take a set  $M$  such that  $M = \text{Cosets}(P, G)$ .

For every element  $x$  of  $M$  we have  $f[(\text{One}(H), x)] = x$ .

Let us show that for every element  $x$  of  $M$  for all elements  $a, b$  of  $\text{El}(H)$

$f[(a *^{\{H\}} b, x)] = f[(a, f[(b, x)])]$ .

Let  $x$  be an element of  $M$ .

Let  $a, b$  be elements of  $\text{El}(H)$ .

Take an element  $g$  of  $\text{El}(G)$  such that  $x = \text{Coset}(g, P, G)$ .

We have  $f[(b, x)] = \text{Coset}(b *^{\{G\}} g, P, G)$ .

$f[(a, f[(b, x)])] = \text{Coset}(a *^{\{G\}} (b *^{\{G\}} g), P, G)$ .

$f[(a *^{\{H\}} b, x)] = \text{Coset}((a *^{\{G\}} b) *^{\{G\}} g, P, G)$ .

Thus  $f[(a, f[(b, x)])] = f[(a *^{\{H\}} b, x)]$ .

end.

Therefore the thesis.

Qed.

### 3.15 Vorbereitung für den zweiten Satz von Sylow

Wir führen die Begriffe des zweiten Satzes von Sylow ein und zeigen, dass zwei Sylowgruppen die gleiche Kardinalität haben.

Signature.

Let  $p$  be a prime.

A subgroup of  $G$  of order  $p$  is a subgroup  $U$  of  $G$  such that  $\text{Gr}(U, G)$  is a group of order  $p$ .

Definition.

Let  $p$  be a prime.

Let  $G$  be a finite group.

$\text{Syl}(p, G) = \{P \mid P \text{ is a subgroup of } G \text{ of order } p \text{ and } \text{not } (p \mid \text{Index}(G, P))\}$ .

Lemma SylSize.

Let  $p$  be a prime.

Let  $G$  be a finite group.

Let  $P, U$  be elements of  $\text{Syl}(p, G)$ .

$\text{card}(U) = \text{card}(P)$ .

Proof.

Take natural numbers  $n, m$  such that  $p^n = \text{card}(U)$  and  $p^m = \text{card}(P)$ .

(1)  $\text{card}(\text{El}(G)) = (p^n) * \text{Index}(G, U)$   
and  $\text{card}(\text{El}(G)) = (p^m) * \text{Index}(G, P)$   
and  $p$  does not divide  $\text{Index}(G, U)$   
and  $p$  does not divide  $\text{Index}(G, P)$ .

Thus we have  $n = m$  (by DLogN, 1).

Therefore the thesis.

Qed.

## 3.16 Der zweite Satz von Sylow

Schlussendlich können wir den Beweis des zweiten Satzes von Sylow in Naproche formulieren.

Theorem Sylow2a.

Let  $p$  be a prime.

Let  $G$  be a finite group.

Let  $P$  be an element of  $\text{Syl}(p, G)$ .

Let  $U$  be a subgroup of  $G$  of order  $p$ .

There is an element  $g$  of  $\text{El}(G)$  such that  $\text{Conjugate}(g, U, G)$  is a subset of  $P$ .

Proof.

Take a group action  $f$  from  $\text{Gr}(U, G)$  on  $\text{Cosets}(P, G)$  such that  $f = \text{Op}(U, P, G)$ .

Let us show that  $\text{card}(\text{fixedPoints}(f, \text{Cosets}(P, G), \text{Gr}(U, G))) \neq 0$ .

We have  $\text{card}(\text{fixedPoints}(f, \text{Cosets}(P, G), \text{Gr}(U, G))) = \text{Index}(G, P) \pmod{p}$ .

$p$  does not divide  $\text{Index}(G, P)$ .

Therefore  $\text{Index}(G, P) \neq 0 \pmod{p}$ .

end.

We can take an element  $x$  of  $\text{fixedPoints}(f, \text{Cosets}(P, G), \text{Gr}(U, G))$   
and an element  $g$  of  $\text{El}(G)$  such that  $x = \text{Coset}(g, P, G)$ .

Let us show that every element of  $\text{Conjugate}(\text{Inv}(g, G), U, G)$  is an element of  $P$ .  
Let  $h$  be an element of  $\text{Conjugate}(\text{Inv}(g, G), U, G)$ .

Take an element  $u$  of  $U$  such that  $h = \text{Inv}(g, G) *^{\{G\}} (u *^{\{G\}} g)$ .

We have  $\text{Coset}(g, P, G) = f[(u, x)] = \text{Coset}((u *^{\{G\}} g), P, G)$ .

Therefore  $\text{Inv}(g, G) *^{\{G\}} (u *^{\{G\}} g)$  is an element of  $P$ .

Thus  $h$  is an element of  $P$ .

end.

Qed.

**Theorem** Sylow2b.

Let  $p$  be a prime.

Let  $G$  be a finite group.

Let  $P, U$  be elements of  $\text{Syl}(p, G)$ .

$P$  and  $U$  are conjugates in  $G$ .

**Proof.**

Take an element  $g$  of  $\text{El}(G)$  such that  $\text{Conjugate}(g, U, G)$  is a subset of  $P$ .

$\text{card}(\text{Conjugate}(g, U, G)) = \text{card}(U) = \text{card}(P)$ .

Hence  $\text{Conjugate}(g, U, G) = P$ .

qed.

## 4 Vergleich

### 4.1 Direkte Gegenüberstellung

#### 4.1.1 Herkömmliche Mathematik

**Theorem 4.1.** *Sei  $p$  eine Primzahl und  $G$  eine endliche Gruppe mit  $|G| = p^r \cdot m$ , sodass  $p \nmid m$ . Sei  $U \leq G$  eine  $p$ -Untergruppe, und sei  $P \leq G$  eine  $p$ -Sylowgruppe. Dann gilt:*

(i) *Es gibt ein  $g \in G$  mit*

$$gUg^{-1} \subseteq P.$$

(ii) *Je zwei  $p$ -Sylowgruppen sind konjugiert.*

*Beweis.* (i) Setze  $X := G/P$  und betrachte die Gruppenaktion

$$\phi : U \times X \rightarrow X$$

$$(u, gP) \mapsto ugP.$$

Nach Lemma 1.5 gilt

$$|X| = [G : P] = m \equiv |X^G| \pmod{p}.$$

Da  $p \nmid m$ , gilt  $X^G \neq \emptyset$ . Es existiert also ein  $g \in G$ , sodass  $ugP = gP$  für alle  $u \in U$ . Folglich ist  $g^{-1}Ug \subseteq P$  und damit  $U$  konjugiert zu  $P$  bzgl.  $g^{-1}$ .

(ii) Dies gilt insbesondere im Falle  $U \in \text{Syl}_p(G)$ . □

#### 4.1.2 Lean

```
lemma sylow_2 [fintype G] {p : ℕ} (hp : nat.prime p)
(H K : set G) [is_sylow H hp] [is_sylow K hp] :
  ∃ g : G, H = conjugate_set g K :=

have hs : card (left_cosets K) = card G / (p ^ dlogn p (card G)) :=
  (nat.mul_right_inj (pos_pow_of_pos (dlogn p (card G)) hp.pos)).1
$ by rw [← card_sylow K hp, ← card_eq_card_cosets_mul_card_subgroup,
  card_sylow K hp,
  nat.div_mul_cancel (dlogn_dvd _ hp.1)],

have hmodeq : card G / (p ^ dlogn p (card G)) ≡ card (fixed_points H (
  left_cosets K)) [MOD p] :=
eq.subst hs (mul_action.card_modeq_card_fixed_points hp (card_sylow H
  hp)),

have hfixed : 0 < card (fixed_points H (left_cosets K)) :=
```

```

nat.pos_of_ne_zero
( $\lambda$  h, (not_dvd_div_dlogn (fintype.card_pos_iff.2  $\langle$ (1 : G) $\rangle$ ) hp.1)
  (by rwa [h, nat.modeq.modeq_zero_iff] at hmodeq)),

```

### 4.1.3 Naproche

**Theorem** Sylow2a.

Let  $p$  be a prime.

Let  $G$  be a finite group.

Let  $P$  be an element of  $\text{Syl}(p, G)$ .

Let  $U$  be a subgroup of  $G$  of order  $p$ .

There is an element  $g$  of  $\text{El}(G)$  such that  $\text{Conjugate}(g, U, G)$  is a subset of  $P$ .

**Proof.**

Take a group action  $f$  from  $\text{Gr}(U, G)$  on  $\text{Cosets}(P, G)$  such that  $f = \text{Op}(U, P, G)$ .

Let us show that  $\text{card}(\text{fixedPoints}(f, \text{Cosets}(P, G), \text{Gr}(U, G))) \neq 0$ .

We have  $\text{card}(\text{fixedPoints}(f, \text{Cosets}(P, G), \text{Gr}(U, G))) = \text{Index}(G, P) \pmod{p}$ .

$p$  does not divide  $\text{Index}(G, P)$ .

Therefore  $\text{Index}(G, P) \neq 0 \pmod{p}$ .

end.

We can take an element  $x$  of  $\text{fixedPoints}(f, \text{Cosets}(P, G), \text{Gr}(U, G))$

and an element  $g$  of  $\text{El}(G)$  such that  $x = \text{Coset}(g, P, G)$ .

Let us show that every element of  $\text{Conjugate}(\text{Inv}(g, G), U, G)$  is an element of  $P$ .

Let  $h$  be an element of  $\text{Conjugate}(\text{Inv}(g, G), U, G)$ .

Take an element  $u$  of  $U$  such that  $h = \text{Inv}(g, G) *^{\{G\}} (u *^{\{G\}} g)$ .

We have  $\text{Coset}(g, P, G) = f[(u, x)] = \text{Coset}((u *^{\{G\}} g), P, G)$ .

Therefore  $\text{Inv}(g, G) *^{\{G\}} (u *^{\{G\}} g)$  is an element of  $P$ .

Thus  $h$  is an element of  $P$ .

end.

**Qed.**

**Theorem** Sylow2b.

Let  $p$  be a prime.

Let  $G$  be a finite group.

Let  $P, U$  be elements of  $\text{Syl}(p, G)$ .

$P$  and  $U$  are conjugates in  $G$ .

**Proof.**

Take an element  $g$  of  $\text{El}(G)$  such that  $\text{Conjugate}(g, U, G)$  is a subset of  $P$ .

$\text{card}(\text{Conjugate}(g, U, G)) = \text{card}(U) = \text{card}(P)$ .

Hence  $\text{Conjugate}(g, U, G) = P$ .

qed.

## 4.2 Beweisführung

Der zentrale Unterschied zwischen den beiden Formalisierungen ist, dass Lean eine funktionale Programmiersprache ist und auf der Typentheorie basiert. Dies führt zu einer sehr technischen Aufbau des Lean-Beweises durch die Komposition von Lambda-Termen. Als Beispiel hierfür betrachten wir einen Teil des Beweises, dass es sich bei der Sylow-Gruppenaktion um eine Gruppenaktion handelt:

```
one_smul : ∀ (x : left_cosets L1), (1 : L2) · x = x :=  
λ a, quotient.induction_on' a (λ a, quotient_group.eq.2  
(by simp [is_submonoid.one_mem]))
```

Im Gegensatz dazu arbeitet das Naprochesystem in einem deklarativen Stil, das heißt mit aneinandergereihten Aussagen, die durch den internen Reasoner sowie den externen ATP schrittweise verifiziert werden. Dies ermöglicht es dem Naproche-Text auf der einen Seite, auf sprachlicher Ebene recht nah am Stil der herkömmlichen Mathematik zu bleiben:

For every element  $x$  of  $M$  we have  $f[(\text{One}(H), x)] = x$ .

Auf der anderen Seite ermöglicht die Beschaffenheit von Lean als Programmiersprache jedoch gewisse Methoden wie die mehrfache Wiederholung von Argumenten durch sogenannte "Taktiken", was sich im deklarativen Stil von Naproche momentan nicht abbilden lässt (Betrachte den Beweis in Abschnitt 3.8).

```
example (p q : Prop) (hp : p) (hq : q) : p ∧ q :=  
by split; assumption
```

(Beispiel eines Taktik-Beweises in Lean unter Verwendung der Taktikverknüpfung ";", die dazu führt, dass die Taktik `assumption` auf alle verbleibenden `subgoals` angewandt wird [7].)

## 4.3 Algebraische Strukturen

Ein weiterer Unterschied ist die Behandlung von algebraischen Strukturen hinsichtlich der Begriffsbildung.

So existiert in Lean das System der Typenklassen, während in Naproche keine bis auf einen naiven Mengen und Funktionsbegriff keine Strukturelemente bereitgestellt werden.

Während in der Formalisierung in Lean beispielsweise die Gruppen strukturell als Erweiterung des Typenklasse `Monoid` entstehen, werden diese in der Naproche-Formalisierung als abstrakte Notion eingeführt. Als exemplarisch stellt sich die Behandlung der Untergruppen heraus:

```
instance subtype.group s : set α [is_subgroup] s : group s := ...
```

Hier wird in Lean gezeigt, dass Untergruppen eine `instance` der Typenklasse `group` ist. Dies sorgt dafür, dass sich Untergruppen in Lean nun ohne weitere Notation auch als Gruppen auffassen lassen. Da Naproche keine solche Strukturen bereitstellt, benötigten wir hierfür die axiomatische geforderte Gruppe  $\text{Gr}(U, G)$  (siehe Abschnitt 3.2).

## 4.4 Nebenklassen

Der Begriff der Nebenklassen ist in den vorliegenden Formalisierungen insofern interessant, als er in Lean und Naproche auf zwei verschiedene Arbeiten umgesetzt wird. Während diese in Lean als Quotienten eingeführt werden

```
def left_rel [group  $\alpha$ ] (s : set  $\alpha$ ) [is_subgroup s] : setoid  $\alpha$  :=
  ⟨λ x y,  $x^{-1} * y \in s$ ,
  assume x, by simp [is_submonoid.one_mem],
  assume x y hxy,
  have  $(x^{-1} * y)^{-1} \in s$ , from is_subgroup.inv_mem hxy,
  by simpa using this,
  assume x y z hxy hyz,
  have  $x^{-1} * y * (y^{-1} * z) \in s$ , from is_submonoid.mul_mem hxy hyz,
  by simpa [mul_assoc] using this⟩

def left_cosets [group  $\alpha$ ] (s : set  $\alpha$ ) [is_subgroup s] : Type* :=
  quotient (left_rel s)
```

haben wir uns in Naproche aufgrund des dort fehlenden Quotientenbegriffes für eine mengenbasierte Definition entschieden:

**Definition.**

Let  $g$  be an element of  $\text{El}(G)$ .

Let  $H$  be a subgroup of  $G$ .

$\text{Coset}(g, H, G) = \{g * \{G\} h \mid h \ll H\}$ .

Das Lemma 1.1 beweist, dass beide Ansätze das gleiche metatheoretische Objekt beschreiben.

## 4.5 Funktionsdefinitionen

Während Lean als funktionale Programmiersprache verschiedene Möglichkeiten zur Definition von Funktionen und Strukturen bereitstellt (Siehe [7]), stellt Naproche nur einen eingeschränkten naiven Funktions- und Mengenbegriff zur Verfügung. Während innerhalb von Beweisen in Naproche durch Ausdrücke der Form `Let f[x] = y for x in M` Funktionen definiert werden können, gibt es auf der globalen Ebene nur die Möglichkeit, Funktionen durch Axiome beziehungsweise 'axiomatische' Definitionen zu fordern. Dies führt zu den in Abschnitt 3.12 angesprochenen Problemen hinsichtlich der "Wohldefiniertheit".

## 4.6 Struktur

Im herkömmlichen Beweis [1] werden die grundlegende Eigenschaften von endlichen Mengen und den ganzen Zahlen als bekannt vorausgesetzt. Dies spiegelt sich in der Formalisierung

in Naproche insofern wieder, als diese Eigenschaften axiomatisch gefordert und nicht explizit bewiesen werden. In der Lean-Formalisierung hingegen wird mithilfe der umfassenden mathlib ausgehend von grundlegenden typentheoretischen Definitionen eine abgeschlossene Theorie aufgebaut und verifiziert.

Es wäre wünschenswert, die Naproche-Formalisierung als Ganzes verifizieren zu lassen. Daran scheitert jedoch das System aus Komplexitätsgründen, weswegen wir in jeder Datei jeweils die Aussagen und Definitionen der vorangegangenen Dateien als Axiome ohne Beweise einbinden. Dieser Ansatz findet sich insofern in der herkömmlichen Mathematik, als dort auch nur die Aussagen eines bereits bewiesenen Theorems zitiert werden, wohingegen die exakte Ausgestaltung des Beweises meist eine untergeordnete Rolle spielt: "Nach Lemma 1.5 gilt [...]"[1].

Im Gegensatz hierzu profitiert Lean als Programmiersprache von der Möglichkeit, Bibliotheken einzubinden. Es ist insbesondere möglich, Dateien oder ganze Bibliotheken durch den Kommandozeilenbefehl `leanpkg build` in `.olean` Binärdateien zu übersetzen, die von Lean dann weitaus schneller verifiziert werden können. Dies ermöglicht es, mit umfangreichen Bibliotheken wie der mathlib [3] interaktiv zu arbeiten.

## 4.7 Lesbarkeit

In der vorangegangenen Gegenüberstellung ist erkennbar, dass der deklarative Stil von Naproche / ForTheL sowie der Verwendung von kontrollierter natürlicher Sprache dazu führt, dass der Naproche-Text für herkömmliche Mathematiker lesbar ist. So ist bis auf die Layout- und Gestaltungsebene eine große oberflächliche Ähnlichkeit zwischen den Beweisen zu erkennen. Betrachte:

Nach Lemma 1.5 gilt

$$|X| = [G : P] \equiv |X^G| \pmod{p}.$$

We have `card(fixedPoints(f, Cosets(P, G), Gr(U, G))) = Index(G, P) (mod p)`.

Im Gegensatz hierzu lässt sich die Formalisierung in Lean nur mit einer gewissen Vorkenntnis in funktionaler Programmierung und dem Beweisen mithilfe von Taktiken verstehen. Beispielweise:

```
(λ h, (not_dvd_div_dlogn (fintype.card_pos_iff.2 ⟨(1 : G)⟩) hp.1)
```

## 4.8 Elaborating

Ein Vorteil von Lean gegenüber Naproche / ForTheL hinsichtlich der Lesbarkeit ist das sogenannte "Elaborating". Aufgrund der strikten Typisierung ist Lean in der Lage, beispielsweise bei Ausdrücken der Form  $a * b$  mit  $a, b : G$  selbstständig aus dem Kontext zu ermitteln, dass es sich bei  $*$  um die Verknüpfung von  $G$  handelt. Da dies in Naproche nicht möglich ist, entstehen sperrige Ausdrücke wie beispielsweise `fixedPoints(Op(U, P, G), Cosets(P, G),`



$\text{Gr}(U, G)$ ), die die Lesbarkeit des Naproche-Textes vermindern. In der herkömmlichen Mathematik findet sich hier oft ein Kompromiss. So werden an einigen Stellen die Abhängigkeiten gekennzeichnet, wie zum Beispiel im Ausdruck  $\text{Syl}_p(G)$ , während an anderen Stellen, wie in *Je zwei  $p$ -Sylowgruppen sind konjugiert*, aus dem Kontext ersichtlich wird, welche Gruppe gemeint ist.

## 4.9 User Experience

Wir wollen nun einige Aspekte des Arbeitens mit den beiden Systemen beschreiben.

Ein Gesichtspunkt ist die Stabilität der Systeme. Solange man die gleiche Lean Version verwendet, kann man einen einmal geschriebenen Lean-Text in verschiedenen Umgebungen verifizieren. Für verschiedene Versionen von Lean gilt dies jedoch nicht. So ist zum Beispiel die ursprüngliche Lean Datei [2] mit der Lean Version 3.4.2 nicht mehr kompatibel und musste deswegen angepasst werden. Im Gegensatz hierzu ist das Verifizieren in Naproche sehr instabil. So führt das Verändern weniger Zeilen im Quelltext häufig dazu, dass Aussagen an anderen Stellen, die vorher verifiziert wurden, nicht mehr verifiziert werden. Insbesondere ist das Zusammenarbeiten mehrerer Personen mit verschiedenen Betriebssystemen momentan dadurch gehindert, dass nach unserer Erfahrung auf Linux und Mac verifizierte Dateien unter Windows oftmals nicht ohne weitere Veränderungen verifiziert werden konnten.

In Naproche scheint insbesondere der Reasoner eine Rolle zu spielen, der in unserer Arbeit große Schwierigkeiten hatte, Funktionsterme auf ontologische Korrektheit zu überprüfen, weswegen wir deren Einsatz auf ein Minimum reduzieren mussten.

Schlussendlich würde insbesondere das Naproche-System von einer ausgeprägteren Dokumentation profitieren, da momentan viel Zeit darauf verloren geht, sich über einen Trial-and-Error-Prozess mit den Systemen vertraut zu machen.

Lean profitiert von den ausgeprägten Fehlermeldungen, die oftmals klar erkennbar machen, welche Zeilen in welcher Form geändert werden müssen, um eine valide Datei zu erhalten. Schreibt man anstatt "contradiction" fälschlicherweise "contradictio", so meldet Lean "unknown identifier contradictio" während Isabelle-Naproche erst am Ende der Zeile "unexpected ." reklamiert. Schlägt die Verifizierung fehl, so gibt Lean beispielsweise folgende Fehlermeldung aus:

```
contradiction tactic failed
state:
x y : ℕ,
h : x = y
⊢ y = x
```

während Isabelle-Naproche nur [Reasoner] goal failed zurückgibt.

## 5 Diskussion

### 5.1 Begriffsbildung

Um mathematische Beweise zu formalisieren, ist es grundlegend, die im Beweis vorkommenden Begriffe im jeweiligen System zu implementieren. Im vorliegenden Projekt ist insbesondere die Implementierung der Nebenklassen (Siehe Abschnitt 4.4) zu betrachten. Für diese werden zwei verschiedene Ansätze genutzt, die auf der Metaebene äquivalent sind.

Interessant wäre es, Möglichkeiten zu schaffen, Formalisierungen in verschiedenen Systemen auf einer Metaebene miteinander zu kombinieren, um die jeweiligen Vorteile auszunutzen. Hätte man diesen Schritt vollzogen, so könnte man die vorliegende Formalisierung des zweiten Satzes von Sylow in Naproche durch die Lean-Formalisierung der ganzen Zahlen und Kardinalitäten von endlichen Mengen vervollständigen, um eine in sich geschlossene Formalisierung zu erhalten, deren Hauptresultat in der für Mathematiker leichter lesbaren kontrollierten natürlichen Sprache ForTheL vorliegt, während elementare technische Aussagen durch Lean mithilfe der bestehenden mathlib verifiziert werden würden.

Um die verschiedenen Ansätze zu kombinieren, benötigt man Mittel, Begriffe des einen Systems in Begriffe des anderen Systems umzusetzen. Dies setzt gewisse Konventionen in der Begriffsbildung voraus. (Die Benennungskonventionen der mathlib sind in [8] zu finden). Hervorzuheben ist das Projekt "Formal Abstracts" [9], das zentrale Sätze der Mathematik in Lean formuliert, um eine einheitliche Grundlage für weitere Formalisierungen zu schaffen.

### 5.2 Vorschläge zur Weiterentwicklung an Naproche

Als Resultat des Formalisierungsprozesses sind einige Ideen für die Weiterentwicklung des Naprochesystems entstanden.

- So wäre es wünschenswert, eine native Option zu haben, mit algebraischen Strukturen umzugehen, da diese Ausgangspunkt vieler mathematischer Theorien sind und momentan von Naproche nicht unterstützt werden. (Siehe Abschnitt 3.2 bezüglich der Formalisierung des Gruppenbegriffes).
- Des Weiteren ist der aktuell in Naproche implementierte Funktionsbegriff nicht ausreichend, um Konstrukte wie in Abschnitt 3.12 abzudecken. In Lean werden solche Konstruktionen durch den Quotientbegriff `quot` abgedeckt (Siehe Abschnitt 2.1). Insofern wäre es sinnvoll, einen solchen auch in Naproche zu implementieren.
- Ein großer Teil des Formalisierens in Naproche beschränkte sich darauf, die Ausdrücke so zu modifizieren, dass sie vom Reasoner auf ontologische Korrektheit überprüft werden konnten. In Anbetracht der vorangegangenen Punkte, wäre es interessant, den Reasoner hinsichtlich evtl. nativen Konstrukte zu optimieren. Momentan scheint dieser gerade bei Funktionstermen große Probleme zu haben, sodass an vielen Stellen weitere Argumente hinzugefügt werden mussten.

- Eine weitere Idee, die während unseres Projektes entstanden ist, ist das Einführen eines weiteren Axiom-Begriffes. So finden sich in unser Formalisierung zum einen "grundlegende" Axiome wie die Forderung des Existenz von Inversen in einer Gruppe (Siehe Abschnitt 3.2) und "voraussetzenden" Axiome wie `cardUnion1` (Siehe Abschnitt 3.9.), welche im Gegensatz zu den "grundlegenden" Axiomen sozusagen die mathematischen Vorkenntnisse beschreiben, die von einem Leser eines herkömmlichen Textes über die Sylow-Sätze gefordert werden. Es wäre eventuell sinnvoll, eine Möglichkeit der expliziten Unterscheidung dieser Axiome vorzunehmen. (Zum Beispiel durch das Einführen des Bezeichners `Presupposition` zusätzlich zu `Axiom`.)
- Für das Einbinden von anderen Dateien existiert in Isabelle-Naproche bereits der `read` Befehl. Dieser kann allerdings in der momentanen Ausführung nur auf Dateien im `examples` Ordner zugreifen. Es wäre wünschenswert, auch auf andere Verzeichnisse zugreifen zu können. In Anlehnung an die `.olean` Binärdateien in Lean wäre es zudem sinnvoll, einen ähnlichen Übersetzungsprozess in Naproche zu implementieren, um bereits verifizierte Texte effizienter einlesen zu können.
- Genauere Fehlermeldungen in Isabelle-Naproche würden den Prozess des Formalisierens vermutlich vereinfachen, da gerade die Arbeit des `Reasoners` in Kombination mit dem externen ATP momentan eine Blackbox ist, was dazu führt, dass das Beheben von Fehlern meist nur durch langwieriges Ausprobieren realisierbar ist.
- Es wäre des Weiteren sinnvoll, Isabelle-Naproche dahingehend anzupassen, dass es sich unter den verschiedenen Betriebssystemen identisch verhält. So brechen unter Mac Os X die Beweise momentan nach einer bestimmten Zeit ab, während dies unter Windows nicht der Fall ist. Dies hindert die gemeinsame Entwicklung von Naproche-Texten.
- Schlussendlich würde eine ausgeprägtere Dokumentation des Isabelle-Naproche im Sinne des Einführungstextes "Theorem Proving in Lean" [7] insbesondere den Einstieg in das Arbeiten mit Naproche vereinfachen.

## 5.3 Fazit

Zusammenfassend ist erkennbar geworden, dass die betrachteten Formalisierungssysteme unterschiedliche Ansätze verfolgen, welche verschiedene Vor- und Nachteile haben. Während Lean als typentheoretische funktionale Programmiersprache von der Möglichkeit des effizienten Einbindens von umfassenden Bibliotheken wie der `mathlib` sowie der interaktiven Unterstützung durch präzise Fehlermeldungen profitiert, liegt der Vorteil von Naproche im deklarativen Stil und der natürlichen Sprache, die es ermöglicht, Formalisierungen zu erstellen, die Texten der herkömmlichen Mathematik ähneln. Erstrebenswert wäre es, Möglichkeiten der Kombination der beiden Systeme zu schaffen, um auch umfassendere mathematische Theorien in einem für gewöhnliche Mathematiker verständlichen Stil zu formalisieren.

## Literatur

- [1] J. Schröder. Eine Einführung in die Algebra (Skript, WS 19/20, Bonn). 2020.
- [2] C. Hughes. Sylow. <https://github.com/ChrisHughes24/Sylow>.
- [3] mathlib. <https://github.com/leanprover-community/mathlib>, .
- [4] 2. Satz von Sylow in Lean. <https://github.com/moritz-hl/sylow2>, .
- [5] M. Wenzel. ISABELLE/NAPROCHE FOR AUTOMATIC PROOF-CHECKING OF ORDINARY MATHEMATICAL TEXTS. <https://sketis.net/2019/isabelle-naproche-for-automatic-proof-checking-of-ordinary-mathematical-texts>.
- [6] 2. Satz von Sylow in Naproche. <https://github.com/moritz-hl/sylowftl>, .
- [7] J. Avigad. Theorem Proving in Lean. [https://leanprover.github.io/theorem\\_proving\\_in\\_lean/tactics.html](https://leanprover.github.io/theorem_proving_in_lean/tactics.html).
- [8] Mathlib naming conventions. <https://github.com/leanprover-community/mathlib/blob/master/docs/contribute/naming.md>, .
- [9] T. Hales. Formal Abstracts. <https://formalabstracts.github.io>, 2017.