

A számításelmélet alapjai I. (Nyolcadik gyakorlat)

Dr. Lázár Katalin Anna

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
e-mail: lazarkati@elte.hu

2024. április 9.

- Környezetfüggetlen grammatikák és nyelvek. Levezetési fa.
- Az aktív/nem aktív (inaktív) nemterminális, az elérhető/nem elérhető nemterminális, a hasznos/nem hasznos nemterminális fogalma. A redukált környezetfüggetlen grammatika fogalma
- ε -mentes grammatikák. A környezetfüggetlen grammatikák Chomsky normálformája.

Példa 1

Legyen $G = (\{S\}, \{a\}, \{S \rightarrow SS, S \rightarrow a\}, S)$.

- Igazoljuk, hogy G nem egyértelmű!
- Határozzuk meg $L(G)$ -t!

Példa 2

Legyen $G = (N, T, P, S)$, ahol $N = \{S, A\}$, $T = \{a, b, c\}$ és $P = \{S \rightarrow abSba, S \rightarrow A, A \rightarrow cAc, A \rightarrow cc\}$.

- Bizonyítsuk be, hogy a $w = (ab)^2c^2(ba)^2 \in L(G)$!
- Adjuk meg $L(G)$ -t!

Példa 3

Legyen $G = (N, T, P, S)$, ahol $N = \{S, A, B\}$, $T = \{a, b\}$ és $P = \{S \rightarrow ABS, S \rightarrow AB, A \rightarrow aA, A \rightarrow a, B \rightarrow bA\}$. Az alábbi szavak közül melyek vannak $L(G)$ -ben:

- $aabaab$,
- $aaaaba$,
- $aabbba$,
- $abaaba$?

Indokoljuk meg az állítást!

Aktív, elérhető és hasznos nemterminálisok

Példa 4

Legyen $G = (N, T, P, S)$, ahol $N = \{S, X, Y, Z\}$, $T = \{a, b\}$, ahol $P = \{S \rightarrow YXX, S \rightarrow ab, X \rightarrow YY, X \rightarrow bY, Y \rightarrow aa, Y \rightarrow aX, Z \rightarrow aSa, Z \rightarrow b\}$. Határozzuk meg G hasznos nemterminálisainak halmazát!

Példa 4

Megjegyzés

- Az A nemterminális hasznos a G grammatikában, ha aktív és elérhető.
- Akkor mondjuk, hogy A aktív, ha G -ben levezethető belőle terminális szó, azaz $A \Rightarrow^* v$ valamely $v \in T^*$ -ra.
- Akkor mondjuk, hogy A G -ben elérhető, ha létezik G -ben $S \Rightarrow^* uAv$ levezetés, ahol $u, v \in (N \cup T)^*$.

Példa 4

Megjegyzés

- Először az aktív nemterminálisok halmazát határozzuk meg az alábbi halmazsorozat segítségével: $A_1 = \{X \mid X \rightarrow u \in P, u \in T^*\}$,
 $A_{i+1} = A_i \cup \{X \mid X \rightarrow w \in P, w \in (T \cup A_i)^*\}, i = 1, 2, \dots$
- Ezek a halmazok nemcsökkenő hierarchiát alkotnak a tartalmazásra nézve. Mivel a nemterminálisok száma véges, létezik olyan k szám, hogy $A_k = A_l$ teljesül minden $l \geq k$ -ra.

Példa 4

Megjegyzés

- Ezután az elérhető nemterminálisokat határozzuk meg a következő halmazsorozat segítségével: $R_1 = \{S\}$, $R_{i+1} = R_i \cup \{Y \mid X \rightarrow uYw \in P, X \in R_i, u, w \in (N \cup T)^*\}$, $i = 1, 2, \dots$. Az előzőekhez hasonlóan létezik olyan m szám, hogy $R_m = R_l$ minden $l \geq m$ esetben.

Aktív, elérhető és hasznos nemterminálisok

Példa 5

Legyen $G = (N, T, P, S)$, ahol $N = \{S, A, B, C, D\}$, $T = \{a, b, c\}$, ahol $P = \{S \rightarrow bCB, S \rightarrow bBB, S \rightarrow abD, A \rightarrow ADb, A \rightarrow bD, C \rightarrow bBc, C \rightarrow aCB, D \rightarrow DD, D \rightarrow Cb, D \rightarrow \varepsilon\}$. Adjunk meg olyan G -vel ekvivalens G' grammatikát, amelynek minden szimbóluma hasznos! Adjuk meg $L(G)$ -t!

Aktív, elérhető és hasznos nemterminálisok

Példa 6

Legyen $G = (N, T, P, S)$, ahol $N = \{S, A, B, C, D\}$, $T = \{a, b\}$, ahol $P = \{S \rightarrow B, A \rightarrow AbB, A \rightarrow BA, A \rightarrow b, B \rightarrow aAB, B \rightarrow \varepsilon, C \rightarrow DC, C \rightarrow \varepsilon, D \rightarrow CD, D \rightarrow \varepsilon\}$.

- Határozzuk meg G aktív, elérhető és hasznos nemterminálisainak halmazát!
- Adjunk G -vel ekvivalens és csak hasznos szimbólumokat tartalmazó grammatikát!

Redukált környezetfüggetlen grammatika

Példa 7

Legyen $G = (N, T, P, S)$, ahol $N = \{S, A, B, C\}$, $T = \{a, b\}$, ahol $P = \{S \rightarrow SAAC, S \rightarrow AAA, A \rightarrow AB, A \rightarrow ab, B \rightarrow b, B \rightarrow CC, C \rightarrow CA\}$. Adjunk meg olyan G -vel ekvivalens G' grammatikát, amely redukált (nem redundáns)!

Redukált környezetfüggetlen grammatika

Példa 7

Megjegyzés

Egy környezetfüggetlen grammatika redukált (nem redundáns), ha minden nemterminálisa aktív és elérhető.

Példa 8

Legyen $G = (N, T, P, S)$ környezetfüggetlen grammatika, ahol $N = \{S, A, B, C\}$, $T = \{a, b, c\}$ és $P = \{S \rightarrow cBBA, S \rightarrow cAc, S \rightarrow c, A \rightarrow bB, A \rightarrow a, A \rightarrow \varepsilon, B \rightarrow aB, B \rightarrow b, C \rightarrow ccc\}$. Konstruáljunk egy G' környezetfüggetlen grammatikát, úgy, hogy $L(G) - \{\varepsilon\} = L(G')$ legyen! (G' G -vel ekvivalens ε -mentes környezetfüggetlen grammatika.)

Példa 8

Megjegyzés

- P' -t a következőképpen konstruáljuk meg: minden $X \rightarrow u$ szabály benne van P' -ben, akkor és csak akkor, ha $u \neq \varepsilon$ és van olyan v szó, $v \in (N \cup T)^*$, hogy $X \rightarrow v \in P$ és u -t v -ből úgy kapjuk meg, hogy U -beli nemterminálisok valahány, azaz nulla vagy több előfordulását elhagyjuk v -ből.
- Ekkor látható, hogy $L(G') \subseteq L(G) - \{\varepsilon\}$, hiszen minden $X \rightarrow u$ szabály alkalmazása megfelel az $X \rightarrow v$ szabály alkalmazásának, amelyet valahány $Z \Rightarrow_G^* \varepsilon$ levezetés alkalmazásával kombinálunk, ahol $Z \in U$ és Z előfordul u -ban.

Példa 8

Megjegyzés

- Megfordítva, ha $S \Rightarrow_G^* u$ és $u \neq \varepsilon$, akkor $S \Rightarrow_{G'}^* u$, hiszen az $X \rightarrow \varepsilon$ -típusú szabályok alkalmazása elkerülhető P' megfelelő szabályának alkalmazásával.
- Ezek alapján $L(G') = L(G) - \{\varepsilon\}$.
- Ha $\varepsilon \in L(G)$, akkor vesszük a $G_1 = (N \cup \{S_1\}, T, P' \cup \{S_1 \rightarrow \varepsilon, S_1 \rightarrow S\}, S_1)$ grammatikát, amely az $L(G)$ nyelvet generálja.

Példa 8

Megjegyzés

- U meghatározása: definiáljuk az $U_i \subseteq N$ halmazokat a következőképpen: $U_1 = \{X \mid X \rightarrow \varepsilon \in P\}$,
 $U_{i+1} = U_i \cup \{X \mid X \rightarrow u \in P \text{ és } u \in U_i^*\}, i \geq 1.$
- Nyilvánvaló, hogy az U_i sorozat, $i = 1, 2, \dots$ a tartalmazásra nézve hierarchiát alkot és van olyan k index, hogy $U_k = U_{k+1}$ és így $U_k = U_j$ minden $j \geq k$ -ra. Legyen $U = U_k$.
- Ekkor azonnal látható, hogy $X \Rightarrow_G^* \varepsilon$ akkor és csak akkor, ha $X \in U$. Vagyis, $\varepsilon \in L(G)$ akkor és csak akkor, ha $S \in U$.

Példa 9

Legyen $G = (N, T, P, S)$ környezetfüggetlen grammatika, ahol
 $N = \{S, A, B, C\}$, $T = \{b\}$ és
 $P = \{S \rightarrow ABC, A \rightarrow BB, A \rightarrow \varepsilon, B \rightarrow CC, B \rightarrow A, C \rightarrow AA, C \rightarrow b\}$.
Konstruáljunk egy G' környezetfüggetlen grammatikát, úgy, hogy
 $L(G) - \{\varepsilon\} = L(G')$ legyen!

Példa 10

Legyen $G = (N, T, P, S)$ környezetfüggetlen grammatika, ahol $N = \{S, A, B, C\}$, $T = \{a, b, c\}$ és $P = \{S \rightarrow ABB, S \rightarrow b, A \rightarrow cC, A \rightarrow \varepsilon, A \rightarrow B, A \rightarrow a, B \rightarrow ab, B \rightarrow A, C \rightarrow c\}$. Határozzuk meg G azon nemterminálisainak halmazát, amelyekből ε levezethető!

Chomsky-normálforma

Példa 11

Legyen $G = (N, T, P, S)$, ahol $N = \{S, A, B, C\}$, $T = \{a, b\}$, ahol $P = \{S \rightarrow AB, S \rightarrow b, A \rightarrow C, A \rightarrow aB, B \rightarrow ab, B \rightarrow A, C \rightarrow bSb\}$ (G ε -mentes környezetfüggetlen grammatika). Konstruáljunk meg G -ből kiindulva egy olyan Chomsky normálformájú G' környezetfüggetlen grammatikát, amelyre $L(G') = L(G)$ teljesül! (Hozzuk Chomsky normálformára G grammatikát!)

Példa 11

Megjegyzés

A Chomsky normálformára hozás lépései:

- Feltesszük, hogy a P szabályhalmaz elemei terminális szimbólumokat csak az $X \rightarrow a$, $a \in T$ alakú szabályokban tartalmaznak.
- Ha ez nem így lenne, akkor ún. áletterminálisok (új nemterminálisok) bevezetésével létrehozunk egy G -vel ekvivalens grammatikát, amelynek a szabályai ilyen alakúak.

Példa 11

Megjegyzés

- Ekkor minden további szabály $X \rightarrow u$ alakú, ahol $u \in N^*$.
- Ezután ún. hosszredukciót hajtunk végre, vagyis minden $X \rightarrow Y_1 Y_2 \dots Y_k, k \geq 3$ alakú szabályt, ahol $X, Y_1, \dots, Y_k \in N$ helyettesítünk egy $X \rightarrow Y_1 Z_1, Z_1 \rightarrow Y_2 Z_2, \dots, Z_{k-2} \rightarrow Y_{k-1} Y_k$ szabályhalmazzal, ahol Z_1, \dots, Z_{k-2} új nemterminális szimbólumok.

Példa 11

Megjegyzés

- Ekkor egy $G_1 = (N', T, P_1, S)$ grammatikát kapunk, ahol P_1 olyan szabályokból áll, amelyek alakja az alábbi három típus valamelyike:
 $X \rightarrow a$, $X \in N'$, $a \in T$, $X \rightarrow Y$, $X, Y \in N'$, $X \rightarrow YZ$, $X, Y, Z \in N'$.
- Az N' halmaz N elemeiből, valamint azokból az új nemterminálisokból áll, amelyeket külön-külön bevezettünk P azon szabályaihoz, amelyek jobboldalának hosszát csökkentettük.

Példa 11

Megjegyzés

- Ezután elimináljuk a láncszabályokat (az $X \rightarrow Y$ alakú szabályokat, ahol X és Y nemterminálisok).
- Ezért minden egyes $X \in N'$ nemterminálisra definiáljuk az $U_i(X)$ halmazokat: $U_1(X) = \{X\}$,
 $U_{i+1}(X) = U_i(X) \cup \{Y \mid Y \rightarrow Z \in P_1, Z \in U_i(X)\}, i = 1, 2, \dots$
- Nyilvánvaló, hogy van olyan k természetes szám, hogy $U_k(X) = U_{k+1}(X)$, és így $U_k(X) = U_l(X)$ teljesül minden l -re, ahol $l \geq k$. Legyen $U_k(X) = U(X)$.

Példa 11

Megjegyzés

- Definiáljuk P' -t a következőképpen:
 - 1 $X \rightarrow a \in P'$ akkor és csak akkor, ha van olyan $A \in N'$, ahol $X \in U(A)$ és $A \rightarrow a \in P_1$,
 - 2 $X \rightarrow YZ$ akkor és csak akkor, ha van olyan $A \in N'$, ahol $X \in U(A)$ és $A \rightarrow YZ \in P_1$.

Chomsky-normálforma

Példa 11

Megjegyzés

- Látható, hogy $X \rightarrow a \in P'$ akkor és csak akkor, ha $X \Rightarrow_{G_1}^* a$ és $X \rightarrow YZ \in P'$ akkor és csak akkor, ha $X \Rightarrow_{G_1}^* A \Rightarrow_{G_1}^* YZ$ teljesül valamely A -ra.

Chomsky-normálforma

Példa 12

Legyen $G = (N, T, P, S)$, ahol $N = \{S, A, B, C\}$, $T = \{a, b, c\}$, ahol $P = \{S \rightarrow cBBA, S \rightarrow cBc, S \rightarrow AC, S \rightarrow c, A \rightarrow bA, A \rightarrow a, B \rightarrow bB, B \rightarrow b, C \rightarrow ccc\}$ (G ε -mentes környezetfüggetlen grammatika). Konstruáljunk meg G -ből kiindulva egy olyan Chomsky normálformájú G' környezetfüggetlen grammatikát, amelyre $L(G') = L(G)$ teljesül!

Chomsky-normálforma

Példa 13

Legyen $G = (N, T, P, S)$, ahol $N = \{S, A, B, C\}$, $T = \{a, b, c\}$, ahol $P = \{S \rightarrow aABC, S \rightarrow a, A \rightarrow aA, A \rightarrow B, A \rightarrow a, B \rightarrow bcB, B \rightarrow bc, B \rightarrow C, C \rightarrow cC, C \rightarrow c\}$ (G ε -mentes környezetfüggetlen grammatika). Konstruáljunk meg G -ből kiindulva egy olyan Chomsky normálformájú G' környezetfüggetlen grammatikát, amelyre $L(G') = L(G)$ teljesül! (Hozzuk Chomsky normálformára G grammatikát!)

Chomsky-normálforma

Példa 14

Legyen $G = (N, T, P, S)$, ahol $N = \{S, A, B\}$, $T = \{a, b, c\}$, ahol $P = \{S \rightarrow BB, A \rightarrow S, A \rightarrow aacc, A \rightarrow b, B \rightarrow AacaA, B \rightarrow A\}$ (G ε -mentes környezetfüggetlen grammatika). Konstruáljunk meg G -ből kiindulva egy olyan Chomsky normálformájú G' környezetfüggetlen grammatikát, amelyre $L(G') = L(G)$ teljesül! (Hozzuk Chomsky normálformára a G grammatikát!)

Példa 15

Legyen $G = (N, T, P, S)$ környezetfüggetlen grammatika, ahol
 $N = \{S, A, B, C\}$, $T = \{a, b\}$ és
 $P = \{S \rightarrow ASB, S \rightarrow B, A \rightarrow Aa, A \rightarrow B, B \rightarrow b, B \rightarrow C, C \rightarrow a\}$.
Adjunk meg egy G -vel ekvivalens, láncszabálymentes grammatikát!