

בחינות בגרות במתמטיקה: החוויה

מוטי בן-ארי

<http://www.weizmann.ac.il/sci-tea/benari/>

גרסת 1.3.0

25 במרץ 2019

מוטי בן-ארי © 2019

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).



תוכן עניינים

8	הקדמה	
10	1 תנועה והספק	
10	קייז תשע"ח מועד ב	1.1
12	קייז תשע"ח מועד א	1.2
14	חוורף תשע"ח	1.3
16	קייז תשע"ז מועד ב	1.4
19	קייז תשע"ז מועד א	1.5
21	חוורף תשע"ז	1.6
23	קייז תשע"ו, מועד ב	1.7
25	קייז תשע"ו מועד א	1.8
27	חוורף תשע"ו	1.9
29	קייז תשע"ה מועד ב	1.10
31	קייז תשע"ה מועד א	1.11
33	חוורף תשע"ה	1.12
35	קייז תשע"ד מועד ב	1.13
36	קייז תשע"ד מועד א	1.14
37	חוורף תשע"ד	1.15
39	המלצות: תנועה והספק	1.16
39	המלצות: תנועה והספק	
40	2 סדרות	
40	קייז תשע"ח מועד ב	2.1
42	קייז תשע"ח מועד א	2.2
44	חוורף תשע"ח	2.3
46	קייז תשע"ז מועד ב	2.4

48	קייז תשע"ז מועד א	2.5
50	חרוף תשע"ז	2.6
51	קייז תשע"ו מועד ב	2.7
52	קייז תשע"ו מועד א	2.8
53	חרוף תשע"ו	2.9
55	קייז תשע"ה, מועד ב	2.10
56	חרוף תשע"ו	2.11
58	קייז תשע"ה מועד ב	2.12
59	קייז תשע"ה מועד א	2.13
60	חרוף תשע"ה	2.14
62	קייז תשע"ד מועד ב	2.15
63	קייז תשע"ד מועד א	2.16
65	חרוף תשע"ד	2.17

66

המלצות: סדרות

68	3 הסתרות	
68	קייז תשע"ח מועד ב	3.1
70	קייז תשע"ח מועד א	3.2
73	חרוף תשע"ח	3.3
74	קייז תשע"ז מועד ב	3.4
76	קייז תשע"ז מועד א	3.5
78	חרוף תשע"ז	3.6
80	קייז תשע"ו מועד ב	3.7
81	קייז תשע"ו מועד א	3.8
83	חרוף תשע"ו	3.9
85	קייז תשע"ה מועד ב	3.10
87	קייז תשע"ה מועד א	3.11
90	חרוף תשע"ה	3.12
91	קייז תשע"ד מועד ב	3.13
93	קייז תשע"ד מועד א	3.14
95	חרוף תשע"ד	3.15

97

המלצות: הסתרות

99	4 גיאומטריה
99	קייז תשע"ח מועד ב 4.1
102	קייז תשע"ח מועד א 4.2
104	חרוף תשע"ח 4.3
107	קייז תשע"ז מועד ב 4.4
110	קייז תשע"ז מועד א 4.5
113	חרוף תשע"ז 4.6
115	קייז תשע"ו מועד ב 4.7
117	קייז תשע"ו מועד א 4.8
119	חרוף תשע"ו 4.9
121	קייז תשע"ה מועד ב 4.10
123	קייז תשע"ה מועד א 4.11
125	חרוף תשע"ה 4.12
127	קייז תשע"ד מועד ב 4.13
129	קייז תשע"ד מועד א 4.14
131	חרוף תשע"ד 4.15

133 המלצות: גיאומטריה

134	5 טריגונומטריה
134	קייז תשע"ח מועד ב 5.1
137	קייז תשע"ח מועד א 5.2
139	חרוף תשע"ח 5.3
141	קייז תשע"ז מועד ב 5.4
143	קייז תשע"ז מועד א 5.5
145	חרוף תשע"ז 5.6
148	קייז תשע"ו מועד ב 5.7
151	קייז תשע"ו מועד א 5.8
153	חרוף תשע"ו 5.9
155	קייז תשע"ה מועד ב 5.10
157	קייז תשע"ה מועד א 5.11
159	חרוף תשע"ה 5.12
161	קייז תשע"ד מועד ב 5.13
165	קייז תשע"ד מועד א 5.14

167	5.15	חורף תשע"ד
169	5.16	חורף תשע"ד (שאלה 6)

172 המלצות: טריגונומטריה

173	6	חדו"א שאלה 6
173	6.1	קייז תשע"ח מועד ב
175	6.2	קייז תשע"ח מועד א
177	6.3	חורף תשע"ח
180	6.4	קייז תשע"ז מועד ב
182	6.5	קייז תשע"ז מועד א
185	6.6	חורף תשע"ז
187	6.7	קייז תשע"ו מועד ב
189	6.8	קייז תשע"ו מועד א
192	6.9	חורף תשע"ו
195	6.10	קייז תשע"ה מועד ב
197	6.11	קייז תשע"ה מועד א
199	6.12	חורף תשע"ה
201	6.13	קייז תשע"ד מועד ב
203	6.14	קייז תשע"ד מועד א
205	6.15	חורף תשע"ד

207	7	חדו"א שאלה 7
207	7.1	קייז תשע"ח מועד ב
209	7.2	קייז תשע"ח מועד א
211	7.3	חורף תשע"ח
213	7.4	קייז תשע"ז מועד ב
215	7.5	קייז תשע"ז מועד א
217	7.6	חורף תשע"ז
219	7.7	קייז תשע"ו מועד ב
221	7.8	קייז תשע"ו מועד א
223	7.9	חורף תשע"ו
225	7.10	קייז תשע"ה מועד ב
227	7.11	קייז תשע"ה מועד א
229	7.12	חורף תשע"ה

231	קייז תשע"ד מועד ב	7.13
233	קייז תשע"ד מועד א	7.14
235	חורף תשע"ד	7.15
237	חדו"א שאלת 8	
237	קייז תשע"ח מועד ב	8.1
239	קייז תשע"ח מועד א	8.2
241	חורף תשע"ח	8.3
243	קייז תשע"ז מועד ב	8.4
245	קייז תשע"ז מועד א	8.5
247	חורף תשע"ז	8.6
249	קייז תשע"ו מועד ב	8.7
251	קייז תשע"ו מועד א	8.8
253	חורף תשע"ו	8.9
255	קייז תשע"ה מועד ב	8.10
257	קייז תשע"ה מועד א	8.11
259	חורף תשע"ה	8.12
261	קייז תשע"ד מועד ב	8.13
263	קייז תשע"ד מועד א	8.14
265	חורף תשע"ד	8.15
266	המלצות: פרקים 6, 7, 8	
269	א' אין לסמוק על איורים	
270	ב' ייצוג גרפי של משפטי בגיאומטריה	
272	ג' מעגל היחידה	
272	ריבועים של מעגל היחידה	ג.1
273	חלוקת מעגל היחידה ל-8 קטעים	ג.2
273	סינוס וקוסינוס של זוויות הגודלות מ- 90°	ג.3
275	הסינוס והקוסינוס של 30° ו 60°	ג.4
277	סינוס וкосינוס של $(90 - \theta)$	ג.5
279	ד' נוסחאות בחדו"א	

הקדמה

מתמטיקאים ידועים לטענה כי הם מפרסמים והוכחות מסודרות וברורות, ומסתירים את העובדה ששל הניירות שלהם מלא עד אפס מקום בניסיונות שהובילו למבואות סתוויים וטעויות. תלמידים לא נחשפים **لتתאליכים** למציאות הפתורונות, וזה עולל לטסכל אותם. הם צריכים ללמידה לא להתייאש כאשר הם לא מצליחים לפתור בעיות בניסיון הראשון. לא חסרים פתרונות של בחינות הבגרות, אבל גם הם "נקיקים" ללא ניסיונות שלא צלחו ודיוונים על דרכי החשיבה שהובילו לפתרונות.

חוברת זו מכילה פתרונות לבחינות הבגרותשאלון 806 בשנים תשע"ד עד תשע"ח. אני משתמש לתאר את חוויתי בחיפוש פתרונות, כגון הבנה מוטעית של ניסוח השאלות, מלכודות שנפלתי בהם ופתרונות חלופיים שמצאתי. בסוף כל פרק רשותי המלצות שגיבשתי לאורך העבודה.

השווהתי את הפתרונות שלי לפתרונות המופיעים בראשת. עם זאת הפתרונות הם שלי ובסגנון שלי. אני קיצרתי בכתיבת חישובים ברורים ואני משתמש תמיד שדרכים מקובלות להציג פתרונות, כגון טבלאות בבעיות תנואה. אני חסיד גדול של תרשימים באמצעות אמצעי עזר חיווני לפתרון בעיות במתמטיקה, ולא חסhti בתרשימים מדויקים.

תנועה והספק

הצעה של אביתל אלבוםס-כהן כיון אותי לפתח את הפתרון של הבעיה הללו באמצעות תרשימים דו-ממדיים. מצאתי שהתרшиומים מאוד עוזרים בזיהוי הקשרים בין קטיעי התנועה ובכתיבת הנוסחאות. ניתן להיעזר בתרשימים דו-ממדיים גם בעיות הספק שיש להן מבנה דומה לבעיות תנואה. התרшиומים קלים מאוד לציר ומוסילים גם אם קני המיידה בכלל לא מדויקים, כך שניתנו להשתמש בהם כאשר פתרים בחינות.

הציר האופקי בתרשימים הוא ציר הזמן, והציר האנכי הוא ציר המרחק בעיות תנואה וציר העבודה בעיות הספק. היתרונו של יציג זה הוא שמהירות והספקים מוצגים כSHIPועים של הקווים. ככל שהמהירות או הפסק גובה יותר, הקו תלול יותר. לכל דמות (מכונית, סירה, צבע, וכדומה) צירתי קו עبور כל קטיע בתנועה או בעבודה.

המאמר "פתרונות שונים בעיות הספק באמצעות גрафים" מאת אביתל אלבוםס-כהן וג'יסון קופר. על"ה גילון 51, מרץ 2015, עמ' 14-19, מביא פתרונות גיאומטריים עבור בעיות הספק.

סודות

לדעתי, שאלות הסדרות הן הכימלות לפתרון, כדי בסופו של דבר יש יחסים ברורים בין איברים עוקבים בסדרה (חישובית או הנדסית), ובין האיברים לסכומים. עם זאת, מצאתי שקל מאד לטעות, למשל, אם מבלבלים בין האינדקסים של איברי הסדרה לבין ערכיהם.

הסתברות

הчисובים בעיות עם הסתברות פשוטים, אבל קשה לתרגם את העלילה המילולית למשוואות הנכונות. הדבר נכון במיוחד כאשר השאלה שואלת על הסתברות מותנית. מצאתי עשור רב של ביטויים המכונים להסתברות מותנית (ראו בסעיף המלצות), וזה לא מקל על הפתרון.

קושי נוסף נובע מהעובדה שיש שתי דרכים שונות לארון את המידע הנוכחי והחישובים: בטבלה או בעץ. שאלת על מהهو שהוא "גם א וגם ב" מכוון לחיתוך של הסתברויות, ומכוונת לטבלה, לעומת שאלת המנוסחת "א ואחר כך ב" מכוונות למכלפה של הסתברויות הכדי להציג בעז.

גיאומטריה וטריגונומטריה

הפתרונות מבאים ציטוטים של המשפטים המתקדמיים מتوزע רשימת המשפטים שהתלמידים רשאים לצטט ללא הוכחה. כל אחד זוכר ללא קושי שימושים חופפים לפי צ.צ.צ., אבל קשה יותר לזכור משפטיים כגון שווין הזווית בין משיק למיתר.

יש חשיבות רבה לצירורים גדולים שעלייהם ניתן לרשום ערכיים, נעלמים ובניות עזר בצורה ברורה. אני ממליץ להזכיר צירורים שונים לסעיפים שונים של אותה שאלה.

חשבון דיפרנציאלי וAITגרלי

בחדו"א שיטות ברורות לחישוב תחומי הגדרה, נקודות קיצון ואסימפטוטות, אבל לעיתים החישובים ארוכים. חשוב לדikk כי שגיאה בסעיף אחד תגרום לשגיאות בהמשך.

הספר "לŁמוד ולŁמד אנליזה" מציג את הנושא בצורה מקיפה ביותר, ומהווה משאב חשוב למורה.

<http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/>

Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/Analiza.htm.

נספחים

נספח א' מכיל "הוכחה" ידועה שכל משולש שווה שוקיים. ההוכחה מראה שתרשימים אינם תחליף להוכחה.

נספח ב' מכיל צירורים צבעוניים של מספר משפטיים מתקדמיים בגיאומטריה. בנושא כל כך מוחשי קל יותר לזכור ציור ולא תיאור מילולי מסורבל. כדי להדפיס עמודים אלה בדף.

נספח ג' עוסק במעגל היחידה. כאשר אני פותר בעייה בטריגונומטריה, אני מצייר בצד תרשימים של מעגל היחידה כדי לראות את הקשרים של הפונקציות הטריגונומטריות של זוויתות שונות. למשל, לא כדאי לזכור זהויות כגון $\sin(\theta) = \sin(180 - \theta)$.

בנספח ד' סיכמתי הערות על הדרך שלי לחשב חישובים בחדו"א. דרכי החישוב מעט שונות ממה שרואים בספרים ובחינות פתרונות, ואני מסביר את השיקולים שלי להשתמש בחישובים האלה.

הבעת תודה

אני מודה לד"ר רונית בר-בסט לוי ולד"ר אבטל אלבוייס-כהן שלוו אותי בצלילה ללימודיו המתמטיקה בבתי ספר תיכון. עברו חמישים שנה מאז שלמדתי בתיכון!

פרק 1 תנועה והספק

1.1 קיז תשע"ח מועד ב

המרחק מביתה של רננה עד בית הספר הוא 500 מטרים.

רננה יצאתה מביתה אל בית הספר והלכה ב מהירות קבועה.


- 3 דקות לאחר שיצאה מביתה, יצא אביה בעקבותיה כדי להביא לה כריך ששכחה. הוא רץ ב מהירות קבועה של 2.5 מטרים לשנייה.

כאשר הגיע האב לרננה הם עמדו ושוחחו במשך 2 דקות והוא נתן לה את הכריך, ולאחר מכן הלך כל אחד מהם לדרכו – רננה לבית הספר והאב בחזרה אל הבית. רננה המשיכה ללכת באותה מהירות שהלכה לפני כן, והאב הלך ב מהירות של 1.5 מטרים לשנייה.

אביה של רננה הגיע אל הבית לבדוק באותו הזמן שהגיעה רננה אל בית הספר.

א. חשב את מהירות ההליכה של רננה.

ב. כמה זמן עבר מן הרגע שרננה יצאתה מביתה ועד שהגיעה אל בית הספר?



נסמן: v = מהירות ההליכה של רננה, t = הזמן עד למפגש בין רננה לאביה, t' = הזמן מהפרידה בין רננה לאביה ועד שנייהם מגיעם ליעד.

מהתרשים אפשר לראות שווון בין מרחקים: רננה ואבאו עד למפגש, אבאו אל המפגש ובחזרה, וכן, שהмарחק לבית הספר מורכב משני קטעים שרננה הלכה. תחילת נשווה את המרחקים שאבאו עבר מהבית עד למפגש ובחזרה כדי לקבל את t' כפונקציה של t :

$$\frac{5}{2}t = \frac{3}{2}t'$$

$$t' = \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{2}t = \frac{5}{3}t.$$

סעיף א

עד למפגש המרחקים שעוברים רננה ואביה שווים:

$$(1.1) \quad v(t + 180) = \frac{5}{2}t.$$

אנו זוקקים לשתי משוואות עם שני הנעלמים כדי למצוא את v . אי-אפשר למצוא משווהה שנייה מהנתונים מהמפגש עד ליעדים, כי המרחקים והמהירותו לא בהכרח שווים. במקומות זה נמצא דרך אחרת להשוות את המרחק שעוברים רננה ואביה עד למפגש.

עבור אבא השתמש באותו ביטוי $\frac{5}{2}t$ שהשתמשנו במשווהה 1.1. עבור רננה נשים לב שניתנו לחשב את המרחק כהפרש בין המרחק מהבית לבית הספר (500) לבין המרחק שרננה עוברת מהמפגש ועד לבית הספר (vt') :

$$(1.2) \quad \frac{5}{2}t = 500 - v\left(\frac{5}{3}t\right).$$

משווהה 1.1 ניתן למצוא משווהה עבור t :

$$(1.3) \quad t = \frac{360v}{5 - 2v}.$$

נציב את משווהה 1.3 ב- 1.2:

$$500 - \frac{5}{3}v\left(\frac{360v}{5 - 2v}\right) = \frac{5}{2}\left(\frac{360v}{5 - 2v}\right)$$

נפשלט את המשווהה ונקבל משווהה ריבועית עבור v :

$$\begin{aligned} 6v^2 + 19v - 25 &= 0 \\ (v - 1)(6v + 25) &= 0. \end{aligned}$$

המהירות חייבת להיות חיובית ולכן הפתרון היחיד הוא $v = 1$.

סעיף ב

משווהה 1.1 קיבל $t = 120$ ונסכם את פרקי הזמן על הציר האופקי בתרשימים:

$$180 + 120 + 120 + \frac{5}{3} \cdot 120 = 620$$

שניות.

הערה

שימוש לב למלכודת שקל ליפול לתוכה: הזמינים נתוניים בדקות ומהירותו נתונות במטרים שנייה!

1.2 קיז תשע"ח מועד א

שני רוכבי אופניים, אמיר ומשה, יצאו בשעה 6:00 זה לכיווןו של זה. אמיר רכב ב מהירות קבועה מעיר א לעיר ב, ומשה רכב ב מהירות קבועה מעיר ב לעיר א. אמיר ומשה עברו זה על פני זה והמשיכו כל אחד ליעדו. אמיר הגיע לעיר ב שעתים אחרי שעבר על פני משה, ואילו משה הגיע לעיר א 8 שעות אחרי שעבר על פני אמיר.


א. באיזו שעה עברו אמיר ומשה זה על פני זה?

נסמן את מהירותם נסיעתו של אמיר באות V .

בדיקת כאשר עברו אמיר ומשה זה על פני ישמעון, רוכב על אופניו, מעיר א לעיר ב, ב מהירות קבועה. נתון שישמעון הגיע לעיר ב אחרי אמיר, אך לפני שהוא הגיע לעיר א.

ב. (1) הבע באמצעות V את המרחק בין עיר א לעיר ב.

(2) הבע באמצעות V את טווח המהירות האפשרי של ישמעון.



נסמן: $t = t_y$ הזמן עד מפגש בין אמיר למשה, $t_y =$ זמן הנסעה של ישמעון מעיר א לעיר ב, $v_a, v_m, v_y =$ מהירותם של אמיר, משה וישראל.

סעיף א

מהתרשים מאד עוזר לראות שיש **שלושה** ביטויים עבור המרחק בין הערים: (א) הרחק שנסע אמיר, (ב) המרחק שנסע משה, ו-(ג) סכום המרחקים שנסעו אמיר ומשה עד למפגש:

$$tv_a + tv_m = (t + 2)v_a = (t + 8)v_m.$$

משני הביטויים הראשונים אנו מקבלים:

$$\frac{v_a}{v_m} = \frac{t}{2}.$$

נציב בשני הביטויים האחרונים:

$$(t+2) \cdot \frac{tv_m}{2} = (t+8)v_m .$$

v_m מצטמצם ונקבל משווה ריבועית $16 - t^2$ עם הפתרון חיובי $t = 4$.

שיעור לב

יש נטייה לעצור כאן כאשר חישבנו את הזמן t , אבל עיון חזרה בשאלת מראה שהיא מבקשת את השעה של המפגש שהיא 10:00. לאחר שפותרים בעיה יש לעיין שוב בשאלת כדי לוודא שאנו מספקים את התשובה הנדרשת.

סעיף ב

המרחק בין הערים הוא $v_a(t+2)$. חישבנו ש- $t = 4$ וכאן המרחק הוא $6V$ (הסימן הנתון V שונה מ- v_a שבחרתי בתחלת הפתרון).

סעיף ג

נתון שיסמין מגיע לעיר ב אחרי אמיר ולפני משה. מהתרשים רואים ש:

$$2 < t_y < 8 .$$

זמן הוא מרחק חלקי מהירות ואת המרחק חישבנו בסעיף ב:

$$2 < \frac{6V}{v_j} < 8 .$$

מכאן ש:


$$\frac{3}{4}v_a < v_j < 3v_a$$

כי כיווני האידשוויון מתחלפים עם היפוך השבר.

1.3 חורף תשע"ח

בכפר נופש יש שתי בריכות: בריכה א' ובריכה ב'.
 הנפח של בריכה א' הוא V_1 והנפח של בריכה ב' הוא V_2 .
 את הבריכות ממלאים באמצעות 4 צינורות בעלי אותו הספק.
 ביום כלשהו שתי הבריכות היו ריקות.
 התחלו למלא את בריכה א' באמצעות ארבעת הצינורות. כאשר הת מלאה בריכה א' לכדי $\frac{1}{6}$ מנפחיה, העבירו אחד מן הצינורות לבריכה ב' והתחלו למלא אותה באמצעותו. כאשר הת מלאה בריכה א' עד מחציתה, העבירו עוד שני צינורות למילוי בריכה ב'.
 מילוי שתי הבריכות הסתיים באותו הזמן.
 כל הצינורות הזרימו מים ללא הפסקה עד שהת מלאו שתי הבריכות.

$$\text{חישב את היחס } \frac{V_1}{V_2}.$$



נסמן: $x = \text{קצב המילוי של כל צינור ("בעל אותו הספק")}$, $t = \text{פרק הזמן בין העברת הצינורות}$.
 הקו העליון בתרשים מתאר את המילוי של בריכה א', והקו התחתון מתאר את מילוי של בריכה ב'.
 שימו לב שככל שייתר צינורות ממלאים בריכה, השיפוע של הקו תלול יותר.
 יש לנו שלושה סוגים של געלמים: x , שלושת ה- t_i ושני ה- V_i . אם נצליח להיפטר מ- x או מה- t_i , השני יצטמצם כאשר נחלק את ה- V_i .
 נתחיל עם משוואות ההספק עבור בריכה א', כאשר בכל פרק זמן ממלאים את ההפרשים של הנפחים, למשל, בזמן t_2 בריכה א' מתמלאת מששית לחצי:

$$\begin{aligned} 4xt_1 &= \frac{1}{6}V_1 \\ 3xt_2 &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6}\right)V_1 \\ xt_3 &= \left(1 - \frac{1}{2}\right)V_1. \end{aligned}$$

נשתמש במשוואת כדי לחשב את פרקי הזמן כתלות בנפח בבריכה:

$$\begin{aligned} t_1 &= \frac{V_1}{24x} \\ t_2 &= \frac{V_1}{9x} \\ t_3 &= \frac{V_1}{2x}. \end{aligned}$$

מהתרשים רואים שאפשר לבטא את הנפח של V_2 כסכום של שני חלקים: הנפח שמתמלא בפרק הזמן t_2 והנפח המתמלא בפרק הזמן t_3 . כאשר נציב את המשוואות שקיבלנו עבורה בפרק הזמן, נקבל את הנפח של V_2 כתלות ב- V_1 בלבד, כי המשתנה x מצטמצם:

$$\begin{aligned} V_2 &= xt_2 + 3xt_3 = \frac{xV_1}{9x} + \frac{3xV_1}{2x} = \frac{29}{18}V_1 \\ \frac{V_1}{V_2} &= \frac{18}{29}. \end{aligned}$$

הערה

קיבלנו שהנפח של בריכה ב גדול מהנפח של בריכה א, עובדה שלא ידעתו כאשר ציירתי את התרשים עם נפח בריכה א גדול מນפח בריכה ב. אין להחמיר. מטרת התרשים היא להציג את התסריט כדי שנוכל לכתוב את המשוואות הנכונות.

פרט מעניין הוא שפרק הזמן הראשון t_1 לא נחוץ לפתורון, כי המילוי של בריכה ב מתבצע בשני שלבים לאחר העברת הציינור הראשון.

1.4 קיז תשע"ז מועד ב

הערים A ו B נמצאות על גדת נהר הזורם

במהירות קבועה. כיוון הזורם הוא מ- A ל- B .

מן העיר B יצא סירת מנוע לכיוון העיר A .

הסירה שטה נגד כיוון הזורם.

באותו הזמן יצא רפסודה מן העיר A .

לכיוון העיר B . הרפסודה שטה עם כיוון הזורם.

מהירות סירת המנוע במים עומדים היא קבועה וגדולה פי 4 מהירות הזורם של הנהר.

מהירות הרפסודה במים עומדים היא אפס. במים זורמים הרפסודה שטה עם הזורם.

הסירה והרפсадה נפגשו 3 שעות ו- 45 דקות אחרי יציאתן לדרכם המשיכו בדרךן. סירת המנוע הגיעו לעיר A ומיד הסתובבה ושטה בחזרה לעיר B .

כאשר סירת המנוע הגיעו לעיר B , הרפסודה הייתה למרחק של 35 ק"מ מן העיר B .


א. חשב את מהירות הזורם ואת מהירות סירת המנוע במים עומדים.

ב. דרך חזרה לעיר B פגשה סירת המנוע את הרפסודה בפעם השנייה.

כמה זמן עבר מרגע יציאתה של הרפסודה מן העיר A עד שהסירה והרפсадה נפגשו

בפעם השנייה?

סעיף א



נסמן: d = מרחק בין שני הנמלים, d_r, d_s = מרחקי ההפלגה של הסירה והרפсадה עד למפגש הראשון, v_z = מהירות הזורם, v_s = מהירות הסירה במים עומדים. בתרשימים ציר הזמן הוא בשעות.

הזמן עד למפגש הראשון שווה עבור הסירה והרפסודה ויחס המהירות של הסירה והזרם ידוע כך שנכתוב את המשוואות התנוועה עד למפגש. נתון:

$$(1.4) \quad v_z = v_s/4.$$

במפגש הראשון:

$$d = d_s + d_r = \frac{15}{4}(v_s - v_z) + \frac{15}{4}v_z.$$

מהירות הזרם מתאפסת ומתקיים:

$$(1.5) \quad d = \frac{15}{4}v_s.$$


כעת נכתוב משוואות תנוועה כדי להשוו את הזמן עד סוף הסיפור. בפרק הזמן שהסירה מפליגה ל- A' ובזרם ל- B (מרחק של $d + d'$), הרפסודה מפליגה מ- A ומגיעה "כמעט" לנמל B :

$$\frac{d}{v_s - v_z} + \frac{d'}{v_s + v_z} = \frac{d - 35}{v_z}.$$

מנוסחה (1.4) נציב עבור v_z , מנוסחה (1.5) נציב עבור d , ונקבל משווהה עם נעלם אחד בלבד, v_s .
הפתרון הוא $v_s = 20$ ו- $v_z = 5$.
מנוסחה 1.5 מתקיים $d = 75$ שנוצרך במשהך.

סעיף ב

צייר תרשימים חדש עם סימונים הקשורים למפגש השני.



נסמן: $t_1 = t_1$ הזמן שהסירה מפליגה ל- A' , $t_2 = t_2$ הזמן שהסירה מפליגה מ- A' למפגש השני.
 $d' = d'$ המרחק שהרפסודה מפליגה בזמן t_1 , $d'' = d''$ המרחק שהרפסודה מפליגה בזמן t_2 .

קל לחשב t_1 ממשוואת התנוועה של הסירה:

$$t_1 = \frac{d}{v_s - v_z} = \frac{75}{20 - 5} = 5,$$

ולחשב שת המרחק d' מהמשווהה של הרפסודה:

$$d' = v_z t_1 = 5 \cdot 5 = 25.$$

נשאר לחשב את פרק הזמן t_2 . בפרק הזמן זה, הסירה מפליגה מרחק $d' + d''$ והרפסודה מפליגה מרחק d'' . מהירותיידעות, כך שיש לנו שתי משוואות עבור t_2 :

$$\begin{aligned} t_2 &= \frac{d' + d''}{v_s + v_z} = \frac{25 + d''}{25} \\ t_2 &= \frac{d''}{v_z} = \frac{d''}{5}. \end{aligned}$$

נפתרו את המשווה ונקבל:

$$\begin{aligned} d'' &= \frac{25}{4} \\ t_2 &= \frac{d''}{v_z} = \frac{5}{4}. \end{aligned}$$


שימו לב שהשאלה מבקשת את זמן ההפלגה של הרפסודה מנמל A ועד למפגש השני:

$$t_1 + t_2 = 5 + \frac{5}{4} = \frac{25}{4}.$$

1.5 קיז תשע"ז מועד א

נעה רכבה על אופניים במסלול באורך מסויים, ארבע מהירותים קבועות. בכל פעם, לאחר שעברת מקטע שאורכו רבע המסלול, היא הגירה את מהירותה, ורכבה ב מהירות הגדולה פי 2 מן מהירות הקודמת. בקטע האחרון היא רכבה ב מהירות של 40 קמ"ש. נעה יצאתה לדרך בשעה 08:00 בבוקר וסיימה את המסלול בשעה 11:45 בלילה.

- א. מהו אורך המסלול?
- ב. דניאל יצא לדרך באותו מסלול בשעה 9:45, ונסע ב מהירות קבועה לאורך כל המסלול. גם הוא הגיע ל סוף המסלול בשעה 11:45. באיזה מארבעת מקטעי המסלולפגש דניאל את נעה בפעם הראשונה, ובאיזה שעה?



נסמן: x = המרחק של מקטע, t_1, t_2, t_3, t_4 = זמני רכיבה של נעה בקטעים. נתון: 40 = מהירות בקטע האחרון, אך מהירותים של המקטעים האחרים הן $5, 10, 20$.

סעיף א

נתון לנו הזמן הכולל ומהירות (המהירות الأخيرة אבל אפשר לחשב את האחרות), והנעלם היחיד הוא המרחק. נסכם את הזמנים של המקטעים:

$$\left(\frac{x}{5} + \frac{x}{10} + \frac{x}{20} + \frac{x}{40} \right) = \frac{15}{4}.$$

הפתרון הוא $x = 10$ וכאן אורך המסלול הוא 40 ק"מ.

סעיף ב

чисבנו את המרחק וננוו הזמן של דניאל. מהירות של דניאל היא $40/2 = 20 \text{ קמ''ש}$. יכול להיות שאפשר למצוא נוסחה עבור המפגש, אבל פשוט יותר לעבור מקטע מקטע ולבזוק אם המפגש מתקיים באותו מקטע.

נגה עוברת 10 ק''מ בכל מקטע. מה המרחק שעובר דניאל עד סוף המקטע הראשון? המרחק שהוא עבר הוא רק $t_1 = 10/5 = 2 \text{ כז שסוע}$ המקטע הוא בין $10:00$ ו- $10:45$. דניאל רוכב רבע שעה מ- $10:00$ ועד $10:45$ ולכן המפגש לא התקיים במקטע הראשון. מתי נגה מגיעה לסוף המקטע השני? המרחק גדול מהמרחק של נגה, ולכן המפגש מתקיים במקטע השני.

נשאר רק לחשב את פרק הזמן בתוך המקטע השני עד למפגש, שנסמן t . נכתב משווהה למרחקים השווים של נגה ודניאל. נגה רכבה 10 ק''מ עד סוף הקטע הראשון ודניאל רכב 5 ק''מ . מסוף הקטע הראשון, הם רכבו t שעות, כל אחד ב מהירות של:

$$\begin{aligned} 10 + 10t &= 5 + 20t \\ t &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

כבר חישבנו שתחילת המקטע השני בשעה $10:00$, ולכן שעת המפגש היא $10:30$.

1.6 חורף תשע"ז

שני צינורות א' ו ב' מזרימים מים לברכה בקצב קבוע.

כאשר צינור א' בלבד פתוח, הברכה הריקה מתמלאת לגמרי ב- m שעות.

כאשר צינור ב' בלבד פתוח, הברכה הריקה מתמלאת לגמרי ב- $2m$ שעות.

כאשר שני הצינורות פתוחים במקביל, הברכה הריקה מתמלאת לגמרי ביותר מ- 4 שעות.

ביום מסויים הברכה הייתה ריקה. פתחו את צינור א' בלבד לשעתיים.

אחר כנ' פתחו גם את צינור ב', ושני הצינורות היו פתוחים בו בזמן שעתיים נוספות.

בתום אותן שעתיים נוספות יותר מ- $\frac{1}{2}$ הברכה הייתה מלאה.

א. מצא את תחומי הערכים האפשריים של m .

ב. ביום אחר $\frac{1}{2}$ הברכה הייתה מלאה. פתחו את שני הצינורות, אלא שבשל התקלה טכנית

צינור ב' רוקן מים מן הברכה במקום למלא בה מים. שני הצינורות היו פתוחים בו בזמן

במשך שעה אחת, ובמהלכה צינור א' מלא מים בברכה וצינור ב' רוקן ממנה מים.


בתום אותה שעה תוקנה התקלה, ושני הצינורות החלו למלא את הברכה יחד, עד שהיא

התמלאה לגמרי בעבר שעתיים וחצי נוספת.

נתון שהקצב שבו צינור ב' מרוקן מים מהברכה שווה לקצב שבו הוא ממלא אותה במים.

מצא את m .


סעיף א



כאשר שני הצינורות פתוחים, ההספק הכלול הוא סכום ההספקים של הצינורות. לפי הנתונים:

$$1/\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{2m}\right) > 4,$$

$$\text{כך ש-}6 > m.$$




נסמן: $w_a = \text{כמות המים שמילא צינור א}, w_b = \text{כמות המים שמילא צינור ב}$.
כמות המים לאחר ארבע שעות שווה לסכום הכמות שכל צינור מילא והיא לפחות מחצית הבריכה:

$$w_a + w_b = \frac{1}{m} \cdot 4 + \frac{1}{2m} \cdot 2 > \frac{1}{2}.$$

מכאן, $m < 10$.

סעיף ב'



כדי למלא את הבריכה, מתחילהים ממחצית הכמות, מושכים (מחסירים כי שלילי) את הכמות של השעה הראשונה, ומוסכים את הכמות מהתקופה השנייה של שעתיים וחצי:


$$\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{m} - \frac{1}{2m} \right) \cdot 1 + \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{2m} \right) \cdot 2.5 = 1.$$

הפתרונות הוא $m = 8.5$.

1.7 קיז תשע"ו, מועד ב

- . שני הטענים גל ודני עבדו בהרכבת מחשבים. קצב העבודה של כל אחד מהם קבוע.
- א. ביום העבודה הראשון הרכיבו שני הטענים אותו מספר של מחשבים.
- gal התחל ל לעבוד בשעה 8:00, וסיים ל לעבוד בשעה 15:00.
- דני התחל ל לעבוד לאחר השעה 08:00 ולפני השעה 09:00, וסיים ל לעבוד בשעה 13:00.
- ידעו ש gal ודני הרכיבו אותו מספר של מחשבים מהרגע שכל אחד מהם התחל ל לעבוד ועד השעה 09:00.
- כמה זמן אחרי השעה 08:00 התחל דני לעבוד?
- ב. ביום העבודה השני, התחלו gal ודני לעבוד באותה שעה וסימנו ל לעבוד באותו אותה שעה.
- ביום זה הם הרכיבו סך הכל יחד את אותו מספר מחשבים שהרכיבו יחד ביום העבודה הראשון.
- כמה זמן עבדו הטענים ביום העבודה השני?

סעיף א



נסמן: $t = \text{זמן שDani התחל בהרכבה}$.

נשתמש בנתונים כדי למצוא ביטויים עבור ההספקים של Dani וGal. נתייחס לסך המחשבים שהרכיבם כל אחד כיחידה אחת. Gal עבד שבע שעות ולכן ההספק שלו הוא $\frac{1}{7}$, Dani עבד $t - 1$ עד לשעה 09:00 ולאחר מכן עוד ארבע שעות. ההספק שלו הוא $\frac{1}{(1-t)+4}$.


נתון ששבועה 0900 שניהם סיימו להרכיב אותו כמות של מחשבים:

$$\frac{1}{7} \cdot 1 = \frac{1}{5-t} \cdot (1-t),$$

ולכן דני התחיל לעבוד $t = \frac{1}{3}$ שעה לאחר 08:00.

סעיף ב

נציר תרשימים חדש עם המידע לסעיף זה.



נסמן: $T =$ הזמן השנים עבדו ביום השני. על התרשימים סיינו גם את כמות העבודה שעשה כל אחד מهما: $w_g =$ העבודה של גל, $w_d =$ העבודה של דני.

בסעיף א הערכנו שההספק של גל הוא $\frac{1}{7}$, וחישבנו שDani עבד:

$$\left(1 - \frac{1}{3}\right) + 4 = \frac{14}{3}$$

שעות. ההספק שלו הוא:

$$\frac{1}{\frac{14}{3}} = \frac{3}{14}.$$

נתון שהם סיימו אותה כמות עבודה כמו היום הראשון:

$$1 + 1 = w_g + w_d = \frac{1}{7}T + \frac{3}{14}T,$$

$$.T = \frac{28}{5}$$

1.8 קיז תשע"ו מועד א

שתי מכוניות יצאו באותו זמן מעיר א' לעיר ב'.

המרחק בין שתי הערים הוא 300 ק"מ.

המכונית הראשונה נסעה במהירות הגדולה ב- 25 קמ"ש מהמהירות של המכונית השנייה.


כעבור 1.5 שעות מרגע יציאתה מעיר א', הקטינה המכונית הראשונה את מהירותה
לחצי מהירותה הקודמת, והגיעה לעיר ב' $\frac{1}{2}$ שעה אחרי המכונית השנייה.

א. מצא את מהירותן של המכונית השנייה אם ידוע שמהירותה גדולה מ- 60 קמ"ש.

ב. מצא כעבור כמה שעות מרגע יציאתה מעיר א' ולפניהם שהמכונית השנייה השיגה את

המכונית הראשונה, היה המרחק בין שתי המכוניות 12.5 ק"מ

(מצא את שתי האפשרויות).



נסמן: v_1 = מהירות התחלתית של מכונית 1, v_2 = מהירות מכונית 2, t = זמן נסעה של מכונית 2 מעיר א' עד לעיר ב'.

נתון: $v_1 = v_2 + 25$. השיפוע של הקו של מכונית 1 גדול מהשיפוע של הקו של מכונית 2.

סעיף א

שתי המכוניות נסעו אותו מרחק מעיר א' לעיר ב'. נכתוב את משוואות התנועה של שתי המכוניות:

$$\begin{aligned} v_1 \cdot \frac{3}{2} + \frac{v_1}{2} \left(\left(t - \frac{3}{2} \right) + \frac{1}{2} \right) &= 300 \\ v_2 t &= 300. \end{aligned}$$


נציב $v_1 = v_2 + 25$ במשוואת הראשונה ונקבל משואה ריבועית ב- v_2 :

$$v_2^2 - 125v_2 + 3750 = 0.$$

השורשים הם 50, 75 ונתון $v_2 > 60$ כך שיש לבחור $v_2 = 75$ קמ"ש.

סעיף ב

נציר תרשים חדש עם המידע עבור סעיף זה:



הקוויים האנכיים הכלואים בין הקווים של שתי המכוניות מסמנים מרחק של 12.5 ק"מ . קו אחד הוא לפניו שינוי המהירות בזמן t_1 מתחילה הנסיעה וקו שני לאחר שינוי המהירות.

בסעיף א' חישבנו $v_2 = 75$ ולבן $v_1 = 100 - 25 = 75$.

נכתוב את המשוואות עבור הפרשי המרחקים:

$$\begin{aligned} 100t_1 - 75t_1 &= 12.5 \\ \left(100 \cdot \frac{3}{2} + 50 \left(t_2 - \frac{3}{2}\right)\right) - 75t_2 &= 12.5. \end{aligned}$$

פתרונותם הם $t = \frac{1}{2}, t_2 = \frac{5}{2}$ שעות.

1.9 חורף תשע"ו

רוכב אופניים ורוכב אופנו יצאו באותו רגע זה לכיוון השני היישובים שונים.

הם נפגשו כעבור 3 שעות.

רוכב האופנו עבר $\frac{2}{3}$ מהדרך שבין שני היישובים ב- 1.25 שעות פחות מזמן הרוכב


האופניים עבר $\frac{1}{4}$ מהדרך שבין שני היישובים.

מהירות הרוכבים אין משתנות.

א. מצא פי כמה המהירות של רוכב האופנו גדולה מן המהירות של רוכב האופניים.

ב. מצא בכמה שעות עבר רוכב האופנו את כל הדרך שבין שני היישובים.

סעיף א



נסמן: v_b = מהירות אופניים, v_m = מהירות אופנו, x = מרחק בין הערים, T_m = פרק הזמן שהאופנו עבר $\frac{2}{3}$ מהדרך, פרק הזמן שהאופניים עבר $\frac{1}{4}$ מהדרך.

כאשר שני כלי רכב היוצאים מנקודות שונות נפגשים, סכום המרחקים שהם עוברים הוא המרחק בין הנקודות. לא נתון המרחק, ולכן אנו משתמשים בנגע:

$$x = 3v_b + 3v_m.$$

הנתון השני הוא הקשר בין זמני הנסעה של חלקו המרחק בין היישובים:

$$\frac{x/4}{v_b} = \frac{2x/3}{v_m} + \frac{5}{4}.$$

נסמן את היחס בין המהירות (התשובה הדרישה) $\frac{v_m}{v_b} = r$ ונקבל משווהה הריבועית:

$$3r^2 - 10r - 8 = 0.$$

השורש החיובי הוא $r = 4$.

סעיף ב

נתונה משווהת המרחק בין היישובים:

$$x = 3v_b + 3v_m.$$

נשתמש ביחס ש חישבנו בסעיף א כדי לחשב את הזמן של נסיעת האופנוע:

$$\frac{x}{v_m} = \frac{3v_b + 3v_m}{v_m} = 3\frac{v_b}{v_m} + 3 = 3\frac{v_m/4}{v_m} + 3 = \frac{15}{4}$$

שעות.


1.10 קיז תשע"ה מועד ב

בזמן הנסיעה באוטובוס הבחן יוסי ברגע מסויים באימא שלו, הולכת ליד האוטובוס בכיוון הפוך לכיוון הנסיעה של האוטובוס. כעבור 10 שניות מהרגע שיויסי הבחן באימו, עצר האוטובוס בתחנה, וIOSI רץ מיד כדי להשיג את אימו. מהירות הריצה של IOSI גדולה פי 2 מהירות ההליכה של אימו, והוא $\frac{1}{7}$ מהירות הנסיעה של האוטובוס. כל המהירויות הן קבועות.

א. כמה זמן רץ IOSI כדי להשיג את אימו?

ברגע שיויסי השיג את אימו, הם הלבו יחד 3 דקoot במהירות ההליכה של אימו (בכיוון ההליכה שלה). מיד בתום 3 הדקות רץ IOSI בחזרה לתחנת האוטובוס שירד בה. (מהירות הריצה של IOSI היא כמו בסעיף א).

ב. כמה זמן רץ IOSI בחזרה לתחנת האוטובוס?



בתרשים סימנו את הקטעים:

$b = \text{IOSI רץ לפגישה עם אמא}$

$a = \text{IOSI נסע באוטובוס}$

$c = \text{אמא הולכת עד למפגש עם IOSI}$

$d = \text{IOSI ואמא הולכים ביחד}$

$e_1 + e_2 = \text{IOSI רץ חזרה לתחנה}$

נסמן זמן: $t =$ הזמן שיווי רץ מתחנה כדי להשיג את אמא.

נסמן מהירותו: $v_y =$ יוסי, $v_a =$ אמא, $v_b =$ אוטובוס.

נתון: $v_y = v_b/7, v_y = 2v_a$.

סעיף א

מצאת שקשה לפטור את השאלה עד שצירתי את התרשימים המופיעים לעיל. את הזמן t נוכל לחשב ממשוואות התנועה מהפגישה הראשונית (יוסי רואה את אימו) ועד למפגש השני (יוסי משיג את אימו). המרחק מסומן מהתרשימים וראים שהמרחק NN' בתרשימים. נוכל למצוא שתי משוואות עבור מרחק זה, אחד עבר אמא, קטע c :

$$v_a(t + 10),$$

$$\text{ואחד עבר יוסי, קטעים } : a, b \\ -10v_b + tv_y .$$

שים לב שבקטע a יוסי מתרחק מהפגישה ולכון המרחק הוא שלילי.

יש לנו שני ביטויים עבור אותו מרחק ולאחר הצבת יחסיה המהירותים הנתונים קיבל את המשווה:

$$\frac{v_y}{2}(t + 10) = v_y t - 7v_y 10$$

שהפתרונו שלה הוא $t = 150$ שניות.

סעיף ב

מהתרשים קל לראות **שני** קטעי היקויים e_1, e_2 מתארים את הריצה של יוסי בחזרה לתחנה. רואים גם שהמרחק PP' של e_1 הוא גם המרחק שאמא הולכת, קטעים c, d . לפי התוצאה של סעיף א, לוקח לאמא $0 = 150 + 180 + 10 = 340$ שניות לעבר מרחק זה. נתון שיווי רץ פי שניים מהר יותר מההילכה של אמא, ולכון $170 = t_1$ שניות.

עבור הקטע השני e_2 , המרחק RR' שווה למרחק MM' , המרחק שהאוטובוס עבר מהפגישה הראשונית ועד התחנה. נתון שהאוטובוס עבר מרחק זה -10 שניות, ונמצא שמהירות הריצה של יוסי פי שבע לאת מהירות הנסיעה של האוטובוס, כך $70 = t_2$.

נסכם ונקבל שיווי רץ מנוקדת הפרידה לתחנה ב $t_1 + t_2 = 240$ שניות.

הערה


שאלה זו שיכנע אותנו שתרשימים דו-ממדיים זמן-מרחק חיוני בפתרון בעיות תנועה. שימו לב למלכודות: זמן ההליכה היחיד נתון בדקות ושאר הזמן בשניות. אמנס המילה "דקות" מודגש אבל אפשר להתבלבל.

1.11 קיז תשע"ה מועד א

מכוניות I ומכוניות II יצאו באותו זמן מאותו מקום ולאותו כיוון. מהירות של מכונית I הייתה 50 קמ"ש, ומהירות של מכונית II הייתה 40 קמ"ש. כעבור חצי שעה מרגע היציאה של שתי המכוניות, יצא גם מכונית III מאותו מקום ולאותו כיוון.

ברגע שמכונית III פגשה במכונית II, המרחק בין מכונית I למכונית II היה 15 ק"מ. מהירות של כל המכוניות היו קבועות.

- מצא את מהירות של מכונית III.
- אם יתכן שאחרי הפגיעה בין מכונית III למכונית II, יהיה המרחק בין מכונית III למכונית I שווה למרחק בין מכונית II למכונית I ? נמק.



מהירות של מכונית I גדולה מהמהירות של מכונית II, ולכן השיפוע שלו תלול יותר. נסמן t = הזמן בין היציאה של III ועד למפגש שלו עם II, $v_3 = u_3$ = המהירות של III. נתון מהירות של I $v_1 = 50$, המהירות של II $v_2 = 40$.

סעיף א


לאחר $t + 1/2$ שעות, המכוניות II ו-III עברו אותו מרחק, ומכונית I עבר אותו מרחק ועוד 15 ק"מ. נכתוב את משוואות התנועה לשני המקרים:

$$\begin{aligned} 40(t + 1/2) &= v_3 t \\ 50(t + 1/2) &= v_3 t + 15. \end{aligned}$$

מהמשוואות מתקובל $t = 1$ וachable $v_3 = 60$ קמ"ש.

סעיף ב

נוסיף סימונים לתרשים שיעזרו לנו לפתור את הבעיה:



נעין בקווים מנוקדים בתרשימים ונראה שהמרחקים לא יכולים להיות שווים. בנקודת A המרחקים שוויים, אבל מנקודת זו ועד לנקודת B , המרחק I-II גדול והмарחק I-III קטן. בנקודת B המרחק I-II חיובי והмарחק I-III שווה לאפס. מכאן ולהלאה, שני המרחקים גדלים באותוקצב כי הפרשי המהירויות שוויים 10 קמ"ש.

הוכחה בחישוב

נסמן $t_A = \text{זמן מן נקודת } A \text{ ל- } B$, $t_B = \text{זמן מן נקודת } B \text{ ל- } A$.
משמאלי לנקודת B המרחקים שוויים אם:

$$15 + (v_1 - v_2)t_A \stackrel{?}{=} 15 + (v_1 - v_3)t_B .$$

נציב $0 = v_3 - v_1$, $10 = v_2 - v_1$ ונקבל $v_1 = 50$, $v_2 = 40$, $v_3 = 60$.
מיימין לנקודת B המרחקים שוויים אם:


$$(v_3 - v_1)t_B \stackrel{?}{=} d_B + (v_1 - v_2)t_B .$$

לאחר הצבה עבורו המהירויות, נקבל שהטיעון נכון אם $d_B > 15$.

1.12 חורף תשע"ה

- צבעים ותיקים וצבעים מהתלמידים צריכים לצבוע מספר מסוים של דלתות. צבע אחד ותיק ו-2 צבעים מהתלמידים יסימנו את הצבעה בזמן הארוך ב- 25% מהזמן שבו יסימנו את הצבעה 2 צבעים ותיקים וצבע אחד מהתלמיד. לכל צבע ותיק אותו קצב עבודה בלתי משתנה, ולכל צבע מהתלמיד אותו קצב עבודה בלתי משתנה. (צבע ותיק עובד מהר יותר מצבע מהתלמיד).
- א. מצא את היחס בין הזמן שצבע מהתלמיד יסימן לבדוק את צביעת הדלתות לבין הזמן שצבע ותיק יסימן לבדוק את צביעת הדלתות.
- ב. מצא כמה צבעים מהתלמידים צריכים לעבוד עם צבע אחד ותיק, כדי שהם יסימנו את צביעת הדלתות באותו הזמן שבו יסימנו את הצבעה 2 צבעים ותיקים וצבע אחד מהתלמיד.

סעיף א



נסמן את הזמן לצביעת כל הדלתות. t_v = הזמן שלוקח צבע ותיק, t_m = הזמן שלוקח צבע מתלמיד, T = הזמן שלוקח שני צבעים ותיקים וצבע מתלמיד אחד. למעשה, הערך של T לא חשוב ואפשר להשתמש בו כיחידת זמן.

הסבר על התרשים

הצבעים עובדים במקביל אבל הציג בתרשימים מראה **חלוקת העבודה**, כאשר צבע (או זוג צבעים) מסיים את חלקו בעבודה ולאחר מכן הצבע השני מתחילה את חלקו. ההספקים מתקבלים מעבודה חלקית זמן. כאשר יש זוג צבעים הם רשומים צבע אחד עם הספק כפול. הקווים הקיימים מראים צבע אחד ותיק ($1/t_v$) ושני צבעים מהתלמידים ($2/t_m$). הקווים העבים מראים שני צבעים ותיקים ($2/t_v$) וצבע אחד מהתלמיד ($1/t_m$).


שני הרכיבים סיימו את העבודה ומהן שמשוואת ההספק נותנת אותו ערך עבור שני הרכיבים.
(אזכירו שקבענו שהזמןם הם 1 ו-1.25 עבור שני הרכיבים):

$$\frac{2}{t_v} \cdot 1 + \frac{1}{t_m} \cdot 1 = \frac{1}{t_v} \cdot 1.25 + \frac{2}{t_m} \cdot 1.25.$$

הפתרון הוא:

$$\frac{t_m}{t_v} = 2.$$

סעיף ב



נסמן n = מספר הביצועים המתלמידים. העבודה של שני הרכיבים שווה ולכן:

$$\frac{2}{t_v} + \frac{1}{t_m} = \frac{1}{t_v} + \frac{n}{t_m}.$$

נשתמש ביחס שיחסבנו בסעיף א ונקבל:

$$n = \frac{t_m}{t_v} + \frac{t_m}{t_m} = 2 + 1 = 3.$$

1.13 קיז תשע"ד מועד ב

רץ I ורץ II יצאו באותו רגע מאותו מקום. הם רצו במהירות קבועה ובאותו כיוון.


המהירות של רץ I הייתה 6 קמ"ש, ומהירות של רץ II הייתה 7.5 קמ"ש.

כעבור 20 דקות מרגע היציאה של שני הרצים,

יצא רץ III מאותו מקום ובאותו כיוון, והוא רץ במהירות קבועה.

רץ IIIפגש בדרך את רץ I, ושעה אחר כך הואפגש את רץ II.

מצא כמה שניות עברו מרגע היציאה של רץ III עד לפגישתו עם רץ II.



נסמן: t = הזמן בין היציאה של III ועד למפגש שלו עם I, v = המהירות של III.

נתון: $6 =$ מהירות של I ו- $7.5 =$ המהירות של II. שימוש לב לשיפורים של הקווים.

בכל מפגש בין שתי דמויות המרחקים שוים. המפגש בין I ל-III:

$$6(t + 1/3) = vt,$$

ומפגש בין II ל-III:

$$7.5(1/3 + t + 1) = v(t + 1).$$

מהמשוואת הראשונה קיבל ביטוי עבור v ונציב במשוואת השנייה. קיבל משוואת ריבועית ב- t :


$$1.5t^2 + 2t - 2 = 0,$$

שיש לה פתרון חיובי אחד $t = 2/3$.

הזמן מהיציאה של III ועד המפגש שלו עם II הוא $t + 1 = 5/3$ שעות.

1.14 קיז תשע"ד מועד א

משאית יצאה מעיר A, וכעבור 6 שעות מרגע יציאתה הגיעה לעיר B.
 זמן מה אחרי יציאת המשאית יצאה מכונית מעיר A,
 והגיעה לעיר B 2 שעות לפני המשאית.
 המשאית והמכונית נפגשו כעבור שעה מרגע היציאה של המכונית.
 מהירותי של המשאית ושל המכונית היו קבועות.
 מצא כמה שעת אחורי רגע היציאה של המשאית יצאה המכונית (מצא את שני הפתרונות).



בתרשים חשוב לרשום את כל פרק זמן, במיוחד כדי לקבל את זמן הנסעה של המכונית.
 נסמן: $t = \text{זמן יציאת המכונית}$, $v_c = \text{מהירות המכונית}$, $v_m = \text{מהירות המשאית}$.
 נכתוב משוואות למרחקים שווים, מד- A עד למפגש ומד- A עד ל- B :

$$\begin{aligned} v_m(t+1) &= v_c \cdot 1 \\ v_m \cdot 6 &= v_c(4-t). \end{aligned}$$


משתי המשוואות מתקבלת משווה ריבועית ב- t :

$$t^2 - 3t + 2 = 0$$

ישש לה שני פתרונות $t = 1$ שעיה ו- $t = 2$ שעיה.

1.15 חורף תשע"ד

נמל A ונמל B נמצאים על אותה גדה של נהר, שכןון הזרם שלו הוא מ- A ל- B. רפסודה הפליגה בשעה 9:00 בבווקר מנמל A אל נמל B, והיא נישהה על גבי הזרם של הנהר כך שמהירות הרפסודה היא מהירות הזרם. באותו שעה הסירה סיירה מנמל B (נגד כיוון הזרם) לכיוון נמל A. מהירות הסירה במים עומדים היא 15 קמ"ש. הסירה הגיעה לנמל A, ומיד חזרה אל נמל B. ידוע כי הרפסודה והסירה הגיעו לנמל B באותו שעה. נתון כי הרפסודה והסירה נפגשו לראשונה כעבור 5 שעות מרגע הפלגתן. האם הסירה והרפסודה הגיעו לנמל B עד לשעה 9:00 בערך באותו יום? נמק. מהירות הזרם ומהירות הסירה במים עומדים הן קבועות. הערה: בחישוביך דיק Ud שתי ספינות אחורי הנקודה העשרונית.



נסמן: d = מרחק בין שני הנמלים, $d_1 = d_2 = d$ מפגש בין A למפגש, $d_2 = d$ מפגש בין B למפגש. $t =$ זמן עד למפגש ב- B , $v =$ מהירות הזרם.

מהירות הזרם היא נתון חשוב בפתרון הבעיה כי המהירות של הסירה והרפסודה תלויות בה. כאשר הסירה מפליגה מ- A ל- B , היא עוברת מרחק כפול מהמרחק שהרפסודה עוברת באותו פרק זמן. נשווה את משוואות התנועה לפרק זמן זה:

$$\frac{d}{v} = \frac{d}{15 - v} + \frac{d}{15 + v}.$$

d הצטמצם ונקבל משווה ריבועית בmphירות הזרם v :

$$v^2 + 30v - 225 = 0.$$

השורש החיובי שלה הוא $v = 6.21$.

עכשו שאנו יודעים את mphירות והזמן עד למפגש נתון, ננסה לחשב את המרחק d , שהו הוא הסכום של המרחקים שעוברים הרפסודה והסירה:

$$d = 5v + 5(15 - v).$$

הפתרון הוא $d = 75$ (ללא תלות mphירות הזרם v).

את הזמן עד המפגש במל B אפשר לחשב לפי הפלגה של הסירה או לפי הפלגה של הרפסודה. כמוובן שפנות יותר לחשב עבור הקטע היחיד של הרפסודה:

$$t = \frac{d}{v} = \frac{75}{6.21} \approx 12.08.$$

בכל זאת נבדק לפי הסירה:

$$t = \frac{d}{15 - v} + \frac{d}{15 + v} = \frac{75}{8.79} + \frac{75}{21.21} = 8.532 + 3.536 \approx 12.07.$$

בגלל עיגול של החישובים יש הבדל קטן בין שתי התוצאות.

הסירה והרפסודה יצאו בשעה 09:00 בבוקר וההפלגות לקחו יותר מ-12 שעות, כך המפגש השני התקיים לאחר השעה 09:00 בערב.

1.16 המלצות: תנועה והספק

- שימושו לב שבניגוד לתרשיים חד-ממדיים בהם אורך קו הוא מרחק הנסעה, כאן מרחק הנסעה הוא החפרש בציר האנכי בין נקודת התחלה לנקודת הסופה.
- הקושי בפתרון של בעיות הללו נובע מ הצורך לתרגם את התיאורים המילוליים לשווואת. אפשר בקלות להתבלבל כאשר מתרגמים ביטויים כגון "לפניהם", "אחרי", "מהר יותר", וכו'. כדי לפתור את הבעיה יש להכין תרשימים בו יוציין המסלול של כל דמות בשאלת.
- מצאתי שיש יתרונות מובהקים לשימוש בתרשיים דו-ממדיים כאשר הציר האופקי הוא הזמן והציר האנכי הוא המרחק. היתרונות הם:
 - נקודות המפגש בין הדמויות ברורות. זה חשוב כי בדרך כלל תכונות כגון מהירות וכווניות משתנות בנקודות המפגש.
 - מהירות של כל דמות משתקפת מהSHIPוע את כל קטע קו. קל לוודא אם מהירות שיפיעו במשוואות תואמות את התיאורים בשאלות, כגון "פי ארבע".
- מומלץ להכין תרשימים גדולים וברורים כדי סימנים שימושיים ממידע נתון או ממידע המתබל מחושבים יהיו קריאים. לעיתים, כדאי להכין תרשימים חדשים לכל סעיף כדי שמידע הנחוץ רק לסעיף אחד לא יקשה על עיון במידע הנחוץ לסעיף אחר.
- מצאתי שאפשר "לקראן" את המשוואות ישירות מהתרשיים. לחילופין אפשר גם לסדר את הנתונים בטבלה כמפורט.
- נקודות מפגש נוחות מאוד לכטיבת זוג משוואות תנועה עם אותם נעלמים. הזמן האם אותו זמניים (לפעמים בתוספת קבוע), והמרחקים שווים (אם הדמויות נסעו באותו כיוון), או שסכום המרחקים שווה למרחק בין נקודות הקצה (כאשר הדמויות נסעוות אחת כלפי השנייה).
- פתרון המשוואות עצמן הוא בדרך כלל קל: שני משוואות עם שני נעלמים, כאשר המשוואות שיש לפתור הן לינאריות או ריבועיות.

פרק 2 סדרות

2.1 קייז תשע"ח מועד ב

- .2. הסדרה a_n מוגדרת לכל $n \geq 1$ טبוי על ידי כלל הנסיגה: $a_1 = -\frac{1}{c}$, $a_{n+1} = -\frac{c^{n-2}}{a_n}$. נתון: $c > 0$.
- א. הוכח כי האיברים בסדרה a_n הנמצאים במקומות הזוגיים מהווים סדרה הנדסית, וכי האיברים בסדרה a_n הנמצאים במקומות הזוגיים מהווים גם הם סדרה הנדסית.
- ב. (1) רשום את 7 האיברים הראשונים בסדרה a_n . הבע את תשובתך באמצעות c אם יש צורן.
- (2) הבע באמצעות c את סכום 7 האיברים הראשונים בסדרה a_n .
- (3) הוכח שלכל $n \geq 1$, הסכום של $1 - a_n$ האיברים הראשונים בסדרה a_n אינו תלוי ב- n .
- ג. הסדרה b_n מוגדרת באופן הזה: $b_n = -\frac{2}{a_n \cdot a_{n+1}}$.
- (1) הראה כי b_n היא סדרה הנדסית.
- (2) מהו תחום הערכים של c שבעבורם b_n היא סדרה יורדת?
- (3) נתון שהסדרה האינסופית b_n היא סדרה יורדת. הבע באמצעות c את סכומה.

סעיף א

כדי להוכיח שסדרה המוגדרת על ידי כלל נסיגה היא הנדסית, לא כדאי לחשב מנתה של שני איברים עוקבים, כי איברים לא יצטמצמו. במקום זה, יש להציג את כלל הנסיגה כדי לקבל ערך של איבר כתלותו של איבר אחר:

$$a_{n+1} = -\frac{c^{n-2}}{a_n} = -\frac{c^{n-2}}{-\frac{c^{n-3}}{a_{n-1}}} = ca_{n-1}.$$

ה מנתה $c = a_{n+1}/a_{n-1}$ קבועה ולא תלוי ב- n . ההוכחה נcona עבר כל זוג של איברים שיש הפרש של שניים במקומות שלהם בסדרה, ולכן ההוכחה נcona גם עבר זוגות של מספרים זוגיים וגם עבר זוגות של מספרים א-זוגיים.

סעיף ב (1)

הסדרות של הזוגיים והאי-זוגיים הן סדרות הנדסיות **נפרזיות** ויש לחשב את האיברים בנפרד:

$$a_1 = -\frac{1}{c}, \quad a_3 = ca_1 = -1, \quad a_5 = ca_3 = -c, \quad a_7 = ca_5 = -c^2$$

$$a_2 = -\frac{c^{1-2}}{a_1} = -\frac{c^{-1}}{-\frac{1}{c}} = 1, \quad a_4 = ca_2 = c, \quad a_6 = ca_4 = c^2.$$

שבעת האיברים הראשונים של הסדרה הם:

$$-\frac{1}{c}, 1, -1, c, -c, c^2, -c^2.$$

סעיף ב (2)

כאשר מסכמים את האיברים הם מצטמצמים פרט לאיבר הראשון, ולכן $S_7 = -\frac{1}{c}$.

סעיף ב (3)

כאשר יש מספר אי-זוגי של איברים המתחילים ממוקם אי-זוגי, מספר האיברים האיזוגיים גדול באחד ממספר האיברים הזוגיים. נבדוק דוגמה:

$$a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8, a_9.$$

מספר האיברים הוא 9, מהם 5 אי-זוגיים ו-4 זוגיים.

נចטרך לסכם את הזוגיים והאי-זוגיים בנפרד, כי הסדרה המקורית אינה הנדסית. עבור שני התת-סדרות, המנה הוא c , אבל האיבר הראשון שונה $1 : -\frac{1}{c}$.

$$S_{odd} + S_{even} = -\frac{1}{c} \frac{c^n - 1}{c - 1} + 1 \cdot \frac{c^{n-1} - 1}{c - 1} = -\frac{1}{c},$$

לא תלוי ב- n .

סעיף ג (1)

כאו הסדרה נתונה על ידי נוסחה ולא כלל נסיגה ולכן ניתן לחשב ישירות את המנה:

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{\frac{2}{a_{n+1}a_{n+2}}}{\frac{2}{a_na_{n+1}}} = \frac{\frac{1}{a_{n+2}}}{\frac{1}{a_n}} = \frac{1}{\frac{a_{n+2}}{a_n}} = \frac{1}{c}.$$

סעיף ג (2)

סדרה יורדת אם $c > 1$, ולכן אם $q = \frac{1}{c} < 1$ ונתון $c > 0$. ולכן הסדרה יורדת אם $c < 0$.

סעיף ג (3)

עבור סדרה הנדסית יורדת:

$$\begin{aligned} S_b &= \frac{b_1}{1 - (1/c)} \\ &= \frac{-2}{a_1 \cdot a_2} \cdot \frac{c}{c - 1} \\ &= \frac{-2}{-\frac{1}{c} \cdot 1} \cdot \frac{c}{c - 1} \\ &= \frac{2c^2}{c - 1}. \end{aligned}$$

2.2 קיז תשע"ח מועד א

- a. היא סדרה הנדסית אין-סופית מתכנסת שסכוםה שלילי.
 a₁ הוא האיבר הראשון בסדרה, ו- q היא מנת הסדרה.
 א. לפניך ארבע טענות (I-IV). רק אחת מהן בהכרח נכונה. צין את מספירה ונמק.

$$q < 0 \quad (\text{I})$$

$$q < 0 \quad \text{וגם } a_1 < 0 \quad (\text{II})$$

$$a_1 < 0 \quad (\text{III})$$

$$q < 0 \quad \text{או } a_1 > 0 \quad (\text{IV})$$

נסמן ב- T את סכום האיברים במקומות האיזוגיים בסדרה a_n,
 ונסמן ב- R את סכום האיברים במקומות הזוגיים בסדרה a_n.

c. הוא פרמטר.

$$\text{נתון: } T + p \cdot R = 0.$$

ב. הביע את c באמצעות q.

b_n היא סדרה הנדסית שהמנה שלה היא p.

ג. האם b_n היא סדרה מתכנסת? נמק.

ד. נתון: c שלילי. הראה שלכל n טבעי a_{n+1} > a_n (כלומר הראה שהסדרה a_n היא סדרה עולה).

סעיף א

השאלה יפה כי היא דורשת חשיבה, לא חישובים! נבדוק את הטענות על סדרה מוכרת:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 2.$$

אם נהפוך את כל הסימנים למינוס, נקבל סדרה שסכוםה שלילי:

$$-1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{8} - \dots = -\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots\right) = -2.$$

ברור שהמנה עדין חיובית:

$$\frac{-2^{-(n+1)}}{-2^{-n}} = 2^{-1} = \frac{1}{2}.$$

לכן אפשר לפסול מייד תשובות IV, II, I ונשאר רק תשובה III.

נעביר לסדרה כללית. סדרה הנדסית מתכנסת רק אם $|q| < 1$. מהנוסחה עבור הסכום:

$$S = \frac{a_1}{1-q} < 0,$$

ניתן לראות ש- a_1 שלילי כי המכנה חיובי $2 < 1 - q < 0$.

סעיף ב

כאן מדובר בתת-סדרות של סדרה הנדסית, ועוד תת-סדרות שאיבריהן במקומות קבוע אחד מהשני (הפרש של שני מקומות: זוגי לאזוגי או אי-זוגי לא-אי-זוגי). לכן, המנה של כל אחת מהסדרות היא q^2 , והסכוםים הם:

$$T = \frac{a_1}{1-q^2}, \quad R = \frac{a_1 q}{1-q^2}.$$

מהמשוואת הנטונה $0 = T + pR$, נקבל $p = -\frac{1}{q}$ ו- $1 + pq = 0$.

סעיף ג

הסדרה לא מתכנסת כי $1 < |q|$ גורר $|p| > 1$.

סעיף ד

שיםו לב שהשאלה שואלת על **הסדרה המקורית** a_n ולא על b_n ! נתון ש- p שלילי ולכן $q = -\frac{1}{p}$ חיובי. נתון שהסדרה מתכנסת ולכן $0 < q < 1$. מצאנו בסעיף א' ש- a_1 שלילי ולכן $a_{n+1} > a_n$ כי מכפלה של מספר שלילי x עם מספר חיובי פחות מ-1 מקטינה את הערך המוחלט $|x|$ ומורידה את $-|x|$.

נבדוק בדוגמה: אם $a_1 = -6$, $q = \frac{1}{2}$, אז:

$$a_{n+1} = a_n q = -6 \cdot \frac{1}{2} = -3 > -6 = a_n.$$

2.3 חורף תשע"ח

- 2.** a_n היא סדרה חשבונית שההפרש שלה, d , שונה מ-0.
- נתון: $a_7 = -a_{17}$.
- a.** מצא את a_{12} .
- b.** (1) האם קיימים בסדרה איבר שערכו שווה ל- a_1 ? נמק.
- (2) מצא מספר טבעי n שעבורו סכום n האיברים הראשונים בסדרה שווה ל-0.
- ג.** האם קיימים n טבעי שעבורו: $a_n \cdot a_{n+1} < 0$? אם כן – מצא n כזה, אם לא – נמק.
- ד.** האם אפשר לדעת כמה איברים שליליים יש בסדרה? נמק (הבחן בין מקיריים שונים).

שאלה זו מתאפיין בהצבה של נוסחאות של נסוחאות לאיברים מסוימים לתוך הנוסחאות הכלליות.

סעיף א

$$\text{נציב } d \text{ במשוואת } a_7 = -a_{17} + (n-1)d:$$

$$\begin{aligned} a_7 &= a_1 + 6d = -(a_1 + 16d) = -a_{17} \\ a_1 + 11d &= 0 \\ a_{12} &= a_1 + 11d = 0. \end{aligned}$$

סעיף ב (1)

נשווה את $-a_1$ – לנוסחה לאיבר כללי:

$$-a_1 = a_n = a_1 + (n-1)d.$$

נציב $a_1 = -11d$ שישבנו בסעיף א:

$$-(-11d) = -11d + (n-1)d.$$

d מצטמצם ונקבל $n = 23$.

סעיף ב (2)

נציב $a_1 = -11d$ בנוסחה לסכום של סדרה חשבונית:

$$\frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) = \frac{n}{2}(2 \cdot -11d + (n-1)d) = \frac{dn}{2}(n-23) = 0.$$

נתון שההפרש d שונה מאפס ושה- n מספר טבעי ולכן חיובי, כך שהביטוי מהתאפס רק עבור $n = 23$.

סעיף ג

אם איבר חיובי וההפרש חיובי, המכפלה של שני איברים עוקבים היא חיובית, וכך גם אם שניהם שליליים. האפשרות היחידה לקבל מכפלה שלילית היא איבר שלילי והפרש חיובי או איבר חיובי והפרש שלילי:

$$a_k < 0, \quad a_{k+1} > 0$$

$$a_k > 0, \quad a_{k+1} < 0.$$

אבל ידוע שאחד האיברים בסדרה (a_{12}) הוא אפס:

$$a_k < 0, \quad a_{k+1} = 0, \quad a_{k+2} > 0$$

$$a_k > 0, \quad a_{k+1} = 0, \quad a_{k+2} < 0,$$

ולכן המכפלה של זוג איברים עוקבים חייבת להיות חיובית או אפס.

סעיף ד

נרשום את הסדרה לפי מה שידוע לנו ש- $a_{12} = 0$:

$$a_1, \quad a_2, \quad \dots, \quad a_{11}, \quad 0, \quad -a_{11}, \quad \dots, \quad -a_2, \quad -a_1, \quad \dots.$$

או ש- a_{11} האיברים הראשוניים שליליים אם ההפרש חיובי, או כל האיברים לאחר האיבר 0 שליליים אם ההפרש שלילי.

2.4 קיז תשע"ז מועד ב

.2 נתונה סדרה כללית a_n .

נסמן ב- S_n את סכום כל האיברים הראשונים בסדרה a_n .

נתון: $S_n = k - \frac{1}{3^{n+1}}$ לכל n טבעי. k הוא מספר קבוע.

א. הביע את a_1 ואת האיבר הכללי a_n עבור $n < 1$ באמצעות n ו- k במידת הצורך.

ב. מצא את k שעבורו הסדרה a_n היא סדרה הנדסית. נמק.

גדייה: $T = a_2^2 + a_5^2 + a_8^2 + \dots$ (סכום ריבועי כל איבר שלישי בסדרה a_n החל ב- a_2).

ג. חשב את T .

שאלה זו שונה משאלות אחרות כי נתון ביטוי עבור **סכוםים** ולא עבור האיברים בסדרה.

סעיף א

ניתן לחשב את האיברים על ידי שימוש בנוסחה עבור S_n . האיבר הראשון מתקבל ישירות מהנוסחה:

$$a_1 = S_1 = k - \frac{1}{3^{1+1}} = k - \frac{1}{9},$$

והאיבר הכללי מתקבל על ידי ההפרש בין הנוסחאות לסכומים עוקבים:

$$a_n = S_n - S_{n-1} = \left(k - \frac{1}{3^{n+1}} \right) - \left(k - \frac{1}{3^n} \right) = \frac{2}{3^{n+1}}.$$

סעיף ב

המנה $\frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ לא תלויות ב- k . במבט ראשון נראה שהנוסחה היא הנדסית עבור כל ערך של k , אולם זו טעות. המנה המתקבלת מ- $\frac{a_2}{a_1}$ חייבת להיות שווה למנה המתקבלת מהמקרה הכללי $\frac{a_{n+1}}{a_n}$. נחשב:

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{\frac{2}{3^3}}{k - \frac{1}{9}} = \frac{2}{3(9k - 1)} = \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{3}.$$

הפתרונות היחיד הוא $k = \frac{1}{3}$.

עבור הסעיף הבא נצטרך את האיבר הראשון:

$$\frac{1}{3} - \frac{1}{9} = \frac{2}{9},$$

סעיף ג

האיבר הראשון בסדרה החדשה הוא:

$$a'_1 = a_2^2 = (a_1 q)^2 = \left(\frac{2}{9} \cdot \frac{1}{3}\right)^2 = \frac{4}{729},$$

הסדרה החדשה היא הנדסית:

$$\left(\frac{a_{3(k+1)-1}}{a_{3k-1}}\right)^2 = \left(\frac{qa_{3k+1}}{a_{3k-1}}\right)^2 = \left(\frac{q^2 a_{3k}}{a_{3k-1}}\right)^2 = \left(\frac{q^3 a_{3k-1}}{a_{3k-1}}\right)^2 = q^6 = \left(\frac{1}{3}\right)^6 = \frac{1}{729}.$$

הסכום מתקיים מהנוסחה לסדרה הנדסית אינסופית עבור a', q' :

$$S' = \frac{a'_1}{1 - q'} = \frac{\frac{4}{729}}{1 - \frac{1}{729}} = \frac{1}{182}.$$

2.5 קיז תשע"ז מועד א

$$\text{נתונה הסדרה } a_n = \frac{(2^n + 1)(2^n - 1)}{2^n}.$$

$a_n = b_n - c_n$ ו- c_n הן סדרות הנדסיות שכל איבריהן חיוביים, המקייםות לכל n טبعי: $a_n = b_n - c_n$

$$\text{נתון: } b_6 = 64, c_3 = \frac{1}{8}$$

א. (1) מצא את b_1 ואת המנה של הסדרה b_n .

(2) מצא את c_1 ואת המנה של הסדרה c_n .

את סכום n האיברים הראשונים בסדרה a_n נסמך ב- A_n ,

את סכום n האיברים הראשונים בסדרה b_n נסמך ב- B_n ,

ואת סכום n האיברים הראשונים בסדרה c_n נסמך ב- C_n .

ב. הראה ש- $C_n = B_n - A_n$.

ג. עבור אילו ערכי n מתקיים האידויון: $0.9 < B_n - A_n < 1$?

הנוסחה ל- a_n אינה כולל נסיגה כי איברים של הסדרה לא מופיעים מצד ימני של המשוואה. נתון שהסדרות b_n, c_n הנדסיות אך לא נתון אם הסדרה המקורית a_n הנדסית או לא.

סעיף א (1, 2)

נתון ש- $a_n = b_n - c_n$, לכן כדי לקבל ערך של איבר בסדרה b_n , נצטרך לחשב את הערכים a_n, c_n ובאופן דומה עבור איברים בסדרה c_n . נתון שני ערכי b_6, c_3 וקל לחשב איברים ב- a_n כי הם נתונים כפונקציה של n בלבד:

$$a_3 = \frac{(2^3 + 1)(2^3 - 1)}{2^3} = \frac{63}{8} \quad a_6 = \frac{(2^6 + 1)(2^6 - 1)}{2^6} = \frac{65 \cdot 63}{64}$$

$$b_3 = a_3 + c_3 = \frac{63}{8} + \frac{1}{8} = 8 \quad c_6 = b_6 - a_6 = 64 - \frac{65 \cdot 63}{64} = \frac{1}{64}.$$

כדי לחשב את מנתה של b_n והמנה של c_n נשתמש בעובדה שהן סדרות הנדסיות וכדי לקבל את האיבר השלישי מהאיבר השלישי יש להכפיל במנה לחזקת שלוש:

$$b_6 = b_3 q_b^3 \quad q_b = \sqrt[3]{\frac{b_6}{b_3}} = \sqrt[3]{8} = 2 \quad b_3 = b_1 q_b^2 \quad b_1 = \frac{b_3}{q_b^2} = \frac{8}{4} = 2$$

$$c_6 = c_3 q_c^3 \quad q_c = \sqrt[3]{\frac{c_6}{c_3}} = \sqrt[3]{\frac{1}{8}} = \frac{1}{2} \quad c_3 = c_1 q_c^2 \quad c_1 = \frac{c_3}{q_c^2} = \frac{1/8}{1/4} = \frac{1}{2}$$

סעיף ב

הטיון נובע מחוקיק הקיבוץ והחילוף של מספרים שלמים:

$$\begin{aligned} C_n &= (b_1 - a_1) + (b_2 - a_2) + \cdots + (b_n - a_n) \\ &= (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) - (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) \\ &= B_n - A_n. \end{aligned}$$

סעיף ג

הוכחנו ש- $C_n = B_n - A_n$, ונתונה שהסדרה c_n הנדסית. מסעיף א' ולכן:

$$C_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{\left(\left(\frac{1}{2}\right)^n - 1\right)}{\left(\frac{1}{2} - 1\right)} = 1 - 2^{-n}.$$

בדיקה במחשבון מראה ש:

$$0.9 < 1 - 2^{-3} = 0.875 < 1$$

$$0.9 < 1 - 2^{-4} = 0.938 < 1.$$

לא לעצור לנו! השאלה מבקשת את **כל הערכים** של n המקיימים את האיסויון, ולכן התשובה המלאה היא כל מספר גדול או שווה ל-4, כי כאשר n גדול מ-4, הערך של $1 - 2^{-n}$ עולה (ולכן גדול מ-0.9) אבל תמיד פחות מ-1.

2.6 חורף תשע"ז

נתונה סדרה a_n המקיימת את כלל הנסיגה: $a_1 = -1$, $a_{n+1} = \frac{a_n}{4 \cdot a_n + 3}$

$$\text{נגידר סדרה חדשה } b_n = \frac{1}{a_n} + 2$$

א. הוכח כי b_n היא סדרה הנדסית.

ב. הביע באמצעות n את הסכום: $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}$

ג. נתון: n הוא מספר זוגי.

הביע באמצעות n את הסכום: $\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} - \frac{1}{a_4} + \dots + \frac{1}{a_{n-1}} - \frac{1}{a_n}$

סעיף א

נחשב את המנה על ידי הצבה עבור b_n לפי ההגדרה, ולאחר כך הצבה עבור a_{n+1} לפי כלל הנסיגה.
נקבל ממנה קבועה ולכן הסדרה הנדסית:

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{\frac{1}{a_{n+1}} + 2}{\frac{1}{a_n} + 2} = \frac{\frac{4a_n + 3}{a_{n+1}} + 2}{\frac{1}{a_n} + 2} = \frac{\frac{3(2a_n + 1)}{a_{n+1}} + 2}{\frac{1}{a_n} + 2} = \frac{3(2a_n + 1)}{2a_n + 1} = 3.$$

סעיף ב

לא נתון שהסדרה a_n הנדסית, אבל בסעיף א הוכחנו שהסדרה b_n הנדסית, ולכן ניתן לבטא את סכום הסדרה $\frac{1}{a_n}$ באמצעות b_n על ידי הצבה $\frac{1}{a_i} = b_i - 2$.

$$\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n} = (b_1 - 2) + \dots + (b_n - 2) = b_1 + \dots + b_n - 2n.$$

נתון ש $\frac{1}{a_n}$ הוא סכום של הסדרה b_n על ידי הצבה $\frac{1}{a_1} = b_1 - 2 = 1$. סכום הסדרה של b_n הוא:

$$b_1 + \dots + b_n - 2n = \frac{1(3^n - 1)}{3 - 1} - 2n = \frac{3^n - 4n - 1}{2}.$$

סעיף ג

לפי ההגדרה של b_n נוכל לבטא את הסכום כך:

$$(b_1 - 2) - (b_2 - 2) + \dots + (b_{n-1} - 2) - (b_n - 2).$$

נתון שמספר האיברים הזוגיים ולכן סכום הקבועים מתאפס. המנה של הסדרה היא -3 – והסכום הוא:

$$b_1 - b_2 + \dots + b_{n-1} - b_n = \frac{1((-3)^n - 1)}{-3 - 1} = \frac{(-3)^n - 1}{-4} = \frac{1 - 3^n}{4},$$

כי מספר האיברים הזוגיים ולכן $3^n = (-3)^n$

2.7 קייז תשע"ו מועד ב

- .2. נתונה סדרה חשבונית שיש בה n איברים. הפרש הסדרה הנתונה הוא 3.
- א. בין כל שני איברים עוקבים הכניסו איבר אחד נוספת, וኖצלה סדרה חשבונית חדשה.
 (1) הראה כי היחס בין סכום האיברים בסדרה החדשה לסכום האיברים בסדרה הנתונה

$$\text{הוא } \frac{2n-1}{n}.$$
- (2) נתון כי היחס שਮופיע בתת-סעיף (1) שווה ל-1.9.
 סכום של כל האיברים שהכניסו לסדרה הנתונה הוא 130.5.
 מצא את האיבר הראשון בסדרה הנתונה.
- ב. יוצרים סדרה חשבונית נוספת על ידי הכנסת k איברים בין כל שני איברים עוקבים של
 בסדרה הנתונה. הביע באמצעות k את הפרש הסדרה המתבקשת.

סעיף א (1)

מספר האיברים החדשים הוא $1 - n$, כפי שראויים אם רושמים את הסדרה:

$$a_1, a'_1, a_2, a'_2, \dots, a_{n-1}, a'_{n-1}, a_n.$$

נתון שהסדרה החדשה גם היא חשבונית. הפרש הסדרה אינו מספרשלם אלא 1.5! אז מה? נחשב את היחס בין סכומי הסדרות, כאשר האיבר a_1 מוצטצם:

$$\frac{S_{new}}{S_{old}} = \frac{\frac{2n-1}{2}(2a_1 + 1.5(2n-1-1))}{\frac{n}{2}(2a_1 + 3(n-1))} = \frac{\frac{2n-1}{2}(2a_1 + 3(n-1))}{\frac{n}{2}(2a_1 + 3(n-1))} = \frac{2n-1}{n}.$$

סעיף א (2)

$\frac{2n-1}{n} = 1.9$ נקבע $n = 10$. אם הסדרה הנתונה חשבונית וגם הסדרה החדשה חשבונית,
 סדרת האיברים החדשיה היא חשבונית עם אותו הפרש כמו בסדרה המקורית, 3. האיבר הראשון
 של האיברים החדשיה הוא $a'_1 = a_1 + 1.5$, ונתון סכום האיברים החדשיה:

$$\frac{10-1}{2}(2(a_1 + 1.5) + ((10-1)-1) \cdot 3) = 130.5,$$

והפתרון הוא $a_1 = 1$.

סעיף ב

נתון שהסדרה המתבקשת לאחר הכנסת k איברים חדשים בין איברים סמוכים של הסדרה הנתונה:

$$a_i, b_1, b_2, \dots, b_k, a_{i+1}$$

היא חשבונית. ההפרשאים בין האיברים החדשיה חייבים להיות שווים וסכום שווה להפרש של
 $\frac{3}{k+1}$.

2.8 קיז תשע"ו מועד א

- . נתונה סדרה חשבונית a_n המקיימת: $a_4 + a_8 + a_{12} + a_{16} = 224$
 א. מצא את הסכום של 19 האיברים הראשונים בסדרה a_n .

סדרה S_n היא סדרת הסכומים החלקיים של הסדרה a_n : S_1, S_2, S_3, \dots
 נתון כי $n \cdot a_n = S_n$ לכל n טבעי.

- ב. הראה כי הפרש הסדרה a_n הוא 0.
 ג. היעזר בסעיפים הקודמים, ומצא את a_1 .

- . נתונה סדרה b_n המקיימת את הכלל: $b_{n+1} - b_n = a_n + S_n$ לכל n טבעי.
 ד. היעזר בסעיפים הקודמים, ומצא את הסכום

$$(b_2 - b_1) + (b_3 - b_2) + (b_4 - b_3) + \dots + (b_{20} - b_{19})$$

סעיף א

האיברים a_4, a_8, a_{12}, a_{16} מהווים סדרה חשבונית עם הפרש d^4 . נתון הסכום של הסדרה:

$$\begin{aligned} (a_1 + 3d) + (a_1 + 7d) + (a_1 + 11d) + (a_1 + 15d) &= 224 \\ a_1 + 9d &= 56. \end{aligned}$$

יש לנו משווה אחת עם שני נעלמים. לא נת്യיאש וננסה בכל זאת לחשב את הסכום S_{19} :

$$S_{19} = \frac{19}{2}(2a_1 + 18d) = 19(a_1 + 9d) = 19 \cdot 56 = 1064.$$

סעיף ב

נשווה את המשווה הנתונה $S_n = n \cdot a_n$ לנוסחה עבור סכום של סדרה חשבונית:

$$\begin{aligned} n \cdot a_n &= \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) \\ n(a_1 + (n-1)d) &= \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d). \end{aligned}$$

נפחס את המשווה ונקבל $d = d/2$ שהפתרון היחיד שלו הוא 0.

סעיף ג

$$. a_1 + 9d = a_1 + 0 = 56$$

סעיף ד

במבחן ראשון נראה שכך כדי לצלם את סכום הסדרה $b_1 - b_{20}$, אבל זה מבוי סתום כי אין לנו דרך לחשב את איברי הסדרה b_n . במקום זה נחשב את $(b_{i+1} - b_i)$ וণיעזר במשווה הנתונה:

$$b_{i+1} - b_i = a_i + S_i = (a_1 + (i-1) \cdot 0) + \frac{i}{2}(2a_1 + (i-1) \cdot 0) = a_1(1+i).$$

הסכום הוא:

$$a_1(2 + 3 + \dots + 20) = 56 \cdot \frac{19}{2}(2 \cdot 2 + (19-1) \cdot 1) = 11704.$$

2.9 חורף תשע"ו

a₁ , a₂ , a₃ , ... , a_n , ... נתונה סדרה הנדסית עולה: .2

ההפרש בין האיבר הרביעי בסדרה לאיבר השלישי גדול פי 4 מההפרש בין האיבר השני לאיבר הראשון.

האיבר השישי בסדרה גדול פי 31 מהאיבר הראשון.

א. מצא את מנת הסדרה, ואת האיבר הראשון בסדרה.

ב. מהסדרה הנתונה בנו שתי סדרות חדשות, I ו- II:

I. a₁ · a₂ , a₂ · a₃ , a₃ · a₄ , ... , a_n · a_{n+1} , a_{n+1} · a_{n+2}

II. $\frac{a_2}{a_1} + \frac{a_3}{a_2}$, $\frac{a_3}{a_2} + \frac{a_4}{a_3}$, $\frac{a_4}{a_3} + \frac{a_5}{a_4}$, ... , $\frac{a_{n+1}}{a_n} + \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}}$

(1) האם כל אחת מהסדרות החדשות היא סדרה הנדסית עולה? נמק.

הסכום של כל האיברים בסדרה I הוא 2730.

(2) מצא את מספר האיברים בסדרה I.

(3) מצא את הסכום של כל האיברים בסדרה II.

סעיף א

נתון:

$$(1) a_4 - a_3 = 4(a_2 - a_1), \quad (2) a_6 - a_1 = 31.$$

נzieib $q = 1, q = 2, q = -2$ עבור $a_1, a_2, a_3, a_4, a_n = a_1 q^{n-1}$, וב(1), ונ קיבל שלוש תשובות נתון שהסדרה עולה ולכנן $q = 2$. נzieib $a_1 = 1$ עבור a_6 ב-(2), ונ קיבל

(1)

עבור סדרה I:

$$q_I = \frac{a_{n+1} \cdot a_{n+2}}{a_n \cdot a_{n+1}} = \frac{a_{n+2}}{a_n} = \frac{a_n q^2}{a_n} = q^2 = 4,$$

והסדרה היא סדרה הנדסית עולה. עבור סדרה II:

$$q_{II} = \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} + \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} \right) / \left(\frac{a_n}{a_{n-1}} + \frac{a_{n+1}}{a_n} \right) = \frac{q + q}{q + q} = 1.$$

הסדרה הנדסית אבל לא עולה.

(2)

מסכום הסדרה ניתן לחשב את מספר האיברים בסדרה:

$$a_1 \cdot a_2 + \cdots + a_{n+1} \cdot a_{n+2} = 2730$$

$$(1 \cdot 2) \cdot \frac{4^{n+1} - 1}{4 - 1} = 2730$$

$$4^{n+1} = 4096$$

$$n = 5.$$

שימו לב! אמונם $n = 5$ אבל מספר האיברים בסדרה I הוא 6 :

$$(1) a_1 \cdot a_2, \quad (2) a_2 \cdot a_3, \quad (3) a_3 \cdot a_4, \quad (4) a_4 \cdot a_5, \quad (5) a_5 \cdot a_6, \quad (6) a_6 \cdot a_7 (= a_{n+1} \cdot a_{n+2}).$$

סעיף ב (2)
чисלנו $a_1^{II} = 1$. נחשב את a_{II} :

$$a_1^{II} = \frac{a_2}{a_1} + \frac{a_3}{a_2} = \frac{2}{1} + \frac{4}{2} = 4.$$

שימו לב! מספר האיברים בסדרה II הוא 5:

$$(1) \frac{a_2}{a_1} + \frac{a_3}{a_2}, \quad (2) \frac{a_3}{a_2} + \frac{a_4}{a_3}, \quad (3) \frac{a_4}{a_3} + \frac{a_5}{a_4}, \quad (4) \frac{a_5}{a_4} + \frac{a_6}{a_5}, \quad (5) \frac{a_6}{a_5} + \frac{a_7}{a_6} \left(= \frac{a_{n+1}}{a_n} + \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} \right).$$

ולכן סכום האיברים הוא:

$$a_1^{II} + a_1^{II} \cdot 1 + a_1^{II} \cdot 1^2 + \cdots + a_1^{II} \cdot 1^4 = 4 \cdot 5 = 20.$$

2.10 קיז תשע"ה, מועד ב

- .2. נתונה סדרה b_n המקיים את הכלל $b_{n+1} = \frac{1}{2^n} \cdot b_n$
- א. הוכח כי האיברים העומדים במקומות הזוגיים בסדרה מהווים סדרה הנדסית, וגם האיברים העומדים במקומות הזוגיים מהווים סדרה הנדסית.
- ב. סכום 8 האיברים הראשונים בסדרה b_n שווה ל- $3\frac{7}{16}$.
מצאו את b_1 (מצאו את שתי האפשרויות).

סעיף א

החלוקת של איברים במרחיק שני מקומות אחד מהשני לא תלוי בזוגיות:

$$\frac{b_{n+2}}{b_n} = \frac{1}{2^{n+1}b_{n+1}} \cdot \frac{1}{b_n} = \frac{1}{2^{n+1} \cdot \frac{1}{2^n}b_n} = \frac{1}{2}.$$

סעיף ב

נחשב בנפרד את הסכום של ארבעת האיברים הזוגיים וארבעת האיברים האיזוגיים:

$$\begin{aligned} S_{odd} &= b_1 + b_3 + b_5 + b_7 = b_1 \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}\right) = \frac{15}{8}b_1 \\ S_{even} &= b_2 + b_4 + b_6 + b_8 = b_2 \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}\right) = \frac{15}{8}b_2 = \frac{15}{8} \cdot \frac{1}{2^1}b_1. \end{aligned}$$

מ:

$$S_{odd} + S_{even} = \frac{15}{8} \left(b_1 + \frac{1}{2b_1}\right) = 3\frac{7}{16} = \frac{55}{16}.$$

נקבל משוואה ריבועית $0 = 6b_1^2 - 11b_1 + 3$.

2.11 חורף תשע"ו

- נתונה סדרה הנדסית עולה: $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$.
 ההפרש בין האיבר הרביעי בסדרה לאיבר השלישי גדול פי 4 מההפרש בין האיבר השני לאיבר הראשון.
 האיבר השישי בסדרה גדול ב- 31 מהאיבר הראשון.
 א. מצא את מנת הסדרה, ואת האיבר הראשון בסדרה.
 ב. מהסדרה הנתונה בנו שתי סדרות חדשות, I ו- II:
 I. $a_1 \cdot a_2, a_2 \cdot a_3, a_3 \cdot a_4, \dots, a_n \cdot a_{n+1}, a_{n+1} \cdot a_{n+2}$
 II. $\frac{a_2}{a_1} + \frac{a_3}{a_2}, \frac{a_3}{a_2} + \frac{a_4}{a_3}, \frac{a_4}{a_3} + \frac{a_5}{a_4}, \dots, \frac{a_{n+1}}{a_n} + \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}}$
- (1) האם כל אחת מהסדרות החדשניות היא סדרה הנדסית עולה? נמק.
 הסכום של כל האיברים בסדרה I הוא 2730 .
 (2) מצא את מספר האיברים בסדרה I .
 (3) מצא את הסכום של כל האיברים בסדרה II .

סעיף א

שימו לב לשאלים על **ההפרשים** של סדרה הנדסית.

ה מנתון הראשון:

$$\begin{aligned} a_4 - a_3 &= 4(a_2 - a_1) \\ a_1q^3 - a_1q^2 &= 4(a_1q - a_1) \\ q^2(q - 1) &= 4(q - 1). \end{aligned}$$

פתרון אחד של המשוואת $1 = q$ אבל נתון שהסדרה עולה ולכן $1 \neq q$. אם $1 = q$, נחלק ב- $1 - q$ ונקבל $4 = q^2$. כאשר המנה שלילי, הסימנים של איברי הסדרה מתחלפים, אז הפתרון היחיד הוא $q = 2$.

ה מנתון השני:

$$\begin{aligned} a_6 - a_1 &= 31 \\ a_1q^5 - a_1 &= 31 \\ 32a_1 - a_1 &= 31 \\ a_1 &= 1. \end{aligned}$$

סעיף ב (1)

עבור סדרה I :

$$q_I = \frac{a_{n+1} \cdot a_{n+2}}{a_n \cdot a_{n+1}} = \frac{a_{n+2}}{a_n} = \frac{a_n q^2}{a_n} = q^2 = 4,$$

והסדרה היא סדרה הנדסית עולה.

עבור סדרה II:

$$q_{II} = \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} + \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} \right) / \left(\frac{a_n}{a_{n-1}} + \frac{a_{n+1}}{a_n} \right) = \frac{q+q}{q+q} = 1.$$

הסדרה הנדסית אבל **לא עולה**.

סעיף ב (2)

מסכום הסדרה ניתן לחשב את מספר האיברים בסדרה:

$$\begin{aligned} a_1 \cdot a_2 + \cdots + a_{n+1} \cdot a_{n+2} &= 2730 \\ (1 \cdot 2) \cdot \frac{4^{n+1} - 1}{4 - 1} &= 2730 \\ 4^{n+1} &= 4096 \\ n &= 5. \end{aligned}$$

שימו לב! אמן $n = 5$ אבל מספר האיברים בסדרה I הוא $6 = n + 1$.

- (1) $a_1 \cdot a_2$, (2) $a_2 \cdot a_3$, (3) $a_3 \cdot a_4$, (4) $a_4 \cdot a_5$, (5) $a_5 \cdot a_6$, (6) $a_6 \cdot a_7 (= a_{n+1} \cdot a_{n+2})$.

סעיף ב (3)

чисבנו 1. נחשב את a_1^{II} . נזכיר את $q_{II} = 1$:

$$a_1^{II} = \frac{a_2}{a_1} + \frac{a_3}{a_2} = \frac{2}{1} + \frac{4}{2} = 4.$$

שימו לב! מספר האיברים בסדרה II הוא 5:

- (1) $\frac{a_2}{a_1} + \frac{a_3}{a_2}$, (2) $\frac{a_3}{a_2} + \frac{a_4}{a_3}$, (3) $\frac{a_4}{a_3} + \frac{a_5}{a_4}$, (4) $\frac{a_5}{a_4} + \frac{a_6}{a_5}$, (5) $\frac{a_6}{a_5} + \frac{a_7}{a_6} \left(= \frac{a_{n+1}}{a_n} + \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} \right)$.

$4 \cdot 5 = 20$ ולכן **כל** איברי הסדרה שווים ל-4. הסכום הוא: $a_1 = 4$.

2.12 קייז תשע"ה מועד ב

- .2. נתונה סדרה b_n המקיימת את הכלל $b_{n+1} = \frac{1}{2^n} \cdot b_n$
- א. הוכח כי האיברים העומדים במקומות הזוגיים מהווים סדרה הנדסית, וגם האיברים העומדים במקומות הזוגיים מהווים סדרה הנדסית.
- ב. סכום 8 האיברים הראשונים בסדרה b_n שווה ל- $3\frac{7}{16}$.
מצא את b_1 (מצא את שתי האפשרויות).

סעיף א

החילוק של איברים במרחב שני מקומות אחד מהשני לא תלוי בזוגיות:

$$\frac{b_{n+2}}{b_n} = \frac{1}{2^{n+1} \cdot b_{n+1} \cdot b_n} = \frac{1}{2^{n+1} \cdot \frac{1}{2^n} \cdot b_n} = \frac{1}{2}.$$

סעיף ב

אנחנו לא יודעים אם הסדרה כולה היא הנדסית, לכן נחשב בנפרד את הסכום של ארבעת האיברים הזוגיים וארבעת האיברים האיזוגיים:

$$\begin{aligned} S_{odd} &= b_1 + b_3 + b_5 + b_7 = b_1 \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}\right) = \frac{15}{8}b_1 \\ S_{even} &= b_2 + b_4 + b_6 + b_8 = b_2 \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}\right) = \frac{15}{8}b_2 = \frac{15}{8} \cdot \frac{1}{2^1}b_1. \end{aligned}$$

מ:

$$S_{odd} + S_{even} = \frac{15}{8} \left(b_1 + \frac{1}{2b_1}\right) = 3\frac{7}{16} = \frac{55}{16}.$$

נקבל משוואה ריבועית 0 $\frac{3}{2}b_1^2 - 11b_1 + 3 = 0$

קייז תשע"ה מועד א 2.13

- . $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ נתונה סדרה הנדסית אינסופית יורדת שכל איבריה חיוביים: כל איבר בסדרה זו (חוץ מהראשון) הוא $\frac{2}{5}$ מסכום שני האיברים הסמוכים לו, אחד לפניו ואחד אחריו.

- א. מצא את המנה של הסדרה .
 ב. נתונה הסדרה $b_n = \frac{a_{n+1}}{(a_n)^2}$
 (1) הוכח כי הסדרה b_n היא סדרה הנדסית.
 (2) סכום עשרת האיברים הראשונים בסדרה b_n הוא 20,460
 מצא את סכום כל האיברים בסדרה a_n .

סעיף א

נתון:

$$a_n = \frac{2}{5}(a_{n-1} + a_{n+1}) = \frac{2}{5} \left(\frac{a_n}{q} + qa_n \right)$$

עבור $2q^2 - 5q + 2 = 0$ מוצטמצם ונקבל משווה ריבועית $a_n \cdot n \geq 2$ שיש לה שני פתרונות $q_a = \frac{1}{2}, q = 2$.

סעיף ב (1)

$$q_b = \frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{\frac{a_{n+2}}{(a_{n+1})^2}}{\frac{(a_n)^2}{(a_{n+1})^2}} = \frac{a_{n+2}}{(a_{n+1})^2} \cdot \frac{(a_n)^2}{a_{n+1}} = \frac{a_n q^2}{(a_n q)^2} \cdot \frac{(a_n)^2}{a_n q} = \frac{1}{q} = 2.$$

סעיף ב (2)

מ:

$$S_{10} = \frac{b_1(2^{10} - 1)}{2 - 1} = 20460$$

מתקיים $b_1 = 20$. השאלה מבקשת את סכום הסזרה המקורית a_n . כבר חישבנו את המנה q_a ונitin ליחס את a_1 מהנוסחה עבור b_n :

$$b_1 = \frac{a_2}{a_1^2} = \frac{a_1 q_a}{(a_1)^2} = \frac{1}{2a_1}$$

$$a_1 = \frac{1}{2b_1} = \frac{1}{40}$$

$$S_a = \frac{a_1}{1 - q_a} = \frac{1}{40 \left(1 - \frac{1}{2} \right)} = \frac{1}{20}.$$

2.14 חורף תשע"ה

$$a_1 = 4 \quad .2. \quad \text{סדרה מוגדרת לכל } n \text{ טبוי על ידי הכלל:}$$

$$a_n + a_{n+1} = 4n + 2$$

א. אם בסדרה יש 100 איברים, מצא את הסכום של שני האיברים העומדים במקומות
האמצעיים בסדרה.

ב. הוכח כי איברי הסדרה העומדים במקומות אי-זוגיים מהווים סדרה חשבונית,
וגם איברי הסדרה העומדים במקומות זוגיים מהווים סדרה חשבונית.

אם בסדרה יש 101 איברים, מצא:

- ג. את האיבר העומד באמצע הסדרה.
- ד. את הסכום של כל איברי הסדרה.

שימו לב שלא נתון שהסדרה כולה היא חשבונית.

סעיף א

כדי לרשום את איברי הסדרה כדי לוודא מהם האיברים האמצעיים:

$$\overbrace{a_1, a_2, \dots, a_{49}}^{50}, \overbrace{a_{50}, a_{51}, a_{52}, \dots, a_{100}}^{50}.$$

ניתן לחשב את הסכום מהגדרת הסדרה:

$$a_{50} + a_{51} = 4 \cdot 50 + 2 = 202.$$

סעיף ב

במבט ראשון השאלה נראהת בעייתית כי נתונה נוסחה לחישוב איברים סמוכים זה לזה, $a_n + a_{n+1}$, אבל האיברים הזוגיים נמצאים במרחק שני מקומות זה מזה וכך גם האיברים האי-זוגיים $a_{n+2} - a_n$. חבל שאין לנו $a_n - a_{n+1} - a_{n+2} - a_{n+3}$. צמד הביטויים האלה יכול לרמזו ל-”טריק” ידוע במתמטיקה: אם נוסיף ונהסיר את אותו ערך לביטוי, ערך הביטוי לא משתנה:

$$\begin{aligned} a_{k+2} - a_k &= a_{k+2} + (a_{k+1} - a_{k+1}) - a_k \\ &= (a_{k+2} + a_{k+1}) - (a_{k+1} + a_k) \\ &= (4(k+1) + 2) - (4k + 2) \\ &= 4. \end{aligned}$$

ההפרש קבוע ולא תלוי בזוגיות, ולכן הזוגיים והאי-זוגיים מהווים סדרות חשבוניות.

סעיף ג

לא ידוע שהסדרה a_n חשבונית, אבל a_{51} הוא איבר בסדרת **האי-זוגיים**. נרשום את הסדרה כדי לדijk במספר האיברים הזוגיים והאי-זוגיים:

$$\overbrace{a_1, a_2, \dots, a_{49}, a_{50}}^{50}, \overbrace{a_{51}, a_{52}, \dots, a_{100}, a_{101}}^{50}.$$

ברור שמספר האיברים האי-זוגיים גדול באחד ממספר האיברים הזוגיים, 51 אי-זוגיים ו-50 זוגיים. a_{51} הוא האיבר ה-25 העומד באמצע הסדרה. האיבר הראשון של המספרים האי-זוגיים נתון, $a_1 = 4$, ואת ההפרש $d = 4$ חישבנו בסעיף הקודם. מכאן:

$$a_{51} = a_1 + 25d = 4 + 25 \cdot 4 = 104.$$

סעיף ד

נחשב את סכום הסדרה כחיבור של סכום האי-זוגיים וסכום הזוגיים. $a_1 = 4$ נתון, וניתן לחשב לפי הנוסחה הנתונה:

$$a_2 = a_{1+1} = 4 \cdot 1 + 2 - a_1 = 4 + 2 - 4 = 2.$$

כבר חישבנו שהפרשיהם של שתי תת-הסדרות הם 4. מספר האי-זוגיים הוא 51 ומספר הזוגיים הוא 50. הסכום הוא:

$$S = S_{odd} + S_{even} = \frac{51}{2}(2 \cdot 4 + 50 \cdot 4) + \frac{50}{2}(2 \cdot 2 + 49 \cdot 4) = 5304 + 5000 = 10304.$$

2.15 קייז תשע"ד מועד ב

.2. נתונה סדרה חשבונית: a_1, a_2, a_3, \dots , מקיימים:

שלושה איברים עוקבים בסדרה, a_n, a_{n+1}, a_{n+2} ,

$$a_{n+2}^2 - a_n^2 = 216$$

$$a_n + a_{n+1} + a_{n+2} = 54$$

א. מצא את האיבר a_n .

ב. לקחו חלק מהאיברים בסדרה הנתונה ובני סדרה חשבונית חדשה:

$$a_5, a_9, a_{13}, \dots, a_{4k+1}$$

סכום כל האיברים בסדרה החדשה הוא 450.

האיבר הראשון בסדרה נתונה בפתרונות הוא $a_1 = -21$

מצא את הערך של k .

סעיף א

הסדרה חשבונית ולכן ניתן להשתמש להציג בתוך המשוואות הנתונות ולקבל שתי משוואות עם שני נעלמים:

$$\begin{aligned} (a_n + 2d)^2 - a_n^2 &= 216 \\ 4a_n d + 4d^2 &= 216 \\ a_n + (a_n + d) + (a_n + 2d) &= 54 \\ 3a_n + 3d &= 54. \end{aligned}$$

הפתרון הוא $d = 3, a_n = 15$

סעיף ב

הסדרה החדשה חשבונית שאיברה a'_1, a'_2, \dots הם:

$$\overbrace{a_5 = a_1 + 4d}^{a'_1}, \quad a_6 = a_5 + 5d, \quad a_7 = a_5 + 6d, \quad a_8 = a_5 + 7d, \quad \overbrace{a_9 = a_5 + 8d}^{a'_2}.$$

בסדרה החדשה $a'_1 = a_5 = -21 + 4d = -9$ ו- $d' = 4d = 12$. מסכום הסדרה החדשה:

$$\frac{k}{2}(2a'_1 + (k-1)d') = \frac{k}{2}(-18 + (k-1) \cdot 12) = 450$$

מתקבלת משוואה ריבועית $2k^2 - 5k - 150 = 0$ שהשורש החיובי שלה הוא

$$k = 10$$

2.16 קיז תשע"ז מועד א

.2. בסדרה חשבונית יש 3 איברים.

סכום כל האיברים האחרונים גדול פי 2 מסכום כל האיברים הקודמים להם.

א. הוכח שסכום כל האיברים הראשונים הוא 0.

ב. נתון גם שסכום האיברים החמישי והשביעי הוא 0.

סכום כל איברי הסדרה הוא 726.

מצא את הפרש הסדרה.

סעיף א

כדי לבדוק עם האינדקסים כדי לרשום את הסדרה עם סימון של הסדרות החלקיות:

$$\underbrace{a_1, a_2, \dots, a_n}_{S_{3n}}, \underbrace{a_{n+1}, a_{n+2}, \dots, a_{2n}}_{S_2}, \underbrace{a_{2n+1}, a_{2n+2}, \dots, a_{3n}}_{S_3}.$$

$$\text{נתון } :S_3 = 2S_2$$

$$\begin{aligned} \frac{n}{2}(2(a_1 + 2nd) + (n - 1)d) &= 2 \cdot \frac{n}{2}(2(a_1 + nd) + (n - 1)d) \\ 2a_1 + (5n - 1)d &= 4a_1 + (6n - 2)d \\ 2a_1 + (n - 1)d &= 0. \end{aligned}$$

הביטוי בצד השמאלי של המשוואה האחרון הוא הסכום S_1 .

דרך אחרת לפטור את הבועה היא להחסיר את סכום התת-הסדרות מסכום הסדרה כולה:

$$\begin{aligned} S_1 &= S_{3n} - (S_2 + S_3) = S_{3n} - (S_2 + 2S_2) = S_{3n} - 3S_2 \\ &= \frac{3n}{2}(2a_1 + (3n - 1)d) - 3 \cdot \frac{n}{2}(2(a_1 + nd) + (n - 1)d) \\ &= 0. \end{aligned}$$

בבוחינה של חורף תשע"ב אורך הסדרה הוא $1 - 2n$, ונתונים הסקומים של n האיברים הראשונים ו- n האיברים האחרונים. רק רישום זהיר של הסדרה יבהיר שיש חפיפה בין שתי תת-הסדרות:

$$\overbrace{a_1, a_2, \dots, a_n}^n, a_{n+1}, a_{n+2}, \dots, a_{2n-1}.$$

$\underbrace{}_n$

בדוגמה קל יותר לשים לב לחפיפה. עם $n = 4$:

$$\overbrace{a_1, a_2, a_3, a_4}^4, a_5, a_6, a_7.$$

$\underbrace{}_4$

סעיף ב'

נתון סכום הסדרה ועלינו למצוא d למורות שאין לנו a_1 . נבדוק אם הנתון השני יכול לעזור:

$$a_5 + a_7 = (a_1 + 4d) + (a_1 + 6d) = 0.$$

$$\text{מכאן } d = -5a_1.$$

בסעיף א' חישבנו $S_1 = 0$ ונציב עבור a_1 :

$$\frac{n}{2}(-10d + (n-1)d) = 0.$$

d לא יכול להיות 0 כי אחרת מהנתון שהסכום של שני איברים הוא אפשרי להסיק שככל איברי הסדרה הם אפס. זה סותר את הנתון שהסכום הוא מספר חיובי. לכן אפשר לחלק את המשוואה ב- d ונקבל $n = 11$.

נציב עבור n בנוסחה ל- S_{3n} :

$$\begin{aligned} S_3 &= \frac{3n}{2}(2a_1 + (3n-1)d) \\ &= \frac{33}{2}(-10d + (33-1)d) \\ &= \frac{33}{2} \cdot 22d = 363d = 726, \end{aligned}$$

ונקבל $d = 2$.

2.17 חורף תשע"ד

a₁ , a₂ , a₃ , a₄ , ... נתונה סדרה הנדסית אינ-סופית יורדת:

סכום כל איברי הסדרה בלי האיבר הראשון הוא 6.

מחליפים את הסימנים של כל האיברים הנמצאים במקומות הזוגיים בסדרה,

a₁ , -a₂ , a₃ , -a₄ , ... ומקבלת סדרה הנדסית חדשה:

סכום כל איברי הסדרה החדשה בלי האיבר הראשון הוא -3.

מהאיברים של הסדרה הנתונה בנו סדרה שלישית: ..., $\frac{1}{a_2}$, $\frac{1}{a_3}$, $\frac{1}{a_4}$... מהו היחס בין הסדרה השלישית להסדרה הנדסית?

א. היחס כה שסדרה השלישית היא סדרה הנדסית.

ב. נתון כי סכום של האיברים הראשונים בסדרה השלישית הוא 273.25.

מצא את n.

סעיף א

המנה של הסדרה השלישית קבועה כי נתון שהסדרה הראשונה הנדסית:

$$\frac{1/a_{n+1}}{1/a_n} = \frac{a_n}{a_{n+1}}.$$

סעיף ב

נשתמש בשני הסכומים הנתונים כדי לכתוב שתי משוואות עם שני נעלמים:

$$\begin{aligned} \frac{a_2}{1-q} &= 6 \\ \frac{-a_2}{1-(-q)} &= -3. \end{aligned}$$

$$a_2 = 4 \quad q = \frac{1}{3}$$

בסדרה השלישית, האיבר הראשון הוא $\frac{1}{d} = \frac{1}{a_2} = \frac{1}{4}$ וההפרש הוא $3 = \frac{1}{4} \cdot 3^n - 1$ מהסכום השלישי ונקבל:

$$\frac{1}{4} \cdot \frac{3^n - 1}{3 - 1} = 273.25$$

$$3^n = 2187$$

$$n = 7,$$

כאשר בדקנו חזקות של 3 עד שהתקבל 2187.

המלצות

- **חוובה לקרוא את השאלות בזיהירות רבה.** בבחינה של קיז תשע"ה א', סעיף ב שואלת על סדרה חדשה b_n אבל בסוף חוזרת וمبקשת למצוא את הסכום של הסדרה הנתונה a_n .
- **שיםו לב אם סדרה היא חשבונית, הנדסית או לא זו ולא זו.**
- **ברוב השאלות נתונה סדרה ומוגדרת סדרה חדשה המבוססת על הסדרה הנתונה. אין בהכרח קשר בין תכונה של הסדרה המקורית והסדרה החדשה.** להלן שתי סדרות חשבוניות, אבל כאשר משלבים את שתיהן, מתקבלת סדרה שאיננה חשבונית:

$$1, 4, 7, 10, 13, \dots$$

$$2, 5, 8, 11, 14, \dots$$

$$1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, \dots$$

- כאשר מבקשים להוכיח שתת-סדרת הזוגיים חשבונית או הנדסית וגם שתת-סדרת האיזוגיים, הוכחה אחת תספק כי אם $\frac{a_{n+2}}{a_n}$ קבוע, לא משנה אם n זוגי או אי-זוגי.
- כדאי לרשום את איברי הסדרה כדי לדijk במקומות של האיברים:

$$\overbrace{a_1, a_2, \dots, a_{49}, a_{50}}^{50}, \overbrace{a_{51}, a_{52}, \dots, a_{100}}^{50}$$

$$\underbrace{\overbrace{a_1, a_2, \dots, a_{49}, a_{50}}_{50}, \overbrace{a_{51}, a_{52}, \dots, a_{100}, a_{101}}_{50}}.$$

- מקרה מעניין הוא שתת-סדרות חופפות (בחינה של חורף תשע"ב שלא נמצאת במסמך זה):

$$\overbrace{a_1, a_2, \dots, a_n}^n, \overbrace{a_{n+1}, a_{n+2}, \dots, a_{2n-1}}^n$$

- קיימות שתי דרכים לסכם מספר שתת-סדרות (בחינה של קיז תשע"ד א'). דרך אחת היא לסכם כל שתת-סדרות בנפרד עם ערכי d, a_1 או q, n שלהם. זה קורה לעיתים קרובות כאשר השאלה מבקשת לחשב סכום של סדרה, אבל ידוע רק שתת-סדרות חשבוניות או הנדסיות, למשל, זוגיים או איזוגיים (בחינה של קיז תשע"ח ב').
- דרך אחרת היא לחבר הסכומים של שתת-סדרות ולהחסיר את התוצאה מסכום הסדרה כולה:

$$S_1 = S_n - (S_2 + S_3).$$

- בסדרה קיימים ארבעה נעלמים d, a_1 או q, n, S . כדי למצוא את ערכו של נעלם אחד, צריך לדעת את ערכי שלושת הנעלמים האחרים (או שניים אם לא מדובר בסכום). לעיתים מספיק לדעת את הקשר בין שני נעלמים, כגון $0 = a_1 + 11d$ בבחינה של חורף תשע"ח.

- הבחינה של חורף תשע"ז מענינית כי מספר האיברים הוא לא הערך של המספר n המופיע בשאלה. חשוב לרשום דוגמה מסכמת כדי לוודא מהו מספר האיברים:

$$(1) a_1 \cdot a_2, \quad (2) a_2 \cdot a_3, \quad \dots \quad (5) a_5 \cdot a_6 = (a_n \cdot a_{n+1}), \quad (6) a_6 \cdot a_7 (= a_{n+1} \cdot a_{n+2}).$$

- טרייך שימושי הוא לחבר ולהחסיר את אותו ערך בבייטוי (בחינה חורף תשע"ה):

$$a_{k+2} - a_k = a_{k+2} + (a_{k+1} - a_{k+1}) - a_k = (a_{k+2} + a_{k+1}) - (a_{k+1} + a_k).$$

- הכנסת איברים חדשים בתוך סדרה לא בהכרח שומרת על הסדרה כحسابונית או הנדסית. השורה הראשונה להלן היא סדרה חשבונית. בשורה השנייה הוכנסו איברים של סדרה חשבונית נוספת ונוספת והסדרה החדשה היא חשבונית. בשורה השלישית הוכנסו איברים של סדרה חשבונית נוספת והסדרה החדשה אינה חשבונית.

$$1, \quad 5, \quad 9, \quad 13, \quad 17$$

$$1, \quad 3, \quad 5, \quad 7, \quad 9, \quad 11, \quad 13, \quad 15, \quad 17$$

$$1, \quad 2, \quad 5, \quad 6, \quad 9, \quad 10, \quad 13, \quad 14, \quad 17$$

בחינה של קיז תשע"ו בכתוב במפורש שהסדרה חדשה חשבונית.

- בטישוב הפרש אומנה, כדאי להציב ב- a_{n+1} או a_{n-1} בייטוי שיש בו a_n . הנה דוגמה מהבחינה של קיז תשע"ה:

$$a_n = \frac{2}{5}(a_{n-1} + a_{n+1}) = \frac{2}{5} \left(\frac{a_n}{q} + qa_n \right).$$

מצטמץ ונקבל משווהה ריבועית ב- q .

פרק 3 הסתברות

3.1 קיז תשע"ח מועד ב

במבחן רב-ברירה ("אמריקני") יש 5 שאלות.

כל שאלה מוצגות 4 תשובות, אך רק אחת מהן נכונה.

התלמידים צריכים לסמך תשובה אחת מבין 4 התשובות המוצגות.

תלמיד שמסמן את התשובה הנכונה על השאלה מקבל 20 נקודות לשאלה זו.

תלמיד שמסמן תשובה לא נכונה על השאלה אינו מקבל נקודות לשאלה.

כדי לעبور את המבחן יש לצבור לפחות 60 נקודות סך הכל.

א. על 2 מן השאלות ידע שחר בודאות לענות את התשובות הנכונות, וסימן אותן.

בשאר השאלות הוא סימן באקראי תשובה אחת בכל שאלה.

(1) מהי ההסתברות ששחר יצבור בבדיקה 60 נקודות?

(2) מהי ההסתברות ששחר עבר את המבחן?

ב. על 2 מן השאלות ידע דניאל בודאות לענות את התשובות הנכונות, וסימן אותן.

בכל אחת משלוש השאלות האחרות ידע דניאל בודאות שתשובה אחת, מבין 4 התשובות המוצגות, אינה נכונה,

ולכן סימן באקראי אחת מן התשובות האחרות בכל שאלה.

מהי ההסתברות שדניאל יצבור בבדיקה 60 נקודות?

ג. על 3 מן השאלות ידעה הדס בודאות לענות את התשובות הנכונות, וסימנה אותן.

בכל אחת משתי השאלות האחרות היא ידעה בודאות שר' k מבין 4 התשובות המוצגות אין נכון, וסימנה

באקראי אחת מן התשובות האחרות בכל שאלה.

ידוע שההסתברות שהדס תצבור בבדיקה 60 נקודות בmäßigון שווה להסתברות שהיא תצBOR 100 נקודות בבדיקה.

מצאת k. נמק.

שאלה זו ארוכה במיוחד, אבל לא קשה במיוחד, כי ניתן לפתור את כל הסעיפים באמצעות נוסחת ברנולי בלבד.

סעיף א (1)

שחר ידע שהוא ענה נכון על שתי שאלות ולכן כדי לקבל ציון 60 עליו לענות על **בדיקה אחת** משלושה שאלות האחרות:

$$\binom{3}{1} \left(\frac{1}{4}\right) \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{27}{64}.$$

סעיף א (2)

כדי לעبور את המבחן עליו לצBOR **פחות** שלוש תשובות נכון. להסתברות מהסעיף הקודם יש להוציא את ההסתברויות של ארבע וחמש תשובות נכון:

$$\frac{27}{64} + \binom{3}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^1 + \binom{3}{3} \left(\frac{1}{4}\right)^3 \left(\frac{3}{4}\right)^0 = \frac{37}{64}.$$

סעיף ב

דניאל צריך לענות נכון על שאלה אחת **בבדיקה** מתוך שלושת השאלות הנותרות. דניאל ידע שתשובה אחת לא נכונה, لكن ההסתברות שהוא ענה נכון על השאלה היא $\frac{1}{3}$ ולא $\frac{1}{4}$ כמו בסעיף הקודם:

$$\binom{3}{1} \left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}.$$

סעיף ג

השאלה בסעיף זה דומה לשאלות בסעיפים הקודמים, רק במקום מספר קבוע של תשובות נכונות / לא נכונות ידועות, המספר ניתן על ידי פרמטר.

אם הדס ידעה ש- k מתוך 4 תשובות לא נכונות, ההסתברות שהיא ענתה תשובה נכונה היא $\frac{1}{4-k}$, וההסתברות ענתה תשובה לא נכונה היא $\frac{4-k-1}{4-k}$, כי $1 = \frac{4-k-1}{4-k} + \frac{1}{4-k}$. כדי לקבל ציון **בבדיקה** 100 הדס צריכה לבחור תשובות נכונות לשתי השאלות הנותרות. כדי לקבל ציון **בבדיקה** 60 עליה לבחור תשובות לא נכונות לשתי השאלות הנותרות.

אין צורך להשתמש בנוסחת ברנולי במלואו, כי כאשר מחשבים את ההסתברות של "הכל" או "אף אחד", $1 = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$, וגם $1 = 1^0 (1-p)^0$ או $1 = 0^0 (1-p)^0$, ולכן, מספיק לחשב את ההסתברות של האירוע חזקת מספר השאלות:

$$\left(\frac{1}{4-k}\right)^2 = \left(\frac{4-k-1}{4-k}\right)^2.$$

נפשט ונקבל משואה ריבועית $k^2 - 6k + 8 = 0$ שהפתרונות שלה הם $k=2, k=4$. הפרמטר k מוגדר כמספר התשובות שהدس ידעת שהן **אינן** נכונות, ונתון (בשורה השנייה של השאלה) שהשובה אחת נכונה, כך שיש לפסול את הפתרון $k=4$ ולבחור $k=2$.

3.2 קיז תשע"ח מועד א

בעיר גודלה נערכן מבחן לכל תלמידי התיכון.
 37% מן התלמידים שניגשו לבחון נעזרו בחבריהם כדי להתכוון לבחון. $\frac{35}{37}$ מהם עברו את המבחן.
 מספר התלמידים שלא נעזרו בחבריהם ולא עברו את המבחן קטן פי 5 ממספר התלמידים שנעזרו בחבריהם ועברו את המבחן.

- א. בחרו באקראי תלמיד שניגש לבחון, והתברר שהוא לא עבר את המבחן. מהי ההסתברות שהוא נעזר בחבריו?
- ב. יעל והדס ניגשו לבחון. ידוע שיעל נזורה בחבריה כדי להתכוון לבחון, והדס לא נזורה בחבריה כדי להתכוון לבחון. האם ההסתברות שיעל עברה את המבחן גבוהה מההסתברות שהדס עבר את המבחן? נמק.
- ג. בחרו באקראי 6 תלמידים שניגשו לבחון.
 מהי ההסתברות שבבדיקה שליש מהם לא נעזרו בחבריהם ועברו את המבחן?
- ד. בחרו באקראי תלמיד שניגש לבחון. מהי ההסתברות שהוא מקיים לפחות אחת משתי הטענות I-II:
 - (I) התלמיד נעזר בחבריו.
 - (II) התלמיד לא עבר את המבחן.

לפני שניגש לפתרון השאלות בסעיפים, נמלא את טבלת ההסתברויות לפי המידע הנוכחי.

נסמן ב- N את התלמידים שנעזרו בחבריהם, וב- A את התלמידים שעברו את המבחן.
 די ברור שם 37% נעזרו בחבריהם ו-35 מהם עברו אז $P(N \cap A) = 0.35$, אבל בכל זאת נחשב בצורה פרומילית. נתון ש- $P(N) = \frac{35}{37}$. מהם עברו את הבחינה $P(A|N) = 0.37$, כך שערך זה הוא ההסתברות המותנית $P(A|N)$. נחשב:

$$P(A|N) = \frac{P(N \cap A)}{P(N)} = \frac{P(N \cap A)}{0.37} = \frac{35}{37}$$

$$P(N \cap A) = 0.35.$$

עד כאן טבלת ההסתברויות היא:

\bar{A}	A	
N		
\bar{N}		
0.37	0.02	0.35
0.63		
1.0		

בהמשך נתון ש:

$$P(\bar{N} \cap \bar{A}) = \frac{P(N \cap A)}{5} = \frac{0.35}{5} = 0.07,$$

וניתן להשלים את הטבלה:

\bar{A}	A	
0.37	0.02	0.35
0.63	0.07	0.56
1.0	0.09	0.91

סעיף א

נקרא את השאלה בעיון: "בחרו ... תלמיד ... שלא עבר את המבחן. מה ההסתברות שהוא נער בחבריו?" הניסוח שני שלבים מכוון להסתברות מותנית:

$$P(N/\bar{A}) = \frac{P(N \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{0.02}{0.09} = \frac{2}{9}.$$

סעיף ב

"ידעו ש" מכוון להסתברות מותנית, כי השאלה אם התלמידה עברה את המבחן או לא, תלוי בעובדת שאנו ידועים שהיא נערה או לא נערה בחברים. עבור על ההסתברות המותנית היא:

$$P(A/N) = \frac{P(A \cap N)}{P(N)} = \frac{0.35}{0.37} = 0.9459,$$

ובעבור הדס ההסתברות המותנית היא:

$$P(A/\bar{N}) = \frac{P(A \cap \bar{N})}{P(\bar{N})} = \frac{0.56}{0.63} = 0.8889.$$

לייעל הסתברות גבוהה יותר לעבור את המבחן.


סעיף ג

שליש של שש הוא שניים. (שים לב שלא לקרוא "שלשה" במקום "שלישי"!) החישוב הוא לפי נוסחת ברנולי כאשר הערך $P(\bar{N} \cap A) = 0.56$ נמצא בטבלה:

$$\binom{6}{2} (0.56)^2 (1 - 0.56)^4 = 0.1763.$$

סעיף ד

הניסוח "לפחות אחת" מציין הטענות I, II אומר שהairoע קורה אם קורה אחד מהairoעים I, II או שנייהם. בתרשים להלן שני העיגולים המייצגים את שני האירועים I, II, והairoע "פחות אחת" מיוצג על ידי כל השטח המוקווקו:



יש שתי דרכים לחשב את ההסתברות. בדרכן הראשונה אנו לוקחים את סכום ההסתברויות של שני האירועים, ומחסירים את ההסתברות של האירוע המשותף כי ספרנו אותו פעמיים, פעם כחלק מהאירוע I ופעם כחלק מהאירוע II:

$$P(I \cup II) = P(I) + P(II) - P(I \cap II).$$

בדרך השנייה אנו סופרים כל חלק מהאירוע השותף בנפרד, כאשר הסימון $B - A$ הוא כל האיברים בקבוצת A שאינם בקבוצה B :

$$P(I \cup II) = P(I - II) + P(II - I) + P(I \cap II).$$

את ההסתברויות לחישוב ניקח מהטבלה. הדרכן הראשונה מופיעה מימין והדרך השנייה משמאלה:

\bar{A}	A		\bar{A}	A	
0.37	0.02	0.35	N		
0.63	0.07	0.56	\bar{N}		
1.0	0.09	0.91			

\bar{A}	A		\bar{A}	A	
0.37	0.02	0.35	N		
0.63	0.07	0.56	\bar{N}		
1.0	0.09	0.91			

בשתי הדריכים מקבלים אותה תוצאה:

$$P(N \cup \bar{A}) = P(N) + P(\bar{A}) - P(N \cap \bar{A}) = 0.37 + 0.09 - 0.02 = 0.44$$

$$P(N \cup \bar{A}) = P(N - \bar{A}) + P(\bar{A} - N) + P(N \cap \bar{A}) = 0.35 + 0.07 + 0.02 = 0.44.$$

3.3 חורף תשע"ח

למייל יש קובייה מאוזנת. על שלוש פאות הקובייה שלה כתוב המספר 2, ועל שלוש הפאות האחרות כתוב המספר 4.

לגלית יש קובייה מאוזנת אחרת. על כל אחת מפאות הקובייה של גלית כתוב אחד מן המספרים: 1 או 3, מייל וגלית משחקים משחק בן חמישה סיבובים. המשתתפת שتنצח במספר סיבובים רב יותר מחברתה, תנצח במשחק. בכל סיבוב של המשחק כל אחת מהן מטילה את הקובייה שלה פעם אחת. המנצח בסיבוב היא השחקנית שהמספר שהתקבל על הקובייה שלה גבוהה יותר.

נתון שבסיבוב יחיד הסיכוי של מייל לניצח את גלית הוא $\frac{7}{12}$.

- על כמה פאות בקובייה של גלית כתוב המספר 1? נמק את תשובתך.
- מהו הסיכוי שgalit תניצח במשחק?
- מהו הסיכוי של galit לניצח במשחק, אם ידוע שהיא ניצחה בסיבוב הראשון?

סעיף א

נסמן ב- a את המספר הפאות של הקובייה של גלית שכותוב עליהם 1. מייל תניצח אם היא מטילה $\frac{3}{6}$ (הסתברות $\frac{3}{6}$), לא משנה מה גלית מטילה (הסתברות 1), או אם היא מטילה 2 (הסתברות $\frac{3}{6}$), וגלית מטילה 1 (הסתברות $\frac{n}{6}$):

$$\frac{3}{6} \cdot 1 + \frac{3}{6} \cdot \frac{n}{6} = \frac{7}{12},$$

והפתרון הוא $n = 1$.

סעיף ב

galit תניצח אם היא תניצח ב-5, 4, 3 סיבובים. ההסתברות לניצחון בכל סיבוב היא:

$$\binom{5}{3} \left(\frac{5}{12}\right)^3 \left(\frac{7}{12}\right)^2 + \binom{5}{4} \left(\frac{5}{12}\right)^4 \left(\frac{7}{12}\right)^1 + \binom{5}{5} \left(\frac{5}{12}\right)^5 \left(\frac{7}{12}\right)^0 = 0.3466.$$

סעיף ג

המילים **אם ידוע** מכוונות להסתברות מותנית:

$$P = \frac{\text{(גלית ניצחה בסיבוב הראשון} \cap \text{galit תניצח})}{\text{(galit ניצחה בסיבוב הראשון}/galit תניצח}} = \frac{\text{(galit ניצחה בסיבוב הראשון}/galit תניצח)}{\text{(galit ניצחה בסיבוב הראשון)}}.$$

ההסתברות במנה: כדי שgalit תניצח במשחק וגם בסיבוב הראשון, היא חייבת לניצח בסיבוב הראשון וגם ב-4, 3, 2 מהסיבובים הנוגדים:


$$\frac{5}{12} \left[\binom{4}{4} \left(\frac{5}{12}\right)^4 \left(\frac{7}{12}\right)^0 + \binom{4}{3} \left(\frac{5}{12}\right)^3 \left(\frac{7}{12}\right)^1 + \binom{4}{2} \left(\frac{5}{12}\right)^2 \left(\frac{7}{12}\right)^2 \right] = \frac{5}{12} \cdot 0.5534.$$

ההסתברות במכנה היא $\frac{5}{12}$ ולכן התשובה היא 0.5534.

3.4 קיז תשע"ז מועד ב

בקופסה I יש 10 כדורים, כמה מהם כחולים והשאר אדומים, ובבקופסה II יש 7 כדורים כחולים ו-3 כדורים אדומים. מוצאים באקראי כדור מקופסה I. אם יצא כדור אדום, מעבירים אותו לקופסה II. אם יצא כדור כחול, מחזירים אותו לקופסה I. שוב מוצאים באקראי כדור מקופסה I, ושוב, אם יצא כדור אדום, מעבירים אותו לקופסה II. ואם יצא כדור כחול, מחזירים אותו לקופסה I. לאחר מכן מוצאים באקראי כדור אחד מקופסה II. נתון כי ההסתברות שאחרי שתי הוצאות מקופסה I יועבר כדור אדום אחד בלבד מkopסה I לkopסה II היא $\frac{19}{36}$. חשב את מספר ה כדורים הכחולים שהיו בקופסה I לפני הוצאה הראשונה.

- ענה על השיעיפים ב-ג עבור מספר ה כדורים הכחולים שחייבת בסעיף א.
 ב. מהי ההסתברות שהכדור שהוציאו מkopסה II הוא כדור אדום?
 ג. ידוע שהכדור שהוציאו מkopסה II הוא כדור אדום.
 מהי ההסתברות שאחרי שהוציאו את הכדור האדום מkopסה II נשארו בה שלושה כדורים אדומים בדיק?



המילים "מוצאים באקראי ... ולאחר מכן שוב מוצאים באקראי" מכוונות לשימוש בעז. נסמן ב- b את מספר ה כדורים הכחולים בקופסה I. בתרשים בכל צומת רשום שני זוגות של מספרים: מספר ה כדורים האדומים ומספר ה כדורים הכחולים בקופסה I, ומתחתיו מספר ה כדורים האדומים ומספר ה כדורים הכחולים בקופסה II.

סעיף א

הכוכبيות מסמנות את שתי האפשרויות בהן הוצאנו כדור אדום אחד בבדיקה מקופסה I. נשווה את הסתברות הנתונה לסכום ההסתברויות של שני המסלולים:

$$\frac{10-b}{10} \cdot \frac{b}{9} + \frac{b}{10} \cdot \frac{10-b}{10} = \frac{19}{36}.$$

נפשט ונקבל משווה ריבועית $0 = b^2 - 10b + 25 = (b-5)^2$ שיש לה פתרון אחד $b = 5$.

סעיף ב

בתרשים רשום מספר ה כדורים האדומים מתוך כל ה כדורים בקופסה II. מלמעלה למטה:

$$\frac{5}{5+7} = \frac{5}{12}, \quad \frac{4}{4+7} = \frac{4}{11}, \quad \frac{4}{4+7} = \frac{4}{11}, \quad \frac{3}{3+7} = \frac{3}{10}.$$

את ההסתברות להגיע לכל אחד מהמצבים נקבל לאחר הצבת $b = 5$. נסכם את ההסתברויות להוציא כדור אדום:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{5}{10} \cdot \frac{4}{9} \right) \left(\frac{5}{12} \right) + \left(\frac{5}{10} \cdot \frac{5}{9} \right) \left(\frac{4}{11} \right) + \\ & \left(\frac{5}{10} \cdot \frac{5}{10} \right) \left(\frac{4}{11} \right) + \left(\frac{5}{10} \cdot \frac{5}{10} \right) \left(\frac{3}{10} \right) = 0.3595. \end{aligned}$$

סעיף ג

המילים "ידעו ש-" מכוונות להסתברות מותנית:

$$= (\text{הוציאו כדור אדום מקופסה I} / \text{נשארו שלושה אדומים בקופסה II})$$

$$\frac{P(\text{הוציאו כדור אדום מקופסה I} \cap \text{nשארו שלושה אדומים בקופסה II})}{P(\text{הוציאו כדור אדום מקופסה II})}$$

ישארו שלושה כדורים אדומים רק אם היו ארבעה כדורים אדומים לפני הבחירה. ההסתברות במנה היא $\frac{19}{36}$, ההסתברות (הנתונה!) שנגיע לאחד הממצבים המסומנים בכוכבית, כפול ההסתברות לבחר כדור אדום מקופסה II, 4 מתוך 11 כדורים. חישבנו את ההסתברות במכנה בסעיף ב:

$$\frac{\frac{19}{36} \cdot \frac{4}{11}}{0.3595} = 0.53385.$$

3.5 קיז תשע"ז מועד א

- בבית אבות גדול יש לכמה מן הדירות קלנווית, ולשאר אין.
- אם בוחרים באקראי 9 דירות מבית האבות זהה, ההסתברות של 4 מהם בדיק יש קלנווית גדולה פי 24 מן ההסתברות של 6 מהם בדיק יש קלנווית.
- א. מהי ההסתברות שלدير שנבחר באקראי יש קלנווית?
- ב. בוחרים באקראי 6 דירות מבית האבות. ידוע שלפחות ל-3 מהם יש קלנווית.
- ג. בוחרים באקראי 6 דירות מבית האבות, בזה אחר זה, עד של-3 מהם בדיק יש קלנווית. מהי ההסתברות שייבחרו בדרך זו בדיק 6 דירות?

סעיף א

נסמן ב- D את האירוע "לدير יש קלנווית" ואת ההסתברות של האירוע ב- p . לפי נוסחת ברנולי נתון ש:

$$\binom{9}{4} p^4 (1-p)^5 = 24 \binom{9}{6} p^6 (1-p)^3.$$

נפеш ונקבל משווה ריבועית:

$$15p^2 + 2p - 1 = 0,$$

$$p = \frac{1}{5} = 0.2$$

סעיף ב

המילים "ידוע ש-" מכונות להסתברות מותנית:

$$P(D = 4 | D \geq 3) = \frac{P(D = 4 \cap D \geq 3)}{P(D \geq 3)}.$$

כאשר יש חפיפה בין שני ביטויים בחיתוך אפשר לפשט אותן: ברור שאם ערך גדול או שווה 3 וגם שווה ל-4 אז הוא שווה ל-4, וניתן לפשט את המשווה להסתברות מותנית:

$$P(D = 4 | D \geq 3) = \frac{P(D = 4)}{P(D \geq 3)}.$$

לפי נוסחת ברנולי:

$$P(D = 4) = \binom{6}{4} 0.2^4 (1-0.2)^2 = 0.01536.$$

את המנה $P(D \geq 3)$ אפשר לחשב בשתי דרכים, בצורה ישירה:

$$\binom{6}{3} 0.2^3 (1-0.2)^3 + \binom{6}{4} 0.2^4 (1-0.2)^2 + \binom{6}{5} 0.2^5 (1-0.2)^1 + \binom{6}{6} 0.2^6 (1-0.2)^0 = 0.099,$$

או אחד פחות המשלימים:

$$1 - 0.2^0(1 - 0.2)^6 - \binom{6}{1}0.2^1(1 - 0.2)^5 - \binom{6}{2}0.2^2(1 - 0.2)^4 = 0.099,$$

כמובן שצדאי לבחור את האפשרות השנייה כי יש פחות גורמים לחשב.

התשובה לשאלה היא:

$$P(D = 4 | D \geq 3) = \frac{P(D = 4)}{P(D \geq 3)} = \frac{0.01536}{0.099} = 0.15534.$$

סעיף ג

המשמעות של "עד ש" היא שהבחירה **אחרונה** תהיה "הצלחה" ויהיו שתי "הצלחות" בחמשת הבחירה הקודומות:

$$\underbrace{\pm \pm \pm \pm \pm}_{2/5} \quad \underbrace{+}_{1/1}.$$

התשובה מתתקבלת מנוסחת ברנולי לבחירות הראשונות כפול הסתברות p לבחירה الأخيرة:

$$\left[\binom{5}{2} 0.2^2 (1 - .02)^3 \right] \cdot 0.2 = 0.04096.$$

3.6 חורף תשע"ז

אביגיל משתתפת במשחק של זריקת חצים למטרה. הסיכוי שלו לפגוע במטרה בניסיון בודד הוא $P(0 > P)$, ואינו תלוי בניסיונותיה הקודמים. כל משתתף זורק 5 זירות רצופות. הסיכוי של אביגיל לפגוע במטרה ארבע זירות מותוך החמש גדול פי 3 מן הסיכוי שלו לפגוע בה בכל חמש הזריקות.

א. מצא את P .

- משתתף מנצח המשחק אם מותוך 5 זירות רצופות, מספר הפגיעה שלו במטרה גדול ממספר ההחטאות שלו (יכול להיות יותר ממנצח אחד במשחק).
- ב. מהי ההסתברות שאביגיל תנצח במשחק?
- ג. (1) אם אביגיל תחתיא את המטרה בזריקה השנייה, מהי ההסתברות שהיא תנצח במשחק?
(2) גם תמר משתתפת במשחק, וגם הסיכוי שלו לפגוע במטרה בניסיון בודד שווה ל- P וaino תלוי בניסיונותיה הקודמים. תמר החטיאה בזריקה הראשונה. מהי ההסתברות שהיא תנצח במשחק?

סעיף א

נכתב משאווה עם נוסחת ברנולי לפי המידע הנתון:

$$\binom{5}{4} p^4 (1-p)^1 = 3 \binom{5}{5} p^5 (1-p)^0.$$

הגורם p^4 מצטמצם והפתרון הוא $p = \frac{5}{8}$.

סעיף ב

אביגיל תנצח אם היא פוגעת ב- 5, 4, 3 זירות. ההסתברות היא:

$$\binom{5}{3} p^3 (1-p)^2 + \binom{5}{4} p^4 (1-p)^1 + \binom{5}{5} p^5 (1-p)^0.$$

נציב $p = \frac{5}{8}$ ונקבל 0.7248.

סעיף ג (1)

לדעתו, ניסוח השאלה לא ברור. אני פירשתי אותה כך: מה ההסתברות של **האירוע "אביגיל מחתיאה בזירה השנייה ופוגעת בשלוש או ארבע מהזריקות האחרות"**? כותב הבדיקה התכוון להסתברות מותנית: **"אם ידוע ש-אביגיל החטיאה בזירה השנייה, מה ההסתברות שהיא פוגעת בשלוש או ארבע מהזריקות האחרות?"** הנוסחה היא:

$$P(1, 3, 4, 5) = \frac{(אביגיל החטיאה בזירה השנייה \cap אביגיל פגעה בשלוש או ארבע מהזריקות 5)}{(אביגיל החטיאה בזירה השנייה \cap אביגיל פגעה בשלוש או ארבע מהזריקות 5)}.$$

אפשר לפתור את הבעיה בשתי דרכים. נתנו שהסיכוי לפגיעה במטרה אינו תלוי בנסיבות הקודמים, ולכן ההסתברויות בלתי תלויות וחישוב מוצטמצם:

$$P(1, 3, 4, 5) = \frac{(אביגיל החטיאה בזירה השנייה \cdot (אביגיל פגעה בשלוש או ארבע מהזריקות 5))}{(אביגיל החטיאה בזירה השנייה)}$$

$$(אביגיל פגעה בשלוש או ארבע מהזריקות 5).$$

לפי נוסחת ברנולי:

$$\binom{4}{4} \left(\frac{5}{8}\right)^4 \left(\frac{3}{6}\right)^0 + \binom{4}{3} \left(\frac{5}{8}\right)^3 \left(\frac{3}{8}\right)^1 = 0.5188.$$

הדרך השנייה ארוכה יותר אבל מעניינת. האירוע של החיתוך בנוסחה להסתברות מותנית מורכבת משני אירועים: (א) לא משנה מה יצא מהזריקה הראשונה, הזריקה השנייה החטיאה, ושלושת הזריקות האחרונות פגעו. (ב) הזריקה הראשונה פגעה, הזריקה השנייה החטיאה, ושתיים מתוך שלושת הזריקות האחרונות פגעו. הסתברות של האירוע המשותף היא:

$$1 \cdot \frac{3}{8} \cdot \left(\frac{5}{8}\right)^3 + \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{8} \cdot \left[\binom{3}{2} \left(\frac{5}{8}\right)^2 \frac{3}{8}\right] = 0.1945.$$

נחלק ב- $\frac{3}{8}$, ההסתברות האביגיל החטיאה בזירה השנייה, ונקבל 0.5188.

סעיף ג (2)

לא משנה איזו זריקה החטיאה, הזריקות בלתי תלויות וחישוב ההסתברות של "תמר פגעה בשלוש או ארבע מהזריקות 5,2,3,4,5" נותן אותה תוצאה כמו האירוע "אביגיל פגעה בשלוש או ארבע מהזריקות 1,3,4,5".

3.7 **קייז תשע"ו מועד ב**

שחמט הוא משחק בין שני שחקנים שיכל להסתois בניתו של אחד מהם או בתיקו.
 יעל ו安娜 משחקים זו מול זו בטורניר שחמט בשני סבבים.
 ההסתברות של כל אחת מן השחקניות לניצח במשחק בודד היא קבועה בכל הטורניר.
 א. בסבב הראשון יש 4 שחקנים. ההסתברות שיעיל תניצח ב- 2 שחקנים
 או ב- 3 שחקנים גדולה פי 10 מן ההסתברות שיעיל תניצח ב- 4 שחקנים.
 חשב את ההסתברות שיעיל תניצח במשחק בודד.

בסבב השני יש 2 משחקים.

הסתברות שתוצאה הסבב השני תהיה שוויה – היא 0.34.

ב. מהי הנסיבות שאנה תנצח במשחק בודד?

ג. חשב את ההסתברות שאנו תנча במשחק השני, אם ידוע שתוצאה סבב זה היא שוויון.

נוסף: $y = \text{הסתברות שיעיל תנצח במשחק בודד}$, $a = \text{הסתברות שאנה תנצח במשחק בודד}$.

סעיף א

לפי המידע הנוכחי:

$$\binom{4}{2}y^2(1-y)^2 + \binom{4}{3}y^3(1-y) = 10 \cdot \binom{4}{4}y^4(1-y)^0.$$

. $y = \frac{1}{2} = 0.5$ השורש החיובי של h הוא $4y^2 + 4y - 3 = 0$

סעיף ב

האפשרויות לקבל שוויון הם: (א) ניצחון אחד לאנה וליעל, או (ב) תיקן בשני המשחקים. ההסתברות לתיקו היא המשלבים לסכום ההסתברויות שאחת מהן תנצח:

$$\binom{2}{1}ya + (1 - (y + a))^2 = 0.34.$$

$a = 0.3$ ונקבל $y = 0.5$

סעיף ג

המילים "אם ידוע ש-" מכוונות להסתברות מותנית:

= (תוצאת הסבב השני היא שוויון/אנה תנצח במשחק השני)

$$\frac{P(\text{תוצאת הסבב השני היא שוויון} \cap \text{אני תנצה במשחק השני})}{P(\text{תוצאת הסבב השני היא שוויון})}.$$

תנץ' במשחק הראשון: $\pi_A = 0.5 - 0.3$

$$\frac{ya}{.34} = \frac{0.5 \cdot 0.3}{.34} = 0.4412.$$

שיםו לב שלא צריכים $\binom{2}{1}$ כי האירוע הוא שאנו תניצח במשחק השני ויעל תניצח במשחק הראשון.

3.8 קיז תשע"ו מועד א

במבחן כניסה למכללה 20% מן הנבחנים היו מקיובצים.

40% היו ממושבים ו- 40% היו מעירים.

70% מן הנבחנים הצליחו במבחן.

$\frac{1}{8}$ מן הנבחנים שהיו ממושבים נכשלו במבחן.

הסתברות לבחור באקראי מבין כל הנבחנים נבחן שהוא מעיר וגם הצליח במבחן, גדולה פי 2.5 מן ההסתברות לבחור באקראי מבין כל הנבחנים נבחן שהוא מקיובץ וגם הצליח במבחן.

א. מבין הנבחנים שנכשלו במבחן, מהי ההסתברות לבחור באקראי נבחן שלא היה מעיר?

ב. (1) משה הצליח במבחן.

מהי ההסתברות שהוא לא היה ממושב?

(2) חמישה נבחנים הצליחו במבחן.

מהי ההסתברות שלפחות אחד מהם היה ממושב?

לפני שניגש לפתרון השאלות, ננסה למלא את טבלת ההסתברויות.

נסמן S = נבחנים שהצליחו, K = נבחנים מקיובצים, M = נבחנים ממושבים, E = נבחנים מעירים. ההסתברויות הנתונות הן:

$$P(K) = 0.20, \quad P(M) = 0.40, \quad P(E) = 0.40, \quad P(S) = 0.70.$$

נתון:

$$P(\bar{S}/M) = P(\bar{S} \cap M)/P(M) = \frac{1}{8},$$

ולכן:

$$P(\bar{S} \cap M) = P(\bar{S}/M) \cdot P(M) = \frac{1}{8} \cdot 0.40 = 0.05.$$

סיכום ביניים:

	E	M	K	
S	0.70		0.35	
\bar{S}			0.05	
	1.0	0.40	0.40	0.20

הنتון האחרון הוא: $P(E \cap S) = 2.5P(K \cap S)$, ולכן:

$$P(S) = 0.70 = P(K \cap S) + 0.35 + 2.5P(K \cap S),$$

ולכן: $P(K \cap S) = 0.1$, $P(E \cap S) = 0.25$.

	<i>E</i>	<i>M</i>	<i>K</i>	
0.70	0.25	0.35	0.10	<i>S</i>
0.30	0.15	0.05	0.10	\bar{S}
1.0	0.40	0.40	0.20	

שימו לב שהמילים "מן הנבחנים שהיו ממושבים נכשלו" מכוונות להסתברות מותנית, לעומת המילים "ההסתברות לבחור באקראי **בין** כל הנבחנים נבחן שהיא מהעיר **ומם** החלטה ב מבחן" מכוונות לחישוך הסתברויות **כי** ההסתברות לבחור אחד " מכל הנבחנים" היא 1:

$$P(E \cap S / S) = \frac{(P(E \cap S) \cap \text{כל הנבחנים})}{P(\text{כל הנבחנים})} = \frac{P(E \cap S)}{1} = P(E \cap S).$$

סעיף א

לפי הנוסחה להסתברות מותנית והנחה שאף נבחן לא בא גם מקיבוץ וגם ממושב:

$$P(\bar{E} / \bar{S}) = P((K \cup M) / \bar{S}) = \frac{P(K \cap \bar{S}) + P(M \cap \bar{S})}{P(\bar{S})} = \frac{0.10 + 0.05}{0.30} = \frac{1}{2}.$$

סעיף ב (1)

לפי הנוסחה להסתברות מותנית והנחה שאף נבחן לא בא גם מקיבוץ וגם מעיר:

$$P(\bar{M} / S) = P((K \cup E) / S) = \frac{P(K \cap S) + P(E \cap S)}{P(S)} = \frac{0.10 + 0.25}{0.70} = \frac{1}{2}.$$

סעיף ב (2)

"לפחות אחד ממושב" הוא המשלים ל-"כולם לא מהמושב":

$$1 - P(\bar{M} / S)^5 = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{31}{32}.$$

3.9 חורף תשע"ו

במוכנות מזל אפשר לזכות ב- 50 שקל, ב- 100 שקל או לא לזכות כלל.

דן משחק 5 משחקים במוכונה זו.

הסתברות שדן יזכה ב- 50 שקל לבדוק פעמיים שווה להסתברות שהוא יזכה ב- 50 שקל בבדיקה פעם אחת.

(הסתברות לזכות ב- 50 שקל שונה מאפס).

הסתברות שדן לא יזכה באך משחק היא $\frac{1}{32}$.

א. מהי הסתברות שדן יזכה ב- 50 שקל במשחק בודד?

ב. מהי הסתברות שדן יזכה ב- 100 שקל במשחק בודד?

ג. ידוע כי לאחר שדן שיחק שני משחקים הוא זכה סך הכל ב- 100 שקל בבדיקה.

מהי הסתברות שהוא לא זוכה ב- 50 שקל באך אחד משני המשחקים?

סעיף א

הסתברות שדן לא יזכה באך אחד מחמשת המשחקים היא $P(0)$. נתון שערך זה הוא $\frac{1}{32}$, ולכן

$$P(0) = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \binom{5}{2} P(50)^2 (1 - P(50))^3 &= \binom{5}{1} P(50) (1 - P(50))^4 \\ P(50) &= \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

סעיף ב

$$P(100) = 1 - P(0) - P(50) = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

סעיף ג


הambilים "ידעו כי" מכוונות להסתברות מותנית:

$$= (\text{זכה ב-} 100 \text{ בשני משחקים/לא זוכה ב-} 50 \text{ באך משחק})$$

$$\frac{(\text{זכה ב-} 100 \text{ בשני משחקים} \cap \text{לא זוכה ב-} 50 \text{ באך משחק})}{(\text{זכה ב-} 100 \text{ בשני משחקים})}.$$

נתבונן בעז המופיע בעמוד הבא שמציג את תוצאות שני המשחקים. סימנו את המסלולים שבהם דן זוכה ב-100 והמסלולים בהם דן לא זוכה ב-50 באך אחד משני המשחקים. חישוב ההסתברות המותנית:

$$\frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{5}{18}} = \frac{3}{5}.$$



3.10 קיז תשע"ה מועד ב

חוקר עורך מחקר על הרגלי האכילה של סטודנטים באוניברסיטה גדולה במשך יום לימודים.

חלק מהסטודנטים מביאים תמיד אוכל מהבית, והשאר אינם מביאים אוכל מהבית.

כל הסטודנטים שמביאים אוכל מהבית אוכלים אותו במשך היום ואינם אוכלים בקפריה.

הסטודנטים שאינם מביאים אוכל מהבית אוכלים בקפריה או אינם אוכלים במשך היום.

א. נמצא כי אם בוחרים באקראי 4 סטודנטים, ההסתברות שבדיוק 2 מהם מביאים

אוכל מהבית גדולה פי 6 מההסתברות שבדיוק 1 מהם מביא אוכל מהבית.

(1) מהו אחוז הסטודנטים שמביאים אוכל מהבית?

(2) החוקר בחר באקראי 8 סטודנטים באוניברסיטה.

מהי ההסתברות שלפחות אחד מהם מביא אוכל מהבית, אבל לא כולם?

ב. נמצא כי 60% מהסטודנטים שאינם מביאים אוכל מהבית אינם אוכלים במשך היום.

(1) מהו אחוז הסטודנטים באוניברסיטה שאוכלים בקפריה?

(2) מהי ההסתברות לבחור סטודנט שמביא אוכל מהבית מ בין הסטודנטים שאוכלים

במשך היום?

סעיף א (1)

נסמן $b = \text{ההסתברות להביא אוכל מהבית. לפי המידע הנתון:}$

$$\binom{4}{2} b^2 (1-b)^2 = 6 \cdot \binom{4}{1} b (1-b)^3.$$


$$\text{פתרון המשווה הוא } .b = \frac{4}{5}$$

סעיף א (2)

"פחות אחד אבל לא כולם" היא המשלים ל-"לא אף ולא כולם":

$$1 - \left(\frac{1}{5}\right)^8 - \left(\frac{4}{5}\right)^8 = 0.8322.$$

סעיף ב (1)



בעז ההסתברויות הכוכבית מראה את מהמסלול עבור "אוכל בקפטריה":

$$\frac{1}{5} \cdot \frac{4}{10} = \frac{2}{25}.$$

סעיף ב (2)

המילה "מביין" מכונה להסתברות מותנית וקבוצת "מביין אוכל" היא תת-קבוצה של "אוכלים":

$$P(\text{אוכלים}/\text{מביין אוכל}) =$$

$$\frac{P(\text{אוכלים} \cap \text{מביין אוכל})}{P(\text{אוכלים})} =$$

$$\frac{P(\text{מביין אוכל})}{P(\text{אוכלים})}.$$

הчисוב הוא:

$$\frac{\frac{4}{5}}{\frac{4}{5} + \frac{2}{25}} = \frac{10}{11}.$$

3.11 קיז תשע"ה מועד א

נתונה קבוצה של ספרות שונות: 3 ספרות הן זוגיות (שונות מ-0), והשאר הן ספרות אי-זוגיות.

יוני יוצר מספר דמיוני מן הספרות שבקבוצה הנתונה באופן זה:

הספרה הראשונה שיווני בוחר באקראי היא ספרת העשרות,

והספרה השנייה שהוא בוחר באקראי היא ספרת היחידות.

יוני בוחר כל ספרה בדיק פעם אחת בלי החזרה.

א. נתון כי הסתברות שיווני ייצור מספר אי-זוגי היא $\frac{4}{7}$.

מהו מספר הספרות האי-זוגיות בקבוצה הנתונה?

ב. אם ידוע שהמספר שנוצר הוא זוגי, מהי הסתברות שתשתי הספרות שיווני בחר הן זוגיות?

אמיל יוצרת מספר תלת-ספרתי מן הספרות שבקבוצה הנתונה באופן זה:

הספרה הראשונה שאmil בוחרת באקראי היא ספרת המאות,

הספרה השנייה שהיא בוחרת באקראי היא ספרת העשרות,

והספרה השלישית שהיא בוחרת באקראי היא ספרת היחידות.


אמיל בוחרת כל ספרה בדיק פעם אחת בלי החזרה.

ג. ידוע כי הספרה הראשונה שאmil בחרה היא זוגית.

מהי הסתברות שבמספר התלת-ספרתי שאmil יירה, סכום הספרות יהיה זוגי?

נסמן $n =$ מספר הספרות בקבוצה. מספר הזוגיים = 3, ומספר האי-זוגיים = $3 - n$.

בחירה של ספרת העשרות ולאחר כך ספרת היחידות מכוונת לעצם הסתברויות. כדי לפשט את התרשימים רשמיים בכל צומת את הסתברויות ולא את מספר הספרות.



סעיף א

המספר שיוני בחר היה איזוגי רק אם **בחירה השנייה** היא ספרה איזוגית. המסלולים המתאימים מסוימים בתרשים בכוכבויות. נשווה את סכום הסתברויות של המסלולים לערך הנתון:

$$\frac{3}{n} \cdot \frac{n-3}{n-1} + \frac{n-3}{n} \cdot \frac{n-4}{n-1} = \frac{4}{7}.$$

נפשט ונקבל משווה ריבועית $0 = n^2 - 8n + 7 = n(n-1) - 7(n-1)$ שיש לה שני פתרונות חיוביים $n = 7$ ו- $n = 1$, נתון שיש לפחות ספרות, לכן מספר הספרות הוא 7.

שימו לב שהשאלה מבקשת את מספר הספרות **האיזוגיות** ולכן התשובה היא $7 - 3 = 4$.

סעיף ב

המילים "אם ידוע ש-" מכוונות להסתברות מותנית. במספר זוגי הספרה האחורה זוגית: $P = (\text{ספרה אחרונה זוגית} / \text{שתי ספרות זוגיות})$

$$\frac{P(\text{ספרה אחרונה זוגית} \cap \text{שתי ספרות זוגיות})}{P(\text{ספרה אחרונה זוגית})} = \frac{\frac{P(\text{שתי ספרות זוגיות})}{P(\text{ספרה אחרונה זוגית})}}{P(\text{ספרה אחרונה זוגית})}.$$

את החיתוך אפשר לפשט כי אם שתי הספרות זוגיות הספרה האחורה חייבת להיות זוגית. ניתן לחשב את ההסתברות "ספרה אחרונה זוגית" במכנה לפי המידע בעז או פשוט לשים לב שהוא המשלימה לערך הנתון בסעיף א של "ספרה האחורה איזוגית". נחשב את ההסתברות במנה לפי המסלול העליון בעז עבור בחירה של שתי ספרות זוגיות:

$$\frac{\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6}}{1 - \frac{4}{7}} = \frac{1}{3}.$$

סעיף ג


הסכום יהיה זוגי רק אם שתי הספרות האחרונות הן זוגיות או איזוגיות:

$$\begin{aligned} 2k_1 + 2k_2 + 2k_3 &= 2(k_1 + k_2 + k_3) \\ 2k_1 + 2(k_2 + 1) + 2(k_3 + 1) &= 2(k_1 + k_2 + k_3 + 1). \end{aligned}$$

שני האירועים (בחירה הספרות) בלתי תלויים, ולכן אפשר לבטא את החיתוך כמכפלה:

$$\begin{aligned} P(\text{ספרה ראשונה זוגית} / \text{סכום זוגי}) &= \\ \frac{P(\text{ספרה ראשונה זוגית} \cap \text{סכום זוגי})}{P(\text{ספרה ראשונה זוגית})} &= \\ \frac{P(\text{ספרה ראשונה זוגית}) \cdot P(\text{סכום זוגי})}{P(\text{ספרה ראשונה זוגית})} &= \\ P(\text{סכום זוגי}). \end{aligned}$$

שימו לב שלאחר הבחירה הראשונה של אמילי מספר הספרות הוא ש. הנה עז ההסתברויות לאחרבחירה הראשונה, כאשר הכוכبيות מסמנות את המסלולים לסכום זוגי (שני מספרים זוגיים או שני מספרים אי-זוגיים):



ההסתברות היא:

$$\frac{2}{6} \cdot \frac{1}{5} + \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{7}{15}.$$

3.12 חורף תשע"ה

בישוב גדול $\frac{1}{3}$ מההתושבים הם נשים, והשאר הם גברים.

מבין התושבים בוחרים באקראי שתי קבוצות:

קבוצה של 4 אנשים (נשים / גברים) לריאיון ברדיו

וקבוצה של 4 אנשים (נשים / גברים) לריאיון בטלוויזיה.

א. מהי ההסתברות שבסכום קבוצה יש בדיק 2 גברים?

ב. ידוע כי בקבוצה שנבחרה לריאיון ברדיו היו לכל היותר 2 גברים.

מהי ההסתברות שהיו בקבוצה זו בדיק 2 גברים?

"ישוב גדול" אומר לי שנייתן לבחור מספר רב של תושבים, לפחות שמונה תושבים כפי שנדרש.

סעיף א

כל קבוצה היא בבחירה בלתי תלוייה. לפי נוסחת ברנולי:

$$\binom{4}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(1 - \frac{2}{3}\right)^2 = \frac{8}{27}.$$

כדי לקבל את ההסתברות שלשתי הקבוצות יהיו בדיק שני גברים, עולה ערך זה בריבוע:

$$\left(\frac{8}{27}\right)^2 = \frac{64}{729}.$$

סעיף ב

המילים "ידוע כי" מכוונות להסתברות מותנית:

$$P = \text{(לכל היותר שני גברים/בדיקות שני גברים)}$$

$$\frac{\text{(לכל היותר שני גברים \cap בדיק שני גברים)}}{\text{(לכל היותר שני גברים)}}.$$

החותוך במנה שköלה ל-"בדיקה שני גברים" (שהיחסבנו בסעיף א), כי "לכל היותר שני גברים" היא 0, 1, 2 גברים. "לכל היותר שני גברים" הוא הסכום של שלוש נוסחאות ברנולי:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^0 \left(\frac{1}{3}\right)^4 + \binom{4}{1} \left(\frac{2}{3}\right)^1 \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \binom{4}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{11}{27}$$

והתשובה לשאלת היא:

$$\frac{\frac{8}{27}}{\frac{11}{27}} = \frac{8}{11}.$$

3.13 קיז תשע"ז מועד ב

בעיר גודלה כל אחד מתלמידי כיתות י"ב בשנה מסויימת בוחר באחד משני המסלולים לטיוול שנתי:
מסלול א' או מסלול ב'.

נמצא: 75% מן התלמידים שבחרו במסלול א' הן בנות.

10% מן הבנות בחרו במסלול ב'.

40% מן התלמידים הם בנות.

א. בוחרים באקראי תלמיד י"ב (בן/בת).

מהי ההסתברות שהוא בחר במסלול א'?

ב. כאשר בוחרים באקראי תלמיד י"ב (בן/בת), האם המאורע "התלמיד הוא בת"

ומאורע "התלמיד (בן/בת) בחר במסלול א'" הם מאורעות בלתי תלויים? נמק.

ג. בחרו באקראי כמה בנות מבין התלמידים.

נמצא שההסתברות שלפחות אחת מהן בחרה במסלול א' היא 0.99.

(הבחירה של המסלולים על ידי הבנות שנבחרו הן בלתי תלויות.)

כמה בנות נבחרו?

נתון ש- 0.4 מהתלמידים הן בנות. 10% מהם בחרו במסלול ב': $0.1 \times 0.4 = 0.04$. נתון שגם 75% מהתלמידים שבחרו במסלול א' הן בנות: $0.36 = 0.75 \times 0.48$, ולכן $0.36/0.75 = 0.48$. כלומר $0.36/0.75 = 0.48$ מהתלמידים בחרו מסלול א'. נמלא את הטבלה לפי ההסתברויות המשלימות:

		בנות	בנים
א	.36/.75 = .48	.48 - .36 = .12	.4 - .04 = .36
	1 - .48 = .52	.52 - .04 = .48	.1 × .4 = .04
ב	1	1 - .4 = .6	נתון 0.4

בצורה יותר מפורשת תוק שימוש בהסתברות מותנית:

$$0.1 = P(\text{בנות}/\text{מסלול ב'}) = \frac{P(\text{בנות} \cap \text{מסלול ב'})}{P(\text{בנות})} = \frac{P(\text{בנות} \cap \text{מסלול ב'})}{0.4}.$$

מכאן ש:

$$P(\text{בנות} \cap \text{מסלול ב}) = 0.4 \cdot 0.1 = 0.04.$$

נמשיך עם הנתון הנוסף:

$$0.75 = P(\text{מסלול א} / \text{בנות}) = \frac{P(\text{מסלול א} \cap \text{בנות})}{P(\text{בנות})} = \frac{0.36}{P(\text{בנות})}.$$

מכאן ש:

$$P(\text{מסלול א}) = \frac{0.36}{0.75} = 0.48.$$

סעיף א

הסעיף מבקש $P(\text{מסלול א})$ וחשבנו שערכו 0.48.

סעיף ב

$$\begin{aligned} P(\text{מסלול א} \cap \text{התלמיד הוא בת}) &= 0.36 \\ P(\text{התלמיד הוא בת} \cdot P(\text{מסלול א})) &= 0.4 \cdot 0.48 = 0.192. \end{aligned}$$

האירועים **איןם** בלתי תלויים.

סעיף ג

כדי לחשב "לפחות אחת", נחשב שת ההסתברות המשלימה ל-"**אף אחת**". ההסתברות שבת לא תבחר מסלול א היא ההסתברות שהיא תבחר מסלול ב:

$$P(\text{בת} / \text{מסלול ב}) = \frac{P(\text{בת} \cap \text{מסלול ב})}{P(\text{מסלול ב})} = \frac{0.04}{0.4} = 0.1.$$

נפתרו את המשוואה:

$$(0.1)^n = 1 - 0.99 = 0.01,$$

ונקבל $n = 2$.

3.14 קיז תשע"ז מועד א


אבא וدني משחקים בזריקת כדור לסל. בכל משחק שני סיבובים. המנצח בסיבוב מקבל נקודה אחת. אם הסיבוב מסתיים בתיקו, כל אחד מקבל חצי נקודה. נתון: ההסתברות שدني ינצח בסיבוב היא 0.1,
ההסתברות שאבא ינצח בסיבוב היא 0.2,
ההסתברות שהסיבוב יסתתיים בתיקו היא 0.7.
הסיבובים אינם תלויים זה בזה.

- מיהי ההסתברות שאבא יצBOR בשני הסיבובים יותר מנקודה אחת?
- מיהי ההסתברות שدني יצBOR בשני הסיבובים פחות נקודה אחת?
- ידוע כי דני כבר בשני הסיבובים פחות נקודה אחת.
- מיהי ההסתברות שאחד הסיבובים הסתיים בתיקו והאחר הסתיים בניצחון של דני?
- אבא וدني משחקים 4 פעמים את המשחק שמתחiar בפתיחתו. (בכל משחק שני סיבובים). מהי ההסתברות שدني יצBOR פחות נקודה אחת 2 פעמים בדיקן?

סעיף א

עż ההסתברות מראה את צבירת הנקודות של אבא בשני הסיבובים, כאשר המצביעים בהם אבא צובר יותר מנקודה אחת מסומנים בכוכבית. ההסתברות של האירוע היא:


$$0.2 \cdot 0.2 + 0.2 \cdot 0.7 + 0.7 \cdot 0.2 = 0.32.$$



סעיף ב

עż ההסתברות מראה את צבירת הנקודות של דני בשני הסיבובים, כאשר המცבים בהם דני צובר לפחות מנקודה אחת מסומנים בכוכבית. ההסתברות של האירוע היא:

$$0.2 \cdot 0.1 + 0.1 \cdot 0.2 + 0.1 \cdot 0.1 + 0.1 \cdot 0.7 + 0.7 \cdot 0.1 + 0.7 \cdot 0.7 = 0.68.$$



סעיף ג

הambilים "ידוע פי" מכונות להסתברות מותנית והחיתוך מצטמצם כי אם יש תיקו אחד וניצחון של דני אז דני צבר לפחות נקודת אחת:

$$= (\text{Dani wins at least one point})$$

$$= \frac{(\text{Dani wins at least one point} \cap \text{Tie})}{P(\text{Dani wins at least one point})}$$

$$= \frac{P(\text{Tie})}{P(\text{Dani wins at least one point})}.$$

נחשב את המנה על ידי חיבור ההסתברויות של שני מסלולים בעז המסומנים ב-#:

$$\frac{0.1 \cdot 0.7 + 0.7 \cdot 0.1}{0.68} = .2059.$$

סעיף ד

סעיף ב חישבנו את ההסתברות של האירוע בכל סיבוב, ונשאר רק לחשב:

$$\binom{4}{2} (0.68)^2 (0.32)^2 = 0.2841.$$

3.15 חורף תשע"ד

בעיר מסוימת יש תושבים המשתתפים בחוג לרכיבי עם, יש תושבים המשתתפים בחוג לתאטרון ויש תושבים המשתתפים בשני החוגים. נמצא כי המאורע "תושב העיר משתתף בחוג לרכיבי עם" והמאורע "תושב העיר משתתף בחוג לתאטרון" הם מאורעות בלתי תלויים. מספר התושבים המשתתפים בחוג לרכיבי עם גדול פי 2 ממספר התושבים המשתתפים בחוג לתאטרון. מבין התושבים המשתתפים בחוג לתאטרון, 60% משתתפים בחוג לרכיבי עם. א. מהו אחוז התושבים בעיר שהשתתפו בו כל התושבים המשתתפים בחוג לרכיבי עם, ורק הם. ב. יומם אחד נערך בעיר כנס שהשתתפו בו 6 משתתפים בכנס שנחדרו באקראי. עיתונאי ראיין מהי ההסתברות שלפחות 2 מהם משתתפים בחוג לתאטרון?

נסמן T = מספר המשתתפים בתאטרון, R = מספר המשתתפים בריקודי עם. המילה "**מבחן**" מכוונת להסתברות מותנית. נתון $P(R/T) = 0.6$ וגם שהאירועים בלתי תלויים. נחשב:

$$0.6 = P(R/T) = \frac{P(R \cap T)}{P(T)} = \frac{P(R) \cdot P(T)}{P(T)} = P(R).$$

ביחד עם הנתון $P(R) = 2P(T)$ נתחיל למלא את הטבלה:

	\bar{T}	T	
R			
\bar{R}			
0.60			
0.40			
1.0	0.70	0.30	

שוב נסתמך על העובדה שהאירועים בלתי תלויים ונקבל:

$$P(R \cap T) = P(R) \cdot P(T) = 0.6 \cdot 0.3 = 0.18,$$

ואז יש לנו מספיק נתונים למלא את הטבלה:

	\bar{T}	T		
	0.60	0.42	0.18	R
	0.40	0.28	0.12	\bar{R}
	1.0	0.70	0.30	

סעיף א

$$P(R \cap T) = 0.18$$

סעיף ב

המילים "כל התושבים המשתתפים בחוג לרכיבי עם, ורק הם" מכוונות להסתברות מותנית. אם ידוע שתושב משתתף בריקודי עם, ההסתברות שהוא משתתף גם בתאטרון היא:

$$P(T|R) = \frac{P(T \cap R)}{P(R)} = \frac{0.18}{0.60} = 0.3.$$

כדי לחשב "פחות שניים" עדיף לחשב את המשלים ל-"אפס או אחד":

$$1 - \binom{6}{0}(0.3)^0(0.7)^6 - \binom{6}{1}(0.3)^1(0.7)^5 = 0.5798.$$

המלצות: הסתברות

- קרא בזיהירות את השאלה. לעיתים השאלות ארכוכות (בחינות של קיז תשע"ח א, קיז תשע"ח ב) וחשוב לחבין את המשמעות של כל פסקה.

- כמעט כל הבדיקות מכילות שאלות על **הסתברות מותנית**. ניסוחים רבים מקוונים להסתברות מותנית וחשוב להכיר אותם!

- הניסוח השכיח ביותר משתמש במילים "**אם ידוע ש-**" או "**ידוע כי**".

- בבדיקה של חורף תשע"ז כתוב "**אם ... מהי ההסתברות ...**". לא גמור ברור שלמילה "אם" יש משמעות של "אם ידוע", אבל זאת הכוונה.

- לעיתים קרובות (בדיקה של קיז תשע"ה ב) כתוב "**מה ההסתברות לבחור ... מבין ...**".

- יוצא מן הכלל: בבדיקה של קיז תשע"ו או כתוב "**מבחן כל הנבחנים**" והמילה "מבחן" בדרך כלל מכוonta להסתברות מותנית, אבל כאשר "מבחן" מתייחס ל"**כל הנבחנים**" אין הסתברות מותנית, או ההסתברות מותנית בהסתברות שהיא 1, והחיתוך מצטמצם:

$$P(X \cap \text{כל הנבחנים}) = \frac{P(X)}{\text{כל הנבחנים}} = \frac{P(X)}{1} = P(X).$$

מצב דומה מופיע בבדיקה של קיז תשע"ד ב ("בוחרים באקראי תלמיד י"ב (בן/בת")", ובבדיקה של קיז תשע"ח ב ("מן התלמידים שנגשו למבחן").

- בבדיקה של קיז תשע"ח א הניסוח הוא: " $\frac{k}{n}$ נעזרו בחבריהם (נקרא לאירוע A) ו- $P(B \cap A) = k$, אבל נבדק לפני **מהם עברו את הבדיקה**" (נקרא לאירוע B). ברור ש- $P(A)$, אבל נבדק לפי הנוסחה להסתברות מותנית:

$$P(B/A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{P(B \cap A)}{n} = \frac{k}{n}$$

$$P(B \cap A) = k.$$

- בבדיקה של חורף תשע"ד יש ניסוח אחר: **כל התושבים המשתתפים ב...**, ורק הם.

- כאשר יש חיתוך בחישוב של הסתברות מותנית, לעיתים קרובות ניתן לפשט את החישוב. בבדיקה של קיז תשע"ז א יש לחשב $P(D = 4 \cap D \geq 3)$, אבל אם ערך גדול או שווה 3 וגם שווה ל-4, אז הוא שווה ל-4, ולכן מספיק לחשב $P(D = 4)$.

- אם שני אירועים תלויים, חישוב ההסתברות המותנית מצטמצם:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B) \cdot P(A)}{P(A)} = P(B).$$

מצב זם מופיע בבדיקות של חורף תשע"ז, חורף תשע"ח, קיז תשע"ה א, חורף תשע"ד.

- הミלה **בדיק** מכוונת לחישוב אחד של נוסחת ברנולי, כי נתון כמה "הצלחות" צריכות להיות וגם כמה "כשלונות". מקרה מעניין נמצא בבדיקה של קיז תשע"ח באשר נתון שהסתברות לקבל 60 שווה להסתברות לקבל 100. נתון גם שיש שלוש הצלחות מתוך חמיש (20 נקודות כל אחת), אז ההסתברות לקבל שני כשלונות (20 נקודות כל אחת) צריכה להיות שווה להסתברות לקבל שתי הצלחות (20 נקודות כל אחת).

- בבדיקה של קיז תשע"ז א כתוב **"בוחרים באקראי ... עד של- 3 מהם בדיק יש קלונועית"**. המשמעות של "עד ש" היא שמספרים את הבחירה האקראית כאשר הבחירה[האחרונה](#) היא "הצלחה". במקרה זה נשארו שתי "הצלחות" שיש לחשב את ההסתברות שלhn לפי נוסחת ברנולי, ואז להכפיל בהסתברות של "הצלחה" בבחירה[האחרונה](#):

$$\overbrace{\pm \pm \pm}^{2/5} \quad \overbrace{+}^{1/1}$$

- בבדיקה של קיז תשע"ז ב הביטוי **"מושאים באקראי ..."**, ובהמשך הביטוי **"מושאים באקראי שוב ..."** מכוון לשימוש בעז כדי לתאר את הבחירה הסדרתית.

- בבדיקה של קיז תשע"ח א, המשמעות של הניסוח **"לפחות אחת משתי הטענות I, II היא שהairoע קורה אם קורה אחד מהairoעים I, II, או שניהם, המסומן I ∪ II."** יש שתי דרכים לחשב את ההסתברות: על ידי חיבור ההסתברות של שני האירועים וחיסור האירוע המשותף כדי לקז את הספירה הכפולה, או לחבר את האירוע המשותף עם האירועים של אחד ולא השני המסומן $-II, II - I$:

$$\begin{aligned} P(I \cup II) &= P(I) + P(II) - P(I \cap II) \\ P(I \cup II) &= P(I - II) + P(II - I) + P(I \cap II). \end{aligned}$$

- בבדיקה של קיז תשע"ח ב יש לחשב את ההסתברות של תשובה נcona **לכל** ($n = k$) השאלה או תשובה נcona **לאף אחת** ($k = 0$) מהשאלות, כאשר ההסתברות לשובה נcona אחת היא p . אין צורך להשתמש בנוסחת ברנולי הכללית:

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

$$\begin{aligned} \text{אם } p^0 (1-p)^{n-0} = (1-p)^n, \binom{n}{0} = 1, k = 0 \\ \text{אם } p^n (1-p)^{n-n} = p^n, \binom{n}{n} = 1, k = n \end{aligned}$$


- בבדיקות של קיז תשע"ז א, ב יש שלוש תוצאות לפוליה במקום שתיים. סכום ההסתברויות חייב להיות אחד, ולכן כאשר מחשבים משלים להסתברות אחת, יש להחסיר את שתי ההסתברויות האחרות. בבדיקה של מועד ב, ההסתברות לתקן היא אחד פחות ההסתברות שיעיל תנצה פחות ההסתברות أنها תנצה:

$$P(\text{תקן}) = 1 - P(\text{על}) - P(\text{על על}).$$

- במספר בבדיקות (חוורף תשע"ה, קיז תשע"ד ב, קיז תשע"ה ב) כתוב **"ישוב גדול"**, **"עיר גדולה"**, **"אוניברסיטה גדולה"**. אני מניח שבמילה **"גדול"** מבטיחה שאפשר לבחור תושבים או סטודנטים כפי שדרושים בשאלות. אין משמעות לבחור ארבעה סטודנטים אם יש רק שניים.

פרק 4 גיאומטריה

4.1 קיז תשע"ח מועד ב



. ABC הוא משולש שווה שוקיים ($AB = BC$) .

AK ו- CL הם תיכונים במשולש, החותכים זה את זה בנקודה D .

נתון: $AK \perp CL$.

א. הוכח: $BD = AC$.

$$\text{ב.} \quad \text{חשב את היחס} \quad \frac{S_{BLDK}}{S_{\Delta ABC}}$$

ג. M הוא מרכזו המוגל החוסם את המרובע $ALKC$.


$$\text{הוכחה: } \angle AML = 90^\circ \quad (1)$$

$$\text{מזהה את היחס} \quad (2) \quad \frac{AM}{AD}$$

תוכל להשאיר שורש בתשובהך.

סעיף א

כאשר יש תיכונים נחתכים מיד חושבים על משפט 45 "שלושת התיכונים במשולש נחתכים בנקודה אחת", ובמשפט 46 "נקודות חיתוך התיכונים מחולקת כל תיכון ביחס 1 : 2". הוא התיכון BE מ- B - C , שחותך את מפגש התיכונים האחרים ב- D . $BE \perp AC$ לפי משפט 6 "במשולש שווה שוקיים, חוצה זווית הראש, התיכון לבסיס והגובה לבסיס מתלכדים". מכאן קל להראות שהתיכונים AK, CL שוויים.



אם נכיח ש- $\angle ADE = \angle CDE$, נוכיח ש- $AE = EC = DE$. לפי משפט $BD = 2b = 2DE = AE + ED = AC = DE$, $AE = EC = DE$. והוא נכון $\angle ABC$, וגם של $\angle ADC$ כי חוצה הזווית והຕיכון מתלכדים. נתון $BE \perp AC$ כך ש- $\angle ADE = \angle CDE = 45^\circ$. במשולשים $AK \perp CL$.

ישר זווית $\angle DAE$, $\angle DCE$, $\angle ADE$, $\angle CDE$ שוות 45° , ולכן גם הזווית $\angle DAE = \angle DCE = \angle ADE = \angle CDE = 45^\circ$ והמשולשים שווה שוקיים. מכאן $AE = EC = DE = b$.

אפשרות אחרת, פשוטה יותר, להוכיח $AE = EC = DE = b$ היא להשתמש במשפט 86 "במשולש ישר זווית התיכון ליתר שווה למחצית היתר".

סעיף ב

כדי לחשב S_{BLDK} על ידי חישור שטח המצלע $ALDKC$ מהשתח של $\triangle ABC$, כי המצלע מורכב משולשים ישר זווית וחישוב השטח שלהם קל מאוד:


$$\begin{aligned} S_{ALDKC} &= 2S_{ADL} + S_{ADC} \\ &= 2 \cdot \frac{1}{2} AD \cdot DL + \frac{1}{2} AC \cdot DE \\ &= 2a \cdot a + \frac{1}{2} \cdot 2b \cdot b \\ &= 2a^2 + b^2. \end{aligned}$$

אפשר להניח שהיחס המבוקש אינו תלוי באורךי הצלעות, לכן נחפש דרך להביע את שטח המצלע S_{ALDKC} כפונקציה של b בלבד. משפט פיתגורס על $\triangle ADE$:

$$\begin{aligned} b^2 + b^2 &= (2a)^2 = 4a^2 \\ S_{ALDKC} &= 2a^2 + b^2 = 2 \cdot \frac{1}{4}(b^2 + b^2) + b^2 = 2b^2 \\ S_{ABC} &= \frac{1}{2} AC \cdot BE = \frac{1}{2} 2b \cdot 3b = 3b^2 \\ S_{BLDK} &= S_{ABC} - S_{ALDKC} = 3b^2 - 2b^2 = b^2 \\ \frac{S_{BLDK}}{S_{ABC}} &= \frac{b^2}{3b^2} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

סעיף ג (1)

לא התקדמתי בפתרון עד שציירתי תרשימים חדש עם המעל וראיתי שהזווית ההיקפית $\angle LKA$ נשענת על המיתר עליו נשענת הזווית המרכזית $\angle AML$, כך ש- $\angle AML = 2\angle LKA$ לפי משפט 69 "במעגל, זווית היקפית שווה לממחצית הזווית המרכזית הנשענת על אותה הקשת". אבל לפי משפט 14 "קטע אמצעים במשולש מקביל לצלע השלישית ושווה למחציתה", $.LK \parallel AC$, $\angle KAC = \angle AML = 2\alpha = 90^\circ$, כלומר $\angle LKA = \alpha$.



סעיף ג (2)

תחילה שמתי לב שה- $\triangle MGA \sim \triangle DGL$ כי במשולשים ישר זווית, הزواיות קודקודיות. נישה או לא הצליחה כי לא מצאתי דרך לבטא את הקשר בין AD, GD . לבסוף שמתי לב שלמשולשים $\triangle LDA, \triangle LMA$, יתר משותף, והמשולש $\triangle LMA$ שווה שוקיים כי שני הצלעות AM, ML הם רדיוסים. משפט פיתגורס:

$$AM^2 + ML^2 = AL^2$$

$$2AM^2 = AL^2$$

$$LD^2 + AD^2 = AL^2$$

$$a^2 + AD^2 = 2AM^2$$

$$\frac{1}{4}AD^2 + AD^2 = 2AM^2$$

$$\frac{AM}{AD} = \sqrt{\frac{5}{8}}.$$

4.2 קיז תשע"ח מועד א

ABCD הוא מעוין. E ו- F הן אמצעי הצלעות AB ו- BC בהתאם.

נקודה K היא מפגש האלכסונים של המעוין.

מן הנקודה E העלו אנך ל- AB, החותר את המשך האלכסון BD בנקודה G (ראה ציור).

א. הוכח: הנקודה G היא מרכזו המעגל החוסם את המשולש ABC.

הקטע GF חותר את האלכסון AC בנקודה M,

שהיא מרכזו המעגל החוסם את המשולש CDB.


ב. הוכח שהמשולשים CFC, BKC, MFC ו- BFG דומים זה לזה.

נסמן ב- R את רדיוס המעגל החוסם את המשולש ABC,

וב- z את רדיוס המעגל החוסם את המשולש BDC.


ג. (1) הוכח כי $\frac{MF}{CF} = \frac{BK}{CK} = \frac{MC}{GB}$ וכי $\frac{MF}{CF} = \frac{R}{z}$.

(2) הראה כי היחס בין אלכסוני המעוין שווה ל- $\frac{r}{z}$.




סעיף א

כדי להוכיח שהנקודה G היא מרכזו של מעגל חוסם השתמש במשפט 54 "במשולש, שלושת האנכים האמצעיים נחתכים בנקודה אחת, שהיא מרכזו המעגל החוסם את המשולש". צריך להוכיח ש- GE, GB הם אנכים אמצעיים. מעוין הוא מקבילית עם צלעות שוות, ומקבילilit, ניתן לשמש במשפט 28 "במקבילית האלכסונים חוצים אותה". סימנו בציר את אורכי האלכסון AC ב- b. ביחד עם משפט 35 "במעוין האלכסונים מאונכים זה זה", GB הוא אכן אמצעי ל- AC. נתון שנקודת E היא אמצע של AB, וש- GE⊥AB, ולכן G היא נקודת החיתוך של שני אנכים אמצעיים ומרכז של מעגל חוסם ל- $\triangle ABC$.



סעיף ב

הוכיחה שהמשולשים דומים תהיה קל יותר אם נזכיר מחדש את התרשים תוך הדגשת צלעות המשולשים. לפי משפט 35 האלכסון AC הוא אכן אמצעי ל- DB . נתון שהנקודה M היא מרכז המעלג החוסם את $\triangle BDC$, ולכן הנקודה G שחותכת את BC ב- M היא אכן אמצעי ל- GF . האזווית α משותפת לשני המשולשים ישר זוויות, כך $\triangle BKC \sim \triangle MFC$. האזווית β משותפת לשני המשולשים ישר זוויות, וכך $\triangle BFG \sim \triangle BKC \sim \triangle MFC$.



סעיף ג (1)

היחס:

$$\frac{MC}{GB} = \frac{MF}{BF} = \frac{MF}{CF}$$

מתקובל מדמיון המשולשים $BF = CF$ כי F הוא אמצע הצלע BC .
מדמיון המשולשים $\triangle BFG \sim \triangle MFC$ ו- $\triangle BFG \sim \triangle MFC$.
מתקובל: $\triangle BKC \sim \triangle MFC$.


$$\begin{aligned} \frac{MF}{BK} &= \frac{CF}{CK} \\ \frac{MF}{CF} &= \frac{BK}{CK}. \end{aligned}$$

סעיף ג (2)

מהנתון שהנקודה M היא המרכז של המעלג החוסם את BDC , אנו מקבלים שהאלכסון MC שווה ל- r . בסעיף א הוכיחנו שהנקודה G היא מרכז המעלג החוסם את ABC , ולכן GB שווה ל- R . נחשב את יחס הרדיוסים תוך שימוש ביחס שחיישנו בסעיף ג 1 ומשפט 29 שהאלכסונים של מקבילית (מעוין) חוצים אחד את השני:

$$\frac{r}{R} = \frac{MC}{GB} = \frac{BK}{CK} = \frac{DB/2}{AC/2} = \frac{DB}{AC}$$

4.3 חורף תשע"ח



המרובע $ABCD$ חסום במעגל.

הנקודה G נמצאת על הצלע CD כך ש- $CB = CG$ ו- $AB = AG$ וגם המשיק למעגל בנקודה A חותך את המשך הצלע CD בנקודה L , וחותך את המשך הצלע CB בנקודה K (ראה ציור).

א. הוכח כי $AD = AG$


ב. (1) הוכח כי $\triangle ABK \sim \triangle CDA$

$$(2) \text{ הוכח כי } AD^2 = BK \cdot CD$$

$$\text{ג. הראה כי } \frac{S_{\triangle LDA}}{S_{\triangle KAB}} = \frac{LA}{AK}$$

סעיף א

נתון ש- $ABCG$ הוא דלתון, אבל לא ברור בשלב זה אם זה יעזור בפתרון. נתון שהמרובע $ABCD$ חסום במעגל, ולפי משפט 56 "ניתן לחסום מרובע במעגל אם $\alpha' = 180 - \alpha$, $\beta' = 180 - \beta$ ו- α, β סימנו זוויות נגדיות שווה ל- 180° ". סימנו זוויות נגדיות שווה ל- 180° .



אם המשולש $\triangle GAD$ שווה שוקיים, ולפי הסימונים של הזווית הנסה להוכיח ש- $\angle AGD = \angle ADG = \beta$. נזכיר ש- $ABCG$ דלתון והזווית הצדדיות שלו שוות, כך ש:

$$\angle AGC = \angle ABC = \beta', \quad \angle AGD = 180 - (180 - \beta) = \beta.$$


רשימת המשפטים לבגרות לא כוללת משפט על שוויון זוויות בדלתון, אז נדרש להוכיח אותו. דלתון מוגדר כמרובע עם שני זוגות של צלעות סמוכות שוות, כך שהוא מורכב משני משולשים שווה שוקיים המוצמדים בבסיסיהם (קו מקווקו בתרשימים):

$$\angle ABC = \angle ABG + \angle GBC = \angle AGB + \angle BGC = \angle AGC.$$

סעיף ב (1)

נדגש בתרשימים את המשולשים $\triangle ABK, \triangle CDA$ ששי להוכיח שהם דומים. הוספנו לתרשימים את הסימון $\beta = \angle ABK = \angle ABC = \beta'$, המשלימים של $\angle ABC = \beta'$. אם נמצא עוד זוג של זוויות שוות נקבל $\angle ACD = \angle BAK$.

$\angle BAK$ היא זוויות בין המשיק KA והמיתר AB . לפי משפט 79 "זוויות בין משיק ומיתר שווה לאוויות היקפית הנשענת על מיתר זה מצידו השני", $\angle BAK = \angle BCA = \gamma$. לפי משפט 21 $\angle BAK = \angle BCA = \angle ACD = \gamma$. מכאן $\triangle ABK \sim \triangle CDA$ לפי 2.



דרך אחרת להוכיח $\triangle ABK \sim \triangle CDA$ היא לשים לב ש- $\angle BCA = \angle ACD$. השתמש במשפט 63 "במugen, מיתרים שווים זה לזה אם ורק אם שתי הקשתות המתאימות להם שוות זו לזו" ומשפט 71 "במugen, לקשתות שוות מתאימות זוויות היקפות שוות", ונקבל $\angle BCA = \angle ACD$.

סעיף ב (2)

לפי $:AB = AD$ שהוכחנו בהחלק הראשון של הסעיף ולפי

$$\begin{aligned} \frac{AB}{CD} &= \frac{BK}{AD} \\ AB \cdot AD &= BK \cdot CD \\ AD^2 &= BK \cdot CD. \end{aligned}$$

סעיף ג


הם הבסיסים של המשולשים $\triangle LDA, \triangle KAB$ וכך שנתקבל את היחס המבוקש אם נוכיח שהגבהים שוים. הוכחנו שהיתרים ב- $\triangle ADN, \triangle ABM$ שוים $AB = AD = a$, וכך שנשאר רק להוכיח שהזווית שווה γ . הוכחנו ש- $\angle BAK = \angle DAL = \gamma$, ו- $\angle DCA = \angle BAK$ היות $\angle DCA = \angle DAL$. הזווית בין המשיק LA והמיתר AD , כך ש- $\angle DCA = \angle DAL$. לפיה משפט 79, $\angle BAK = \angle DCA = \angle DAL = \gamma$. כעת ניתן לחשב את השטחים:

$$\frac{S_{LDA}}{S_{KAB}} = \frac{(LA \cdot DN)/2}{(AK \cdot BM)/2}$$


$$DN = AD \sin \angle DAL = a \sin \gamma$$

$$BM = AB \sin \angle BAK = a \sin \gamma$$

$$\frac{S_{LDA}}{S_{KAB}} = \frac{LA}{AK}.$$



4.4 **קייז תשע"ז מועד ב**



המרובע ABCD הוא מקבילית.
הزاوية A היא זווית חדה.
הנקודה E היא אמצע הצלע BC
והנקודה F היא אמצע הצלע CD
(ראה ציור).

- א. שטח המשולש ECF הוא S .

הבע את שטח המקבילית ABCD
באמצעות S . נמק את תשובה.

ב. הנקודה L היא אמצע הקטע BE .

דרך הנקודה L העבירו ישר המקביל ל- AB וחוטר את BF ואת AD
בנקודות M ו- N בהתאמה.


• $\frac{LM}{MN}$ חשב את היחס .

ג. נתון $BE = EF$.

האם אפשר לחסום את המרובע ABFD במעגל? נמק את קביעתך.

סעיף א


כדי לחשב את שטח המקבילית באמצעות שטח של משולש נפרק את המקבילית למשולשים. יהיו GF מקביל ל- BC ו- EH מקביל ל- CD . לפי זוויות מתאימות ומשלים, המרובעים $BEHG$, $ECFH$ והם מקבילים. בಗל ש- E היא נקודת האמצע של BC , H הוא נקודת האמצע של $GF = BC$. מכיוון שהמשולשים $\triangle ECF$, $\triangle EHF$ ו- $\triangle CHF$ חופפים, $S_{EHF} = S_{ECF} = S_{CHF}$. באותה דרך נוכחים ש-



הוכחה אחרת משתמשת במשפט 5 א' "שטח מקבילית שווה למינימל צלע המקבילית בגובה לצלע זו". הגובה של המקבילית באורך כפול מהגובה של המשולש לפי דמיון המשולשים $\triangle FCK, \triangle DCJ$:

$$S_{ECF} = \frac{1}{2}ah = S$$

$$S_{ABCD} = 2a \cdot 2h = 4ah = 8S.$$




סעיף ב'

נקבל יחס בין קטעי קו אם נמצא משולשים דומים שקטעי הקו הם צלעות שלהם. בתרשים להלן הדגשתי משולשים שיכולים להתאים. קטע האמצעים במקבילית מקביל לבסיסים $BC \parallel GF$ ומאזויות מתחלפות $\angle LBM = \angle MFK = \angle LMB$, מתקבל:

$$\triangle LMB \sim \triangle KMF.$$

בתרשים רשםנו את אורכי הקטעים תוך שימוש בנתונים a, b, c .



$$\frac{c}{b-c} = \frac{a}{3a} = \frac{1}{3}$$

$$b = 4c$$

$$\begin{aligned} \frac{LM}{MN} &= \frac{c}{2b-c} \\ &= \frac{a}{2 \cdot 4c - c} \\ &= \frac{1}{7}. \end{aligned}$$

סעיף ג

כדי לחסום את המרובע $ABFD$, לפי משפט 56 "ניתן לחסום מרובע במעגל אם ורק אם סכום זוג זוויות נגדיות שווה ל- 180° ".

בתרשים להלן הוספתי את הנטון $BE = EF$. ראייתי פתרון שימושי במשפט 86 "במשולש ישר זוית התיכון ליתר שווה למחצית היתר" כדי להוכיח $\angle BFC = 90^\circ$. הוכחה זו בעייתית כי המשפט 86 לא מנוסח כ-"אם ורק אם". לא קשה להוכיח ההפוך כי כל הנקודות הנמצאות במרחב שווה מנקודה E נמצאות על מעגל שמרכזו E .

אפשר לפתור את השאלה ללא שימוש במשפט 86 תוך שימוש בעובדות ש: (א) המרובע $ABCD$ הוא מקבילית, (ב) המשולשים $\triangle BEF, \triangle CEF$ שווה שוקיים, (ג) זוויות משילימות ב- $\angle E$, נסמן את הזווית של המשולש שווה שוקיים $\angle BEF = 180 - 2\alpha$. מכאן $\angle ECF = 90 - \alpha$ ולפי זוויות משילימות $\angle ECF = \angle EFC = 90 - \alpha$. גם המשולש $\triangle CEF$ הוא שווה שוקיים כך $\angle CEF = 2\alpha$. ניתן $\angle BFD = 90^\circ$. נקבע $\angle BFD = 90^\circ$.


לפי משפט 26 "במקבילית כל שתי זוויות נגדיות שוות זו לזו" $\angle BAD = \angle BCD = 90 - \alpha$. כדי לחסום את המרובע $ABFD$ חיבר להתקיים:

$$\angle BFD + \angle BAD = 90 + (90 - \alpha) = 180 - \alpha = 180.$$

נตอน ש- $\angle BAD$ היא זוית חדה שהיא פחות מ- 90° :

$$\begin{aligned} 90 - \alpha &< 90 \\ \alpha &> 0 \\ 180 - \alpha &< 180, \end{aligned}$$

שסותר את הדרישה $180 - \alpha = 180$, לכן אי אפשר לחסום את המרובע במעגל.



4.5 **קייז תשע"ז מועד א**

נתון מעגל שמרכזו O.

.($\angle ADC = 90^\circ$, $AB \parallel DC$) הוא טרפז ישר זווית ABCD

הצלע AD משיקה למעגל בנקודה E.

והנקודות B ו- C נמצאות על המרגל כך ש- BC הוא קוטר.

הצלע DC חותכת את המעלג בנקודה F, כמתואר בציור.

- . א. $\angle BCD = 2 \angle DEF$ הוכחה:


. ב. $\triangle ABE \cong \triangle DFE$ הוכחה:

. ג. $BC = DE + DC$ הוכחה:

סעיף א

השאלה שואלת על זוויות ויש לנו קווים מקבילים, משיק, זווית ישרה. הנסה להסיק מסקנות על זוויות. מחרבי השאלה סיפקו רמז: הקו EC . $\angle DEF$ היא הזווית בין המשיק ED לבין EF המסומן בתרשים. לפי משפט 79 "זווית בין משיק ומיתר שווה לאוות הhipotenuse הנשענת על מיתר זה מצידו השני", $\angle ECF$ שווה להזווית הhipotenuse $\angle DEF$. סימנו את שתי הזווית ב- α .

נ קיבל את הערך של $\angle BCD$ אם נידע את ערכיה של $\angle ECO$. נתון ש- $\angle ECO = 90^\circ$. המשיק מאונך לרדיס EO , ולכן, $EO \perp AD$, $EO \parallel DC$, $EO \perp AD$ ו- $\angle OEC = \alpha = \angle ECB$, $EO \parallel DC$, $EO \perp AD$ לפי זווית מתחלפות. המשולש $\triangle ECO$ שווה שוקיים ולכן $\angle ECO = \alpha$, $\angle BCD = 2\alpha = 2\angle DEF$, $\angle ECO = \alpha$.



הוכחה אחרת משתמשת במשפט 103 "אם מנקודה שמחוץ למעגל יוצאים חותך ומשיק, אז מכפלת החותך בחלקו החיצוני שווה לריבוע המשיק". לכן:

$$ED^2 = DC \cdot DF$$

$$\frac{ED}{DF} = \frac{DC}{ED}$$


$$\triangle EDF \sim \triangle CDE.$$

נשתמש במשפט 69 "במעגל, זווית היקפית שווה למחצית הזווית המרכזית הנשענת על אותה הקשת", בזרויות המתחלפות $\angle BOE = \angle BCD$ ובדמיון המשולשים $\triangle EDF \sim \triangle CDE$ שכבר הוכחנו:

$$\begin{aligned}\angle BCD &= \angle BOE \\&= 2 \cdot \angle BCE \\ \angle ECD &= \angle BCD - \angle BCE \\&= \angle BCD - \angle BCD/2 \\ \angle DEF &= \angle BCD/2.\end{aligned}$$

סעיף ב

שני המשולשים $\triangle ABE \cong \triangle DFE$ כי הם ישר זווית וצלע באחד המשולשים שווים לזוית וצלע מקבילים במשולש השני, כי ביחד עם הזווית הישרה יש חפיפה לפי ג.ג.ז. נתון ש- BC הוא קוטר שמרכזו O ולכן $BO = OC = r$. נפעיל את המשפט 44 "בטרפז", ישר החוצה שוק אחת ומקביל לבסיסים, חוצה את השוק השנייה" על הטרפז $ABCD$, כדי לקבל $AE = DE = a$. נזכיר את המיתר BE ונוכיח שהזווית $\angle AEB$ בין המיתר ומשיק יהיה שווה לזוית $\angle DEF$ במשולש השני. לפי משפט 79, $\angle AEB = \angle ECO = \alpha$, הזווית היקפית. אבל כבר הוכחנו שזוית זו שווה ל- $\angle ECO = \angle DEF = \alpha$.




הוכחה אחרת מחשבת זווית מהשלש שווה שוקיים $\angle BOE = 2\alpha$. $\triangle BOE$ ישר זווית $\angle BOE = 2\alpha$ ולכן $\angle AEB = \angle DEF = \alpha$. ביחד עם $\angle AED = 2\alpha$ ו- $\angle OBE = 90 - \alpha$ חופפים.

סעיף ג

האורך של BC הוא $2r$, כך שעלינו להוכיח ש- $DF + DC = 2r$. אם נפשת את התרשים נראה ש- EO הוא קטע אמצעים של הטרפז $ABCD$, כי $AE = ED$ ו- $BO = OC = r$. לפי הסעיף הקודם מושפט 43 "קטע האמצעים בטרפז מקביל לבסיסים ושווה למחצית סכומם":


$$\begin{aligned} EO &= \frac{1}{2}(AB + DC) \\ &= \frac{1}{2}(DF + DC) = r, \end{aligned}$$

כי מושולשים חופפים שהוכחנו בסעיף הקודם, ו- EO הוא רדיוס. מכאן ש- $BC = 2r = DF + DC$.




הוכחה אחרת משתמשת במשפט פיתגורס ומשפט 103 על משיק וקו חותך. נסמן את אורך הצלעות באיור ונקבל:

$$\begin{aligned} a^2 &= bc \\ BC^2 &= (2a)^2 + (c - b)^2 \\ &= 4bc + c^2 - 2bc + b^2 \\ &= c^2 + 2bc + b^2 \\ &= (c + b)^2 \\ BC &= c + b = DC + DF. \end{aligned}$$



4.6 חורף תשע"ז



נתונים שני מעגלים בעלי רדיוס שווה,

המשיקים זה לזה מבחן בנקודה F.

AC משיק לשני המעגלים בנקודות B ו C

AE משיק לשני המעגלים בנקודות D ו E

כמפורט בציור.

א. הוכח שהמרובע BDEC הוא טרפז שווה שוקיים.

ב. המשיק המשותף למעגלים העובר בנקודה F חותך את

שוקי הטרפז, DE, BC, בנקודות G ו H בהתאם.

הוכח: GH הוא קטע אמצעים בטרפז.

ג. נסמן ב- R את רדיוס המעגל הגדול וב- r את רדיוס המעגל הקטן.

$$\text{הוכח כי } R \cdot BD = r \cdot CE.$$

סעיף א

המשפט הרלונטי ביותר הוא משפט 80 "שני משיקים למעגל היוצאים מאותה נקודה שווים זה


זה". נפעיל אותו על AC, AE :

$$AD = AB = a$$

$$AE = AC = a + b$$

$$DE = BC = b.$$

אם נכיח ש- $BDEC$, המרובע $DB \parallel EC$ יהיה טרפז לפי ההגדרה והוכחנו שהוא שווה שוקיים. לפי התרשים $\triangle ADB \sim \triangle AEC$. המשולשים דומים כי יש להם זוויות משותפות ב- A והוכחנו ש- $\frac{AD}{AE} = \frac{a}{a+b} = \frac{AB}{AC}$, כך שהמשולשים דומים לפי צ.ז.צ. המשולשים $\triangle ADB, \triangle AEC$ שווה שוקיים, ולכן משפט 6 "במשולש שווה שוקיים, חוצה זוית הראש, התיכון לבסיס והגובה לבסיס מתלכדים". הקו, c, חוצה הזווית A, הוא גם גובה. מכיוון שבבסיסי המשולשים DB, EC מאונכים שניהם לקו c ו- $DB \perp EC$.




סעיף ב

במבחן ראשון נראה שcadai לעבוד עם משפט 43 "קטע האמצאים בטרפז מקביל לבסיסים ושווה למחצית סכומם", כאן, $GH = \frac{1}{2}(BD + CE)$. תחילת עלה בדיוני שאפשר להשתמש בנוסחה לשטח של טרפז שהיא:

$$S_{BDEC} = h \cdot \frac{1}{2}(BD + CE),$$

אבל זה לא הוביל לפתרון. לאחר כך חשבתי לחפש משולשים כדי להשתמש במשפט 14 "קטע אמצאים במשולש מקביל לצלע השלישית ושווה למחציתה", אבל לא מצאתי משולש מתאים.

לאחר פישוט של התרשים שמתי לב שה- H, G הן נקודות הנitinן להפעיל עלייהן את משפט 80 שכבר השתמשתי בסעיף א. $DH = HE = HF = y$, $HE = HF = x$, ולכן $DH = HF = x$. אותה הוכחה מראה שה- GH הוא קטע אמצאים של הטרפז.



סעיף ג


נתן לכתוב את הטענה שיש להוכיח כייחס:

$$\frac{BD}{CD} = \frac{r}{R}.$$


נוכיח שה- O_1, O_2 הן מרכזים המעגלים. המשולשים מורכבים משני משולשים חופפים $\triangle BO_1D \sim \triangle CO_2E$, $\triangle NO_2E \sim \triangle NO_2C$, $\triangle MO_1D \sim \triangle MO_1B$, $\triangle MO_1B \sim \triangle EC$. כז שמספיק להוכיח דמיון של זוג משולשים קטנים. כבר הוכחנו שה- $DB \parallel EC$ והזווית בין רדיוס למשיק היא זוויות ישרה, ולכן:

$$\angle MDO_1 = 90^\circ - \angle MDA = 90^\circ - \angle NEA = \angle NEO_2.$$

לפי גז. $\triangle BO_1D \sim \triangle CO_2E$



4.7 קיז תשע"ו מועד ב



.4 נתון משולש PDC.

הנקודות B ו-L מונחות על הצלע PC.

הנקודות A ו-K מונחות על הצלע PD, כמתואר בציור.

נתון כי המרובע ABLK הוא בר-חסימה במעגל

וגם המרובע KLCD הוא בר-חסימה במעגל.

. AB || DC: א. הוכח:

נתון: $PA = 3 \text{ ס"מ}$, $PB = 4 \text{ ס"מ}$

שטח המשולש ABP הוא $S \text{ סמ"ר}$,

שטח המרובע ABCD הוא $24S \text{ סמ"ר}$.

.ב. האם אפשר לחסום במעגל את המרובע ABCD? נמק.


.ג. מצא את אורך הצלע PD.

.ד. נתון גם: $BL = 5 \text{ ס"מ}$.

היעזר בדמיון משולשים והבע באמצעות S את שטח המרובע KLCD.

סעיף א

שני מרובעים חסומים והמשפט המתאים הוא משפט 56 "ניתן לחסום מרובע במעגל אם ורק אם סכום זוג זוויות נגדיות שווה ל- 180° ". נצייר את שני המעגלים החסומים את המרובעים, ונבחר זוג זוויות נגדיות, למשל, $\angle LKA$, $\angle ABL$, $\angle LKD$, $\angle LCD$. נסמן $\angle LKA = \alpha$, $\angle ABL = \alpha'$, $\angle LKD = \alpha'$, $\angle LCD = \alpha''$ עבור הזווית הנגדית $\angle LAB$. לפי זוויות משילימות בנקודה B, $\angle LAB = \alpha$, $\angle ABP = \alpha' = 180^\circ - \alpha$ מכיוון $\angle ABP + \angle APB = 180^\circ$. נפעיל שוב את משפט 56 כדי להסיק $\angle LCD = \alpha'' = 180^\circ - \alpha' = 180^\circ - (180^\circ - \alpha) = \alpha$. כלומר $\angle LCD = \angle LKD$. מכאן $AB \parallel DC$ לפי זוויות מתאימות.



סעיף ב

כדי להפעיל שוב את משפט 56 נctrץ להוכיח שהزاויות הנגדיות במרובע $ABCD$ מקיימות $\angle ADC = \beta$, $\angle BAD + \angle BCD = 180$, $\angle ADC + \angle ABC = 180$ הוכחנו ש- $AB \parallel DC$, ולפי זוויות חד-מתאימות בנקודות A, D ו- C, B , $\angle PBA = \angle BCD = \alpha$, $\angle PAB = \angle ADC = \beta$, נקבל A, B אם המרובע $ABCD$ בר חסימה, $\alpha' + \beta = 180 - \alpha + \beta = 180$, כך ש- $\beta = \alpha$, אבל נתנו $PA \neq PB$. המשקנה היא שלא ניתן לחסום את המרובע $ABCD$.

סעיף ג

לפי 2. אולם, זה לא עוזר: אמם נתון היחס בין PA, PB , אבל יש שני זוגות של נעלמים AB, DC ו- PD, PC . מה שכן ניתן הוא שטחים של שני המושלים, ולפי משפט 100 "יחס הצלעות הוא השורש של יחס השטחים", נוכל לחשב את יחס הצלעות:

$$\frac{PA}{PD} = \sqrt{\frac{S_{ABP}}{S_{PDC}}} = \sqrt{\frac{S_{ABP}}{S_{ABP} + S_{ABCD}}} = \sqrt{\frac{S}{S + 24S}} = \frac{1}{5}.$$


האורך של PD הוא $.5 \cdot PA = 15$

סעיף ד


מהزاויות שחישבנו ורשמו באיוור, לפי 2. יחס השטחים מתקיים מיחס אורכי הצלעות הנתונים ווחישבנו:

$$\frac{S_{PBA}}{S_{PKL}} = \left(\frac{PA}{PL}\right)^2 = \left(\frac{3}{9}\right)^2 = \frac{1}{9}$$

$$S_{KLCD} = S_{PDC} - S_{PKL} = 25S - 9S = 16S.$$




4.8 קיז תשע"ו מועד א



- נתון טרפז $(AB \parallel EC)$ $ABCE$
 הנקודה F נמצאת על האלכסון BE
 $\angle CEB = \angle AEB$ (ראה ציר).
 $CF \perp BE$.
 הנקודה D היא אמצע הבסיס CE (ראה ציר).
 $\angle CEB = \angle AEB$
 $ED = 3a$, $EA = 4a$
 א. הוכח כי $\triangle EAB \sim \triangle EDF$.
 ב. נתון כי שטח המשולש EAB הוא S .
 הבע באמצעות S את שטח המשולש CEF .
 ג. המשך DF חותך את AB בנקודה G .
 הבע באמצעות S את שטח המשולש BFG .

סעיף א

נסמן את האזויות $\angle AEB = \angle CEB = \alpha$ ונסמן את האורכים הנתונים. כעת קויפז לעין משפט 86 "במשולש ישר זווית התיכון ליתר שווה למחצית היתר", ולכן $DF = CD = DE$, $\angle DFE = \angle DCE = \alpha$. כמו כן, נתון $AB \parallel EC$, כך שגם $\angle ABE = \alpha$. לפי זווית מתחלפות $\angle ABE = \angle CEB$. לפיכך $\triangle EDF \sim \triangle EAB$ עם $\angle CEB$.



סעיף ב

כדי לחשב את השטח של $\triangle CEF$ יש לנו בסיס CE וגובה גובה מ- F ל- CE . כדי עין ישימו לב גובה זה משותף לשני המשולשים $\triangle CFD, \triangle DFE$ הbasisים $CD = DE = 3a$ שווים, ולכן השטחים של שני המשולשים שווים.

בסעיף א הוכחנו ש- $\triangle CEB \sim AEB$, לפי משפט 100 "יחס השטחים שווה לריבועיחס הדמיון":

$$\frac{S_{DFE}}{S_{EAB}} = \left(\frac{DE}{AE}\right)^2 = \left(\frac{3a}{4a}\right)^2 = \frac{9}{16}$$

$$S_{CEF} = S_{CFD} + S_{DFE} = 2S_{DFE} = \frac{9}{8}S.$$


סעיף ג

אנחנו צריכים לחשב את האורך של צלע של $\triangle BFG$ כדי לחשב את יחס השטחים. כבר הראינו ש- $\triangle BFG \sim \triangle DFE$ $\angle BFG = \angle DFE = \alpha$ $\angle ABE = \angle BEC = \alpha$ לפי ז.ז. הזוויות $\angle AGD = 2\alpha$ לפי משפט 13 "זוויות חיצונית למושולש שווה לסכום שתי הזוויות הפנימיות שאינן צמודות לה". המרובע $AGDE$ הוא מקבילית לפי משפט 29 "מרובע שבו כל זוג זוויות נגדיות שוות הוא מקבילית". ועתה ניתן לחשב את $GF = GD + FD = 4a - 3a = a$,


ולהשתמש שוב במשפט 101:

$$\frac{S_{BFG}}{S_{DFE}} = \left(\frac{a}{3a}\right)^2 = \frac{1}{9}$$

$$S_{BFG} = \frac{1}{9}S_{DFE} = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{2}S_{CEF} = \frac{1}{(9 \cdot 2)} \frac{9}{8}S = \frac{1}{16}S.$$



4.9 חורף תשע"ו



בריבוע $ABCD$ הנקודה E

נמצאת על הצלע AD (ראה ציור).

מעגל העובר דרך הנקודות D, E, C ו-

חותך את האלכסון BD בנקודה M ,

ואת הצלע BC בנקודה N .

הנקודה M נמצאת בין הקדקוד

ובין נקודות החיתוך של BD עם CE .

א. הוכח כי $CD = EN$.

ב. האם הקטע DM קצר מהקטע CE

ארוך ממנו או שווה לו? נמק.


ג. הוכח כי $BM \cdot BD = AE \cdot AD$.

סעיף א

קשה להבין את השאלה אלא אם מציררים תרשימים חדש עם הנקודות M, N והקו EN . המעגל מוגדר כך שהוא עובר דרך הנקודות C, D, E , ונתון גם שהנקודה N נמצאת על המעגל. מכיוון $ENDC$ הוא מרובע הסום במעגל. השתמש במשפט 56 "ניתן לחסום מרובע במעגל אם ורק אם סכום זוג זוויות נגדיות שווה ל- 180° ". $ABCD$ הוא ריבוע כך ש- $\angle ADC = \angle EDC = 90^\circ$, $\angle BCD = \angle NCD = 90^\circ$:

$$\angle ENC = 180 - \angle EDC = 90, \quad \angle NED = 180 - \angle NCD = 90.$$

מרובע שכל הזוויות שלו ישרות הוא מלבן ו-




הוכחה אחרת משתמשת במשפט 74 "זווית היקפית בת 90° נשענת על קוטר". הנקודות N, D, E, C נמצאות על מעגל, $\angle EDC = 90^\circ$, כך ש- EC הוא קוטר לפי משפט 74 "זווית היקפית בת 90° נשענת על קוטר". לפי המשפט ההפוך (73) $\angle ENC = 90^\circ$. כדי להשלים את סכום הזוויות במרובע $ENDC$ ל- 360° , חיבר ליהו 90° ו- $\angle NED$ הוא מלבן.

סעיף ב

בזבוזתי הרבה זמן בניסיונות לפתרו סעיף זה כי חשבתי להשווות אורכים לפי מושולשים דומים או משפט פיתגורס. לבסוף נזכרתי במשפט 66 "במעגל, אם מרחקו של מיתר ממרכז המעגל קטן יותר ממרחקו של מיתר אחר, אז מיתר זה ארוך יותר מהמיתר الآخر". בהוכחה השנייה לסעיף א' ראינו EC הוא קוטר, וקוטר הוא מיתר הקרוב ביותר למרכז המעגל (עבורו דרכו) ולכן הוא ארוך יותר מכל מיתר שאינו קוטר. מה שנשאר לעשות הוא להוכיח $DM \neq EN$.

נתנו שהנקודה M נמצאת בין B לבין נקודת החיתוך המשוונן ב- F . נתנו גם ש- E נמצאת על AD ונניח שהכוונה היא ש- $EN \parallel AB$. הוכחנו ש- $EN \parallel AB$ ולכן אם E שונה מ- A גם N שונה מ- B , ו- M אינה מתלכדת עם N .




סעיף ג

הנטיה הראשונה היא להשתמש במשפט תאלס, אבל משפט זה מנוסח כחלוקת ולא ככפל על קטיעים של אותו קו. המשפט שמנוסח ככפל הוא משפט 102 "אם מנקודה מחוץ למעגל יוצאים שני חותכים, אז מכפלת חותך אחד בחלוקת החיצוני שווה למכפלת החותך השני בחלוקת החיצוני". נשתמש במשפט זה עבור החותכים BC, BD היוצאים מנקודה B ונקבל $BN \cdot BC = BM \cdot BD$.
נשתמש במשפט $AD = BC$ כי הם צלעות בריבוע $ABCD$, ו- $ED = NC$ כי הם צלעות של $ENCD$ שהוכחנו בסעיף א' שהוא מלבן. מכאן:

$$BN \cdot BC = (BC - NC) \cdot BD = (AD - ED) \cdot AD = AE \cdot AD.$$

4.10 קיז תשע"ה מועד ב




- מרובע $ABCD$ חסום במעגל שמרכזו O .
הצלע AB היא קוטר.
היא נקודת על המשך AD כר ש- E היא נקודת על המשך AD כר ש- $\Delta CDE \sim \Delta ABC$.
א. הוכח: $\frac{S_{\Delta CDE}}{S_{\Delta ABC}} = \frac{1}{4}$, $OD \perp AC$
נתון גם: $OC \parallel AD$.
ב. הוכח כי AD משיק למעגל.
ג. הוכח כי CE משיק למעגל.

סעיף א

מרובע חסום במעגל מכוון למשפט 56 "ניתן לחסום מרובע במעגל אם ורק אם סכום זוג זוויות נגידיות שווה ל- 180° ". נתון גם שצלע שלו הוא קוטר והמשפט ררלונטי הוא 73 "זוויות היקפית הנשענות על קוטר היא זוויות ישרה (90°)". כדי לקבל את המשלו $\triangle ABC$, נצייר את הקו AC ו- $\angle ACB = 90^\circ$ כי הוא נשען על קוטר.


נסמן זוויות לפי משפט (56) $\angle BAC = 180 - \alpha = \alpha'$, $\angle ABC = \alpha$: $\angle CDE = 180 - \alpha' = \alpha = \angle ABC$, D בנקודת ציון זווית משילimitות בנקודה $\Delta CDE \sim \Delta ABC$ לפי ז.ז.



סעיף ב

בתרשים נראה שהמרובע $AODC$ הוא מקבילית, ואם כן, $OD \perp AC$ ו- $OC \parallel AD$. נתון גם ש- $OD \perp AC$, כך שאמם המרובע הוא מקבילית, הוא גם מעוין לפי משפט 36 "מקבילית שבה האלכסונים מאונכים זה לזה היא מעוין". למעשה לא צריך להשתמש במשפט 36 כדי להוכיח שהמקבילית היא מעוין כי $OA = OC = r$. מכאן שסביר יותר שהנתון $OD \perp AC$ יעזר להוכיח ש- $AODC$ הוא מקבילית. כתע נפנה לנตอน על יחס השטחים של המשולשים. לפי משפט 100 "יחס השטחים שווה לריבוע יחס הדמיון", היחס הצלעות במשולשים הדומים הוא $\frac{1}{2}$. מכאן ש- $r = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2} \cdot 2r = r$. אם נכח ש- $r = AD$ יהיה לנו את המקבילית (מעוין) שנחוץ כדי להוכיח ש- $OC \parallel AD$.

נחזיר לנตอน $OD \perp AC$. הוכחנו ש- $\triangle OCD$ הוא שווה שוקיים (למעשה הוא שווה צלעות), וכך ש- CA גובה ל- OD , ולפי משפט 6 "במשולש שווה שוקיים, חוצה זווית הראש, התיכון לבסיס והגובה לבסיס מתלכדים", ולכן $\triangle OCF \cong \triangle DCF$ ו- $OF = FD = \frac{r}{2}$.¹ אומנה הוכחה מראה ש- $AD = OA = r$ ו- $\triangle DAF \cong \triangle OAF$ ו- $\triangle OAF \cong \triangle OCF$.



בפתרונות אחרים שראיתי, משתמשים בעובדה ש- $\triangle OCD$ הוא שווה צלעות שהזווית שלו הן 60° . לא מצאתי שערך זה נחוץ כדי להוכיח את הטענה.


סעיף ג

המשפט היחיד שהמסקנה שלו היא שקו הוא משיק הוא משפט 78 "ישר המאונך לרדיויס בקצחו הוא משיק למעגל", כאן $CE \perp OC$. כאן כן נשתמש בעובדה ש- $\triangle OCD \sim \triangle OAD$, $\angle OCD = \angle OAD = 60^\circ$ ו- $\angle CAB = \angle ECD$. בסעיף א הוכחנו ש- $\triangle ABC \sim \triangle CDE$, כך ש- $\angle OAD = \angle ECD = 60^\circ$. בסעיף ב הוכחנו ש- AC הוא חוצה זווית של $\angle OAD$. מכאן ש-

$$\angle ECO = \angle ECD + \angle OCD = \angle CAB + 60^\circ = \frac{1}{2}\angle OAD + 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot 60^\circ + 60^\circ = 90^\circ.$$

¹ההיפזה נובעת ממשפט 20 "משפט חפיפה שתי צלעות והזווית שמול הצלע הגדולה מבין השתיים" לאחר שנטען שהזווית הישרה גדולה יותר מהזוויות האחרות. בספר גיאומטריה משתמשים במשפט זה כך: שני משולשים ישר זווית חופפים עם היתר וצלע אחר שווים.

4.11 קיז תשע"ה מועד א



ר. PA ו- PB משיקים למעגל שמרכזו O . המשך BO חותך את המעלג בנקודה D (ראה ציר).

א. הוכח: $PO \parallel AD$.

הנקודה C נמצאת על הקוטר DB כך ש- $AC \perp DB$ נמצאת על הקוטר DB כך ש- $\Delta ADC \sim \Delta POB$.

ב. הוכח: $\Delta ADC \sim \Delta POB$.


ג. הוכח: $\Delta DEC \sim \Delta DPB$.

ד. הוכח: $AC = 2EC$.

סעיף א


כאשר יש שני משיקים וקו מהנקודות החיתוך של המשיקים למרכז המעלג המשפטים האלה עשוויים להיות קלונטיטים: משפט (77) "המשיק למעגל מאונך לרדיוס בנקודה החשקה", משפט (80) "שני משיקים למעגל היוצאים מאותה נקודה שווים זה לזה", ומשפט (81) "קטע המחבר את מרכז המעלג בנקודהmana ייצאים שני משיקים למעגל, חוצה את הזווית שבין המשיקים". באIOR, הוספנו סימנים המציגים את המשפטים האלה.

ניתן להשלים את שאר הזוויות, כאשר השתמשנו בקיים $\alpha' = 90^\circ - \alpha$, תוך שימוש בעובדות סכום הזוויות במשולש הוא 180° , וסכום הזווית המשלימות לזויה שווה הוא 180° . משווין $\angle ADO = \angle DAO = \alpha'$, ולכן נקבע $\angle AOD = \angle DAO = \alpha'$. מכיוון $\angle ADO = \angle DAO = \alpha'$ ו- $PD \parallel AD$ לפי זווית מתאימות.



סעיף ב

הצעד הראשון הוא להוסיף לתרשים את הנקודה C ולסמן את הנתון $AC \perp DB$. הרבה זוויות מופיעות בתרשימים ולכן ננסה להוכיח דמיון לפי ז.ז. מסעיף א אנו יודעים ש- $\angle ADC = \angle POB$, ולכן $\triangle ADC \sim \triangle POB$ משפט הזווית ישר' α' , ולכן $\angle ACD = \angle PBO = \alpha$.



סעיף ג

מוסיף את הנקודה E לתרשים. הזווית EDC של המשולש $\triangle DEC$ היא למעשה אותה זווית α של המשולש PDB , $\triangle DEC \sim \triangle DPB$, ולכן $\triangle DPB$ משפט הזווית ישר' α .

סעיף ד


עלינו לחפש ערך אחד שהוא כפול מערך אחר. כМОבן הקוטר DB כפול מהרדיויסים DO, OB . בסעיפים הקודמים הוכחנו שני זוגות של משולשים דומים. נפשת את האירור וננסה להוכיח את המשוואה תוק שימוש במשולשים. עבור $AC \sim \triangle POB$, מסעיף ב, $\triangle ADC \sim \triangle POB$, ולכן:

$$\frac{AC}{PB} = \frac{DC}{OB} = \frac{DC}{r}.$$


מסעיף ג, $\triangle DEC \sim \triangle DPB$, ולכן:

$$\frac{EC}{PB} = \frac{DC}{DB} = \frac{DC}{2r}.$$

נציב את $AC = 2EC \cdot DC$ ממשוואת אחת בשנייה ונקבל



4.12 חורף תשע"ה



במקבילית ABCD הנקודה E נמצאת על
הצלע AD.

המשך BE חותך את המשך CD בנקודה F
(ראה ציור).

נתון: שטח המשולש ABE הוא 27 סמ"ר.

שטח המשולש DFE הוא 48 סמ"ר.

א. מצא את שטח המשולש BED.

ב. נתון גם כי המרובע BCDE הוא בר חסימה במעגל.

$$\cdot \frac{AB}{EF}$$

סעיף א


יש שתי דרכים לחשב את השטח של $\triangle BED$. הראשונה היא לחשב את השטח של $\triangle ABD$ ולהחסיר את השטח של $\triangle ABE$. לפי הסימונים בתרשימים:

$$S_{ABD} = \frac{1}{2}x(h_1 + h_2), \quad S_{AEB} = \frac{1}{2}xh_1.$$

אם נוכל לבטא את h_2 במנוחים של h_1 , יוכל לחשב את $S_{BED} = S_{ABD} - S_{AEB}$. בגלל הزاויות המתחלפות ב- A, D, F ו- B . לפי משפט 100 יחס השטחים שווה ליחס הדמיון:


$$\frac{h_2}{h_1} = \sqrt{\frac{S_{DEF}}{S_{ABE}}} = \sqrt{\frac{48}{27}} = \frac{4}{3}$$

$$\begin{aligned} S_{BED} &= S_{ABD} - S_{AEB} \\ &= \frac{1}{2}x\left(h_1 + \frac{4}{3}h_1\right) - \frac{1}{2}xh_1 \\ &= \frac{4}{3}\left(\frac{1}{2}xh_1\right) = \frac{4}{3}(S_{ABE}) = \frac{4}{3} \cdot 27 = 36. \end{aligned}$$



הדרך השנייה לחשב את השטח של $\triangle BED$ קשה לראות אבל החישוב מאוד פשוט. למשולשים $\triangle AEB, \triangle BED$ גובה זהה h מהנקודה B ועד AD . יחס השטחים הוא הריבוע של יחס הצלעות AE, ED במשולשים $\triangle ABE, \triangle DFE$ שהיחסינו לעיל:

$$S_{BED} = \frac{4}{3} S_{AEB} = \frac{4}{3} \cdot 27 = 36.$$



סעיף ב

לכואורה, לא צריך את הנתון על המרובע כי $\triangle ABE \sim \triangle DFE$. אבל עיון מדויק יגלה שהיחס שיחסינו הוא $\frac{AB}{EF} = \frac{AB}{FD}$ ולא $\frac{AB}{EF}$.


הנתון שהמרובע $BCDE$ בר חסימה במעגל מכוון למשפט 56 "ניתן לחסום מרובע במעגל אם ורק אם סכום זוג זוויות נגדיות שווה ל- 180° ". נסמן זוויות ונראה אם יוצא מזה משהו מועליל. נסמן ב- α את הזוויות הנגדיות של המקבילית A, C ו- D, B , ואות הזוויות המתאימות בנקודות C, D . נסמן ב- β את הזוויות המתחולפות ב- E, F .

סכום הזוויות במשולש הוא 180 ולבן הזוויות הקודקודיות ב- E שוות ל- $(\alpha + \beta)$. לפי זווית משלימה ב- $\angle BED = \alpha + \beta$. נפעיל את משפט 56 ונקבל:


$$\begin{aligned}\angle BCD + \angle BED &= 180 \\ \alpha + \alpha + \beta &= 180 \\ \alpha &= 180 - (\alpha + \beta) \\ \angle ABE &= \angle EBA \\ \angle DFE &= \angle EFD.\end{aligned}$$

המשולשים $\triangle ABE, \triangle DFE$ שווה שוקיים! נשתמש ביחס שיחסינו בסעיף א:

$$\frac{AB}{EF} = \frac{AB}{FD} = \frac{3}{4}.$$



4.13 קיז תשע"ז מועד ב



AC הוא קוטר במעגל שמרכזו O_1 .

BD הוא קוטר במעגל שמרכזו O_2 .

ישר משיק למעגלים O_1 ו- O_2 בנקודות A ו- B בהתאם.

המשיק חותך את קטע המרכזים O_1O_2 בנקודה E (ראה ציור).

נתון: רדיוס המעגל O_1 הוא 30 ס''מ

רדיוס המעגל O_2 הוא 20 ס''מ

אורך קטע המרכזים O_1O_2 הוא 90 ס''מ

א. (1) מצא את היחס $\frac{O_1E}{O_1C}$. נמק.

(2) הוכח כי $\triangle EO_1C \sim \triangle EO_2D$.

ב. הוכח כי הנקודה E נמצאת על הישר CD.


סעיף א (1)

כדי לסביר מעט את השאלה ביקשו את היחס בין O_1E , O_1C , אבל $O_1A = O_1C$ כי הם רדיוסים. אם נוכיח ש- $\triangle O_1AE \sim \triangle O_2BE$, נוכל לה חשב את היחס המבוקש.

משיק לשני המעגלים ולכן $\angle O_1AE = \angle O_2BE = 90^\circ$ לפי משפט 77 "המשיק למעגל מאונך לרדיוס בנקודת ההשקה". $\angle AEO_1 = \angle BEO_2$ כי הן זוויות קודקודיות. מכאן ש- $\triangle O_1AE \sim \triangle O_2BE$ לפי ז.ז. נסמן ב- x את אורך של O_1E ונקבל:

$$\frac{O_1E}{O_2E} = \frac{x}{90-x} = \frac{O_1A}{O_2B} = \frac{30}{20}$$

$$\frac{O_1E}{O_1C} = \frac{O_1E}{O_1A} = \frac{54}{30} = \frac{9}{5}.$$




סעיף א (2)

נראה שאפשר להשתמש באותה שיטה כדי להוכיח שהמשולשים $\triangle EO_1C \sim \triangle EO_2D$ דומים. אבל, כפי שמרמז סעיף ב, איןנו יודעים שהנקודה E נמצאת על הקו הימני CD , ולכן איןנו יכולים להניח ש- $\angle O_1EC = \angle O_2ED$ (זוויות הקודקודיות (שווות). במקום זה, משתמש בעובדה שהקוטרים מקבילים ולהוכיח בצורה ישירה שהמשולשים דומים.

כי שניהם ניצבים לקו O_1O_2 , $\angle CO_1E = \angle DO_2E = \alpha$, וכך $\angle CO_1E = \angle DO_2E = \alpha$. הוכחנו ש- $\triangle EO_1A \sim \triangle EO_2B$ (הרדיויסים של מעגל שוים), כך ש- $\angle O_1C = O_1A, O_2B = O_2D$. וכך $\angle O_1C = O_1A, O_2B = O_2D$.

$$\frac{O_1E}{O_2E} = \frac{O_1C}{O_2D},$$


$$\therefore \triangle EO_1C \sim \triangle EO_2D$$




סעיף ב

נתבונן בזוויות סביב הנקודה E שנמצאת על CD אם הזווית $\angle AED$ משלימה לזוית $\angle AEC$. הוכחנו את הזווית השותת $\angle O_1AE \sim \angle O_2BE$ ו- $\angle O_1EC \sim \angle O_2ED$. נסמן את זוויות α, β . נתון ש- AB קו ישר ו- $\angle AED = 180^\circ - (\alpha + \beta)$, כך ש- $\angle AED = 180^\circ - (\alpha + \beta) = 180^\circ - (\alpha + \beta) + (\alpha + \beta) = 180^\circ$.

$$\angle AED + \angle AEC = (180^\circ - (\alpha + \beta)) + (\alpha + \beta) = 180^\circ.$$



4.14 קיז תשע"ד מועד א



מןוקודה A יוצא ישר המשיק למעגל בנקודה B, וויצא ישר אחר החותך את המעגל בנקודות C ו-D. הנקודה E היא אמצע המיתר DC.

הנקודה M היא מרכזו המעגל (ראה ציור).

א. הוכח כי המרובע AEMB הוא בר חסימה במעגל.

ב. אלכסוני המרובע AEMB, שהוא בר חסימה במעגל, נפגשים בנקודה T.

נתון כי הנקודה T היא מפגש התיכונים במשולש BDC.

$$\text{הוכח כי } TB^2 = 2MT \cdot TA.$$

$$\text{ג. נתון: } MT = \frac{\sqrt{10}}{2} \text{ ס"מ}, TE = 1 \text{ ס"מ}$$

מצא את רדיוס המעגל החוסם את המרובע AEMB.


סעיף א

משפטים רלוונטיים: (103) "אם מןוקודה שמהווץ למעגל יוצאים חותך ומשיק, אז מכפלת החותך בחלקיו החיצוני שווה לריבוע המשיק", $AB^2 = AC \cdot AD$. (77) "המשיק למעגל מאונך לרדיווס בנקודות החשקה", $MB \perp AB$. (68) "קטע ממרכז המעגל החוצה את המיתר מאונך למיתר", $ME \perp DC$. (56) "ניתן לחסום מרובע במעגל רק אם סכום הזוויות הנגדיות שווה ל- 180° ", $AEMB$ ב-

$$\angleMEA + \angleMBA = \angleEMB + \angleEAB = 180^\circ.$$


מ- $AB \perp DC$ ו- $MB \perp AB$, $\angleMEA + \angleMBA = 180^\circ$. לפי משפט (106) "סכום הזוויות הפנימיות של מצולע קמור הוא $180^\circ(n - 2)$ ", סכום הזוויות הפנימיות של מרובע הוא 360° , ולכן:

$$\angleEMB + \angleEAB = 360^\circ - (\angleMEA + \angleMBA) = 180^\circ.$$



סעיף ב

באיור למטה מופיע המידע הרלוונטי בלבד: המנגנון החוסם את המרובע $AEMB$, האלכסונים שלו AM, EB והמשולש BDC . AM, EB הם מיתרים נחטכים של המנגנון החוסם. לפי משפט (101) "אם במנגנון שני מיתרים נחטכים, אז מכפלת קטעי מיתר אחד שווה למכפלת קטעי המיתר השני", $AM \cdot EB = TB \cdot TE$. אם נוכיח $TB = TB/2$, קיבל הוכחה להמושואה בשאלת. נתון שהנקודה T היא מפגש התיכוןים ב- $\triangle BDC$ ולפי משפט (46) "נקודות חיתוך התיכוןים מחולקת כולם ביחס 1 : 2",ican $TE = TB/2$ או $TB = TE = 2/1$.




סעיף ג

מסעיף א $\angle MBA$ היא זווית ישרה, ולפי משפט (74) "זווית הקפיה בת 90° נשענת על קוטר", המוגן נראה ש- MA יכול להיות קוטר ואז נקבל את הדרישות כמחצית הקוטר.

$$\begin{aligned}
R &= \frac{1}{2}MA \\
&= \frac{1}{2}(MT + TA) \\
&= \frac{1}{2}\left(MT + \frac{TB^2}{2MT}\right) \\
&= \frac{1}{2}\left(MT + \frac{4TE}{2MT}\right) \\
&= \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2 \cdot 1} \cdot 4 \left(\frac{\sqrt{10}}{2}\right)^2\right) \\
&= 3.
\end{aligned}$$

4.15 חורף תשע"ד



משולש שווה-צלעות ABC חסום במעגל.

נקודות D ו- L נמצאות על המרחב כר' ש- $BD \parallel LC$.

המייתרים AL ו- BD נחתכים בנקודה E (ראה ציור).

א. הוכח כי המרובע $LEDC$ הוא מקבילית.

ב. (1) הוכח כי $\triangle ADE$ הוא משולש שווה-צלעות.


. (2) הוכח כי $LC + LB = LA$

סעיף א

אין לנו מידע על המייתרים המגדירים את המרובע, לכן ננסה להוכיח שהוא מקבילית לפי משפט 29 "מרובע שבו כל זוג זוויות נגדיות שוות הוא מקבילית". כאשר יש "מספר רב" של מייתרים, סביר שיש זוויות שוות לפי משפט 72 "במעגל, כל הזוגות ההיקפיות הנשענות על מיתר מסוים צד של המיתר שווים זו לזו". נסמן את הזווית של המשולש שווה צלעות $\triangle ABC$ ב- $60^\circ = \alpha$.

$\angle CLA = \angle CBA = \alpha$ כי הן נשענות על המיתר BC . נתון $\angle LEB = \angle CLA = \alpha$ כי זוויות מתחלפות.


מה עם זוג הזווית הנגדיות השני במרובע? $\angle LED = 180 - \alpha$ לפי זוויות משלימות בנקודה E .
נתון $\angle LCD = 180 - \angle DCB = 180 - \alpha$ ולכן $BD \parallel LC$.



סעיף ב (1)

שוב אין לנו מידע על אורך הצלעות, אך ננסה להוכיח שכל הזוויות של המשולש $\triangle ADE$ שוות. מספיק להוכיח שתי זוויות שוות ל- 60° כי השלישית צריכה להשלים ל- 180° .

בסעיף א הוכיחנו ש- $\angle LEB = \angle CLA = \angle CBA = 60^\circ$. מכאן שגם $\angle DEA = \angle DAL = 60^\circ$ או $\angle DAE = \angle ADB = 60^\circ$ לפי זוויות קודקודיות. כי הן זוויות קודקודיות. ננסה להוכיח ש- $\angle ADE = \angle ADC = 60^\circ$ או $\angle ADB = \angle ACB = 60^\circ$. אכן, על ידי חיפוש זווית הנשענת על המיתר DL או AB . אכן, $\angle ADE = \angle ADB = 60^\circ$ ו- $\angle ADC = \angle ACB = 60^\circ$ נשענות על המיתר AB .



סעיף ב (2)

מהחלק הראשון של הסעיף אנו יודעים ש- $\triangle ADE$ שווה צלעות, $LC = DE$, $AE = DE$ כי $LC = DE$, $AE = DE$ והם צלעות נגדיים של המקבילית. לכן $AE = LC$ ו-

$$LA - LC = (LE + AE) - LC = (LE + LC) - LC = LE.$$

נשאר להוכיח $LE = LB$. הוכיחנו ש- $\angle LEB = 60^\circ$, כך שאם נוכיח שאחת מ- $\angle EBL$, $\angle ELB$ שווה ל- 60° קיבל מושך שווה צלעות.שוב נחפש זווית נשענת על אותו מיתר ונקבל ש- $\angle BCA = \angle BLA = 60^\circ$ כי שתיהן נשענות על המיתר AB .

תוך כי נסינוות לפטור את השאלה, מצאתי הוכחה אחרת מעניינת. קשת LBD , $\angle DCL$ נשענת על אותו קשת אבל **מצדדים נגדיים**. זווית היקפית נשענת על קשת שווה למחצית הזוויות המרכזיות הנשענת על אותה קשת (משפט 69), ולכן אם סכום שתי הקשתות הוא כל המעגל, סכום הזוויות שווה 180° . במקבילית, $\angle DCL = 120^\circ$, ולכן:

$$\angle LBE = \angle LBD = 180^\circ - \angle DCL = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ.$$

המלצות: גיאומטריה

- חשוב לציר תרשימים **ברורים** ו**גדולים** עדיף עם סרגל ומחוגה. בתהליך הפתרון אנו מסמנים את המידע המctruber על הזווית והצלעות ויש לדאוג שהיה מספיק מקום.
- כאשר לשאלת יש מספר סעיפים כדאי לציר תרשימים נפרדים לכל סעיף תוך העלמת מידע לא רלוונטי לאותו סעיף.
- **אין לסמן על התרשימים.** לעיתים, מה שנראה ברור בתרשים הוא לבדוק מה שעליינו להוכיח. במקרה א' הבנתי הוכחה שכל משולש הוא שווה שווקים כאשר ההוכחה مستמכת על תרשימים שאיןנו נכון. מטרת התרשימים היא לחפש קשרים בין זווית, צלעות, משיקים, וכו', כדי להעלות השערות על דרכי אפשרויות להוכחת הטענות.
- אני מעידיף לסמן זווית עם אותיות יווניות כגון α , ולא על ידי ציון שלושת הנקודות המגדירות אותה ABC . הסיבה היא שקשה יותר לעקוב אחר הנקודות השונות של הזווית מלעקב אחר סימן בודד.
- רצוי לרשום את המשפטים שיכולים להיות רלוונטיים לפני שמנסים לפתור את השאלה כי זה יכול לכוון לפתרון. מבון שלא כל המשפטים יהיו נחוצים. לעיתים קרובות שאלה מתבססת על משפט מוקדם אחד, כמו זווית של מרובע החסום במעגל, הזווית בין משיק למעגל או השוויון של כל זווית היקפית הנשענת על מיתר. לכן, ההיכרות עם משפטיים אלה יקל על מציאת פתרונות השאלות.
- יש משפטיים שזכרים בקלות כי הם דיאינטואטיביים, למשל, שימושים חופפים לפי צ.צ.צ. ודומים לפי ז.ז. יש משפטיים אחרים שקשה יותר לזכור אותם ושהוכחת נכונותם לא קללה. למשל, אני מתקשה לזכור איך להפעיל את המשפט על משיק ומיתר. במקרה ב' הבנתי תרשימים צבעוניים של מבחר משפטיים בתקופה שהתרשיים יקלו עליהם לזכור אותן, בוודאי יחסית לניסוחים מיולאים מסורבלים.
- כאשר שואלים על שטחים של משולשים יש לחפש גבהים משותפים. אנו רגילים לראות גבהים שיורדים מנקודה لكו אופקי, אבל גבהים יכולים להופיע מכל נקודה لكו ממול ללא קשר למצג של המשולש על הנייר.
- כדי להוכיח חפיפה של משולשים יש זווית, מספיק להוכיח שווין של צלע אחד וזוית חדת אחת מכל משולש. אם הצלע הוא בין זווית חדת לבין הזווית הישרה, החפיפה היא מיידית לפי ז.צ.ז. אם הצלע הוא בין שתי הזוויות החודות (היתר), זווית שערכה α ושנייה שערכה β , אז $\alpha - \beta = 90^\circ$, ושוב יש ז.צ.ז. אני מניח שבבוחינה צריך לרשום איך מגעים מזווית חדת וצלע לא.צ.ז., אבל כאשר מחפשים הוכחה לחפיפה קיצור דרך זה יכול להועיל.

פרק 5 טריגונומטריה

5.1 קיז תשע"ח מועד ב

. ABC הוא משולש שווה שוקיים ($AB = AC$). BD הוא חוצה זווית במשולש ABC בנקודה E . המשך הקטע BD חותך את המעל החוסם את המשולש ABC בנקודה E . גודל הזווית ABC הוא 2β . ADE . הבعد באמצעות β את $\frac{S_{\Delta ABC}}{S_{\Delta ADE}}$, היחס בין שטח המשולש ABC ובין שטח המשולש ADE . אין צורך לפשט את הביטוי שקיבלה.

נתון: BE שווה באורכו לרדיוס המעל החוסם את המשולש ABC .


ב. חשב את היחס $\frac{S_{\Delta ABC}}{S_{\Delta ADE}}$.

נסמן ב- a את אורך השוק AB .

ג. הביע באמצעות a את רדיוס המעל החסום על ידי המשולש ABC .

בתשובייה השאר שתי ספירות אחרי הנקודה העשרונית.

להלן התרשימים עם הזרויות הנתונות ב- B, C ולאחר חישוב הזרויות האחרות לפי סכום של זוויות של משולש. כמו כן, β , $\angle EAC = \angle EBC = 2\beta$, $\angle EAB = \angle ECA = 3\beta$, כי הן נשענות על אותן קשתות. התרשימים נראים דחוס, אבל צירתי אותם לפי הזרויות המת侃בות במהלך הפתרון.



סעיף א

$\triangle ABC$ משולש שווה שוקיים ולכן מייד יש לנו:

$$S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot a \cdot \sin(180 - 4\beta) = \frac{a^2}{2} \sin 4\beta.$$

כדי שהיחס יהיה ביטוי ב- β בלבד, علينا למצוא ביטוי ל- $S_{\Delta ADE}$ כדי ש- a^2 יצטמצם.

נחפש משולשים כדי לבטא AE , AD כביטויים ב- a , β כדי ש- $a^2 \sin^2 \beta$ יצטמצם. ב- $\triangle ABE$ צלע אחד הוא באורך a וצלע שני באורך AD , AE . לפי חוק הסינוסים:

$$\begin{aligned}\frac{AE}{\sin \beta} &= \frac{a}{\sin 2\beta} \\ AE &= \frac{a \sin \beta}{\sin 2\beta} \\ \frac{AD}{\sin \beta} &= \frac{a}{\sin 3\beta} \\ AD &= \frac{a \sin \beta}{\sin 3\beta} \\ S_{\triangle ADE} &= \frac{1}{2} \cdot \frac{a \sin \beta}{\sin 2\beta} \cdot \frac{a \sin \beta}{\sin 3\beta} \cdot \sin \beta \\ &= \frac{a^2}{2} \cdot \frac{\sin^3 \beta}{\sin 2\beta \sin 3\beta} \\ \frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle ADE}} &= \frac{\sin 4\beta \sin 2\beta \sin 3\beta}{\sin^3 \beta}.\end{aligned}$$

אפשרות אחרת היא לאחר חישוב AE או AD , להשתמש בחוק הסינוסים על המשולש $\triangle ADE$ כדי לחשב את השני.

סעיף ב

נשתמש בחוק הסינוסים על צלע $R = BE$, BE עם $\triangle ABE$, ומ- $\triangle ABC$ הרדיוס יצטמצם:


$$\begin{aligned}2R &= \frac{BE}{\sin(180 - 4\beta + \beta)} = \frac{BE}{\sin 3\beta} = \frac{R}{\sin 3\beta} \\ 2 \sin 3\beta &= 1 \\ 3\beta &= 30^\circ \\ \beta &= 10^\circ.\end{aligned}$$

נכון ש- $\sin 3\beta = \frac{1}{2}$, אבל לא ניתן שלמשולש שתי זוויות של 10° ו- 30° .
עם ערכו של β נוכל לחשב את יחס השטחים:

$$\frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle ADE}} = \frac{\sin 4\beta \sin 2\beta \sin 3\beta}{\sin^3 \beta} = \frac{\sin 40 \sin 20 \sin 30}{\sin^3 10} = 20.99^\circ.$$

סעיף ג

לפי משפט 6 "במשולש שווה שוקיים, חוצה זווית הראש, התיכון לבסיס והגובה לבסיס מתלכדים," כך שחותכה הזווית $\angle BAC$ ניצב ל- BC בנקודה F . לפי משפט 49 "שלושת חוצי הזווית של משולש נחתכים בנקודה אחת, שהיא מרכז המעגל החסום במשולש", הנקודה המסומנת M בתרשים היא מרכז המעגל החסום.




נשאר רק להשתמש בהגדרות של הפונקציות הטריגונומטריות. ב- $\triangle ABF$

$$\begin{aligned} \sin(90 - 2\beta) &= \frac{b}{a} \\ b &= a \cos 2\beta. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tan \beta &= \frac{r}{b} \\ r &= a \cos 2\beta \tan \beta \\ &= a \cos 20 \tan 10 = 0.1657a. \end{aligned}$$

5.2 קיז' תשע"ח מועד א

- . $\triangle ABC$ הוא משולש ישר זווית ($\angle ABC = 90^\circ$).
 M היא נקודה על היתר כך ש- $AM : MC = \sqrt{3} : 4$.
 נתון: $\angle ABM = 30^\circ$, $\angle CMB = 60^\circ$.
- א.** סמן: $MC = 4x$ וחשב את זוויות המשולש ABC .
(1) חשב את הרדיוסים של המעגלים החוסמים את המשולשים ABM ו- CMB .
(2) נסמן את מרכזי המעגלים החוסמים את המשולשים ABM ו- CMB ב- O_1 ו- O_2 בהתאם.
ב. נסמן את מרכז המעגלים החוסמים את המשולשים ABM ו- CMB ב- $O_1 O_2$ והוא דלטון.
(1) הסבר מדוע המרובע BO_1MO_2 הוא דלטון.
(2) חשב את אורך הקטע O_1O_2 .
- נסמן $\angle BAM = \alpha$, $\angle BCM = 90 - \alpha$.



סעיף א

- (1) לשני המשולשים $\triangle ABM, \triangle CMB$ צלע עם הנעלם x , זווית ידועה אחת, זווית שנייה עם הנעלם α . מחוק הסינוסים קיבל שתי משוואות עם שני הנעלמים שאפשר לפתור אתכדי לקבל משוואה אחת עם הנעלם α בלבד:

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{3}x}{\sin 30} &= \frac{8}{\sin \alpha} \\ x &= \frac{8 \sin 30}{\sqrt{3}x \sin \alpha} \\ \frac{4x}{\sin 60} &= \frac{8}{\sin(90 - \alpha)} \\ x &= \frac{8 \sin 60}{4x \cos \alpha}\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}\frac{1}{2\sqrt{3}\sin\alpha} &= \frac{\sqrt{3}}{4 \cdot 2\cos\alpha} \\ \tan\alpha &= \frac{4}{3}.\end{aligned}$$

לכן, $\angle BCA = 90 - \alpha = 36.87^\circ$, ולא נשכח לרשום גם $\angle BAC = \alpha = 53.13^\circ$
 (2) לפי חוק הסינוסים עבור $\triangle CMB, \triangle ABM$

$$\begin{aligned}2R_1 &= \frac{8}{\sin\alpha} \\ R_1 &= 5 \\ 2R_2 &= \frac{8}{\sin(90 - \alpha)} \\ R_2 &= 20/3.\end{aligned}$$

סעיף ב

(1) נזכיר התרשימים חדש עם המעגלים החוסמים. ניתן לראות ש- $O_1M = O_1B = O_2M = O_2B$ כי הם רדיוסים של המעגל החוסם את $\triangle ABM, \triangle O_1O_2M$ כי הם רדיוסים של המעגל החוסם את $\triangle CBM$.
 לפי ההגדרה מרובע עם שני זוגות של צלעות שכנים שהם דלתון.




(2) לפי משפט 21 "האלכסון הראשי בדלתון חוצה את זוויות הראש, חוצה את האלכסון השני ומאונך לו", $MB \perp O_1O_2$ וחוצה אותו. את האורך של O_1O_2 ניתן לחשב כסכום האורכים ממרכזים המעגלים ועד לנקודות החיתוך של האלכסונים. נשתמש במשפט פיתגורס:

$$\begin{aligned}O_1O_2 &= O_1E + O_2E = \sqrt{R_1^2 - 16} + \sqrt{R_2^2 - 16} \\ &= \sqrt{5^2 - 16} + \sqrt{\left(\frac{20}{3}\right)^2 - 16} \\ &= 3 + \frac{16}{3} = \frac{25}{3}.\end{aligned}$$

5.3 חורף תשע"ח

נתונה מקבילית ABCD. AC הוא האלכסון הארוך, כמו תואר בציור.



במשולש ABC חסום מעגל שמרכזו O.

נתון: הנקודה O נמצאת במרוחקים 6 ו- 3

מן היסרים AD ו- AC בהתאם;

$$OA = 10$$


א. חשב את גודלי זוויות המקבילית.

ב. חשב את אורך האלכסון AC.

ג. חשב את שטח המקבילית.

הן נקודות המפגש של האנכים מ- O עם AC, AD עם BC, BD . לפי משפט 49 "שלשות חוציא הזוויות של משולש נחתכים בנקודה אחת, שהיא מרכז המעגל החסום במשולש", AO, CO הם חוציא הזוויות BAC, BCA , בהתאם. המונח "חוצה זוויות" נטפס לי בראש ו"פרטני" את הבעיה תוך הנחה E, F הן נקודות המפגש של האנכים מ- O עם AC, AD עם BC, BD .

נסמן את הזוויות בנקודה A עבור המשולשים ישר-זוויות $\triangle AOE, \triangle AOF$ שנוצרו על ידי האנכים: $\alpha = \angle OAE, \beta = \angle OAF$



סעיף א

לפי התרשימים נחישב α, β מהפונקציות הטריגונומטריות במשולשים ישר-זוויות:

$$\sin \alpha = 3/10$$

$$\alpha = 17.46$$

$$\sin \beta = 6/10$$

$$\beta = 36.87$$

$$\angle BCD = \angle BAD = \alpha + \beta = 54.33$$

$$\angle ABC = \angle ADC = \frac{360 - 2(\alpha + \beta)}{2} = 125.67.$$

סעיף ב

האלכסון AC הוא צלע של $\triangle ABC$ והזווית שלו ידועים, אבל אי-אפשר להשתמש בחוק הסינוסים כי אורכי הצלעות לא ידועים. מהתרשים רואים שהאלכסון מרכיב משני קטעי קו AE, EC שהם צלעות של משולשים ישר-זווית $\triangle AOE, \triangle COE$ מתקיים המשפט פיתגורס:

$$AE = \sqrt{10^2 - 3^2} = 9.54.$$

נשתמש בחוק הסינוסים ב- $\triangle COE$ (ונימנע מהפיתוי לקבע ש- $\angle OCE = \alpha$). לפי זוויות מתחלפות במקבילות $\angle BCA = \angle CAD = \beta - \alpha$ ו- $\angle BCA = \angle CAD = \beta - \alpha$:

$$\begin{aligned}\angle OCE &= \frac{\angle BCA}{2} = \frac{\beta - \alpha}{2} \\ &= \frac{36.87 - 17.46}{2} = 9.71\end{aligned}$$

$$\angle COE = 180 - 90 - \angle OCE = 80.29$$


$$\frac{EC}{\sin 80.29} = \frac{3}{\sin 9.71}$$

$$EC = 17.54$$

$$AC = AE + EC = 9.54 + 17.54 = 27.08.$$

סעיף ג

שטח של מקבילית הוא הבסיס כפול הגובה:



$$\frac{b}{\sin 2\alpha} = \frac{27.08}{\sin 125.67}$$

$$b = 19.08$$

$$\sin(\beta - \alpha) = \frac{h}{27.08}$$

$$h = 9$$

$$S_{ABCD} = bh = 171.71.$$

אפשרות אחרת היא להשתמש בנוסחה הטריגונומטרית כדי לחשב $S_{\triangle ABC}$ ולהכפיל בשניים.

5.4 קיז תשע"ז מועד ב

ABCD הוא טרפז חסום במעגל (AB || DC).

נתון: $a < b$, $CD = b$, $AB = a$.

$$\angle C = 60^\circ$$

א. הבע את שוקרי הטרפז, BC ו- AD, באמצעות a ו- b .

נתון: $a = 4$, אורך האלכסון BD הוא $4\sqrt{7}$.

ב. חשב את b .


ג. (1) R הוא רדיוס המעגל החוסם את הטרפז. מצא את R.

(2) הסבר מדוע אפשר לחסום מעגל בטרפז ABCD.

(3) r הוא רדיוס המעגל החוסם בטרפז. מצא את r.

סעיף א

לפי משפט 56 "ניתן לחסום מרובע במעגל אם ורק אם סכום זוג זוויות נגדיות שווה ל- 180° ", ולכן $\angle DAB = 120^\circ$. נוריד גבהים מ- A, B, C, D החותכים אותו ב- E, F, G, H. $\triangle AED \cong \triangle BFC$ (3). המשולשים ישר-זווית. בתרשים השלמו את הזווית במשולשים ל- 180° . לפי משפט 40 "טרפז בו הזוויות שליד אותו בסיס שוות או לו הוא טרפז שווה שוקיים", ABCD שווה שוקיים.



מכאן: $\triangle AED \cong \triangle BFC$ ש- $AE = BF$

$$\begin{aligned} \cos 60^\circ &= \frac{(b-a)/2}{s} = \frac{1}{2} \\ s &= b - a. \end{aligned}$$

פתרון אחר משתמש בחוק הקוסינוסים על $\triangle ACD$, $\triangle ACB$. נסמן ב- c את אורך האלכסון AC.

$$\begin{aligned} c^2 &= s^2 + b^2 - 2sb \cos 60^\circ \\ &= s^2 - sb + b^2 \\ c^2 &= s^2 + a^2 - 2sa \cos 120^\circ \\ &= s^2 + sa + a^2 \end{aligned}$$


נשווה את שתי הנוסחאות ל- c^2 ונפתח עבור s :

$$\begin{aligned}s(b+a) &= b^2 - a^2 = (b+a)(b-a) \\ s &= b-a.\end{aligned}$$

סעיף ב'

שקלתי להשתמש בחוק הסינוסים במשולש $\triangle ADB$: פעם אחת לחשב $\angle ADB$ ופעם שנייה לחשב את s . עדיף להשתמש בחוק הקוסינוסים ב- $\triangle ADB$ כי אנו יודעים ש- $\triangle ADB$ כי אנו יודעים ש-

$$\begin{aligned}(4\sqrt{7})^2 &= 4^2 + (b-4)^2 - 2 \cdot 4 \cdot (b-4) \cdot \cos 120 \\ b^2 - 4b - 96 &= 0 \\ (b-12)(b+8) &= 0 \\ b &= 12.\end{aligned}$$



סעיף ג'

(1) שימו לב שהאלכסון BD הוא **לא** הקוטר של המעגל החוסם שמסומן בנקודת השחורה הגדולה. לפי חוק הסינוסים ב- $\triangle ADB$:

$$R = \frac{4\sqrt{7}}{2 \sin 120} = \frac{4\sqrt{7}}{\sqrt{3}} = 6.11.$$


(2) לפי משפט 57, "מרובע קמור חוסם מעגל אם ורק אם סכום שתי צלעות נגדיות שווה לסכום שתי הצלעות הנגדיות האחרות":

$$\begin{aligned}a+b &\stackrel{?}{=} s+s \\ a+b &\stackrel{?}{=} (b-a)+(b-a) \\ 3a &\stackrel{?}{=} b \\ 3 \cdot 4 &= 12.\end{aligned}$$

$:BF = 2r$ הם מישיקים מקבילים למעגל החוסם, ולכן (3)

$$\begin{aligned}\sin 60 &= \frac{2r}{s} = \frac{2r}{b-a} = \frac{2r}{8} \\ r &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 8 = 2\sqrt{3} = 3.464.\end{aligned}$$

5.5 קייז תשע"ז מועד א



. (AB = BC) הוא משולש שווה שוקיים ABC

ר' BD CE, AF הם תיכוןים במשולש,

הנחתכים בנקודה O (ראה ציור).

. A. הוכחה: $S_{\Delta BOE} = S_{\Delta COD}$

מעגל שמרכזו O משיק לצלע AC

בנקודה D.


נתון כי שטח העיגול שווה לשטח המשולש AOC.

. B. חשב את גודל הזווית ACE.

. C. הביע את אורך הקטע OE באמצעות רדיוס המעגל.

סעיף א

נסמן בתרשים לפיה $\triangle ABC$ שווה שוקיים, AF, BD, CF תיכוןים. משפט 46 "נקודות חיתוך התיכוןים מחלקת כל תיכון ביחס 1 : 2". כי $AF = CE$ כי $\triangle ACF \cong \triangle ACE$ לפי צ.ז.ב. כי $\triangle ABC$ שווה-שוקיים.



נשתמש במשפט 91 "משפט תאילס המורחב": ישר המקביל לאחלה מצלעות המשולש חותך את שתי הצלעות האחרות או את המשכיהם בקטעים פרופורציוניים", כך שגם גם $\triangle EBF$. $EF = \frac{AC}{2} = \frac{a}{2}$ הוא שווה-שוקיים, ולכן, $EG = \frac{EF}{2} = \frac{a}{4}$

$$S_{BOE} = \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{4} \cdot BG + \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{4} \cdot GO = \frac{a}{8}(BG + GO) = \frac{a}{8} \cdot 2r = \frac{ar}{4}$$

$$S_{COD} = \frac{1}{2} \cdot r \cdot \frac{a}{2} = \frac{ar}{4}.$$


פתרון אחר מתקיים מהנוסחה הטריגונומטרית לשטח עם הזרויות הקודקודיות α :

$$S_{BOE} = \frac{1}{2} \cdot 2r \cdot c \cdot \sin \alpha$$

$$S_{COD} = \frac{1}{2} \cdot r \cdot 2c \cdot \sin \alpha.$$

פתרון זה הרבה יותר קל רק קשה לי להציג מנגינה גיאומטרית לחשב שטח מבסיס וגובה!

סעיף ב



נתון:

$$S_O = \pi r^2 = \frac{1}{2} ar = S_{AOC}$$

$$a = 2\pi r.$$

נציב עבור a בחישוב פונקציה טריגונומטרית עבור הזרות β :

$$\tan \beta = \frac{r}{a/2} = \frac{2r}{2\pi r} = \frac{1}{\pi}$$

$$\beta = \arctan \frac{1}{\pi} = 17.66^\circ.$$

סעיף ג


בתרשים סימנו c . נחשב פונקציה טריגונומטרית עבור הזרות β ב- $\triangle COD$.

$$\sin \beta = \frac{r}{2c}$$

$$c = \frac{r}{2 \sin \beta}$$

$$= 1.648r.$$

5.6 חורף תשע"ז



נתון טרפז $ABCD$ $(BC \parallel AD)$

החסום בחצי מעגל שמרכזו O ורדיוסו R

כך ש- AD הוא קוטר של חצי המעגל.

המשך השוקיים AB ו- DC נפגשים

מחוץ למעגל בנקודה E (ראה ציור).

. \triangleleft EAD = α : נתון:

- א. הביע באמצעות R ו- α את אורך הקטע BC.

ב. מהו התחום של כל הערכים האפשריים עבור הזווית α? נמק.


ג. נתון כי שטח משולש AED גדול פי 9 משטח משולש COD.

ה. מהו היחס בין רדיוס המרגל החוסם את המשולש AED לבין R?

סעיף א

להלן הוכחה לטעוונם של הזווית בתרשים להלן. הרדיוסים של המרגל שווים $OA = OB = R$, לכן $\triangle ABO \sim \triangle BAO$, וכך $\angle BAO = \angle ABO = \alpha$. כדי להשלים זווית של $\angle BCO = \angle AOB = \beta$, נסמן $\angle BCO = \gamma$ לפי זווית מתחלפת, $\angle AOB = 180 - 2\alpha$, $\angle COD = 180 - 2\beta$. נשלים את הזווית $\angle BOC$ של $\triangle BOC$ ונקבל $\angle BCO = \angle CBO = \beta$ כי $\triangle BOC \sim \triangle COD$ שווה שוקיים. נשלים את הזווית $\angle COD$ של $\triangle COD$ ונקבל $\angle COD = \angle BCO = \beta$ לפי זווית מתחלפת. נסמן $\angle COD = \gamma$. נשלים את הזווית $\angle BOC$ של $\triangle BOC$ ונקבל $\angle BOC = 180 - 2\beta$. נסמן $\angle BOC = \delta$. נשלים את הזווית $\angle BAO$ של $\triangle BAO$ ונקבל $\angle BAO = \angle OAD = \alpha$ כי $\triangle BAO \sim \triangle DAO$ שווה שוקיים.

אפשר גם להשתמש במשפט 56 "ניתן לחסום מרובע במעגל אם ורק אם סכום זוג זוויות נגדיות שווה ל- 180° . לאחר שהסקנו ש- $\angle CBO = \alpha$, $\angle OAB = \beta$, $\angle ABO = \gamma$ ו- $\angle CAB = \delta$, אפשר לחשב $\angle CDO = \alpha + \beta$ ומשם את שאר הזויות.



לפני שנמשיך נרשום כמה זהויות טריגונומטריות שימושיות:

$$\begin{aligned}\cos(180 - \theta) &= -\cos \theta \\ \sin(180 - \theta) &= \sin \theta \\ \cos 2\theta &= \cos \theta \cos \theta - \sin \theta \sin \theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\ \sin 2\theta &= \sin \theta \cos \theta + \cos \theta \sin \theta = 2 \sin \theta \cos \theta.\end{aligned}$$

נחשב $a = BC$ לפי חוק הסינוסים ולפי חוק הקוסינוסים, $\triangle BOC$, ותחליטו איזו שיטה עדיפה.
לפי חוק הסינוסים:

$$\begin{aligned}\frac{a}{\sin \gamma} &= \frac{R}{\sin \beta} \\ a &= \frac{R \sin(180 - 2\beta)}{\sin \beta} = \frac{R \sin 2\beta}{\sin \beta} \\ &= \frac{R(2 \sin \beta \cos \beta)}{\sin \beta} \\ &= 2R \cos \beta = 2R \cos(180 - 2\alpha) \\ &= -2R \cos 2\alpha.\end{aligned}$$

לפי חוק הקוסינוסים:

$$\begin{aligned}a^2 &= R^2 + R^2 - 2R \cdot R \cos \gamma \\ &= 2R^2(1 - \cos(180 - 2\beta)) = 2R^2(1 + \cos 2\beta) \\ &= 2R^2(1 + \cos^2 \beta - \sin^2 \beta) \\ &= 2R^2(2 \cos^2 \beta) \\ a &= 2R \cos \beta = 2R \cos(180 - 2\alpha) \\ &= -2R \cos 2\alpha.\end{aligned}$$

סעיף ב

האורך של צלע חייב להיות חיובי, $a = -2R \cos 2\alpha > 0$, ולכן $2\alpha < 0$ נמצא בربיע השני:

$$\begin{aligned}90 < 2\alpha &\leq 180 \\ 45 < \alpha &\leq 90.\end{aligned}$$


$\alpha \neq 90^\circ$ כי האזויות הבסיס של משולש שווה-שוקיים חייבים להיות פחות מ- 90° .

סעיף ג

נתון יחס של השטחים של שני משולשים. נחשב את השטחים של שני המשולשים ונראה מה יוצא.

נחשב $S_{\triangle AED}$ לפי הנוסחה הגיאומטרית. הגובה של $\triangle AED$ הוא $h = R \tan \alpha$, ו:

$$S_{\triangle AED} = \frac{1}{2} \cdot 2R \cdot h = R^2 \tan \alpha.$$



נחשב לפיה הנוסחה הטריגונומטרית:

$$\begin{aligned} S_{\triangle COD} &= \frac{1}{2}R \cdot R \cdot \sin \beta \\ &= \frac{1}{2}R^2 \sin(180 - 2\alpha) = \frac{1}{2}R^2 \sin 2\alpha. \end{aligned}$$

לפי היחס נתון בין השטחים:


$$\begin{aligned} tR^2 \tan \alpha &= 9 \cdot \frac{1}{2}R^2 \sin 2\alpha \\ \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} &= 9 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \sin \alpha \cos \alpha \\ \cos \alpha &= \frac{1}{3} \\ \sin \alpha &= \sqrt{1 - \frac{1}{9}} = \sqrt{\frac{8}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}. \end{aligned}$$

במשולש יש לנו נשותמש בחוק הסינוסים כדי לחשב r , הרדיוס של $\triangle DOE$. $R = DE \cos \alpha$

: $\triangle AED$ המगעל שחותם

$$\begin{aligned} 2r &= \frac{DE}{\sin \alpha} \\ \frac{r}{R} &= \frac{1}{2 \sin \alpha \cos \alpha} \\ &= \frac{1}{2(2\sqrt{2}/3)(1/3)} \\ &= \frac{9}{4\sqrt{2}} = 1.591. \end{aligned}$$

5.7 קיז תשע"ו מועד ב




- . במעגל חסום טרפז $ABCD$ ($AB \parallel DC$) מרכז המעגל O בתור הטרפז (ראה ציור).
- . רדיוס המעגל הוא R וגובה הטרפז הוא h .
- . נתון: $\alpha = \angle BOA = 3\alpha$, $\angle COD = \alpha$.
- . א. הביע באמצעות α את $\angle DAB$.
- . ב. הביע את האורך של שוק הטרפז באמצעות α ו- R .
- . ג. הביע את האורך של שוק הטרפז באמצעות α ו- h .
- . ד. נתון כי שטח המשולש COD הוא $\frac{h^2}{12 \cos^2 \frac{\alpha}{2}}$. מצא את α .

מהתרשים נראה שהטרפז שווה-שוקיים, אבל אין סמוך על תרשימים. השיקתי זמן רב עד שעלה בדעתו האפשרות שטרפז חסום במעגל חייב להיות שווה-שוקיים. המשפט לא מופיע ברשימה המשפטים שניתן לצטט בבחינת הגראות ויש להוכיח אותו. בספרי לימוד המשפט לא מובלט ומופיע רק כדוגמה או תרגיל. אני אביא שתי הוכחות: אחת שליל ואחת המופיעה בספרים.


ההוכחה מהספרים (רישים ימני למטה): $\angle ACD = \angle CAB$ לפי זוויות מתחלפות ולכן גם המיתרים הצלאים שווים $AC = BC$.

ההוכחה שליל (תרשים שמאלי למטה): המשפט הראשון שחשבתי עליו כאשר קראתי את השאלה הוא משפט 56 "ניתן לחסום מרובע במעגל אם ורק אם סכום זוג זוויות נגדיות שווה ל- 180° ". נסמן $\angle DAB = \theta$, ולפי המשפט $\angle DCB = 180 - \theta$. לפי זוויות משלימות ומתאימות $\angle DCF = 180 - \theta - \angle DCB = 180 - (180 - \theta) = \theta$. לפי משפט 40 "טרפז בו הزواיות שליד אותו בסיס שוות זו לזו הוא טרפז שווה-שוקיים", הטרפז שווה-שוקיים.



סעיף א

בארבעת המשולשים עם קודקוד O , הצלעות המקווקות הם רדיוסים שאורכם R , והמשולשים שווה-שוקיים. $\triangle COB \cong \triangle DOA$ לפי צ.צ.צ. כי הטרפז שווה-שוקיים. מכאן $\angle COB \cong \angle DOA$. ונitin לסמן את הزواיות לפי החישובים מימין לתרשים. החישוב של γ מוצדק כי סכום הزواיות סביב נקודת הוא 360° . השורה האחורונה מציגה את התשובה לשאלת כי $\delta + \beta = \gamma$.



$$\begin{aligned}
 \beta &= \frac{180-3\alpha}{2} \\
 \gamma &= \frac{360-(\alpha+3\alpha)}{2} = 180-2\alpha \\
 \delta &= \frac{180-\gamma}{2} = \frac{180-(180-2\alpha)}{2} = \alpha \\
 \beta+\delta &= \frac{180-\alpha}{2}.
 \end{aligned}$$

סעיף ב

כדי לחשב אורך של שוק נחפש משולש שאחד מצלעותיו הוא DA . לפי חוק בסינוסים ב- $\triangle DOA$:

$$\begin{aligned}
 \frac{DA}{\sin \gamma} &= \frac{R}{\sin \delta} \\
 \frac{DA}{\sin(180-2\alpha)} &= \frac{R}{\sin \alpha} \\
 DA &= \frac{R \sin 2\alpha}{\sin \alpha} \\
 &= \frac{R \cdot 2 \sin \alpha \cos \alpha}{\sin \alpha} = 2R \cos \alpha.
 \end{aligned}$$

סעיף ג

בתרשים ציירנו את הגובה מהנקודה C כדי להסתיר את הסימונים ב- $\triangle DOA$:
 $\triangle CBE$ הוא גם שוק. השתמש בהגדרה של סינוס במשולש

$$\frac{h}{CB} = \sin \angle CBE = \sin \left(\frac{180-3\alpha}{2} + \alpha \right) = \sin \left(90 - \frac{\alpha}{2} \right) = \cos \frac{\alpha}{2}.$$

$$CB = \frac{h}{\cos(\alpha/2)}. \text{ התשובה היא } \angle CBE = \angle DAB = \beta + \delta.$$

סעיף ד

בנוסחה הטריגונומטרית עבור $S_{\triangle COD}$ יופיעו ארכי הצלעות R והזווית α . אנו רוצים נוסחה עם h ו- α כדי להשווות לביטויו הנוכחי. נשווה את הביטויים עבור שוקי הטרפז מהתreffים הקודמים:

$$\begin{aligned}
 2R \cos \alpha &= \frac{h}{\cos(\alpha/2)} \\
 R &= \frac{h}{2 \cos \alpha \cos(\alpha/2)}.
 \end{aligned}$$

נציב בנוסחה לשטח, נשווה לנוסחה הנтoна לשטח ונמצא:

$$\begin{aligned}
 S_{\triangle COD} &= \frac{1}{2} \cdot OC \cdot OD \cdot \sin \alpha = \frac{1}{2} R^2 \sin \alpha \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{h^2}{4} \cdot \frac{1}{(\cos \alpha \cos(\alpha/2))^2} \cdot \sin \alpha \\
 \frac{h^2}{12 \cos^2(\alpha/2)} &= \frac{1}{2} \cdot \frac{h^2}{4} \cdot \frac{1}{(\cos \alpha \cos(\alpha/2))^2} \cdot \sin \alpha \\
 \frac{1}{12} &= \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{\cos^2 \alpha} \cdot \sin \alpha \\
 \frac{1}{12} &= \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{1 - \sin^2 \alpha} \cdot \sin \alpha.
 \end{aligned}$$

נקבל משואה ריבועית ב- $\sin \alpha$, ונבחר את השורש $\frac{1}{2}$ כי הערך של סינוס לא יכול להיות מ-2:-


$$2 \sin^2 \alpha + 3 \sin \alpha - 2 = 0$$

$$(2 \sin \alpha - 1)(\sin \alpha + 2) = 0$$

$$\sin \alpha = \frac{1}{2}.$$

הערך היחיד ש- α יכול לקבל הוא 30° כי זוויות הבסיס של טרפז חייבים להיות פחות מ- 90° .

5.8 קיז' תשע"ו מועד א



נתון משולש שווה-שוקיים $\triangle ABC$ ($AB = AC$)

AE הוא גובה לבסיס BC

ו- BT הוא תיכון לשוק AC (ראה ציור).

נתון: $BC = 2k$, $\angle TBC = \alpha$, $\angle ACB = \beta$

(1) הבע את האורך של TC באמצעות k ו- β בלבד.


(2) היעזר בתת-סעיף (1), והראה כי

$$\sin(\alpha + \beta) = 4 \sin \alpha \cdot \cos \beta$$

נתון גם: $5 \text{ ס"מ} = TE = 4 \text{ ס"מ}$

(1) מצא את β .

(2) מצא את α .



(1) לפי הגדרת קוסינוסים ב- $\triangle AEC$:

$$\cos \beta = \frac{k}{2a}$$

$$TC = a = \frac{k}{2 \cos \beta}.$$


(2) נחפש משולש עבورو חוק הסינוסים ייתן משווה בה יצטמצם k או מתאים:

$$\frac{2k}{\sin(180 - (\alpha + \beta))} = \frac{a}{\sin \alpha}$$

$$\frac{2k}{\sin(\alpha + \beta)} = \frac{k / (2 \cos \beta)}{\sin \alpha}$$

$$\sin(\alpha + \beta) = 4 \sin \alpha \cos \beta.$$

(1) נסיף את אורך הצלעות הנתונות ונשתמש במשפט 86 "במשולש ישר זווית התיכון ליתר שווה למחצית היתר" כדי להסביר ש- $\triangle ETC$ שווה-שוקיים:



נוריד גובה מ- T שהוא אכן אמצעי במשולש שווה-שוקיים $\triangle ETC$ ונקבל:

$$\cos \beta = \frac{2}{5}$$

$$\beta = 66.4^\circ.$$

לפי סעיף (1) וסעיף (2) הקודם:

$$\sin(\alpha + \beta) = 4 \sin \alpha \cos \beta$$

$$\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = 4 \sin \alpha \cos \beta$$


$$\sin \alpha \cdot \frac{2}{5} + \cos \alpha \sqrt{1 - \left(\frac{2}{5}\right)^2} = 4 \sin \alpha \cdot \frac{2}{5}$$

$$\sqrt{21} \cos \alpha = 6 \sin \alpha$$

$$\tan \alpha = \frac{\sqrt{21}}{6}$$

$$\alpha = 37.37^\circ.$$

5.9 חורף תשע"ו



במשולש שווה-שוקיים $\triangle ABC$ זווית הבסיס היא 2α .

הנקודה E היא מפגש חוץ-הזווית במשולש $\triangle ABC$. המשך CE חותם את הצלע AB בנקודה D (ראה ציור).


נתון: $\angle BAC > 90^\circ$, $\frac{EC}{DE} = \frac{\sqrt{3}}{2 \sin \alpha}$

א. מצא את α .

ב. מצא את היחס בין רדיוס המרגל החוסם את המשולש $\triangle ABC$ ובין רדיוס המרgal החסום במשולש $\triangle ABC$.

ג. נתון כי הפרש בין רדיוס המרגל החוסם את המשולש $\triangle ABC$ ובין רדיוס המרgal החסום במשולש $\triangle ABC$ הוא 2 ס"מ. מצא את אורך הקטע AE .

נתון שהנקודה E היא מפגש חוץ-הזווית. לפי משפט 6 "במשולש שווה-שוקיים, חוצה זווית הראש, התיכון לבסיס והגובה לבסיס מתלכדים", ולכן חוצה הזווית $\angle BAC$ עובר דרך E וחותם את BC בנקודה F בזווית ישרה. לפני שניגש לשאלות, נסמן זוויות תוך שימוש רק במשפטים פשוטים כגון סכום הזוויות במשולש הוא 180 .



$\triangle EFB \cong \triangle EFC$ לפי צלע-צלע במשולש ישר-זווית: F היא נקודת האמצע של EF ו- BC והוא צלע משותף. לכן $\angle BEF = \angle CEF = 90 - \alpha$ שננסמן β .
בדרכ דומה נראה ש- $\angle BAF = \angle CAF = 90 - 2\alpha$ שננסמן γ .
 $\angle AED = 180 - \beta - \gamma = 3\alpha - \beta$ לפי זווית קודקודיות, ו- $\angle BDE = 180 - 3\alpha$ לפי זווית משלימות.

סעיף א

נתון היחס $\frac{EC}{DE}$ כתלות ב- α , ולכן נחפש מושלש שעבורו חוק הסינוסים ייתן יחס אחר כתלות ב- α , אז תהיה לנו משווהה ב- α בלבד. אמנם EC, DE הם צלעות במשולשים שונים, אבל כבר הוכחנו ש- $\triangle BDE \cong \triangle EFB \cong \triangle EFC$. לפי חוק הסינוסים ב- $\triangle EFB$ כי $EB = EC$.

$$\begin{aligned}\frac{EB}{\sin(180-3\alpha)} &= \frac{DE}{\sin \alpha} \\ \frac{EB}{DE} &= \frac{\sin(180-3\alpha)}{\sin \alpha} = \frac{\sin 3\alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sqrt{3}}{2 \sin \alpha} \\ \sin 3\alpha &= \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \alpha &= 20^\circ.\end{aligned}$$

סעיף ב

לפי משפט 49 "שלשות חוציא הزاויות של משולש נתכנים בנקודה אחת, שהיא מרכז המעגל החסום במשולש", הנקודה E היא מרכז המעגל החסום שמייק לצלע המשולש ב- F . $r = EF$ הוא הרדיוס של המעגל החסום.

כעת צריך להיזהר שלא לקבע ש- E היא מרכז המעגל החסום כי אין אנו יודעים שחווצי הزاויות האחרות הם גם אנכיים אמצעיים. במקום זה נשתמש בחוק הסינוסים על המשולש $\triangle ABC$. נבחר את הزاوية $\angle BAC = 180 - 4\alpha$, כי אפשר לחשב את אורך הצלע הנגדי BC כתלות ב- α :


$$\begin{aligned}\tan \alpha &= \frac{r}{BF} = \frac{r}{BC/2} \\ 2R &= \frac{BC}{\sin(180-4\alpha)} = \frac{2r}{\sin 4\alpha \tan \alpha} \\ \frac{R}{r} &= \frac{1}{\sin 4\alpha \cdot \tan \alpha} = \frac{1}{\sin 80 \cdot \tan 20} = 2.79.\end{aligned}$$

סעיף ג

נתון $R = 2/(2.79 - 1) = 1.117$. נציב $R = 2.79r$ שיחסנו בסעיף ב, ונקבל $r = 2$. אין לנו מספיק מידע על המשולשים $\triangle AED, \triangle AEC$:

$$\begin{aligned}\tan 2\alpha &= \frac{AE + r}{BF} = \frac{AE + r}{r / \tan \alpha} \\ AE &= \frac{r(\tan 2\alpha - \tan \alpha)}{\tan \alpha} \\ &= \frac{1.117(\tan 40 - \tan 20)}{\tan 20} = 1.458.\end{aligned}$$

5.10 קיז תשע"ה מועד ב



מעגל שרדיוסו r חסום בטרפז שווה-שוקיים $ABCD$ ($AB \parallel DC$), כמתואר בציור.

נתון: $\angle BCD = 70^\circ$.

א. הבע באמצעות r :

(1) את הבסיס הגדול של הטרפז.

(2) את שוק הטרפז.


(3) את אלכסון הטרפז.

ב. מצא את היחס בין רדיוס המעגל החסום בטרפז לבין רדיוס המעגל החוסם את הטרפז.

ובין רדיוס המעגל החוסם את הטרפז.

נוריד אnek מ- A שחתוך את DC ב- G , ונקז מ- B שחותך את DC ב- H . בטרפז $ABHG$ ולכן $AB \parallel DC$ והוא מלבן. לפי משפט 77 "המשיק למעגל מאונך לרדיס בנקודת ההשקה", האnek מנוקודת ההשקה של מעגל עם AB עבר דרך מרכז המעגל והוא ניצב לנקודת ההשקה עם DC . מכאן $AG = EF = BF = 2r$

נסמן $.AB = GH = b_2$ הטרפז שווה-שוקיים ולפי משפט 39 "בטרפז שווה-שוקיים הזרויות שליד אותו בסיס שוות זו לזו", $\angle DAG = \angle CBH = 20^\circ$, $\angle ADC = \angle BCD = 70^\circ$. ביחד עם $DG = HC = b_1$. נסמן $\triangle ADG \cong \triangle BCH$, ונקבל $.AD = BC$ $DC = 2b_1 + b_2$ שנסמן b .



סעיף א

(1) נחפש משפט הקשור צלעות של מרובע עם הרדיוס של המרגל החוסם. משפט 57 "מרובע קמור" חוסם מעגל אם ורק אם סכום שתי צלעות נגדיות שווה לסכום שתי הצלעות הנגדיות האחרות":

$$2s = b + b_2 = (b_1 + b_2 + b_1) + b_2 = 2(b_1 + b_2).$$

ממשוואה זו נחשב משוואת נוספות שיערו לנו בהמשך:

$$s = b_1 + b_2, \quad b = 2b_1 + b_2 = s + b_1.$$

לפי ההגדרות של הפונקציות הטריגונומטריות ב- $\triangle ADC$, נוכל לקשר את r לצלעות:

$$\begin{aligned} \tan 70 &= \frac{2r}{b_1} \\ \sin 70 &= \frac{2r}{s} \\ b &= s + b_1 \\ &= 2r \left(\frac{1}{\sin 70} + \frac{1}{\tan 70} \right) \\ &= 2.856r. \end{aligned}$$

$$.s = \frac{2r}{\sin 70} = 2.128r \quad (2)$$

(3) האלכסון הוא היתר של $\triangle BDH$ שצלעותיו ידועים:


$$\begin{aligned} DB^2 &= (b_1 + b_2)^2 + (2r)^2 = s^2 + (2r)^2 \\ &= \left(\frac{2r}{\sin 70} \right)^2 + 4r^2 \\ DB &= 2r \sqrt{\left(\frac{1}{\sin 70} \right)^2 + 1} = 2.921r. \end{aligned}$$

סעיף ב

במבחן ראשון נראה שכדי להשתמש במשפט 56 "ניתן לחסום מרובע במעגל אם ורק אם סכום זוג זוויות נגדיות שווה ל- 180° ", אבל אין בו צורך. שימו לב שהמרכז של המרגל החוסם לא חופף את המרכז של המרגל החוסם, כך שאינן אפשר לחשב R , הרדיוס של המרגל החוסם, כמרחק ממרכז המרגל החוסם לאחת מקודקודיו הטרפז. במקום זה נשתמש בחוק הסינוסים ב- $\triangle BCD$:

$$\begin{aligned} 2R &= \frac{DB}{\sin BCD} = \frac{2.921r}{\sin 70} \\ \frac{r}{R} &= \frac{2 \cdot \sin 70}{2.921} = 6.434. \end{aligned}$$

5.11 קיז' תשע"ה מועד א



נתון טרפז $(BC \parallel AD)$ $ABCD$

הנקודה E נמצאת על המשך AD כך ש- $CE \parallel BD$

(ראה ציור).

$$\angle CAD = 2 \angle DBC$$

$$DB = 1.8AC$$

א. מצא את גודל הזווית $\angle CEA$.


ב. נתון גם כי שטח המשולש ACE הוא 87.873 סמ^2 .

מצא את גובה הטרפז.

סעיף א

נסמן זוויות לפי זוויות מתחלפות, מתאימות ופנימיות:

$$\angle BCE = \angle BDE = 180 - \alpha$$



משולש- $\triangle CEA$ לאחר שנovich ש- $CE \parallel BD$, $BC \parallel AD$. נתון $CD = DB = 1.8a$, ולפי משפט 29 "מרובע שבו כל זוג זוויות נגדיות שוות הוא מקבילית", $BCED$ היא מקבילית.

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{1.8a}{\sin 2\alpha} = \frac{1.8a}{2 \sin \alpha \cos \alpha}$$

$$\cos \alpha = 0.9$$

$$\alpha = 25.84.$$

סעיף ב


נרשום את כל הזוויות ב- $\triangle ACE$:

$$\angle CEA = \alpha = 25.84$$

$$\angle CAE = 2\alpha = 51.68$$

$$\angle ACE = 180 - 3\alpha = 102.48.$$

מהתרשים אפשר לראות ש- $S_{\triangle ACE}$ מורכב מסכום השטחים של שני משולשים עם אותו גובה:



$$\begin{aligned}
 S_{\triangle ACE} &= \frac{1}{2}(b_1 + b_2)h \\
 b_1 &= \frac{h}{\tan 2\alpha} \\
 b_2 &= \frac{h}{\tan \alpha} \\
 S_{ACE} &= \frac{1}{2}h^2 \left(\frac{1}{\tan 2\alpha} + \frac{1}{\tan \alpha} \right) \\
 87.873 &= \frac{1}{2}h^2(6.79 + 2.06) = 1.428h^2 \\
 h &= 7.846.
 \end{aligned}$$


פתרונות אחר משמש בנוסחה הטריגונומטרית לשטח:

$$\begin{aligned}
 S_{\triangle ACE} &= \frac{1}{2} \cdot AC \cdot CE \cdot \sin \angle ACE \\
 &= \frac{1}{2} \cdot a \cdot 1.8a \cdot \sin(180 - 3\alpha) \\
 87.873 &= 0.87873a^2
 \end{aligned}$$

$$a = 10$$

$$h = a \sin 2\alpha = 7.846.$$

5.12 חורף תשע"ה



אלכסוני הטרפו ABCD מאונכים זה זה
ונפגשים בנקודה M.

E היא אמצע השוק (ראה צייר).
נתון: $DC = a$, $\angle ACB = \beta$, $\angle ACD = \alpha$

a. הבע באמצעות a , α ו- β את האורך של ME.


נתון: $a = 6.6$, $\frac{\tan \beta}{\tan \alpha} = \frac{1}{3}$

b. מצא את האורך של AB.

נתון גם: $BM = 1.3$ ס"מ

g. מצא את הזווית DCB.

נמן את הצלעות בתרשים.



סעיף א

$\triangle BMC$ ישר זוית ונתנו ש- ME הוא תיכון ליתר. לפי משפט 86 "במשולש ישר זוית התיכון ליתר שווה למחצית היתר". $ME = c/2$. לפי הגדרות של הפונקציות הטריגונומטריות:

$$\cos \beta = \frac{b}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{a}$$

$$\begin{aligned} ME &= \frac{c}{2} = \frac{b}{2 \cos \beta} \\ &= \frac{a \cos \alpha}{2 \cos \beta}. \end{aligned}$$

סעיף ב

למשולשים $\triangle AMB, \triangle CMB$ צעיף משותף $MB = e$. לפי ההגדרות של הfonקציות הטריגונומטריות:

$$\begin{aligned}\tan \beta &= \frac{e}{b} \\ \sin \alpha &= \frac{e}{d} \\ AB = d &= \frac{e}{\sin \alpha} = \frac{b \tan \beta}{\sin \alpha} \\ &= \frac{a \cos \alpha \tan \beta}{\sin \alpha} = \frac{a \tan \beta}{\tan \alpha} \\ &= 6.6 \cdot \frac{1}{3} = 2.2.\end{aligned}$$

הוכחת אחרת משתמשת במשולשים דומים. לפי זוויות מתחלפות, $\angle BAM = \angle MCD = \alpha$. ו- $\triangle ABM \sim \triangle DMC$:

$$\begin{aligned}\tan \beta &= \frac{e}{b} \\ \tan \alpha &= \frac{f}{b} \\ \frac{e}{f} &= \frac{\tan \beta}{\tan \alpha} = \frac{1}{3} \\ \frac{d}{a} &= \frac{e}{f} = \frac{1}{3} \\ AB = d &= \frac{6.6}{3} = 2.2.\end{aligned}$$

סעיף ג

ממשפט פיתגורס $a^2 - f^2 = 5.32$

$$\tan \beta = \frac{e}{b} = \frac{1.3}{5.32} = 0.2444$$


$$\beta = 13.73$$

$$\tan \alpha = 3 \tan \beta = 0.7331$$

$$\alpha = 36.24$$

$$\angle DCB = \alpha + \beta = 49.97.$$

5.13 קיז תשע"ד מועד ב



במשולש ישר-זווית $\angle ACB = 90^\circ$ $\angle ACB$

נקודה G היא אמצע הnick'ב AC .

נקודה P נמצאת על AB כך ש- $BG = 4 \cdot PG$ (ראה ציור).

רדיוס המעגל החוסם את המשולש CGB הוא R .

נתון: $GC = BC$

א. הבע באמצעות R את רדיוס המעגל

הchosם את המשולש ACB .

ב. הבע באמצעות R את מרחק הנקודה P


ממרכז המעגל החוסם את המשולש ACB .

מצאתים שאלת זו קשה יחסית לשאלות אחרות בטריגונומטריה. אתן שתי הוכחות לסעיף ב.

נסמן $M = R$, M' = מרכז המעגל החוסם את $\triangle CGB$ והרדיוס שלו, ו- R', M' = מרכז המעגל החוסם

את $\triangle ACB$ והרדיוס שלו. שימו לב שבתרשים הנקודות M, M', M' נמצאות על הצלעות GB, AB, AC נמצאות על הצלעות AB, BC, CA .

אבל אנו חייבים להוכיח את הטענה אם רוצים להשתמש בה.



סעיף א

נשתמש בחוק הסינוסים ובמשפט פיתגורס, תחילת עבור $\triangle CGB$:


$$R = \frac{BG}{2 \sin 90^\circ} = \frac{BG}{2} = \frac{\sqrt{a^2 + a^2}}{2} = \frac{a}{\sqrt{2}},$$

ואחר כך עבור $\triangle ACB$:

$$R' = \frac{AB}{2 \sin 90^\circ} = \frac{AB}{2} = \frac{\sqrt{a^2 + (2a)^2}}{2} = \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)a = \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)\sqrt{2}R = \sqrt{\frac{5}{2}}R.$$

סעיף ב

$GM' \perp AC$, מרכז המעלג החוסם את $\triangle ACB$, הוא נקודת החיתוך של האנכים האמצעיים $CH = HB = \frac{a}{2}$. $M'H \perp BC$



אם נמצא משולש שuberו נוכל לחשב שני צלעות והזווית הכלואה ביניהם, נוכל להשתמש בחוק הקוסינוסים. ננסה את $\triangle MPM'$. נסמן את $CG \parallel MH$ ולכן לפי משפט 91 "משפט תאלס המורחבי: ישר המקביל לאחת מצלעות המשולש חותך את שתי הצלעות האחרות או את המשכיהן בקטועים פרופורציוניים":

$$\frac{GC}{MH} = \frac{CB}{HB} = \frac{a}{a/2} = 2,$$

$$\text{אבל } GCHM' \text{ הוא מלבן, ולכן: } MH = \frac{a}{2}.$$

$$y = MM' = M'H - MH = GC - MH = a - \frac{a}{2} = \frac{a}{2} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2}R = \frac{R}{\sqrt{2}}.$$

שוב לפי משפט תאלס המורחבי:

$$\frac{GB}{MB} = \frac{GC}{MH} = 2,$$

ולבסוף, $PG = \frac{1}{4}(2x + 2x) = x$. נתון $GB = 4 \cdot PG$, כך $GM = MB$. $\angle CGB = \angle PG$ שנסמך. את x ניתן לחשב לפי משפט פיתגורס ב- $\triangle CGB$: $PM = 4x - (2x) - x = x$

$$\begin{aligned} (4x)^2 &= a^2 + a^2 \\ x &= \frac{1}{\sqrt{8}}a = \frac{1}{\sqrt{8}} \cdot \sqrt{2}R = \frac{R}{2}. \end{aligned}$$

$\triangle MHB$ הוא משולש ישר-זווית, כך $\angle BMH = 45^\circ$ ו- $\angle PMM' = 45^\circ$ לפי זוויות קודקודיות. כעת יש לנו מספיק נתונים להשתמש בחוק הקוסינוסים. נסמן $z = PG$.

$$\begin{aligned}
z^2 &= x^2 + y^2 - 2xy \cos \angle PMM' \\
&= \left(\frac{R}{2}\right)^2 + \left(\frac{R}{\sqrt{2}}\right)^2 - 2\left(\frac{R}{2}\right)\left(\frac{R}{\sqrt{2}}\right) \cos 45 \\
&= R^2 \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{R^2}{4} \\
z &= \frac{R}{2}.
\end{aligned}$$


* * *

פתרון אחר משתמש בחוק הקוסינוסים על $\triangle PM'B$, האנך האמצעי לצלע AC חותך את AB ב- M' (בלי להסתמך על M' כמרכז המעגל החסום את $GM' \parallel CB$). $(\triangle ACB)$

תאלס (הרגיל)

$$\frac{AG}{GC} = \frac{AM'}{M'B},$$

$$y = AM' = M'B$$



ולפי פיתגורס ב- $\triangle GCB$

$$\begin{aligned}
(4x)^2 &= a^2 + a^2 \\
x &= \frac{1}{\sqrt{8}}a = \frac{1}{\sqrt{8}} \cdot \sqrt{2}R = \frac{R}{2}.
\end{aligned}$$

לפי פיתגורס ב- $\triangle ACB$:

$$\begin{aligned}(2y)^2 &= (2a)^2 + a^2 \\ y &= \frac{\sqrt{5}}{2}a = \frac{\sqrt{5}}{2} \cdot \sqrt{2}R = \sqrt{\frac{5}{2}}R.\end{aligned}$$

נחשב את הזווית α, β :

$$\sin \alpha = \frac{a}{2y} = \frac{\sqrt{2}R}{2\sqrt{(5/2)}R} = \sqrt{\frac{1}{5}}$$

$$\alpha = 26.57$$


$$\beta = 180 - \angle AGB - \alpha = 180 - 135 - 26.57 = 18.43.$$

נשתמש בחוק הקוסינוסים ב- $\triangle PM'B$:

$$\begin{aligned}z^2 &= (3x)^2 + y^2 - 2 \cdot 3x \cdot y \cdot \cos \beta \\ &= \left(\frac{3R}{2}\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{5}{2}}R\right)^2 - 2 \cdot \frac{3R}{2} \cdot \sqrt{\frac{5}{2}} \cdot 0.9487 \\ &= 0.25R^2 \\ z &= \frac{R}{2}.\end{aligned}$$

אני מעדיף את הפתרון הראשון. אמנם התרשים מעט יותר מסובך אבל החישובים הרבה יותר פשוטים.

5.14 קיז' תשע"ז מועד א



במשולש שווה-שוקיים $\triangle ABC$ ($AB = AC$) הוא תיקון לשוק (ראה ציור).

נתון: $\angle BAC = 50^\circ$.

א. חשב את גודל הזווית הקהה $\angle AMB$.

ממשיכים את BM עד הנקודה D .

נתון גם:

רדיוס המעגל החוסם את המשולש $\triangle ABC$ הוא 10 ס"מ .


רדיוס המעגל החוסם את המשולש $\triangle ABD$ הוא 14 ס"מ .

ב. חשב את זוויות המשולש $\triangle AMD$.

נסמן $\angle BAC = 50^\circ$. נתון $\alpha = \angle AMB$ ובמשולש שווה-שוקיים:

$$\angle ABC = \angle ACB = (180 - 50)/2 = 65^\circ.$$

נחשב $\angle ABM = 180 - 50 - \alpha = 130 - \alpha$



סעיף א

נחפש משולש שעליו אפשר להפעיל את חוק הסינוסים. נתון BM הוא תיקון ל- AC . נסמן את $\triangle ABM$ עם הנעלם a , ונפעיל את משפט הסינוסים על $\triangle ABM$.

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{a/2}{\sin(130 - \alpha)}$$


$$\sin \alpha = 2 \sin(130 - \alpha)$$

$$= 2 \sin 130 \cos \alpha - 2 \sin \alpha \cos 130$$

$$\begin{aligned} &= 1.53 \cos \alpha + 1.29 \sin \alpha \\ \tan \alpha &= \frac{-1.53}{0.29} \\ \alpha &= -79.27^\circ = 100.73^\circ \approx 101^\circ. \end{aligned}$$

בالمושך נעבד עם קירובים למעלה שלמה.

סעיף ב



חסבנו $\angle AMD = 79^\circ$ בסעיף הקודם. נצרך לחשב את $\angle MAD$, $\angle ADM$ והזווית השלישית $\angle ADB$ שתתקבל מסכום הזוויות במשולש. מהתרשים אנו רואים שהצלע AB מול הזווית M הוא $\beta = \angle ADB$ והוא אורך a , ו- AB גם צלע מול $\angle AMB = 101^\circ$. לפי חוק הסינוסים ב- $\triangle ACB$:

$$\begin{aligned} 2R_{ABC} &= \frac{a}{\sin 65} = 2 \cdot 10 \\ a &= 18.126 \\ 2R_{ABD} &= \frac{a}{\sin \beta} = \frac{18.126}{\sin \beta} = 2 \cdot 14 \\ \beta &= 40.34. \end{aligned}$$

. 79° , 40° , 61° הן (בקירוב למעלה שלמה) $\triangle AMD$

5.15 חורף תשע"ד

במשולש ABC האנך האמצעי לצלע BA חותך

את הצלעות BC ו BA בנקודות E ו D בהתאם (ראה ציור).

$$\text{נתון: } \angle ABC = \beta, \angle BAC = \alpha.$$


א. (1) הבע באמצעות α ו β את $\angle EAC$.

$$(2) \text{ הבע באמצעות } \alpha \text{ ו } \beta \text{ את היחס } \frac{CE}{EB}.$$

נתון גם: $\angle BAC$ חוצה-זווית,


$$\beta = 40^\circ, AC = 10 \text{ ס"מ}$$

ב. חשב את הרדיוס של המרجل החסום במשולש ABC.



סעיף א

(1) נתון ש-DE הוא האנך האמצעי ל-AB, ולכן $\triangle AED \cong BED$ לפי צ.ג.צ. נסמן את שאר הזוויות לפי זוויות משלימות וסכום זוויות המשולש, כאשר קיצרנו $\beta' = 90 - \beta$. התשובה היא $\angle EAC = \alpha - \beta$.




(2) נסמן $\angle BAC = \alpha = 90^\circ$. השאלה מבקשת את היחס $\frac{c}{b}$. מהתרשים נראה ש- $EC = c, BE = b$, $AE = b$, $AB = a$, $BC = c$, $\angle AED \cong \angle BED$ ונוכל להשתמש במשפט תאלס, אבל אי אפשר להסתמך על התרשימים מהתרשיים. הרינו ש-:

$$\begin{aligned} \frac{c}{\sin(\alpha - \beta)} &= \frac{b}{\sin(180 - (\alpha + \beta))} \\ \frac{c}{b} &= \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\sin(\alpha + \beta)}. \end{aligned}$$

סעיף ב

המשפט הרלונטי הוא 49 "שלושת חוצי הווית של משולש נחכמים בנקודה אחת, שהיא מרכז המרجل החסום במשולש". נתון חוצה זווית AE ב- A . נבנה חוצה זווית שני. נסמן ב- C כי ידוע $AC = 10$ ו諾כל להשתמש במשפט הסינוסים ב- $\triangle ACF$, כאשר F היא נקודת החיתוך עם חוצה הווית AE , ולכן היא המרכז של המרجل החסום.

נתון ש- $\beta = 40^\circ$ זה מאפשר לנו להשלים זווית בתרשימים:



לפי משפט הסינוסים:


$$\frac{x}{\sin 40^\circ} = \frac{10}{\sin 110^\circ}$$

$$x = 6.84.$$

לא לעזרך כאן! השאלה מבקשת את הרדיוס של המרجل החסום ולא המרחק אל מרכז המרجل.


נוריד אנך מ- F לצלע AC ולחשב: $r = x \sin 30^\circ = 3.42$

כדי להראות את המרجل החסום, צירתי תרשימים חדש עם ערכי זווית מדוייקים:



5.16 חורף תשע"ד (שאלת 6)

בבחינה זו היו שלוש שאלות בפרק השני.



שני מעגלים, גדול וקטן, משיקים מפנים בנקודה A.

נקודה F נמצאת על המעגל הגדל כך שקטע המרכזים

של שני המעגלים נמצא על AF.

חותך את המעגל הקטן בנקודה E.

דרך נקודה B של המעגל הקטן העבירו ישר המקביל

למשיק המשותף לשני המעגלים.

המקביל חותך את המעגל הגדל בנקודה C (ראה ציור).


רדיוס המעגל הגדל הוא R, ורדיוס המעגל הקטן הוא r.

נתון: $\angle FAB = \beta$, $\angle BAC = \alpha$.


א. (1) הבע באמצעות α ו- β את $\angle BCA$. נמק.

(2) הבע רק באמצעות α ו- β את היחס $\frac{AC}{AB}$.

ב. הבע באמצעות α ו- β את היחס $\frac{R}{r}$.



בפתרון השאלה השתמש לעיתים קורבות בקשר בין סינוס לкосינוס במשולש ישר זווית:



$$\sin \theta = \frac{a}{c} = \cos(90 - \theta)$$

$$\cos \theta = \frac{b}{c} = \sin(90 - \theta)$$

סעיף א

$\angle BCA = \gamma = 90 - (\alpha + \beta)$. לכן סכום האזויות החדשות שווה ל- 90° .
נפעיל את חוק הסינוסים פעמיים:

$$\frac{AB}{\sin 90^\circ} = \frac{AD}{\sin(90^\circ - \beta)}$$

$$AD = AB \cos \beta$$

$$\frac{AC}{\sin 90^\circ} = \frac{AD}{\sin \gamma}$$

$$AC = \frac{AB \cos \beta}{\sin(90^\circ - (\alpha + \beta))}$$


$$\frac{AC}{AB} = \frac{\cos \beta}{\cos(\alpha + \beta)}.$$

פתרון אחר מתאפשר מפעולת חוק שסינוסים פעם אחת על $\triangle ABC$

$$\begin{aligned} \frac{AC}{\sin(180^\circ - \alpha - \gamma)} &= \frac{AB}{\sin \gamma} \\ \frac{AC}{AB} &= \frac{\sin(\alpha + \gamma)}{\cos(\alpha + \beta)} \\ &= \frac{\sin(\alpha + 90^\circ - (\alpha + \beta))}{\cos(\alpha + \beta)} = \frac{\cos \beta}{\cos(\alpha + \beta)} \end{aligned}$$

סעיף ב

סביר שנצרך להשתמש בתוצאה של הסעיף הקודם, שכן נחפש קשר בין הקווים AB, AC ו- BC הרדיוסים. נחבר ל- B ו- C נקודות E ו- F . נקבל שני משולשים חסומים במעגלים ונitin להשתמש בנוסחה של חוק הסינוסים עם רדיוס.



פתרון אחר: נתון ש- $\angle F A$ הוא קוטר ("קוטר המרכזים") של המעגל הגדול, ולכן $E A$ הוא קוטר של המעגל הקטן. זווית הנשענת על קוטר היא זווית ישרה, כך ש- $\triangle ACF, \triangle ABE$, הם ישר זווית, וניתן פשוט להשتمמש בהגדרת הפונקציות הטריגונומטריות:

$$\begin{aligned}\cos \beta &= \frac{AB}{2r} \\ \cos(\alpha + \beta) &= \frac{AC}{2R} \\ \frac{R}{r} &= \frac{AC}{2\cos(\alpha + \beta)} \cdot \frac{2\cos\beta}{AB} \\ &= \frac{\cos^2\beta}{\cos^2(\alpha + \beta)}.\end{aligned}$$

המלצות: טריגונומטריה

- חשוב לציר תרשימים **ברורים** ו**גודלים** עדיף עם סרגל ומחוגה. בתחילת הפתרון אנו מסמנים את המידע המתOPERט על הזויות והצלעות ויש לדאוג שייהי מספיק מקום.
- כאשר לשאלה יש מספר סעיפים כדאי לציר תרשימים נפרדים לכל סעיף תוך העמתת מידע לא רלוונטי לאותו סעיף.
- אני מעדיף לסמן זויות עם אותיות יוונית כגון α , ולא על ידי ציון שלושת הנקודות המגדירות אותה $\triangle ABC$, כי קשה יותר לעקוב אחר הנקודות המגדירות את הזויות.
- השימוש זויות ככל האפשר תוך שימוש בסכום הזויות במשולש, ובזויות משילומיות. כדי להקל על החישובים אני משתמש בנעלמים נוספים כדי לקצר ביטויים, למשל, $(\beta + \alpha) - \gamma = 180^\circ$.
- שימוש לב שאין עקבות בסימון A, B, C, D של הקודקודים של משולש או מרובע.
- בשאלות על טריגונומטריה בדרך כלל עדיף להשתמש בנוסחה לשטח משולש:

$$S = \frac{1}{2} \cdot b \cdot c \cdot \sin \alpha,$$

ולא בחישוב של מחצית מכפלת הבסיס והגובה.

- עבור מעגל חסום, המשפט הרלוונטי הוא 54 "במשולש, שלושת האנכים האמצעיים נחתכים בנקודה אחת, שהיא מרכז המעגל החסום את המשולש". ניתן בקלהות למצוא את רדיוס המעגל מחלוקת הסינוסים:


$$2R = \frac{a}{\sin \alpha}.$$

- עבור מעגל חסום, המשפט הרלוונטי הוא 49 "שלושת חוצי הזויות של משולש נחתכים בנקודה אחת, שהיא מרכז המעגל החסום במשולש". אין נסחה עבור רדיוס המעגל אבל אפשר למצוא אותו כארך הגובה מהמרכז לאחד הצלעות.
- טרפזים מאד אהובים על ידי כתבי הבחינות. שננו משפטיים 56 "ניתן לחסום מרובע במעגל אם ורק אם סכום זוג זויות נגדיות שווה ל- 180° " ו-57 "מרובע קמור חסום מעגל אם ורק אם סכום שתי צלעות נגדיות שווה לסכום שתי הצלעות הנגדיות האחרות".
- שימוש לב שהמרכז המעגל החסום לא חופף את מרכז המעגל החסום אלא במקרים מיוחדים כגון משולש שווה-צלעות וריבוע.
- לעיתים קרובות משתמש באזהיות $\sin(\theta) = \sin(180^\circ - \theta)$ ו- $\cos(\theta) = \cos(90^\circ - \theta)$. ראו נספח ג'.
- לעיתים קרובות התשובה לשאלה תהיה ערך ממשי לאזיות או אורך. אני מעדיף להישאר עם נעלמים כל עוד הדבר אפשרי ורק בסוף להשתמש במחשבון כדי לחשב ערכים.

פרק 6 חדו"א שאלה 6

6.1 קיז תשע"ח מועד ב

לפניך הגרפים של הפונקציות $(x) f'$ ו- $(x) f''$ (פונקציית הנגזרת הראשונה ופונקציית הנגזרת השנייה של הפונקציה $(x) f$) בתחום $-2.5 \leq x \leq 2.5$. שני הגרפים עוברים בראשית הצירים.



- א. התאם בין הגרפים I ו- II ובין הפונקציות $(x) f'$ ו- $(x) f''$. נמק.
 ב. (1) כמה נקודות קיצון פנימיות יש לפונקציה $(x) f$ בתחום המתוואר בגרף? נמק את תשובתך.
 (2) כמה נקודות פיתול יש לפונקציה $(x) f$ בתחום המתוואר בגרף? נמק את תשובתך.

- ג. עבור أيזה ערך של x בתחום $\sqrt{3} \leq x \leq -\sqrt{3}$ – שיפוע המשיק לגרף פונקציית הנגזרת, $(x) f'$, הוא מינימלי?
 נתון: $(x) f$ היא פונקציה אי-זוגית.

- ד. סרטט סקיצה של גраф הפונקציה $(x) f$.

נתון: ערך הפונקציה $(x) f$ בנקודת המקסימום שלו הוא t .

- ה. הביע באמצעות t את השטח המוגבל על ידי גראף II ועל ידי חלק השילי של ציר ה- x (השטח המוקווקו בציור).
 ו. נתון: קבועים a , b ו- c ממשיים כך ש- $f(x) = ax^5 + bx^3 + c$.
 מצא את c ואת היחס $\frac{a}{b}$.

סעיף א

נקודות הקיצון של $(x) f'$ הן הנקודות בהן $f''(x) = 0$. גראף II נקודות קיצון ב- $\pm\sqrt{3}$ ובנקודות הללו הגרף I חותך את ציר ה- x . לכן, II הוא הגרף של $f'(x)$ ו- I הוא הגרף של $f''(x)$.

סעיף ב

- (1) הגרף II מתאפס ב- $\pm\sqrt{6}$, אבל ב- 0 היא לא מחליפה סימן ולכן 0 הוא לא נקודת קיצון.
 (2) הנגזרת השנייה מתאפסת בשלוש נקודות $\pm\sqrt{6}$, 0 . בכל שלושת הנקודות הנגזרת הראשונה לא מחליפה סימן, ולכן כלן נקודות פיתול ולא נקודות קיצון.

סעיף ג


הנגזרת השנייה היא שיפוע המשיק לנגזרת הראשונה. בתחום הניתן הערך המינימלי מתקבל ב-1.

סעיף ד

נתון שהפונקציה איזוגית אז $f(0) = 0$.

$$f(0) = f(-0) = -f(0) = 0 \text{ אם } f(x) \text{ איזוגית, אם } a = 0 \text{ או } a = -a.$$

בין 0 ל- $\sqrt{6}$ הנגזרת הראשונה, השיפוע, שלילית (גרף II), ולכן מאפס לערכים שליליים. בסעיף ב חישבנו שיש שתי נקודות פיתול נוספות ב- $\sqrt{6} \approx 2.45$. נתון שהפונקציה איזוגית כך שאפשר לקבל את הערכים עבור $x < 0$ על ידי סימטריה סביב ציר ה- y . הגרף נראה כך:



סעיף ה

מהגרף רואים שהגבולות הם $0, -\sqrt{6}, -\infty$, אבל כדי לנמק. מצאנו בסעיף ב ש- $f'(0) = 0$, ובסעיף ד ראיינו ש- $f'(0) = 0$, כך שציר ה- x תוחם את השטח. האינטגרל הוא:

$$\int_{-\sqrt{6}}^0 0 - f'(x) dx = -f(x)|_{-\sqrt{6}}^0 = -(-f(-\sqrt{6})) = t,$$

כי נקודת המקסימום של $f(x)$ היא ב- $-\sqrt{6}$

סעיף ו

לפי 0, $f(0) = 0$

הנגזרת הראשונה מתאפסת ב- $\pm\sqrt{6}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 5ax^4 + 3bx^2 \\ &= 5a(\pm\sqrt{6})^4 + 3b(\pm\sqrt{6})^2 \\ &= 5a(\pm\sqrt{6})^2 + 3b = 0 \\ \frac{a}{b} &= -\frac{1}{10}. \end{aligned}$$

6.2 קיז תשע"ח מועד א

נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{ax - 1}{\sqrt{ax^2 - 2x + 1}}$. a הוא פרמטר.

נתון: הפונקציה $f(x)$ מוגדרת לכל x .

א. הוכח: $a > 1$.

ענה על סעיף ב. אם יש צורך, הביע באמצעות a .

ב. (1) מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גраф הפונקציה $(x)f$ עם הצירים.

(2) כתוב את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $(x)f$ המקבילות לציר ה- x .

(3) מצא את תחומי העליה והירידה של הפונקציה $(x)f$ (אם יש כאלה).

(4) סרטט סקיצה של גраф הפונקציה $(x)f$.

נתון: $a = 3$.

ג. חשב את השטח המוגבל על ידי גраф הפונקציה $(x)f$, על ידי ציר ה- x , ועל ידי הישרים $x = 2$ ו- $x = \frac{2}{3}$.

ד. (x)g היא פונקציה רציפה המוגדרת לכל x .

נסמן ב- S את השטח המוגבל על ידי גраф הפונקציה $(x)f$, על ידי ציר ה- x ועל ידי הישרים $x = b$ ו- $x = \frac{1}{3}$ ($\frac{1}{3} > b$).

נתון: השטח המוגבל על ידי גраф הפונקציה $(x)f$, על ידי גраф הפונקציה $(x)g$ ועל ידי הישרים $x = b$ ו- $x = \frac{1}{3}$ שווה ל- $2S$ בעברו כל b .

הבע את $(x)g$ באמצעות $(x)f$ בתחום $x > \frac{1}{3}$ (כתוב את שתי האפשרויות). אין צורך להוכיח את השובנה.

סעיף א

נתון שהפונקציה מוגדרת לכל x , ולכן הפולינום במכנה לא יהיה שורשים, כלומר, $x^2 - 0 < 0$ $\Rightarrow 0 < x^2$, וכך $-2 < -4 \cdot a \cdot 1 = 4 - 4a < 0$. כמו כן, אסור שלפולינום יהיה ערכים שליליים כדי שהשורש יהיה מוגדר. לפולינום יש לפחות ערך חיובי אחד, למשל, $x = \frac{1}{2}$, והוא $a > 1$. אם הפולינום לא יכול לקבל ערך אפס, אין נקודות חיתוך עם ציר ה- x ולא יהיו ערכים שליליים.

סעיף ב

(1) $f(0) = \frac{-1}{\sqrt{1}} = -1$ ונקודות החיתוך עם ציר ה- y היא $(-1, 0)$. המכנה חיובי כך שנקודות החיתוך עם ציר ה- x מתקבלות מ- $0 = ax - 1$, והנקודה היא $(\frac{1}{a}, 0)$.

(2) עבור $x \rightarrow +\infty$:

$$\frac{\left(a - \frac{1}{x}\right)}{+\sqrt{a - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{a}{\sqrt{a}} = \sqrt{a}.$$

עבור $x \rightarrow -\infty$:

$$\frac{\left(a - \frac{1}{x}\right)}{-\sqrt{a - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}}} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\frac{a}{\sqrt{a}} = -\sqrt{a}.$$


(3) נחשב את הנגזרת הראשונה:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{a\sqrt{ax^2 - 2x + 1} - (ax - 1) \cdot \frac{1}{2} \cdot (\sqrt{ax^2 - 2x + 1})^{-\frac{1}{2}} (2ax - 2)}{(\sqrt{ax^2 - 2x + 1})^2} \\ &= \frac{a(ax^2 - 2x + 1) - (ax - 1)(ax - 1)}{(\sqrt{ax^2 - 2x + 1})^2 \sqrt{ax^2 - 2x + 1}}. \end{aligned}$$

המכנה חיובי ולכן סימן הנגזרת תלוי בסימן המונה:

$$a^2x^2 - 2ax + a - a^2x^2 + 2ax - 1 = a - 1.$$

וכחנו ש- $a > 1$ ולכן $a - 1 > 0$ והפונקציה תמיד עולה.



סעיף ג

ולכן גבולות האינטגרל הם בחלוקת החיובי של הפונקציה. $\frac{1}{3} < \frac{2}{3}$

$$\begin{aligned} \int_{2/3}^2 \frac{3x - 1}{\sqrt{3x^2 - 2x + 1}} &= \int_{2/3}^2 \frac{2}{2} \left(\sqrt{3x^2 - 2x + 1} \right)' \\ &= \sqrt{3x^2 - 2x + 1} \Big|_{2/3}^2 \\ &= \sqrt{12 - 4 + 1} - \sqrt{\frac{4}{3} - \frac{4}{3} + 1} = 3 - 1 = 2. \end{aligned}$$

סעיף ד

נתון ש- $b > \frac{1}{3}$ כך שבגבולות האינטגרלים בתחום החיובי של הפונקציות. שתי האפשרויות הן $f(x) \geq g(x)$ ו- $g(x) \geq f(x)$.

$$\int(g - f) = \int g - \int f = \int g - S = 2S,$$

ולכן $.g = 3f - \int g = 3S$

$$\int(f - g) = \int f - \int g = S - \int g = 2S,$$

ולכן $.g = -f + \int g = S$

חומר תשע"ח 6.3

$$\cdot \quad g(x) = \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} , \quad f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{\cos x}}$$

ענה על סעיף א' עבור התחום $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi$

א. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$, המאונכות לציר ה- x .

(3) מצא את תחומי העליה והירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

(4) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ענה גם על סעיף ב' עבור התחום $\pi \leq x \leq \frac{\pi}{2}$

ב. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$.

(2) הוכח: $g(x) = -f\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$


(3) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

תוכל להיעזר בתשובה ת'יך על הסעיפים הקודמים.

$$\text{ג.} \quad \text{מצא את ערך הביטוי } \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx . \quad \text{נמק את תשובתך.}$$

הקשת העבה מראה את התחים והקוים מראים איך מתקיים $x - \frac{\pi}{2}$ עבור x על מנת ש- $f(x)$ מתקבל

$$\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6} - \frac{3\pi}{6} = -\frac{2\pi}{6} = -\frac{\pi}{3}, \quad \frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{6} - \frac{3\pi}{6} = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3} .$$



סעיף א'

$-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ מוגדרת אם x מימין לציר ה- y . תחום ההגדרה הוא $f(x)$ (1)

(2)


$$\frac{\sin x}{\sqrt{\cos x}} \xrightarrow{+\frac{\pi}{2}} +\infty, \quad \frac{\sin x}{\sqrt{\cos x}} \xrightarrow{-\frac{\pi}{2}} -\infty .$$

(3)

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \frac{\cos x \sqrt{\cos x} - \sin x \cdot \frac{1}{2}(\sqrt{\cos x})^{-\frac{1}{2}} \cdot (-\sin x)}{\cos x} \\
&= \frac{2 \cos^2 x + \sin^2 x}{2 \cos x \sqrt{\cos x}} \\
&= \frac{\cos^2 x + 1}{2 \cos x \sqrt{\cos x}}.
\end{aligned}$$

בתחומי ההגדרה $\cos x > 0$ ולכן הנגזרת הראשונה תמיד חיובית והפונקציה עולה בכל התחום. שימושו לב שאמ nagzrat תמיד חיובית, היא לא מתאפשרת בתחום כך שאין נקודות קיצון פנימיות.

ביחד עם חישוב האסימפטוטות, ניתן לצייר את גרף הפונקציה:



סעיף ב

- (1) הפונקציה מוגדרת אם $\sin x > 0$ מעלה לציר ה- x . תחום ההגדרה הוא $\pi < x < 0$.
- (2) חיבור או חיסור של $\frac{\pi}{2}$ משנה סינוס לקוסינוס ולהיפך. צריך רק לקבוע את הסימנים (ראו תרשימים לפני סעיף א).


$$f\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)}{\sqrt{\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)}} = \frac{-\cos x}{\sqrt{\sin x}} = -g(x).$$

אפשר גם לחשב לפי הנוסחה לחישור של סינוס וкосינוס:

$$\begin{aligned}
\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) &= \sin x \cos \frac{\pi}{2} - \cos x \sin \frac{\pi}{2} = -\cos x \\
\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) &= \cos x \cos \frac{\pi}{2} + \sin x \sin \frac{\pi}{2} = \sin x.
\end{aligned}$$

(3) הגרף של $g(x)$ מתקבל מהזזה ימינה של $\frac{\pi}{2}$ והפיכת הסימן. למשל:

$$g\left(\frac{\pi}{4}\right) = -f\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2}\right) = -f\left(-\frac{\pi}{4}\right).$$



סעיף ג

התרומה של החלק שלילי של הפונקציה לאינטגרל שווה לתרומה של החלק החובי שלו, ולכן האינטגרל מתאפס.

מי שלא משתמש מהטייעון יכול לחשב.

$$(\sqrt{\cos x})' = \frac{1}{2} \cdot (\sqrt{\cos x})^{-\frac{1}{2}} \cdot (-\sin x) = -\frac{1}{2} \frac{\sin x}{\sqrt{\cos x}},$$

ולכן:

$$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{\sqrt{\cos x}} = -2\sqrt{\cos x} \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} = -2\left(\sqrt{\sqrt{2}/2}\right) - (-2)\left(\sqrt{\sqrt{2}/2}\right) = 0.$$

6.4 קיז' תשע"ז מועד ב

נתונה הפונקציה $f(x) = a - \frac{2}{x-2} + \frac{1}{(x-2)^2}$. a הוא פרמטר.

עננה על סעיף א. הביע את תשובותיך באמצעות a במידת הצורך.

א. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את המשוואות של האסימפטוטות המאונכות לצירים.

(3) מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה), וקבע את סוגן.

(4) מצא את תחומי העליה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

נתון כי גраф הפונקציה $f(x)$ משיק לציר x .

ב. מצא את a .

הציב את הערך של a שמצאת ועננה על הסעיפים ג-ד.

ג. סרטט סקיצה של גраф הפונקציה $f(x)$.

ד. נתונה הפונקציה $g(x) = |f(x) + k|$.

ידעו שגרף הפונקציה $g(x)$ משיק לאסימפטוטה האופקית של גраф הפונקציה $f(x)$.

מצא את k (מצא את שתי האפשרויות). נמק את תשובתך.

סעיף א

(1) תחום ההגדרה הוא $x \neq 2$ כי $x = 2$ מאפס את המכנה של שני גורמים.

(2) כאשר $\infty \pm \rightarrow x$ שני גורמים שוואים לאפס, ולכן האסימפטוטה האופקית היא $y = a$.

כאשר $2 \pm \rightarrow x$ שני גורמים שוואים לאינסוף, ולכן האסימפטוטה האנכית היא $x = 2$.

نبזוק את סימן הפונקציה השואפת לאינסוף. כאשר $2 \rightarrow x$, $\frac{1}{(x-2)^2} \gg \frac{2}{x-2}$ כך $y \rightarrow +\infty$ גם מימין וגם משמאל.

(3)

$$f'(x) = -\frac{2 \cdot -1}{(x-2)^2} + \frac{-2}{(x-2)^3} = 0.$$

הפונקציה לא מוגדרת ב- $x = 2$, כך שאפשר להכפיל את המשווה ב- $(x-2)^3$. קיבל $2 = 2(x-2)$. נקבל $2 = x$. נקודת הקיצון היא $(3, a-1)$.

על ידי הכפלה ב- $(x-2)^2$ וב- $(x-2)^2$ הנגזרת הראשונה היא:

$$f'(x) = \frac{2(x-2)^2 - 2(x-2)}{(x-2)^4} = \frac{2x^2 - 10x + 12}{(x-2)^4}.$$

המכנה חיובי ולכן הסימן של הנזירת השנייה הוא סימן נגזרת המונה $10 - 4x$. ב- $x = 3$, הסימן חיובי והנקודות הקיצון היא מינימום.

דרך אחרת לבדוק אם מדובר במינימום או מקסימום היא באמצעות טבלת עליות וירידות:

x	0	2	2.5	3	4
$f'(x)$	0.75	\times	-0.8	0	0.25
$f(x)$	\nearrow	\times	\searrow	$a - 1$	\nearrow

הנקודה $(3, a - 1)$ היא מינימום.


(4) הפתרון מופיע בטבלה בתת-סעיף הקודם.

סעיף ב

נתנו שערך של $f(x)$ בנקודת המינימום הוא אפס. $a - 1 = 0 \Rightarrow a = 1$.

סעיף ג

לפי טבלת העליות והירידות, הפונקציה עולה עד לאסימפטוטה האנכית, אח"כ יורדת לנקודת המינימום ואח"כ עולה.



(3) האסימפטוטה האופקית היא $y = a = 1$ ונקודת המינימום היא $(3, 0)$

$$\begin{aligned} g(3) &= |f(3) + k| = a = 1 \\ |0 + k| &= 1 \\ k &= \pm 1. \end{aligned}$$

6.5 קיז תשע"ז מועד א

$$\text{נתונה הפונקציה } f(x) = \frac{x - 5}{\sqrt{x^2 - 10x + 24}}$$

- א. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.
- (2) מצא את נקודות החיתוך של גраф הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).
- (3) מצא את האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים.
- (4) מצא את את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).
- (5) סרטט סקיצה של גраф הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $(x+5)$ $g(x) = f(x)$ המקיים:

ב. (1) הוכח ש- $g(x)$ היא פונקציה אי-זוגית.

(2) סרטט סקיצה של גраф הפונקציה $g(x)$.

ג. הסבר מדוע לכל $b < a < 1$ מתקיים השוויון:
 $\int_a^b g(x) dx = \int_{a+5}^{b+5} f(x) dx$

סעיף א

(1) הפונקציה מוגדרת אם המכנה שונה מאפס ואם הביטוי בשורש גדול או שווה לאפס:

$$\begin{aligned} x^2 - 10x + 24 &> 0 \\ (x-4)(x-6) &> 0. \end{aligned}$$

המכפלה חיובית רק אם שני הגורמים גדולים מאפס או שניהם קטנים מאפס. אבל אם $x > 6$ או גם $x < 4$, ולכן הפונקציה מוגדרת כאשר:

$$x < 4 \quad \text{או} \quad x > 6.$$

(2) אם המכנה חיובי והמונה $0 = x - 5$. אבל 5 לא בתחום ההגדרה כך שאין נקודת חיתוך עם ציר x . נחשב את נקודת החיתוך $(0, y)$ עם ציר y :

$$y = f(0) = \frac{0 - 5}{\sqrt{0^2 - 10 \cdot 0 + 24}} = \frac{-5}{\sqrt{24}}.$$

(3) כאשר $x \rightarrow 6^+$ המונה שואף ל $+1$, ובמקרה שורש חיובי שהולך וקטן, ולכן $\infty \rightarrow +\infty$. אבל $x = 6$ היא אסימפטוטה אנכית אחת. באופן דומה, כאשר $x \rightarrow 4^-$, $f(x) \rightarrow -\infty$, ו- $y = 1$ היא אסימפטוטה אנכית שנייה.

כאשר $x \rightarrow +\infty$ המונה שואף ל $+\infty$, ובמקרה $x^2 \gg -10x + 24$, וערך שואף ל $+\infty$. לכן $y = 1$ היא אסימפטוטה אופקית אחת. באופן דומה, כאשר $x \rightarrow -\infty$, $y \rightarrow -1$ היא אסימפטוטה אופקית שנייה.


(4) אי-אפשר מיד להכין טבלה של עליות וירידות, כי אין לנו ידיעות אם יש נקודות קיצון בתחום ההגדרה של הפונקציה. לצורך ראשון נבדוק את ערכו של $f'(x)$. לשם קיצור נסמן $u = x^2 - 10x + 24$:

$$\frac{1 \cdot \sqrt{u} - (x-5) \cdot \frac{1}{2}u^{-\frac{1}{2}} \cdot (2x-10)}{u} = \frac{u - (x-5)(x-5)}{u\sqrt{u}}.$$

u חיובי בתחום ההגדרה וגם \sqrt{u} חיובי, ולכן הסימן או נקודת האיפוס של הנגזרת תלוי רק במונה:

$$u - (x-5)(x-5) = x^2 - 10x + 24 - x^2 + 10x - 25 = -1.$$

בתחום ההגדרה, הנגזרת שלילית (ולא מותאמת), ולכן הפונקציה יורדת בכל תחום ההגדרה.



סעיף ב

(1) פתרון אחד הוא לחשב את $g(x), g(-x)$ ולהראות ש-


$$\begin{aligned} g(-x) &= f(-x+5) = f(5-x) \\ &= \frac{5-x-5}{\sqrt{(5-x)^2 - 10(5-x) + 24}} \\ &= \frac{-x}{\sqrt{25 - 10x + x^2 - 50 + 10x + 24}} \\ &= \frac{-x}{\sqrt{x^2 - 1}}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g(x) &= f(x+5) \\ &= \frac{x+5-5}{\sqrt{(x+5)^2 - 10(x+5) + 24}} \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + 10x + 25 - 10x - 50 + 24}} \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} = -\left(\frac{-x}{\sqrt{x^2 - 1}}\right) = -g(-x). \end{aligned}$$

פתרון מעט יותר מסובך הוא להראות (בצורה ישירה):

$$\begin{aligned}
 g(-x) &= f(-x+5) = f(5-x) \\
 &= \frac{5-x-5}{\sqrt{(5-x)^2 - 10(5-x) + 24}} \\
 &= \frac{-x}{\sqrt{25 - 10x + x^2 - 50 + 10x + 24}} \\
 &= \frac{-x}{\sqrt{(x^2 + 10x + 25) - (10x + 50) + 24}} \\
 &= \frac{-(x+5)-5}{\sqrt{(x+5)^2 - 10(x+5) + 24}} \\
 &= -g(x).
 \end{aligned}$$

(2) הגרף הוא אותו גраф מוז שמאלה חמש יחידות:



סעיף ג

נתון ש- $1 < b-a <$, וכפי שניתן לראות מהגרף, a, b הם בתחום ההגדרה של g . נחשב:

$$\int_a^b g(x)dx = \int_a^b f(x+5)dx = \int_{a+5}^{b+5} f(x)dx.$$

6.6 חורף תשע"ז

$$\text{נתונה הפונקציה } f(x) = \frac{ax^2 + 4x}{x^2 + 3x + b}.$$

a ו- b הם פרמטרים.

נתון: $x = 1, y = 1$, הן אסימפטוטות של הפונקציה.

א. מצא את a ואת b.

ב. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

(2) מצא את נקודות החיתוך של גраф הפונקציה עם הציריים (אם יש כאלה).

(3) האם יש לפונקציה אסימפטוטות נוספת המאונכות לצירים

(מלבד $x = 1, y = 1$) ? הסבר.

(4) מצא את תחומי העליה והירידה של הפונקציה (אם יש כאלה).

ג. סרטט סקיצה של גраф הפונקציה.

ד. עבור אילו ערכי x מתקיים: $|f(x)| = -f(x)$? נמק.

ה. נגדיר $(x^! f)(x) = f^2(x)$.

הראה כי השטח המוגבל על ידי ציר ה- x, על ידי גраф הפונקציה $(x^! f)(x)$

ועל ידי הישר $x = 0.5$ הוא $\frac{1}{3}$. נמק את תשובתך.

סעיף א

נקבל את האסימפטוטה אנכית $x = 1$ כאשר המכנה מתאפס:

$$\begin{aligned} x^2 + 3x + b &= 0 \\ 1^2 + 3 \cdot 1 + b &= 0 \\ b &= -4. \end{aligned}$$

נחשב את האסימפטוטה האופקית $y = 1$. כאשר $x \rightarrow \infty$. נמק:

$$\frac{a + \frac{4}{x}}{1 + \frac{3}{x} - \frac{4}{x^2}} \rightarrow 1,$$

סעיף ב

(1) המכנה מתאפס כאשר:

$$x^2 + 3x - 4 = (x + 4)(x - 1) = 0,$$

ולכן הפונקציה מוגדרת עבור כל x פרט ל- $x = -4, x = 1$.

(2) נציב $x = 0$. המונה מתאפס והמכנה לא מתאפס ולכן נקודת החיתוך עם ציר ה- y היא $(0, 0)$. נציב $y = 0$ ונקבל $0 = x^2 + 4x = x(x + 4)$. ($0, 0$) היא נקודת חיתוך עם שני הציריים. ב- $x = -4$ הפונקציה לא מוגדרת, ולכן אין עוד נקודת חיתוך עם ציר ה- x.

(3) אין עוד אסימפטוטה אופקיות כי לפי החישוב בסעיף א, ה-אסימפטוטה היא $\frac{a}{1}$ ש夷' לה רק פתרון אחד כי a הוא קבוע.

אסימפטוטה אנכית יש כאשר $0 = x^2 + 3x - 4 = (x+4)(x-1)$. אבל $-4 = x$ גם מאפס את המוניה. נצמצם את הפונקציה:

$$\frac{x^2 + 4x}{x^2 + 3x - 4} = \frac{x(x+4)}{(x+4)(x-1)} = \frac{x}{x-1}.$$

כאשר $-4 \rightarrow x$ (בשני הכוונים), ערך הפונקציה שואפת ל- $-\frac{4}{5}$, ולכן אין כאן אסימפטוטה אלא חור.


(4) נחשב את הנגזרת הראשונה, כאשר נתיחס רק למוניה כי המכנה הוא ריבוע ש תמיד חיובי פרט לנקודות של החור והאסימפטוטה:

$$(x^2 + 4x)'(x^2 + 3x - 4) - (x^2 + 4x)(x^2 + 3x - 4)' = -(x+4)^2.$$

(לא רשמתי את כל החישובים הארכיים). ערך זה לא מתאים ותמיד שלילי, ולכן הפונקציה יורדת בכל תחום ההגדרה שלה.

אפשר לומר אם נצמצם את הפונקציה לפי שנחשב את הנגזרת. $1 = \left(\frac{x}{x-1}\right)' = -\frac{1}{(x-1)^2}$, שתמיד שלילי.

סעיף ג'



סעיף ד'

אם נתיחס לגרף, $|f(x)|$ מעביר ערכים מתחת לציר ה- x לערכים מעל לציר, ו- $-f(x)$ – מעביר את כל הערכים לצד השני של ציר ה- x . $|f(x)| = -f(x)$ רק עבור ערכים מתחת לציר ה- x כי רק עבור ערכים אלה מתבצעת אותה פעולה. עבור פונקציה זו הערכים הם $0 \leq x < 1$.

סעיף ה

mseuf ב $f''(x)$ תמיד שלילי ולכן $g(x) = f(x)^2 \cdot f'(x) = 0$ תמיד שלילי או אפס. ראיינו גם ש- $f(0) = 0$, ולכן השטח שיש לחשב נמצא מתחת לציר ה- x ומימין לציר ה- y . נשים לב שגם $(f^3(x))' = 3f^2(x) \cdot f'(x)$, ונוכל לחשב את האינטגרל:

$$\int_0^{0.5} 0 - f^2(x) \cdot f'(x) = -\frac{1}{3} f^3(x) \Big|_0^{0.5} = -\frac{1}{3} f^3(0.5) = -\frac{1}{3} \cdot -1 = \frac{1}{3}.$$

6.7 **קייז תשע"ו** מועד ב

$$\text{נقطה הפונקציה: } f(x) = \frac{2\cos^2 x - 1}{2\cos^2 x}$$

$0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ בתחוםו.

- (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.
 - (2) מצא את האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לציר ה- x (אם יש כאלה).
 - (3) מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה- x (אם יש כאלה).
 - (4) מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

וקבע את סוגן.

$$\therefore -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$$

- (1) הראה שפונקציה $f(x)$ היא זוגית.

- (2) סרטט סקיצה של גרפ' הפונקציה $f(x)$.

ג. מצא את השטח בריבוע הראשון המוגבל על ידי גורף הפונקציה $(x)f$.

על ידי ציר ה- x ועל ידי ציר ה- y.

סעיף א

- (1) הפונקציה לא מוגדרת כאשר המכנה מתאפס. $\cos^2 x = 0$ בתחום כאשר $x = \frac{\pi}{2}$, ולכן בתחום ההגדרה הוא $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$.

- (2) כאשר $x = \frac{\pi}{2}$, המכנה שואף לאפס אבל המונה שואף לערך שונה מאשר מ-1, ולכן היא אסימפטוטה אנכית.

- (3) בתחום ההגדרה המכנה לא מאפס, ולכן נקודות החיתוך הן הנקודות עבורן המונה מתאפס:

$$\begin{aligned} 2 \cos^2 x &= 1 \\ \cos x &= \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

בתחום ההגדלה יש רק פתרון אחד ונקודת הקיצון הוא $(\frac{\pi}{4}, 0)$.

- בתחום ההגדרה $f(x) = 1 - \frac{1}{2\cos^2 x}$ ולכן $\cos x > 0$ חישוב הנגזרת הוא:

$$f'(x) = \left(1 - \frac{1}{\cos^2 x}\right)' = -(-2 \cos x \cdot -\sin x) = -2 \cos x \sin x = 0.$$

(x) f' מתאפס בתחום ההגדרה כאשר $x = 0$ ונקודת הקיצון היא $(\frac{1}{2}, 0)$. סינוס וקוסינוס חיוביים בתחום, ולכן הנגרת שלילית והפונקציה יורדת בכל התחום. נקודת הקיצון היא מקסימום.

אפשרות אחרת היא לחשב את הנגזרת השנייה:


$$f''(x) = (-2 \cos x \sin x)' = -2(-\sin^2 x + \cos^2 x).$$

בנקודת הקיצון $f''(0) = -2 \cdot (-0 + 1) = -2$, $x = 0$ מקסימום.

סעיף ב

$\cos^2(-x) = \cos^2 x$, $\cos(-x) = \cos x$ (1)

(2) המקסימום הוא ב- $(0, \frac{1}{2})$, הfonקציה יורדת בתחום ההגדרה $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$, יש אסימפטוטה אנכית ב- $\frac{\pi}{2}$, והfonקציה זוגית. התרשימים שmotקבל הוא:

**סעיף ג**

הנוסחה $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$ אמנים מופיעה בנוסחאות אבל לא מרבים להשתמש בה, כך שהשאלה עלולה להיות קשה.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{2 \cos^2 x - 1}{2 \cos^2 x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} 1 - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2 \cos^2 x} dx \\ &= x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \frac{1}{2} \tan x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{\pi}{4} - 0 - \frac{1}{2} \tan \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \tan 0 = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

קייז תשע"ו מועד א 6.8

. $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq 0$ בתחום $f(x) = x^2 - \sin(2x)$ נתונה הפונקציה

ענה על ההצעדים שלפניו בעבר התחום הנוכחי.

- . א. מצא את השיפוע הגדול ביותר ואת השיפוע הקטן ביותר של גוף הפונקציה (x) .

. ב. סרטט סקיצה של גוף פונקציית הנגזרת (x') .

. ג. (1) מצא את תחומי הקעירות כלפי מעלה U וככלפי מטה U של גוף הפונקציה (x) .
 . (2) סרטט סקיצה של גוף הפונקציה (x) .

אני ממש לא אוהב את השאלה כי היא מחייבת חישובים רבים עם מחשבונו!


סעיף א

נתחיל עם חישוב הנגזרות:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 - \sin 2x \\ f'(x) &= 2x - 2\cos 2x \\ f''(x) &= 2 + 4\sin 2x. \end{aligned}$$

השאלה מבקשת את נקודות הקיצון של הנגזרת הראשונה ונקבל אותם על ידי חישוב הנקודות בהן הנגזרת השניה מתאפסת:

$$\begin{aligned} 2 + 4 \sin 2x &= 0 \\ \sin 2x &= -\frac{1}{2} \\ 2x &= -\frac{\pi}{6} \\ x &= -\frac{\pi}{12}. \end{aligned}$$



בתחום כי $\frac{\pi}{2} < -\frac{5\pi}{6} < -\frac{\pi}{2}$, אבל $x = \frac{1}{2} \cdot -\frac{5\pi}{6} = -\frac{5\pi}{12} > -\frac{5\pi}{6}$. לכן היא נקודת קיצון של הנגזרת הראשון. לא נמצא $2x = -\frac{5\pi}{6}$ למרות ש- $\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$ מתאים את הנגזרת השנייה, להיזהר.

כדי לבדוק אם הנקודות הקיצון הן מינימום או מקסימום, נחשב את **הנגזרת השנייה** של הנגזרת **הראשונה** שהיא הנגזרת השלישייה של הפונקציה.

$$f''(x) = 2 + 4 \sin 2x$$

$$f'''(x) = 8 \cos 2x$$

$$f'''(-\frac{\pi}{12}) = 8 \cos\left(-2 \cdot \frac{\pi}{12}\right) = 6.93 > 0$$


$$f'''(-\frac{5\pi}{12}) = 8 \cos\left(-2 \cdot \frac{5\pi}{12}\right) = -6.93 < 0.$$

מכאן שהSHIPועם הגדול ביותר נמצא ב- $x = -\frac{5\pi}{12}$, והSHIPועם הקטן ביותר נמצא ב- $x = -\frac{\pi}{12}$. שימו לב שהשאלה מבקשת את ערכי הקיצון של **הSHIPועים** ולא רק איפה הם נמצאים:

$$f'\left(-\frac{5\pi}{12}\right) = 2 \cdot -\frac{5\pi}{12} - 2 \cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = -2.62 + 1.73 = -0.89$$

$$f'\left(-\frac{\pi}{12}\right) = 2 \cdot -\frac{\pi}{12} - 2 \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -0.52 - 1.73 = -2.25.$$

סעיף ב'



סעיף ג'

(1) נקודות הפיתול הן הנקודות בהן הנגזרת השנייה מתאפסת ו- $\left(-\frac{5\pi}{12}, 2.21\right)$ ו- $\left(-\frac{\pi}{12}, 0.569\right)$

עבור הערך $-\frac{5.5\pi}{12}$ שהוא מעט קרוב יותר ל- $-\frac{\pi}{2}$ הנגזרת השנייה היא:

$$f''\left(-\frac{5.5\pi}{12}\right) = 2 + 4 \sin\left(2 \cdot -\frac{5.5\pi}{12}\right) = 0.965 > 0,$$

והפונקציה קעורה כלפי מעלה ב- $-\frac{5\pi}{12} < x < -\frac{\pi}{12}$.


עבור הערך $-\frac{\pi}{4}$ שהוא בין שתי נקודות הפיתול, הנגזרת השנייה היא:

$$f''\left(-\frac{\pi}{4}\right) = 2 + 4 \sin\left(2 \cdot -\frac{\pi}{4}\right) = -2 < 0,$$

והפונקציה קעורה כלפי מטה ב- $x < -\frac{\pi}{12}$
 עברו הערך $-\frac{\pi}{24}$ שהוא מעט קרוב יותר ל-0 הנגזרת השנייה היא:

$$f''\left(-\frac{\pi}{24}\right) = 2 + 4 \sin\left(2 \cdot -\frac{\pi}{24}\right) = 0.965 > 0,$$

והפונקציה קעורה כלפי מעלה ב- $x < 0$
 נקודות הפיתול מסומנות. (2)



6.9 חורף תשע"ו

נתונה הפונקציה $f(x) = a \cdot \sin^2 x + b \cdot \cos(4x)$ בתחום $0 \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ ור' a ור' b הם פרמטרים.

לפונקציה $f(x)$ יש קיצון בנקודת שבה $x = \frac{\pi}{3}$. נתון כי $b < 0$.

א. הבע באמצעות b (במידת הצורך) את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$.

בתחום הנתון, וקבע את סוגן.

ב. סרטט סקיצה של גורף הפונקציה $f(x)$ בתחום הנתון.

ג. סרטט סקיצה של גורף פונקציית הנגזרת $f'(x)$ בתחום הנתון.

ד. (1) מצא את הערך של האינטגרל $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{2\pi}{3}} f''(x) dx$.

(2) בתחום $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$, הגורף של פונקציית הנגזרת השנייה $f''(x)$ חותך את

ציר ה- x בנקודת אחת שבה $x = k$.

בתחום $k \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, השטח המוגבל על ידי הגורף של $f''(x)$, על ידי ציר ה- x ועל ידי הישר $x = \frac{\pi}{2}$, שווה ל- S .

הבע באמצעות S את השטח המוגבל על ידי הגורף של $f''(x)$, על ידי ציר ה- x

�על ידי הישר $x = \frac{2\pi}{3}$ בתחום $k \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$. נמק.

הערה: אין צורך למצוא את $f''(x)$.

שאלת מואוד ארוכה. קצר מפחידה!

סעיף א'

נחשב את הנגזרת הראשונה, נציב $x = \frac{\pi}{3}$, ונבדוק אם היא מתאפשרת?

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2a \sin x \cos x - 4b \sin 4x \\ f'\left(\frac{\pi}{3}\right) &= 2a \sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{3} - 4 \sin \frac{4\pi}{3} \\ &= 2a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} - 4b \cdot \frac{-\sqrt{3}}{2} = 0 \end{aligned}$$

$$a = -4b.$$

השאלה מבקשת את נקודות הקיצון באמצעות b ולכן נציב עבור a :

$$f'(x) = -8b \sin x \cos x - 4b \sin 4x = 0.$$

המשוואת נראית די מסובכת אבל ניתן לפשט אותו על ידי שימוש בנוסחה עבור $\sin(\theta + \theta)$:

$$\begin{aligned} -8b \sin x \cos x - 4b \sin 4x &= -4b(2 \sin x \cos x + \sin(2x + 2x)) \\ &= -4b(\sin 2x + 2 \sin 2x \cos 2x) \\ &= -4b \sin 2x(1 + \cos 2x) = 0. \end{aligned}$$

נבדוק כל אחד משני הגורמים כדי לחפש איפה הם מתאפסים בתחום. כאשר $\sin 2x = 0$ או $\cos 2x = -\frac{1}{2}$. בתחום, האפשרויות הן $x = 0, x = \frac{\pi}{2}, x = \pi, x = \frac{3\pi}{2}, \dots$. מ- $1 + \cos 2x = 0$ יש לנו $x = \frac{\pi}{3}, x = \frac{2\pi}{3}, x = \frac{4\pi}{3}, x = \frac{8\pi}{3}, \dots$. נחשב את נקודות הקיצון:

$$\begin{aligned} f(0) &= -4b \sin^2 0 + b \cos 0 = b \\ f\left(\frac{\pi}{3}\right) &= -4b \sin^2 \frac{\pi}{3} + b \cos \frac{4\pi}{3} = -4b \cdot \frac{3}{4} + b \cdot -\frac{1}{2} = -3.5b \\ f\left(\frac{\pi}{2}\right) &= -4b \sin^2 \frac{\pi}{2} + b \cos \frac{4\pi}{2} = -4b + b = -3b \\ f\left(\frac{2\pi}{3}\right) &= -4b \sin^2 \frac{2\pi}{3} + b \cos \frac{8\pi}{3} = -4b \cdot \frac{3}{4} + b \cdot -\frac{1}{2} = -3.5b. \end{aligned}$$

אליה כל נקודות הקיצון כולל בקצות התחום והפונקציה מוגדרת בכל התחום. נתון $0 < b$, ולכן:


(0, b) מינימום

$\left(\frac{\pi}{3}, -3.5b\right)$ מקסימום

$\left(\frac{\pi}{2}, -3b\right)$ מינימום


$\left(\frac{2\pi}{3}, -3.5b\right)$ מקסימום

סעיף ב



סעיף ג

בארבעת נקודות הקיצון הנגזרת הראשונה היא אפס. מעין הגרף של $f(x)$, השיפוע מתחילה באפס, עולה וاز יורדת שוב לאפס, אח"כ יורדת עוד ועולה, ולבסוף עולה עוד ויורדת.



סעיף ד

(1)

$$\begin{aligned}
 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{2\pi}{3}} f''(x) dx &= f'(x) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{2\pi}{3}} \\
 &= -8b \sin \frac{4\pi}{3} \left(1 + 2 \cos \frac{4\pi}{3}\right) + 8b \sin \frac{2\pi}{2} \left(1 + 2 \cos \frac{2\pi}{2}\right) \\
 &= -8b \cdot -\frac{\sqrt{3}}{2} \left(1 + 2 \cdot -\frac{1}{2}\right) + 8b \sin 0 (1 + 2 \cdot -1) \\
 &= 0 + 0 = 1.
 \end{aligned}$$

(2) ב-(1) חישבנו שהאינטגרל על כל התהום מ- $\frac{\pi}{3}$ ל- $\frac{2\pi}{3}$ הוא 0. השטח הראשון, האינטגרל מ- $\frac{\pi}{2}$ ל- k , הוא S . לכן השטח השני, האינטגרל מ- k ל- $\frac{2\pi}{3}$, הוא $.0 - S = -S$.

6.10 קיז תשע"ה מועד ב

נתונה הפונקציה: $f(x) = \frac{1}{\sin x \cos x}$, ונתון התחום

בתחום הנתון ענה על השעיפים א ו ב.

- א. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.
- (2) האם הפונקציה $f(x)$ היא פונקציה זוגית או אי-זוגית? נמק.
- (3) מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.
- (4) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.
- ב. נתונה הפונקציה $g(x) = f(x) - a$.
- (1) מצא את הערכים האפשריים של a שעבורם יש למשואה $g(x) = 0$ פתרון אחד בלבד.
- (2) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ עבור כל אחד מהערכים של a שמצאת בתת-סעיף ב(1).

סעיף א

(1) הערכים שמאפסים את המכנה הם:

$$\sin 0 = 0, \quad \cos \frac{\pi}{2} = 0, \quad \cos -\frac{\pi}{2} = 0.$$

תחום ההגדרה הוא:

$$-\frac{\pi}{2} < x < 0, \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}.$$

(2) הפונקציה סינוס היא אי-זוגית והפונקציה קוסינוס היא זוגית. המכפלה שלן היא אי-זוגיות.

(3)

$$((\sin x \cos x)^{-1})' = -1 \cdot (\sin x \cos x)^{-2} (\sin x \cos x)'.$$

בתחום ההגדרה המכנה חיובי, כך שנאריך רק לבדוק אם המונה יכול להתאפס.

$$-(\sin x \cos x)' = -(\cos^2 x - \sin^2 x) = (\sin^2 x - \cos^2 x) = 0.$$

נקודות הקיצון הם ערכי מוחלט של סינוס שווה לערך מוחלט של קוסינוס, שהם $\frac{\pi}{4} \pm k \cdot \frac{\pi}{2}$. בתחום ההגדרה:

$$x = \frac{\pi}{4}, \quad y = \frac{1}{(\sqrt{2}/2) \cdot (\sqrt{2}/2)} = 2, \quad x = -\frac{\pi}{4}, \quad y = \frac{1}{(-\sqrt{2}/2) \cdot (\sqrt{2}/2)} = -2.$$


המכנה של הנגזרת הראשונה הוא $(\sin x \cos x)^2$, ערך חיובי בתחום ההגדרה, ולכן, סימן הנגזרת השנייה הוא כסימן הנגזרת של המוניה.

$$(\sin^2 x - \cos^2 x)' = 2 \sin x \cos x - 2 \cos x (-\sin x) = 4 \sin x \cos x.$$

עבור $x = \frac{\pi}{4}$ והנקודה היא מינימום.

עבור $x = -\frac{\pi}{4}$ והנקודה היא מקסימום.


(4)




סעיף ב

(1) למשוואת פתרון אחד אם הגרף משיק לציר ה- x או חותך את הציר במקום אחד בלבד (לא קויה כאן). הגרף משיק כאשר $a = \pm 2$, שמעלה או מוריד את הגרף בשתי ייחיות.

(2)



6.11 קיז' תשע"ה מועד א



נתונה הפונקציה $0 \leq x \leq \frac{3\pi}{4}$ $f(x) = \frac{\sin x}{\cos 2x}$ ונתון התחום
(ראה ציור).

ענוה על הסעיפים א, ב ו-ג עבור התחום הנתון.

א. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $f(x)$.

(3) מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$,


וקבע את סוגן על פי הציור.

ב. סרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

ג. נתונה הפונקציה $g(x) = 2f(x) \cdot f'(x)$. המיקימת:

מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $g(x)$,

על ידי ציר ה- x ועל ידי הישר $x = \frac{\pi}{6}$.



סעיף א

(1) הפונקציה לא מוגדרת כאשר $\cos 2x = 0$. בתחום הנתון, רואים בתרשים שהקוּה עברו $\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$. תחום ההגדרה הוא:

$$0 \leq x < \frac{\pi}{4}, \quad \frac{\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{4}.$$

(2) האסימפטוטות הן בערכי ציר ה- x בהם הפונקציה לא מוגדרת: $x = \frac{3\pi}{4}, x = \frac{\pi}{4}$.

(3) יש נקודת קיצון בקצה התחום $(0, 0)$. נחשב את הנגזרת כדי לחפש את נקודת קיצון הפניםית המופיעיה בתרשים:

$$\left(\frac{\sin x}{\cos 2x} \right)' = \frac{\cos x \cos 2x - \sin x(-2 \sin 2x)}{\cos^2 2x}.$$

בתחום ההגדרה המכנה חיובי כך הנגזרת מתאפס אם המונה יתאפס:

$$\begin{aligned} \cos x \cos 2x + 2 \sin x \sin 2x &= \cos x(\cos^2 x - \sin^2 x) + 2 \sin x \cdot 2 \sin x \cos x \\ &= \cos x(\cos^2 x - \sin^2 x + 4 \sin^2 x) \\ &= \cos x((\cos^2 x + \sin^2 x) + 2 \sin^2 x) \\ &= \cos x(1 + 2 \sin^2 x). \end{aligned}$$

בתחום ההגדרה $\cos x$ מתאפס כאשר $x = \frac{\pi}{2}$, אף פעם לא מתאפס. נקודת הקיצון היא $(\frac{\pi}{2}, -1)$. לפי הظיר מדבר במקסימום מקומי.


סעיף ב

$$f'(x) = \frac{\cos x(1 + 2 \sin^2 x)}{\cos^2 2x}.$$

$$f'(\frac{\pi}{2}) = 0 \text{ ובסעיף הקודם חישבנו } f'(0) = 1$$

המכנה של f' שווה לאפס, והמונה שונה מאפס, ולכן ב- $\frac{\pi}{4}$ יש אסימפטוטה אנכית.

בתרשים הנתון ל-(x) $f(x)$ רואים שהשיפוע (הנגזרת הראשונית של הפונקציה) עולה בין 0 ל- $\frac{\pi}{4}$, ושהיא יורדת בין $\frac{\pi}{4}$ ל- $\frac{3\pi}{4}$. התרשים ל-(x) $f'(x)$ נראה כך:




סעיף ג

$$(f^2(x))' = 2f(x) \cdot f'(x) \text{ ולכן:}$$

$$\int_0^{\pi/6} g(x) dx = \int_0^{\pi/6} 2f(x) \cdot f'(x) dx = f^2(x) \Big|_0^{\pi/6} = \frac{\sin(\pi/6)}{\cos(2\pi/6)} - \frac{\sin 0}{\cos 0} = \frac{1/2}{1/2} - \frac{0}{1} = 1.$$

6.12 חורף תשע"ה



נתונות שתי פונקציות:

$$f(x) = 0.5 \sin(2x) + \cos x$$

$$g(x) = \sin(2x)$$

בתחום $0 \leq x \leq 2\pi$.

בתחום הנתון

הגרפים של הפונקציות

נפגשים בשתי נקודות, A ו- B,

הנמצאות על ציר ה- x, כמתואר בציור.

א. דרך נקודה על ציר ה- x, הנמצאת בין הנקודות A ו- B, מעבירים אנך לציר ה- x.


האנך חותך את הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו- $g(x)$ בנקודות M ו- N.

מצא את האורך המקסימלי של הקטע MN.

ב. דרך נקודה על ציר ה- x, הנמצאת בתחום $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, מעבירים אנך לציר ה- x.

האנך חותך את הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו- $g(x)$ בנקודות K ו- L.

מצא את האורך המקסימלי של הקטע KL.



סעיף א

הgraf המודגש הוא g בגלל המחזוריות, אבל נבדוק על ידי חישוב נקודות החיתוך עם ציר ה- x.

בתחום כאשר $x = 0, \pi/2, \pi, 3\pi/2, 2\pi$ נמש נקודות חיתוך.

נחשב את הנגזרת של ההפרש בין הפונקציות:

$$\begin{aligned} g(x) - f(x) &= \sin 2x - 0.5 \sin 2x - \cos x = 0.5 \sin 2x - \cos x \\ (g(x) - f(x))' &= \cos 2x + \sin x = (1 - 2 \sin^2 x) + \sin x. \end{aligned}$$

נקודות החיתוך של f, g ב- A, B עם ציר ה- x הן נקודות השניה והרביעית של g שהן $\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$. נבדוק:

$$\begin{aligned} f\left(\frac{\pi}{2}\right) &= 0.5 \sin 2 \cdot \frac{\pi}{2} + \cos \frac{\pi}{2} = 0 + 0 = 0 \\ f\left(\frac{3\pi}{2}\right) &= 0.5 \sin 2 \cdot \frac{3\pi}{2} + \cos \frac{3\pi}{2} = 0 + 0 = 0. \end{aligned}$$

נחשב מתי הנגזרת הראשונה של הפרש הפונקציות מתאפסת בתחום $:A = \frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2} = B$

$$2 \sin^2 x - \sin x - 1 = 0$$

$$(2 \sin x + 1)(\sin x - 1) = 0$$

$$\sin x = 1, -\frac{1}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{2}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}.$$

נקודות הקיצון המבוקשת. המשקנה היא שנקודות הקיצון של $g - f$ בין A ל- B היא ב- $x = \frac{7\pi}{6}$ ו- $\frac{11\pi}{6}$. נבדוק שנקודה זו היא באמות מקסימום על ידי חישוב הנגזרת השניה:

$$(1 - 2 \sin^2 x + \sin x)' \Big|_{\frac{7\pi}{6}} = (-4 \sin x + 1) \cos x \Big|_{\frac{7\pi}{6}} = -\left(4 \cdot -\frac{1}{2} + 1\right) \cdot -\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} > 0,$$

ולכן:

$$g\left(\frac{7\pi}{6}\right) - f\left(\frac{7\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \sin \frac{7\pi}{3} - \cos \frac{7\pi}{6} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

הוא האורך המקסימלי של MN .

סעיף ב

נקודות חיתוך של שליליה של פונקציה על ציר ה- x זהים לנקודות החיתוך של הפונקציה (ראו בנספח). לכן נקודות האיפוס של $(f(x) - g(x))'$ הן נקודות האיפוס של $(g(x) - f(x))'$, שהן הערכים עבורם $\sin 2x = 1, -\frac{1}{2}$. בתחום $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$. נחשב:

$$f(0) - g(0) = -(0.5 \sin(2 \cdot 0) - \cos 0) = -(0 - 1) = 1$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) - g\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\left(0.5 \sin\left(2 \cdot \frac{\pi}{2}\right) - \cos \frac{\pi}{2}\right) = -(0 - 0) = 0,$$

והאורך המקסימלי של KL הוא 1 כאשר $x = 0$.

6.13 קיז תשע"ז מועד ב

$$f(x) = x\sqrt{8-x^2}$$

$$g(x) = \sqrt{8x^2 - x^4}$$

א. (1) לשתי הפונקציות יש אותו תחום הגדרה.

מצא את תחום ההגדרה.

(2) מצא את נקודות החיתוך של כל אחת מהפונקציות $f(x)$ ו- $g(x)$ עם הצירים.


ב. מצא את השיעורים של נקודות הקיצון המוחלט של כל אחת מהפונקציות, וקבע את סוגן.

ג. על פי הסעיפים א ו-ב, סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ד. וסרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

לפניך ארבעה גרפים, I-IV.

איזה מהגרפים מתאר את פונקציית הנגזרת $(x)^1 g$? נמק.



סעיף א

(1) הפונקיות מוגדרת כאשר ביטוי בשורש לא שלילי. עבור f אם $0 \leq 8 - x^2$. עבור g אם $0 \leq x^4 - 8$. תחום ההגדרה הוא $-\sqrt{8} \leq x \leq \sqrt{8}$.

עבור f אם $0 \leq 8 - x^2$ ותחום ההגדרה מורכב מ- $x = 0$ ו- $x = \pm\sqrt{8}$. אבל $x = 0$ נמצא בתחום הראשון כך שהוא לא מוסיף ערכים, ותחומי ההגדרה של f, g זהים.

(2) עבור f : אם $x = 0$, $y = 0$, ונקודות החיתוך עם ציר ה- x הן $(0,0)$, $(\sqrt{8},0)$, $(-\sqrt{8},0)$. אם $x = 0$, $y = 0$, ונקודות החיתוך עם ציר ה- y היא $(0,\pm\sqrt{8})$.

עבור g : אם $y = 0$, $x = 0$, עבור אותם ערכים $\pm\sqrt{8}$. ונקודות החיתוך הן אותן נקודות שקיבלו עבור f .


סעיף ב'

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= 1 \cdot \sqrt{8-x^2} + x \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{8-x^2}} \cdot (-2x) \\
 &= \frac{8-2x^2}{\sqrt{8-x^2}} \\
 g'(x) &= \frac{1}{2\sqrt{8x^2-x^4}} \cdot (16x-4x^3) \\
 &= \frac{8x-2x^3}{\sqrt{8x^2-x^4}} = \frac{x(8-2x^2)}{\sqrt{8x^2-x^4}}.
 \end{aligned}$$

פרט ל- $\pm\sqrt{8}$, בוחן הנקודות לא מוגדרות, המכנה חיובי והנגזרות יתאפסו כאשר המונה יתאפס.
 עבור f הנקודות הן $(-2, -4)$, $(2, 4)$. בנקודות הקצה ערכי הfonקציה הם $(\pm\sqrt{8}, 0)$, ולכן $(-2, -4)$ היא מינימום אבסולוטי ו- $(2, 4)$ היא מקסימום אבסולוטי.
 עבור g הנקודות הן $(0, 0)$, $(-2, 4)$, $(2, 4)$. בנקודות הקצה ערכי הfonקציה הם $(\pm\sqrt{8}, 0)$, ולכן $(-2, 4)$, $(2, 4)$ הן מינימום אבסולוטי ו- $(0, 0)$, $(\pm\sqrt{8}, 0)$ הן מקסימום אבסולוטי.

סעיף ג'

נתבוס על תחומי ההגדרה ונקודות הקצה של הfonקציות כדי לצייר את התרשימים:



סעיף ד'

$$g'(x) = \frac{x(8-2x^2)}{\sqrt{8x^2-x^4}}$$

לא מוגדר באפס, ולכן אפשר לפסול IV, III. נחשב מספר ערכים:

x	-2	-1	1	2
$g'(x)$	0	$-(6/7)$	$(6/7)$	0

$g'(x)$ יורדת כאשר מתקרבים לציר ה- y משמאל וגם כאשר מתרחקים מציר ה- y לימין. לכן הגרף I מתאר את הfonקציה.

6.14 קיז תשע"ד מועד א

. $0 \leq x \leq \pi$, $g(x) = \sin(2x)$, $f(x) = 2 \sin^2 x$ בתחום

א. בתחום הנדון מצא:

(1) את שיעורי ה- x של נקודות החיתוך בין הגרפים של שתי הפונקציות.

(2) את נקודות החיתוך של כל אחת משתי הפונקציות עם ציר ה- x .

$$\text{ב. (1)} \quad \text{נתונה הפונקציה} \quad h(x) = x - \frac{\sin(2x)}{2} .$$

$$\text{הראה כי } h'(x) = f(x) .$$

(2) בתחום $\pi \leq x \leq 0$ מצא את השטח הכלוא בין הגרפים

של שתי הפונקציות $f(x)$ ו- $g(x)$.

סעיף א

(1) בזרור שערבי הפונקציות שוויים ב- π , $x = 0$ כי $\sin 0 = \sin \pi = 0$

נחפש פתרונות אחרים כאשר נניח ש- $\sin x \neq 0$ כדי לחלק ב- $\sin x$

$$\begin{aligned} 2 \sin^2 x &= \sin 2x \\ &= 2 \sin x \cos x \\ \sin x &= \cos x \\ x &= \frac{\pi}{4} . \end{aligned}$$

(2) ראיינו ששתי הפונקציות מקבילות ערך אפס ב- π . נחפש ערכים אחרים בתחום.

עבור f : $2 \sin^2 x = 0$ רק כאשר $x = 0$, ולכן אין נקודות חיתוך נוספות עם ציר ה- x .


עבור g : $\sin 2x = 0 + k\pi$, ולכן יש נקודת חיתוך גם ב- $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$.

סעיף ב

(1)

$$\begin{aligned} h(x)' &= \left(x - \frac{\sin 2x}{2}\right)' = 1 - \frac{2 \cos 2x}{2} = 1 - \cos 2x \\ &= 1 - (\cos^2 x - \sin^2 x) = (1 - \cos^2 x) + \sin^2 x \\ &= 2 \sin^2 x = f(x) . \end{aligned}$$

(2) מהתרשים להלן אנו רואים שהשטח מורכב משני קטעים, מ-0 עד $\frac{\pi}{4}$, ומן $\frac{\pi}{4}$ עד π .



בסעיף זה יש מתנה: כדי לחשב את האינטגרל של $f(x)$ נוכל להשתמש בפונקציה $h(x)$ הנתונה:

$$h(x) = x - \frac{\sin 2x}{2} = \int h'(x) = \int f(x).$$

השטח הראשון הוא:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin 2x - f(x)) dx &= \left. \frac{-\cos 2x}{2} - \left(x - \frac{\sin 2x}{2} \right) \right|_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \left(0 - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \right) - \left(-\frac{1}{2} - 0 + 0 \right) = -\frac{\pi}{4} + 1. \end{aligned}$$

השטח השני הוא:

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} (f(x) - \sin 2x) dx &= \left. \left(x - \frac{\sin 2x}{2} \right) - \frac{-\cos 2x}{2} \right|_{\frac{\pi}{4}}^{\pi} \\ &= \left(\pi - 0 + \frac{1}{2} \right) - \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} + 0 \right) = \frac{3\pi}{4} + 1. \end{aligned}$$

השטח הכללי הוא:

$$S = -\frac{\pi}{4} + 1 + \frac{3\pi}{4} + 1 = \frac{\pi}{2} + 2.$$

6.15 חורף תשע"ד

$$\text{נתונה הפונקציה } f(x) = \frac{x^2 + x - a}{x^2 - x + a} \quad \text{. } a \text{ הוא פרמטר גדול מ-1.}$$

הfonקציה $f(x)$ מוגדרת לכל x .

א. (1) מצא את האסימפטוטות של $(x)f$ המקבילות לצירים (אם יש כאלה).

(2) מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של $(x)f$, וקבע את סוגן.

(הבע באמצעות a במידה הצורך).

(3) ידוע כי גרף הפונקציה $(x)f$ חותך את ציר ה- x בשתי נקודות בדיק.

סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $(x)f$.

ב. בתחום $0 \leq x$, השטח המוגבל על ידי הגраф של $(x)f$, על ידי הישר $1 - x =$

$$\text{ועל ידי ציר ה- } x, \text{ שווה ל- } \frac{1}{2}.$$

חשב את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $(x)f$ עם ציר ה- x (מצא ערכים מספריים).

בבחינה זו היו שלוש שאלות בפרק השני לבן מספר השאלה הוא 7 ולא 6.

נתון שהfonקציה מוגדרת לכל x אבל מתחשק לי לוודא שהוא נכון. אם נשווה את המכנה לאפס נקבל משווה ריבועית שפתרונה היא:

$$\frac{1 \pm \sqrt{1 - 4a}}{2}.$$

נתון ש- $1 > a$ אז אין פתרונות ממשיים לשווייה.

סעיף א

(1) הפונקציה מוגדרת לכל x אז אין אסימפטוטות אנכיות.

נחלק את הפונקציה בחזקת הדוללה ביותר ונקבל:

$$\frac{1 + \frac{1}{x} - \frac{a}{x^2}}{1 - \frac{1}{x} + \frac{a}{x^2}}$$

שווה ל 1 כאשר $\infty \rightarrow x$. האסימפטוטה האופקית היא $y = 1$.

(2) נחשב את הנגרת הראשונה:

$$f'(x) = \frac{(2x+1)(x^2-x+a) - (x^2+x-a)(2x-1)}{(x^2-x+a)^2} = \frac{-2x^2+4xa}{(x^2-x+a)^2}.$$

מכנה חיובי ולכן הנגרת תתאפס כאשר $2x^2 = 4ax$. נקודות הקיצון הן:

$$(0, -1), \quad \left(2a, \frac{4a+1}{4a-1}\right).$$


המכנה של הנגזרת הראשונה חיובית ולכן מספיק לבדוק את הסימנים של הנגזרת של המונה:

$$(-2x^2 + 4ax)' = -4x + 4a$$

$b=0$: $x = -4x + 4a$ – חיובי כי נתון $x > 1$, ולכן נקודת הקיצון היא מינימום.

$b=2a$: $x = -8a + 4a = -4a$ – שלילי כי נתון $x > 1$, ולכן נקודת הקיצון היא מקסימום.

(3) קיים מינימום $b=0$ $x = a$ ואסימפטוטה אופקית $b=1 = y$. לפי הנתון שיש שתי נקודות חיתוך עם ציר x , הגרף עולה מנקודת המינימום וושאך לאינסוף $b=1 = y$. נשאר רק להחליט אם נקודת המקסימום היא מעל לאסימפטוטה או מתחתיה. אבל עם $\frac{4a+1}{4a-1} > 1$, $a > 1$ אז נקודת המקסימום נמצאת מעל לאסימפטוטה.



סעיף ב

נחשב את האינטגרל של הנגזרת הראשונה הוא הפונקציה עצמה:

$$\left| \int_{-1}^0 -f'(x) dx \right| = \left| f(x) \Big|_{-1}^0 \right| = |f(0) - f(-1)| = \left| -1 - \frac{-a}{a+2} \right| = \left| \frac{-2}{a+2} \right| = \frac{1}{2}.$$

נתון שהשטח שווה ל- $\frac{1}{2}$ ולכן $a = 2$. ערכי x של נקודות החיתוך הן הפתרונות של:

$$x^2 + x - 2 = 0$$

שহם $x = 1, x = -2$. נקודות החיתוך הן $(1, 0), (-2, 0)$.

פרק 7 חדו"א שאלה 7

7.1 קיז תשע"ח מועד ב

נתונה הפונקציה $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{x}\right)$.

a. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$?

ענה על הסעיפים ב-ה עבור התחום $x \geq \frac{2}{7}$.

b. מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה- x .

c. מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוכן.

d. לפונקציה $f(x)$ יש אסימפטוטה אופקית. מצא את משוואת האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $f(x)$.

e. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ענה על סעיף ו עבור התחום $x > 0$.

f. נסתכל על נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה- x .

לפניך 3 טענות (i)-(iii). אחות מהן נכונה. Aiyo מהן היא הנכונה? נמק.

(i) ככל שמתקרבים ל- $x = 0$, המרחק בין שתי נקודות חיתוך סמוכות הולך וקטן.

(ii) המרחק בין כל שתי נקודות חיתוך סמוכות נשאר קבוע.

(iii) ככל שמתקרבים ל- $x = 0$, המרחק בין שתי נקודות חיתוך סמוכות הולך וגדל.

סעיף א

הפונקציה לא מוגדרת רק כאשר המכנה $0 \neq x$.

סעיף ב

$$\sin\left(\frac{\pi}{x}\right) = 0, \quad \frac{\pi}{x} = k\pi, \quad x = \frac{1}{k}.$$

נבדוק עבור כמה ערכים של $[k, x]$:

$$[1, 1], \quad \left[2, \frac{1}{2}\right], \quad \left[3, \frac{1}{3}\right], \quad \left[4, \frac{1}{4}\right].$$

אבל $\frac{2}{7} < 1$ שבעבור $k \geq 4$, הנקודות מחוץ לתוחום. נקודות החיתוך הן:

$$\left(\frac{1}{3}, 0\right), \quad \left(\frac{1}{2}, 0\right), \quad (1, 0).$$

סעיף ג

$$\left(\sin\left(\frac{\pi}{x}\right)\right)' = \cos\left(\frac{\pi}{x}\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 0.$$

הגורם $-\frac{1}{x^2}$ לא יכול לקבל ערך אפס, ולכן נקודות הקיצון הן הנקודות:

$$\frac{\pi}{x} = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad \frac{1}{x} = \frac{1}{2} + k, \quad x = \frac{2}{1+2k}.$$

נבדוק עבור כמה ערכים של $[k, x]$:

$$[0, 2], \left[1, \frac{2}{3}\right], \left[2, \frac{2}{5}\right], \left[3, \frac{2}{7}\right].$$

ברור שעבור $k \geq 4$ הנקודות מחוץ לתוחום.

לפי הערכים של $f(x)$ אפשר לקבוע את סוג נקודות הקיצון:

$$\text{מקסימום } \left(\frac{2}{7}, -1\right) \quad \text{מקסימום } \left(\frac{2}{5}, 1\right) \quad \text{מינימום } \left(\frac{2}{3}, -1\right) \quad \text{מינימום } (2, 1)$$

אפשר לבדוק לפי נגזרת שנייה. המכנה של הנגזרת הראשונה x^2 חיובית, ולכן מספיק לבדוק את הסימן של הנגזרת של המונה:

$$-\left(\cos\left(\frac{\pi}{x}\right)\right)' = -\left(-\sin\left(\frac{\pi}{x}\right)\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{\sin\left(\frac{\pi}{x}\right)}{x^2}.$$

מכאן שסימן הנגזרת השנייה תלוי בסימן של $-\sin\left(\frac{\pi}{x}\right)$.

$$-\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1, \quad -\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 1, \quad -\sin\left(\frac{5\pi}{2}\right) = -1, \quad -\sin\left(\frac{7\pi}{2}\right) = 1.$$


הסימנים תואמים את קבועות סוג נקודות הקיצון שרשמננו.

סעיף 2

$y = \sin\left(\frac{\pi}{x}\right)$ אסימפטוטה אופקית ב-0. יש אסימפטוטה אופקית ב-

סעיף 3

נקודות הקיצון מסומנות:



סעיף 1

אז ככל שמתקרבים לאפס הערך של k עולה. המרחק בין שתי נקודות חיתוך סמוכות $x = \frac{1}{k}$ והו $\frac{1}{k}, \frac{1}{k+1}$:

$$\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{1}{k(k+1)},$$

וברור שערך זה קטן ככל ש- x מתקרב לאפס ולכון k עולה. המסקנה היא ש-(i) נכון.

7.2 קייז תשע"ח מועד א

$f(x)$ היא פונקציה גזירה, המוגדרת לכל x , כך ש- $f'(x) \neq 0$ לכל x .

א. הוכח שאם הפונקציה $f(x)$ עולה בקטע מסוים, אז הפונקציה $\frac{1}{f(x)}$ יורדת באותו הקטע;

ואם הפונקציה $f(x)$ יורדת בקטע מסוים, אז הפונקציה $\frac{1}{f(x)}$ עולה באותו הקטע.

נתונה הפונקציה $g(x) = \sin^2 x + \cos x + 2$, המוגדרת לכל x .

ב. האם קיים x שבבערו $g(x) = 0$? נמק.

ג. (1) האם הפונקציה $g(x)$ היא פונקציה זוגית? נמק.

(2) הראה שלכל x מתקיים: $g(x) = g(x + 2\pi)$.

(3) מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$ בתחום $\pi \leq x \leq 0$, וקבע את סוגן.

(4) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ בתחום $-\pi \leq x \leq 3\pi$.

נתונה הפונקציה $h(x) = \frac{1}{\sin^2 x + \cos x + 2}$.

ענה על סעיף ד. תוכל להיעזר בתשובה תריך על הסעיפים הקודמים.

ד. (1) מהו תחום ההגדרה של הפונקציה $h(x)$? נמק.

(2) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $h(x)$ בתחום $\pi \leq x \leq -\pi$ – באותה מערכת צירים שבה סרטטת את

גרף הפונקציה $g(x)$.

סעיף א

לכואורה הטיעון ברור מליין אבל כנראה צריך להוכיח באמצעות נגזרות:

$$\left(\frac{1}{f(x)} \right)' = -1 \cdot f(x)^{-2} \cdot f'(x).$$

נתון ש- $f'(x)$ מוגדרת בכל התחומים, ו- $f''(x)$ חיובי בכל התחומים. הסימן של $\left(\frac{1}{f(x)} \right)'$ הפוך מהסימן של $f''(x)$, ולכן אם אחת עולה השנייה יורדת.

סעיף ב

$g(x) = \sin^2 x + \cos x + 2 \geq 1 \cdot \cos x \geq -1 \cdot \sin^2 x \geq 0$

סעיף ג

(1) הפונקציה זוגית, כי \cos זוגית ו- \sin אי-זוגית, אבל \sin^2 זוגית. בחישוב:

$$\sin^2(-x) + \cos(-x) + 2 = (-\sin x)^2 + \cos x + 2 = \sin^2 x + \cos x + 2.$$

$$g(x) = g(x + 2\pi) \text{ ולכן } \sin(x + 2\pi) = \sin x, \cos(x + 2\pi) = \cos x \quad (2)$$

אפשר גם לחשב:

$$\begin{aligned} \sin^2(x + 2\pi) + \cos(x + 2\pi) + 2 &= \\ (\sin x \cos 2\pi + \sin 2\pi \cos x)^2 + (\cos x \cos 2\pi - \sin x \sin 2\pi) + 2 &= \\ \sin^2 x + \cos x + 2. \end{aligned}$$

(3) נחשב את הנגזרת הראשונה:


$$g'(x) = 2 \sin x \cos x - \sin x = \sin x(2 \cos x - 1) = 0.$$

בתוחום $\sin x, 0 \leq x \leq \pi$ מטאפס ב- $x = 0, x = \pi$, ו- $x = -\pi$ מטאפס ב- $\frac{\pi}{3}$. נקודות הקיצון
הו $(0, 3), \left(\frac{\pi}{3}, \frac{13}{4}\right), (\pi, 1)$
נחשב את הנגזרת השנייה:

$$\begin{aligned} g''(x) &= \cos x(2 \cos x - 1) + \sin x(-2 \sin x) \\ &= 2 \cos^2 x - 2 \sin^2 x - \cos x \\ &= 4 \cos^2 x - 1 - \cos x. \end{aligned}$$

בנקודות הקיצון: $g''\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$ והנקודה היא מינימום.
 $g''(0) = 2$ והנקודה היא מקסימום.
 $g''(\pi) = 4$ והנקודה היא מינימום.

(4) לפי נקודות הקיצון נצייר את הגרף עבור $0 \leq x \leq \pi$. לפי (1) הפונקציה זוגית אז הגרף עברו
זהה. לפי (2) הפונקציה מחזורית וניתן להעתיק את הגרף לתוחום $0 \leq x \leq \pi$.



סעיף 2

- (1) עבור כל $x, f(x) > 0$, ולכן $h(x) = \frac{1}{f(x)} > 0$, והפונקציה מוגדרת.
(2) ב- $-\pi \leq x \leq 0$ נחשב את נקודות הקיצון ונחפוץ את תחומי העלייה והירידה לפי סעיף א.

7.3 חורף תשע"ח

נתונה משפחת הפונקציות: $f(x) = \frac{(x-2)^2}{x^2-a}$. $a \neq 4$, $a \neq 0$. a הוא פרמטר,

ענה על סעיף א. הבע באמצעות a במידת הצורך. הבחן בין $0 > a$ ובין $0 < a$ במידת הצורך.

- (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.
- (2) מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.
- (3) מצא את משוואת האסימפטוטה של הפונקציה $f(x)$ המקבילה לציר ה- x .
- (4) מצא את משוואות האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לציר ה- x (אם יש כאלה).

ענה על סעיף ב. הבע באמצעות a במידת הצורך. הבחן בין $4 > a$ ובין $4 < a$ במידת הצורך.

ב. מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

סעיף ג של השאלה מופיע בהמשך.

תחילה התעלמתי מהנתון על הסימן של a זה סיבך אותו.

סעיף א

(1) כאשר $a > 0$, הפונקציה לא מוגדרת עבור $x = \pm\sqrt{a}$, ערכיהם שמאפסים את המכנה. כאשר $0 < a$, המכנה תמיד חיובי והפונקציה מוגדרת לכל x .

$$(2) \text{ חישוב נקודת החיתוך עם ציר ה-} y: f(0) = \frac{(-2)^2}{-a} = -\frac{4}{a}$$

חישוב נקודת החיתוך עם ציר ה- x : כאשר $0 < a$, המכנה חיובית והפונקציה מתאפסת כאשר $x = 2$. נתון $\sqrt{-4} \neq x$, ולכן גם כאשר $0 > a$, המכנה לא מתאפסת והפונקציה מתאפסת ב- $x = 2$:

$$\frac{(x-2)^2}{x^2-a} = \frac{(x-2)(x-2)}{(x-\sqrt{a})(x+\sqrt{a})} .$$

(3) נחלק את המונה והמכנה ב- x^2 (נתון $x \neq 0$):

$$f(x) = \frac{1 - \frac{4x}{x^2} + \frac{4}{x^2}}{1 - \frac{a}{x^2}} \xrightarrow{\pm\infty} 1 .$$

$y = 1$ היא אסימפטוטה אופקית.

(4) אסימפטוטות אנכיות יכולות להימצא רק עבור ערכי x שאינם הפונקציה לא מוגדרת. כאשר $0 < a$ הפונקציה מוגדרת לכל x ואין אסימפטוטה.

כאשר $0 > a$: נתון $\sqrt{-4} \neq a$ כך $\sqrt{-a} \neq 2$, לכן המונה של הפונקציה לא מתאפסת כאשר $x = \sqrt{a}$, $x = -\sqrt{a}$ ויש אסימפטוטות אנכיות $x = \pm\sqrt{a}$

סעיף ב

$$\begin{aligned} f'(x) = \left(\frac{(x-2)^2}{x^2-a} \right)' &= \frac{2(x-2)(x^2-a) - (x-2)^2 \cdot 2x}{(x^2-a)^2} \\ &= \frac{2(x-2)(2x-a)}{(x^2-a)^2}. \end{aligned}$$

נקודות הקיצון הן $(2, 0)$ ו- $\left(\frac{a}{2}, \frac{a-4}{a}\right)$.

נחשב את הסימן של הנגזרת של המונה של הנגזרת הראשונה:

$$(2(x-2)(2x-a))' = 8x - 2a - 8.$$

לפי ההנחה ב שאלה נבדוק בנפרד עבור ערכים חיוביים ושליליים של a .


עבור $a > 4$, $2 \cdot 2 - 2a - 8 = 2(4 - a) < 0$ וה- $(2, 0)$ היא מקסימום.

עבור $a < 0$ וה- $\left(\frac{a}{2}, \frac{a-4}{a}\right)$ היא מינימום.

עבור $0 < a < 4$ הנטענים מתחלפים וה- $(2, 0)$ היא מינימום ו- $\left(\frac{a}{2}, \frac{a-4}{a}\right)$ היא מקסימום.

סעיף ג

- ג. לפניו שלושה גרפים אפשריים של הפונקציה $f(x)$, כל אחד עבור ערך אחר של a . כתוב מהו תחום הערכים של a המתאים לכל אחד מן הגרפים I-III. נמק את תשובה.




כאשר $a > 4$ נקודות הקיצון ב- $(2, 0)$ היא מקסימום כפי שモופיע בגרף I.

כאשר $a < 0$ הפונקציה מוגדרת כל x כפי שモופיע בגרף II.

כאשר $0 < a < 4$ נקודות הקיצון ב- $(2, 0)$ היא מינימום, ויש אסימפטוטות ב- $x = \pm\sqrt{-a}$ כפי שモופיע בגרף III.

7.4 קיז תשע"ז מועד ב



סעיף א

הgraf I מתאפס בנקודת C שם לגרף II יש נקודת מקסימום. Graf I מתאפס ב- $(0,0)$ שם לגרף II יש נקודת מינימום. לכן, II הוא graf של $f(x)$ ו- I הוא graf של $f'(x)$.

סעיף ב

בנקודת פיתול הנגזרת השנייה מתאפסת:

$$\begin{aligned} f''(x) &= 1 \cdot (x+b)^3 + x \cdot 3(x+b)^2 = (x+b)^2(4x+b) \\ f''(-1) &= (b-1)^2(b-4) = 0 \\ b &= 4, \end{aligned}$$

כי נתון $b > 1$.

סעיף ג

הערך המקסימלי יתקבל כאשר הנגזרת של ההפרש מאפסת:

$$\begin{aligned}(f(x) - f'(x))' &= f'(x) - (x(x+4))^3)' \\&= x(x+4)^3 - (1 \cdot (x+4)^3) + x \cdot 3(x+4)^2) \\&= (x+4)^2(x^2 - 4) = 0.\end{aligned}$$

פתרונות הם $x_D = 1 - \sqrt{5}$, $x_C = -4$, $x = -4$, $x = \pm 2$.

נבדוק:

$$4 < -2 < 1 - \sqrt{5} = -1.24.$$

7.5 קייז תשע"ז מועד א

$$\text{נתונה הפונקציה } f(x) = \frac{2 \sin x}{\cos^3 x}$$

- א. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.
 (2) מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.
 (3) מצא את האסימפטוטות האנכיות של הפונקציה $f(x)$.
 (4) מצא את תחומי העליה והירידה של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה).

ב. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ בתחום $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$.

$$\text{ג. נתון: } 0 < a < \frac{\pi}{2}$$

השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה $f(x)$, הישר $a = x$ וציר ה- x שווה ל-1.
 מצא את a .


סעיף א

- (1) הפונקציה מוגדרת כאשר המכנה לא מתאפס, כאשר $\pi n \pm \frac{\pi}{2} \neq x$.
 (2) נקודות החיתוך עם ציר ה- x הן כל הנקודות עבורן $\sin x = 0$ ו- $\cos x \neq 0$, כלומר $\pi n \pm \frac{\pi}{2}$.
 כאשר $0 = x = y$ והנקודה היא גם נקודת חיתוך עם ציר ה- y .
 (3) כאשר $\pi n \pm \frac{\pi}{2} = x$, הפונקציה לא מוגדרת כי המכנה מתאפס והמונה לא מתאפס, ולכן אין אסימפטוטות אנכיות. אין אסימפטוטה אופקית: ככל שה- $|x|$ גדול, כל פעם שהוא מתקרב ל- $\pi n \pm \frac{\pi}{2}$, הפונקציה לא חסומה.

(4)

$$f'(x) = \left(\frac{2 \cos x \cdot \cos^3 x - (2 \sin x \cdot 3 \cos^2 x \cdot -\sin x)}{\cos^6 x} \right) = \frac{2 \cos^2 x + 6 \sin^2 x}{\cos^4 x},$$

כאשר צימצמנו $\cos^2 x$ בתחום ההגדרה. כל הגורמים בביטוי חיוביים ולכן הפונקציה עולה בכל תחום ההגדרה.

סעיף ב**סעיף ג**

$$\int_0^a \frac{2 \sin x}{\cos^3 x} dx = \cos^{-2} x \Big|_0^a = \frac{1}{\cos^2 a} - \frac{1}{1^2} = 1.$$

$a = \frac{\pi}{4}$, והפתרון היחיד בתחום $0 < a < \frac{\pi}{2}$ הוא $\cos a = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

7.6 חורף תשע"ז

נתונה הפונקציה: $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}}$, a הוא פרמטר.

ענה על הסעיפים א-ו עבור $0 < a$. הביע את תשובותיך באמצעות a במידת הצורך.

- א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.
- ב. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.
- ג. מצא את תחומי העליה והירידה של הפונקציה (אם יש כאלה).
- ד. סרטט סקיצה של גраф הפונקציה ($f(x)$).
- ה. (1) רשם את האסימפטוטות המאונכות לצירים של גраф הנגזרת ($f'(x)$).
 (2) סרטט סקיצה של גраф הנגזרת ($f'(x)$).

ו. מצא את ערך הביטוי: $\int_{2a}^{3a} f(x) dx + \int_{-3a}^{-2a} f(x) dx$

ענה על סעיף ז' עבור $a = 0$.

- ז. (1) מצא את תחום ההגדרה של ($f(x)$).
- (2) סרטט סקיצה של גраф הפונקציה ($f(x)$).

סעיף א

הפונקציה לא מוגדרת כאשר המכנה מתאפס $x = \pm a$, או כאשר הביטוי בשורש שלילי a .
 תחום ההגדרה היא $x > a, x < -a$ שהוא $|x| > a$.

סעיף ב

המכנה תמיד חיובי אבל x במונה גורם להסימן של האסימפטוטות האכניות להיות תלויות בכיוון ההתקרבות לנקודות בהן הפונקציה לא מוגדרת. כאשר $x \rightarrow +\infty, f(x) \rightarrow +\infty$, וכאשר $x \rightarrow -\infty, f(x) \rightarrow -\infty$.

$$\frac{\frac{x}{\sqrt{x^2}}}{\sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}}} = \frac{\frac{x}{|x|}}{\sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}}} = \pm 1.$$

האסימפטוטה האופקית היא $y = 1$ כאשר $x > a$ ו- $y = -1$ כאשר $x < -a$.

סעיף ג


נבדוק את הסימן של הנגזרת הראשונה:

$$f'(x) = 1 \cdot (x^2 - a^2)^{-\frac{1}{2}} + x \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) (x^2 - a^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2x = \frac{-a^2}{(x^2 - a^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

המכנה חיובי והמונה שלילי, לכן הנגזרת שלילי והפונקציה יורדת בכל תחום ההגדרה שלה.


סעיף 2

יש לנו את האסימפטוטות מסעיף ב, ומסעיף ג' אנו יודעים שהפונקציה תמיד יורדת. הגרף הוא:



סעיף 3

- (1) המכנה של $f'(x)$ מתאפסת כאשר $x = \pm a$ ולכן יש אסימפטוטות אנכיות ב- $x = \pm a$. כאשר $\infty \rightarrow x$, המונה חיובי והמכנה שואפת ל $+\infty$, ולכן יש אסימפטוטה אופקית ב- $y = 0$.
- (2) לפי סעיף ג' הנגזרת תמיד שלילי ויש אסימפטוטות ב- $\pm a$. הגרף הוא:




סעיף 1

$$f(-x) = \frac{-x}{(-x)^2 - a^2} = -\frac{x}{x^2 - a^2} = -f(x).$$


הפונקציה אי-זוגית ולכן אינטגרציה של קטעים סימטריים מצד ציר ה- y מוצטבים והסכום = 0.

סעיף 2

$$\text{עבור } 0 \neq x. \text{ כאשר הסימן הוא הסימן של } x. f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2}} = \frac{x}{|x|} = \pm 1 \quad (1) \quad (2)$$



7.7 קייז תשע"ו מועד ב



בສרטוט שלפניך מתואר גраф הפונקציה $(x) \cdot g(x)$.

הfonקציות $(x) \cdot g'(x)$, $g''(x)$

מוגדרות לכל x השונה מד' 0,

ואין להן נקודות קיצון או נקודות פיתול.

הישר $0 = x$ הוא האסימפטוטה האנכית

לכל אחד מן הגרפים של הפונקציות האלה.

א. (1) סרטט סקיצה של גраф פונקציית הנגזרת $(x) \cdot g'(x)$.

נמק את שיקוליך.

(2) סרטט סקיצה של גраф פונקציית הנגזרת השנייה $(x) \cdot g''(x)$. נמק את שיקוליך.

נתון כי השטח המוגבל על ידי הגראף של פונקציית הנגזרת השנייה $(x) \cdot g''(x)$,

על ידי ציר ה- x ועל ידי הישרים $1 = x$ ו- $2 = x$ שווה ל- 5.25.

ב. הישר $1 = x$ חותם את הגראף של פונקציית הנגזרת $(x) \cdot g'(x)$ בנקודה A,

והישר $2 = x$ חותם גראף זה בנקודה B.


מצא את ההפרש בין שיעור ה- y של הנקודה A ובין שיעור ה- y של הנקודה B. נמק.

ג. הביטוי $\frac{a}{x^3} = y$ מתאר אחת מן הפונקציות $(x) \cdot g(x)$, $g'(x)$, $g''(x)$ מוגדרת בנקודה $x = 0$ והוא פרמטר גדול מד' 0.

(1) קבע אייזו מן הפונקציות הביטוי המתאר. נמק את קביעותך.

(2) מצא את הערך של a .

נוח לי להציג את כל שלושת הגרפים במערכת צירים אחת, למרות שאיפיוון הגרפים יתברר רק בהמשך פתרון השאלה. (1) $g(x)$: קו רגיל. (2) $g'(x)$: קו מקווקו. (3) $g''(x)$: קו מנוקד.




סעיף א

- (1) משמאלי לימין עבור ערכים שליליים של x , השיפוע של פונקציה שלילי וירדת תמיד ולכון הנגזרת תמיד שלילית. ערכה של הנגזרת מתחילה קרוב לאפס, יורדת לאט ואז יורדת מהר ושוואפת $-\infty$.–.
- משמאלי לימין עבור ערכים חיוביים של x , השיפוע של פונקציה חיובי ויורדת תמיד ולכון הנגזרת חיובית. ערכה של הנגזרת מתחילה קרוב $+\infty$, יורדת מהר ואז יורדת לאט ושוואפת 0.
- (2) משמאלי לימין עבור ערכים שליליים של x , הנגזרת הראשונה מתנהגות בדיק כמו הפונקציה, ולכון הגרף של הנגזרת השנייה דומה לgraf של הנגזרת הראשונה.
- משמאלי לימין עבור ערכים חיוביים של x , השיפוע של הנגזרת הראשונה שלילי ועולה תמיד ולכון הנגזרת השנייה שלילית. ערכה של הנגזרת השנייה מתחילה קרוב $-\infty$, עולה מהר ואז עולה לאט ושוואפת 0.

סעיף ב

התרשים להלן מראה את $g'(x)$, $g''(x)$ עבור ערכים חיוביים. השטח המתוואר מודגש.



чисוב השטח:

$$S = \int_1^2 -g''(x) dx = -g'(x)|_1^2 = g'(1) - g'(2) = 5.25.$$

אבל זה בדיק ההפרש בין ערך ה- y של נקודת A לבין ערך ה- y של נקודת B .

סעיף ג

- (1) הביטוי לא מתאפס ולכון לא יכול להיות $g(x)$. הביטוי חיובי עבור $0 < x$ ולכון לא יכול להיות $g'(x) = \frac{a}{x^3}$.
- (2) מסעיף ב:

$$\begin{aligned} g'(1) - g'(2) &= 5.25 \\ \frac{a}{1^3} - \frac{a}{2^3} &= \frac{21}{4} \\ a &= \frac{8}{7} \cdot \frac{21}{4} = 6. \end{aligned}$$

7.8 קיז תשע"ו מועד א

נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{ax^3 + 2ax}{\sqrt{x^4 + 4x^2 + 4}}$

a. הוא פרמטר גדול מד' 0.

a. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה (x) .

b. האם הפונקציה (x) היא זוגית או אי-זוגית? נמק.

c. השטח, המוגבל על ידי גרף הפונקציה (x) , על ידי ציר ה- x

ועל ידי הישרים $1 = x$ ו- $-1 = x$, שווה ל- 4.

מצא את הערך של a.

d. נתון כי הפונקציה (x) g מקיימת $(x)^! = g(x)$ מקיימת:

אחד מנוקודות החיתוך בין הגרפים של הפונקציות (x) f ו- (x) g היא

נקודה שבה $x = 0$.

. g(x) = 2x² (1) הראה כי הפונקציה (x) g מקיימת:

. f(x) > g(x) (2) מצא את התוחום שבו מתקיים .

סעיף א

השאלה פשוטה יותר אם נשים לב ש:

$$f(x) = \frac{ax^3 + 2ax}{\sqrt{x^4 + 4x^2 + 4}} = \frac{ax(x^2 + 2)}{\sqrt{(x^2 + 2)^2}} = \frac{ax(x^2 + 2)}{x^2 + 2} = ax.$$

אנחנו משתמשים על העובדה ש- $x^2 + 2 > 0$ כך שניתן לחשב את השורש במכנה ולצמצם את השבר, בלי לשנות את התכונות של הפונקציה.

ברור ש- $f(x)$ מוגדרת לכל x.


סעיף ב

$x^2 + 2$ זוגית כך שהזוגיות תלויות רק בזוגיות של ax . $a(-x) = -(ax)$ והפונקציה אי-זוגית.

סעיף ג

כאן צריך להיזהר. **האנטגרל** של פונקציה אי-זוגית בתחום הסימטרי בין $-k$ ל- k הוא אפס כי התרומה של הערכים החיוביים והשליליים מctrmciim. אבל השטח בתחום על ידי תחום סימטרי כולל את השטח מתחת לציר ה- x והשטח מעל לציר ה- x . עברו פונקציה אי-זוגית, השטחים שווים.

$$S = 2 \int_0^1 ax dx = ax^2 \Big|_0^1 = a = 4.$$



סעיף ۷

$$(1) \quad g(x) = \int g'(x) dx = \int f(x) dx = \int ax dx = \frac{1}{2}ax^2 + c.$$

לפי הנתון על נקודות החיתוך:

$$f(0) = a \cdot 0 = \frac{1}{2} \cdot a \cdot 0^2 + c = g(0),$$


$$\text{ולכן } g(x) = \frac{1}{2} \cdot 4x^2 + 0 = 2x^2.$$

(2)

$$\begin{aligned} f(x) & \stackrel{?}{>} g(x) \\ 4x & \stackrel{?}{>} 2x^2 \\ 2 & > x. \end{aligned}$$

אפשר לצמצם $x = 0$ כי $f(0) = 0 \not> g(0) = 0$
עבור $x < 0$ $f(x) > g(x)$ שיליי ו- $f(x) \not> g(x)$ חיובי, וברור ש- $f(x) > g(x)$ ב- $x < 0$.
 $0 < x < 2$

7.9 חורף תשע"ו



נתונות הפונקציות: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{3-x}}$

$$g(x) = \frac{2x-3}{\sqrt{x(3-x)}}$$

(ראה ציור).

- א. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$, $g(x)$.
ואת תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x) \cdot g(x)$.

- (2) מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים

של הפונקציה $f(x)$,

ואת האסימפטוטות המאונכות לצירים

של הפונקציה $g(x)$.

- ב. מצא את השטח המוגבל על ידי הגרפים

של הפונקציות $f(x)$ ו- $g(x)$, על ידי ציר x ועל ידי הישר $x = 1$.

ג. נתונות הפונקציות: $t(x) = \frac{2x-3}{\sqrt{x(3-x)}} + 2$, $h(x) = \frac{1}{\sqrt{3-x}} + 2$

S_1 הוא השטח המוגבל על ידי הגרפים של הפונקציות $f(x)$ ו- $g(x)$ ועל ידי הישר $x = 2.5$.

S_2 הוא השטח המוגבל על ידי הגרפים של הפונקציות $h(x)$ ו- $t(x)$ ועל ידי הישר $x = 2.5$.

אם השטח S_1 גדול מהשטח S_2 , קטן ממנו או שווה לו? נמק.

סעיף א

(1) $f(x)$: השורש לא שלילי לכן $3 \leq x$. המכנה לא אפשר濂 $3 \neq x$. ביחיד $x < 3$.

(2) $g(x)$: כמו עבור $f(x)$, אבל x בשערש לא יכול להיות אפשר濂. כמו כן, עבור $x < 0$, בగלל $x - 3 < 0$ אנו מקבלים $0 < (3 - x)$, והשורש לא מוגדר. תחום ההגדרה הוא $0 < x < 3$.


(2) אסימפטוטות אנכיות: $x = 3$ מאנפס את המכנה של שתי הפונקציות, ו- $x = 0$ מאנפס גם את $g(x)$. בכל אחד מהערכים האלה המונה לא מתאפשר ולכלם מגדירים אסימפטוטות.

אסימפטוטות אופקיות: שתי הפונקציות לא מוגדרות עבור $x > 3$ ולכן אין אסימפטוטות כאשר $x \rightarrow \infty$. כאשר $x \rightarrow -\infty$, $f(x) \rightarrow 0$, ולכן יש ל- $f(x)$ אסימפטוטה אופקית $y = 0$. הפונקציה $g(x)$ אינה מוגדרת עבור $x < 0$ ולכן אין אסימפטוטה כאשר $x \rightarrow -\infty$.

סעיף ב

שאלה זו ממש לא מוצאת חן בעניין בגלל כמה חישובים רבה!

השטח התחום גם על ידי ציר x וגם על ידי גרף מעט קשה לדמיין, אבל תרשימים גבולות השטח מסומנים בקו עבה, וברור שצורך להחשב בשני חלקים. אחד מ- $x = 1$ ועד נקודת החיתוך של $g(x)$ עם ציר x , והשני, המשך עד לנקודת החיתוך של שתי הפונקציות.



נקודות החיתוך של $g(x)$ עם ציר x : המכנה חיובי בתחום ההגדרה והמונה מתאפס כאשר $x = \frac{3}{2}$
נחשב את נקודות החיתוך של שתי הפונקציות:

$$\frac{1}{\sqrt{3-x}} = \frac{2x-3}{\sqrt{x(3-x)}}.$$

בתחום ההגדרה, x ו- $x-3$ חיוביים. נמצם $\sqrt{3-x} = x$. נקודת החיתוך היא $x = \frac{9}{4}$ ונקבל $(\frac{9}{4}, \frac{2}{\sqrt{3}})$.

נחשב את שני חלקי השטח בנפרד (לא הבאתן את החישובים המילוגיים):

$$S_1 = \int_1^{\frac{9}{4}} \left(\frac{1}{\sqrt{3-x}} - 0 \right) dx = -2\sqrt{3-x} \Big|_1^{\frac{9}{4}} = -2 \left(\sqrt{\frac{3}{2}} - \sqrt{2} \right) = 0.379$$

$$S_2 = \int_{\frac{3}{2}}^{\frac{9}{4}} \left(\frac{1}{\sqrt{3-x}} - \frac{2x-3}{\sqrt{x(3-x)}} \right) dx = -2 \left(\sqrt{3-x} - \sqrt{x(3-x)} \right) \Big|_{\frac{3}{2}}^{\frac{9}{4}} =$$

$$(-1.732 + 2.598) + (2.449 - 3) = 0.315$$

$$S = 0.379 + 0.315 = 0.694.$$

סעיף ג

בניגוד לשאלת בסעיף ב, כאן הצרירים לא תוחמים את השטח. השטח מחושב על ידי ההפרש בערכי הפונקציות, ולכן הוספות קבוע לפונקציות מצטמצם וערך השטח לא משתנה.

7.10 קיז תשע"ה מועד ב

$$\text{נתונה פונקציית הנגזרת } f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}}.$$

הישר $y = \frac{1}{3}x + 3$ חותך את הגרף של הפונקציה $(x)f$ בנקודה שבה $x = 0$.

א. מצא את הפונקציה $(x)f$.

ב. (1) מהו תחום ההגדרה של פונקציית הנגזרת $(x)f'$ ושל הפונקציה $(x)f$?

(2) מצא את האסימפטוטות המקבילות לצירים של פונקציית הנגזרת $(x)f'$.

(3) מצא את נקודות החיתוך של גраф פונקציית הנגזרת $(x)f'$ עם הצירים (אם יש כאלה).

(4) מצא את תחומי העליה והירידה של פונקציית הנגזרת $(x)f'$ (אם יש כאלה).

(5) סרטט סקיצה של גраф פונקציית הנגזרת $(x)f'$.

(6) הוסף לסקיצה שרטוט בתת-סעיף ב (5) סקיצה של גраф הפונקציה $(x)f$.

ג. נתונות שתי משוואות, I ו-II: $\sqrt{x^2 + 9} = k$, I. $\frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}} = k$

נתון כי $k > 0$.

מצא את תחום הערכים של k שעבורם

אין פתרון למשואה I וגם אין פתרון למשואה II.

סעיף א

$$f(x) = \int f'(x)dx = \int \frac{1}{2}(x^2 + 9)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2x dx = (x^2 + 9)^{\frac{1}{2}} + c.$$

לפי הנתון, $f(x) = \sqrt{x^2 + 9}$, ולכן $c = 0$ ולכן $c = 3$.

סעיף ב

(1) $x^2 + 9$ חיובי עבור כל x שכן $f(x)$ מוגדרת עבור כל x .

(2) מוגדרת עבור כל x אז אין אסימפטוטות אנכיות.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\frac{|x|}{x}}{\sqrt{1 + \frac{9}{x^2}}} = \pm 1,$$

לכן $y = 1$ היא אסימפטוטה אופקית כאשר $x \rightarrow +\infty$ ו- $x \rightarrow -\infty$. $y = -1$ היא אסימפטוטה אופקית כאשר $x \rightarrow -\infty$.

(3) על ידי הצגה של $x = 0$ יש נקודת חיתוך ב- $(0, 0)$.

המכנה חיובי שכן $x \neq 0$ רק אם $x \neq 0$ וכך קיבלנו נקודת חיתוך זו.


(4)

$$f''(x) = \frac{1 \cdot \sqrt{x^2 + 9} - x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 9}} \cdot 2x}{x^2 + 9} = \frac{9}{(x^2 + 9)\sqrt{x^2 + 9}}.$$

הנגזרת השנייה תמיד חיובי ולכן הנגזרת הראשונה עולה בכל התחום.

(5, 6) $f(x)$ היא פרבולה עם נקודת מינימום ב- $(0, 3)$.

לפי (3) $f'(x)$ יש נקודת חיתוך ב- $(0, 0)$. לפי (2) יש אסימפטוטות ב- $x = \pm 1$ כאשר השאייה היא $x \rightarrow -\infty$ עבור $x \rightarrow +\infty$, והשאייה היא $x \rightarrow -\infty$ עבור $x \rightarrow -1$.



סעיף 6

הערך הקטן ביותר של $\sqrt{x^2 + 9}$ הוא 3, ולכן אין פתרון למשוואה II כאשר $3 < k < 0$. זה ברור גם מהגרף כי $(0, 3)$ היא נקודת מינימום של $f(x)$.

מהגרף של $f'(x)$ ברור שאין פתרון למשוואה I כאשר $k \geq 1$. אפשר גם בחישוב:

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{x^2 + 9} &= k^2 \\ x &= \frac{3k}{\sqrt{1 - k^2}}. \end{aligned}$$

כדי שניתן להוציא שורש חייב להתקיים $1 < k$, ולכן אין פתרון כאשר $k \geq 1$.
שים לב שהשאלה בבקשתה את התחום בו אין פתרון ל-I וגם ל-II. צירוף שתי התוצאות נותן שאין פתרון לשתי המשוואות כאשר $1 \leq k < 3$.

7.11 קיז תשע"ה מועד א

$$\text{נתונה הפונקציה } f(x) = \frac{(x+2)^2}{(x-1)^3}$$

א. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

(2) מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המאונכות לצירים.

(3) מצא את נקודות החיתוך של גרען הפונקציה עם הצירים.

(4) מצא את נקודות הקיצון של הפונקציה, וקבע את סוגן.

(5) סרטט סקיצה של גרען הפונקציה.

ב. לפונקציה $f(x)$ יש שתי נקודות פיתול בלבד.

על סמך הגרען של הפונקציה $f(x)$, ציין באיזה תחום נמצאת כל אחת מן נקודות אלה.

ג. האם השטח, המוגבל על ידי גרען הפונקציה $f(x)$ ועל ידי הצירים,

גדול מ-4, קטן מ-4 או שווה לו? נמק.

סעיף א

(1) הפונקציה לא מוגדרת כאשר המכנה מתאפס ב- $x = 1$. תחום ההגדרה הוא $x \neq 1$.

(2) כאשר $x = 1$ המכנה מתאפס אבל המונה לא מתאפס, לכן $x = 1$ היא אסימפטוטה אנכית.

$$\begin{array}{r} \frac{x^2}{x^3} + \frac{4x}{x^3} + \frac{4}{x^3} \\ \hline x^3 - \frac{3x^2}{x^3} + \frac{3x}{x^3} - \frac{1}{x^3} \end{array} \xrightarrow{\pm\infty} 0.$$

לכן יש אסימפטוטה אופקית ב- $y = 0$.

$$(3) \text{ כאשר } y = \frac{4}{-1} = -4, x = 0$$

כדי ש- $y = 0$ והמכנה מתאפס רק עבור $x = 1$

נקודות החיתוך הן $(0, -4), (-2, 0)$

$$(4) f'(x) = \frac{2(x+2)(x-1)^3 - (x+2)^2 \cdot 3(x-1)^2}{(x-1)^6} = -\frac{(x+2)(x+8)}{(x-1)^6}.$$


המכנה לא מתאפס בתחום ההגדרה, לכן נקודות הקיצון הן $(-2, 0), \left(-8, -\frac{4}{81}\right)$

המכנה חיובי ולכן סימן הנגזרת השנייה היא סימן הנגזרת של המונה (5).

$-2(x+5) < 0$ ולכן $(-2, 0)$ היא מקסימום.

$\left(-8, -\frac{4}{81}\right)$ ולכן $-2(-8+5) > 0$ היא מינימום.

(5) לא ניתן לראות את כל המידע החשוב בגרף בקנה מידת אמיתית. הباقي שני גרפים, אחד מימין לציר $\text{ה-}y$ מהראה את האסימפטוטות, ואחד משמאלו לציר $\text{ה-}x$ המראה את נקודות הקיצון.



סעיף ב

בין $-\infty$ ל- -8 , השיפוע יורד וاز עולה ויש נקודת פיתול. בין -8 ל- -2 – השיפוע עולה וاز יורד. ויש נקודת פיתול.

סעיף ג

הקו בין $(0, -4)$ לבין $(0, 0)$ תוחם משולש (ישר זווית) שטחו $4 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4$. הגרף נמצא מעל לקו שכן השטח שהוא תוחם פחות מ-4.

בגלל קנה מידת התרשים קשה לראות שהגרף תמיד מעלה לקו המקווקו, אז נבדוק בחישוב. ב- $x = -1$, $f(-1) = -\frac{1}{8} = -0.125$. לפי משולשים דומים, $-1 = x$ חוצה את הבסיס ולכן הנקודה על הימין של המשולש היא $(-2, -1)$. הגרף מעלה לקו כי $-2 > -0.125$.

7.12 חורף תשע"ה

$$f(x) = \sqrt{\frac{x}{1+x^2}} \quad \text{נתונות הפונקציות:}$$

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{3x^2 + 2}}$$

א. מצא עבור כל אחות מהפונקציות:

(1) את תחום ההגדרה.

(2) את האסימפטוטות המאונכות לצירים (אם יש כאלה).

(3) את השיעורים של נקודות הקיצון (אם יש כאלה), וקבע את סוגן.

ב. סרטט במערכת צירים אחד סקיצה של גורף הפונקציה (x) .

סקיצה של גורף הפונקציה $(x) g$, אם ידוע כי הפונקציות נחתכות בנקודה אחת בלבד.

ג. נתונה הפונקציה $k > 0$, $h(x) = g(x) - k$.

עבור אילו ערכים של k אין לפונקציה $(x) h$ נקודות חיתוך עם הפונקציה $(x) f$? נמק.

סעיף א

(1) המכנה של שתי הפונקציות חיובי, ולכן $f(x) g(x)$ מוגדרת עבור כל x . $f(x)$ לא מוגדרת עבור $x < 0$ בגלל ה- x במונה, כך שתחום ההגדרה הוא $x \geq 0$.

(2) אין אסימפטוטות אנכיות כי כל אחות מהפונקציות מוגדרת בכל התחומים שלה.

$$\sqrt{\frac{\frac{x}{x^2}}{\frac{1}{x^2} + 1}} \xrightarrow{+∞} 0,$$

ולכן $y = 0$ היא אסימפטוטה אופקית.

כאשר $\xrightarrow{±∞} x$, המכנה של $g(x)$ שהוא חיובי שואף ל $+∞$, ולכן $y = 0$ היא אסימפטוטה אופקית.

(3)

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2} \left(\frac{x}{1+x^2} \right)^{-\frac{1}{2}} \left(\frac{1 \cdot (1+x^2) - x \cdot (2x)}{x} \right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{1-x^2}{\left(\frac{x}{1+x^2} \right)^{\frac{3}{2}}}. \end{aligned}$$


המכנה חיובי שכן הנזורה מתאפשר כאשר המונה מתאפס $x = \pm 1$. $f'(x)$ לא מוגדרת כאשר $x < 0$ וכן נקודת הקיצון היחיד היא $(1, \sqrt{\frac{1}{2}})$. הסימן של הנזורה השנייה הוא הסימן של הנזורה של המונה של $f'(x)$: $\frac{1}{2} \cdot -2x$ שהוא שלילי עבור כל x בתחום, ולכן נקודת הקיצון היא מקסימום.

הנגזרת הראשונה היא:

$$g'(x) = -\frac{1}{2} \left(3x^2 + 2\right)^{-\frac{3}{2}} \cdot 6x$$

המכנה חיובי שכן הנגזרת מתאפסת כאשר $x = 0$. נקודת הקיצון היא $\left(1, \sqrt{\frac{1}{2}}\right)$. הנגזרת של המונה היא $0 < 3$, ונקודות הקיצון היא מקסימום.

סעיף ב



ההערה "אם ידוע כי הפונקציות תחתכויות בנקודת אחת בלבד" הייתה לי די מוזרה, אבל לאחר מחשבה הבנתי שההערה באה למנוע אפשרות של חיתוך כאשר $x > 1$ וושאך לאינסוף. רציתי להשתכנע שאכן ההערה נכונה. כאשר משווים $f(x) = g(x)$ ומפשטים, מקבלים פולינום ממעלה שלישית:

$$3x^3 - x^2 + 2x - 1 = 0.$$

לא התקשח לי לחפש את הנוסחה (המסובכת) למציאת פתרונות למשוואות ממעלה שלישית, אבל לבסוף שמתי לב שגם $x > 1$ אז $3x^3 - x^2 - 0 > 0$, ולכן לא יכול להיות פתרונות נוספים.

סעיף ג

הערך המינימלי של $f(x)$ הוא 0 , והערך המקסימלי של $g(x)$ הוא $\sqrt{\frac{1}{2}}$. אם לא יהיו נקודות חיתוך בין שתי הפונקציות.

7.13 קיז' תשע"ז מועד ב

$$\text{נתונה הפונקציה } f(x) = \frac{(x-2)^2}{x^2 - 1}.$$

- א. (1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.
- (2) מצא את האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המקבילות לצירים.
- (3) מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.
- (4) מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.
- ב. רק על פי סעיף א, סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.
- ג. רק על פי הסקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$ שרטט, מצא את התחום שבו מתקיים:
פונקציית הנגזרת $f'(x)$ שלילית ופונקציית הנגזרת השנייה $f''(x)$ חיובית.
نمך.

סעיף א

- (1) הפונקציה לא מוגדרת כאשר המכנה מתאפס $x = \pm 1$
 (2) האסימפטוטות האנכיות הן במקומות שהפונקציה לא מוגדרת $x = \pm 1$.
 חישוב האסימפטוטה האופקית:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1 - \frac{4}{x} + \frac{4}{x^2}}{1 - \frac{1}{x^2}} = 1.$$

- (3) כאשר $y = -4, x = 0$
 כאשר $x = 2$ המונה מתאפס והמכנה לא מתאפס.
 נקודות החיתוך הן $(2, 0), (0, -4)$.
 (4) חישוב הנגזרת הראשונה:

$$f'(x) = \frac{2(x-2)(x^2-1) - (x-2)^2 \cdot 2x}{(x^2-1)^2} = \frac{2(2x^2-5x+2)}{(x^2-1)^2}.$$

המכנה חיובי בתחום ההגדרה ולכן נקודות הקיצון הן הפתרונות של:


$$2x^2 - 5x + 2 = (2x-1)(x-2) = 0.$$

המכנה חיובי ולכן סימן הנגזרת השנייה הוא הסימן של המונה של הנגזרת הראשונה. ביטוי זה חיובי עבור $x = 2$, ושלילי עבור $x = \frac{1}{2}$. נקודות הקיצון הן:

$$(2, 0) \text{ מינימום}, \quad \left(\frac{1}{2}, -3\right) \text{ מקסימום}.$$

סעיף ב

בסעיפים הקודמים חישבנו את האסימפטוטות, נקודות החיתוך עם הצירים וונקודות הקיצון. מידע זה מספיק לצייר תרשימים עבור $x < -1$. עבור $x > 1$ נבדוק אם הגרף מעלה לאסימפטוטה האופקית או מתחתיה. $f(-2) = \frac{16}{3} > 1$.



סעיף ג

כדי שהנגזרת הראשונה תהיה שלילית, הפונקציה צריכה לרדת:

$$\frac{1}{2} < x < 1, 1 < x < 2.$$

כדי שהנגזרת השנייה תהיה חיובית, הנגזרת הראשונה חייב לעלות:

$$x < -1, -1 < x < \frac{1}{2}, 1 < x < x_1,$$

כאשר x_1 היא נקודת הפיתולஇ שם מימין ל- $-2 = x$.

החיתוך בין שני התחומים הוא $1 < x < 2$.

7.14 קיז תשע"ז מועד א

נתונה הפונקציה $f(x) = \sqrt{ax^2 + 9}$. a הוא פרמטר גדול מ-0.

- א. (1) מהו תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$?
 (2) הראה כי לפונקציה $f(x)$ אין נקודות פיתול.
- ב. (1) מהו תחום ההגדרה של פונקציית הנגזרת $(x)f'$?
 (2) הביע באמצעות a את האסימפטוטות האופקיות של פונקציית הנגזרת $(x)f'$.
 (3) מצא תחומי עלייה וירידה של פונקציית הנגזרת $(x)f'$ (אם יש כאלה).
 (4) סרטט סקיצה של גרף פונקציית הנגזרת $(x)f'$.
- ג. השטח, המוגבל על ידי הגרף של פונקציית הנגזרת $(x)f'$, על ידי ציר ה- x ועל ידי הישר $x = -4$, שווה ל-2.
- בלי לחשב את הערך של a , חשב את הערך המספרי של $f(-4)$ ואת הערך המספרי של $f(4)$.

סעיף א

(1) הפונקציה לא מוגדר כאשר $0 \leq ax^2 + 9 < a$. נתון $a > 0$ אז הביטוי תמיד גדול מאפס, והפונקציה מוגדרת עבור כל x .

(2) נחשב את הנגזרת הראשונה והנגזרת השנייה:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2}(ax^2 + 9)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2ax = \frac{ax}{\sqrt{ax^2 + 9}} \\ f''(x) &= \frac{a\sqrt{ax^2 + 9} - ax \cdot \frac{ax}{\sqrt{ax^2 + 9}}}{ax^2 + 9} \\ &= \frac{9a}{(ax^2 + 9)\sqrt{ax^2 + 9}}. \end{aligned}$$

(א) הנגזרת השנייה מוגדרת לכל x , ורק (ב) גם המונה וגם המכנה חיובים, ולכן הנגזרת השנייה לא מתאפסת. המסקנה היא שאין נקודות פיתול.


סעיף ב

- (1) $f'(x)$ מוגדרת כאשר $ax^2 + 9 > 0$, כלומר מוגדרת לכל x בבדיקה כמו $f(x)$.
 (2) נחלק את המונה והמכנה ב- $\sqrt{x^2}$:

$$f'(x) = \frac{\frac{ax}{|x|}}{\sqrt{a + \frac{9}{x^2}}} \xrightarrow{\pm\infty} \pm\sqrt{a}.$$

(3) ראיינו בסעיף א' שהנגזרת השנייה תמיד חיובית ולכן הנגזרת הראשונה תמיד עולה.

(4)



סעיף ג'

הaintגרל של הנגזרת של פונקציה הוא הפונקציה עצמה.

$$\int_{-4}^0 0 - f'(x) dx = - \int_{-4}^0 f'(x) dx = -f(x)|_{-4}^0 = -f(0) + f(-4) = 2.$$

קל לחשב ש- $f(-4) = \sqrt{16a+9}$ ו- $f(0) = \sqrt{9} = 3$. הפתוי הוא לחשב את הערך של a אבל השאלה דורשת את הערך של $f(-4)$ בלי לחשב את הערך של a . החישוב אפילו קל יותר:

$$f(-4) = 2 + f(0) = 2 + 3 = 5.$$

הפונקציה זוגית, לכן $f(4) = f(-4) = 5$

מי שמעוניין יכול לחשב את ערכו של a :

$$\sqrt{16a+9} = 2 + 3$$

$$a = 1.$$

7.15 חורף תשע"ד

במשולש שווה-שוקיים $\triangle ABC$ אורך השוק הוא b .


BD הוא גובה לשוק AC . DE הוא אנך לבסיס BC .

סמן $x = \angle BAC$, ומוצא מה צריך להיות הגודל של $\angle BAC$

כדי שאורך האנך DE יהיה מקסימלי.

בתשובה תדיק עד שתיק ספירות אחרות נקודה העשורה.

בבחינה זו היו שלוש שאלות בפרק השני לבן מס' השאלת הוא 8 ולא 7.



נבדק את סימונן האזויות בתרשים. זווית הבסיס $\angle ACB, \angle ABC$ של המשולש שווה-שוקיים הן:

$$\frac{180 - 2x}{2} = 90 - x.$$

במשולש ישר-זווית $\triangle BDC$ $\angle DBC = 90 - (90 - x) = x$.

במבט ראשון נראה שאפשר למצוא את הערך המקסימלי של $DE = e$ על ידי מציאת הנגזרת $e' = (d \sin x)' = d(\sin x)' = d \cos x$. אבל זה לא נכון כי d קבוע ולכן אי אפשר להוציאו מתוך הנגזרת. נתון ש- d קבוע, כך שעلينו למצוא ביטוי ממחצורה $e = b \cdot f(x) = b \cdot d \cos x$.

את החישוב נבצע בשני שלבים, תחיליה נבטא את e כפונקציה של x, d , ואח"כ נבטא את d כפונקציה של x . אפשר להשתמש בחוק הסינוסים, אבל פשוט יותר להשתמש בהגדרת הפונקציות $\triangle BED, \triangle BDA$:

$$\begin{aligned} e &= d \sin x \\ d &= b \sin 2x \\ e &= (b \sin 2x) \sin x \\ &= b(2 \sin x \cos x) \sin x = 2b \sin^2 x \cos x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e' &= 2b(2 \sin x \cos x \cos x + \sin^2 x \cdot (-\sin x)) \\ &= 2b \sin x (2 \cos^2 x - \sin^2 x) = 0. \end{aligned}$$



הנגזרת מתאפסת אם $x = 0, x = 180$ כי $\sin x = 0$ שלא יתכן, וכי אין יכולם להיות זוויות במשולש. הנגזרת גם מתאפסת אם:

$$\begin{aligned} 2 \cos^2 x - \sin^2 x &= 0 \\ \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)^2 &= 2 \\ \tan x &= \pm\sqrt{2} \\ x &= 54.74, 125.26. \end{aligned}$$

אבל $x = 54.74^\circ$ הוא הפתרון האפשרי היחיד.
השאלה מבקשת את ערכו של זוויות $\angle BAC = 2x = 109.47^\circ$.

פרק 8 חדו"א שאלה 8

8.1 קיז תשע"ח מועד ב



סעיף א

נתון שהשטח של המלבן הוא 4 ולכן הצלע האנכית שלו הוא $\frac{4}{a}$. נסמן ב- X נקודת על ציר ה- x , ונסמן את האורך בין X למרכז הצירים ב- a' . לפי ההגדרה של הפונקציה $f(a') = \frac{1}{(a')^2} = \frac{4}{a}$ ו- $a' = \frac{\sqrt{a}}{2}$. נחשב את השטח המבוקש כסכום השטח של המלבן עד הנקודה X והשטח מתחת לפונקציה מ- X ועד ל- $x = a$:

$$\begin{aligned} S &= \frac{4}{a} \cdot \frac{\sqrt{a}}{2} + \int_{\frac{\sqrt{a}}{2}}^a \frac{1}{x^2} dx \\ &= \frac{2}{\sqrt{a}} + (-1) \cdot x^{-1} \Big|_{\frac{\sqrt{a}}{2}}^a \\ &= \frac{2}{\sqrt{a}} - \frac{1}{a} + \frac{1}{\frac{\sqrt{a}}{2}} = \frac{4\sqrt{a} - 1}{a}. \end{aligned}$$


סעיף ב

ברור ש- $S = \frac{4\sqrt{a}-1}{a}$ יורדת בעקבות הכל ש- a עולה, לכן הערך המקסימלי צריך להיות בערך הקטן ביותר של התחום הנתון $a = \frac{1}{4}$. אם רוצים ניתן לחשב את הנגזרת הראשונה:

$$\left(\frac{4\sqrt{a}-1}{a} \right)' = \frac{\left(4 \cdot \frac{1}{2} \cdot a^{-\frac{1}{2}} \cdot a \right) - ((4\sqrt{a}-1) \cdot 1)}{a^2} = \frac{-2\sqrt{a}+1}{a^2},$$

שנתאפסת ב- $a = \frac{1}{4}$

8.2 קייז תשע"ח מועד א



הוא ריבוע שאורך צלעו 6 ס"מ.

K ו L הן נקודות על הצלע AB .

נתון כי הישרים CK ו DL חותכים זה את זה בנקודה E .


הנמצא מחוץ לרכיב ABCD (ראה ציור).

נסמן: $x = LK$

a. הבע באמצעות x את גובה המשולש KLE .

b. עבור أيיה ערך של x סכום שטחי המשולשים ADL , BCK ו KLE הוא מינימלי? נמק.

תוכל להשאיר שורש בתשובהך.



סעיף א

לאחר שנשלים סימונים בתרשيم, אנו רואים ש- $\triangle CDE \sim \triangle KLE$ כי $DC \parallel LK$. בנוסף, נשים לב שהגובה של $\triangle CDE$ הוא $6 + h$. לכן:

$$\begin{aligned} \frac{h}{x} &= \frac{h+6}{6} \\ h &= \frac{6x}{6-x}. \end{aligned}$$

סעיף ב

נחשב את שלושת השטחים:

$$\begin{aligned} S_{\triangle KLE} &= \frac{1}{2} \cdot x \cdot h = \frac{1}{2} \cdot x \cdot \frac{6x}{6-x} \\ S_{\triangle ADL} &= \frac{1}{2} \cdot AL \cdot 6 \\ S_{\triangle BCK} &= \frac{1}{2} \cdot BK \cdot 6. \end{aligned}$$

המצב נראה אבוד כי AL, BK לא ידועים ואין נתונים עליהם. אבל, נשים לב ש- AB הוא צלע של הריבוע ולכן $AL + BK = AB - LK = 6 - x$. לכן סכום השטחי המשולשים הוא:

$$\begin{aligned} S = S_{\triangle KLE} + S_{\triangle ADL} + S_{\triangle BCK} &= \frac{1}{2} \cdot x \cdot \frac{6x}{6-x} + \frac{1}{2} \cdot (6-x) \cdot 6 \\ &= 6 \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{2(x^2 - 6x + 18)}{6-x} \right). \end{aligned}$$

נחשב את נגזרת הראשונה (ללא הקבועים $(6, 2)$, $\frac{1}{2}$):

$$\begin{aligned} S' &= \frac{(2x-6)(6-x) - (x^2 - 6x + 18)(-1)}{(6-x)^2} \\ &= \frac{-x^2 + 12x - 18}{(6-x)^2}. \end{aligned}$$

המכנה חיובי ולכן המונה מתאפס עבורו:

$$x = \frac{-12 \pm \sqrt{144 - 4 \cdot 18}}{-2} = 6 \mp 3\sqrt{2}.$$

הערך $6 - 3\sqrt{2} > 6 + 3\sqrt{2}$ אינו פתרון כי LK הוא קטע של צלע שאורכו 6. נקודת הקיצון היא המכנה של S' חיובי ולכן הסימן של הנגזרת השנייה יהיה הסימן של הנגזרת של המונה של S' עבור נקודת הקיצון. הנגזרת היא $-2x + 12$. עבור נקודת הקיצון:

$$-2(6 - 3\sqrt{2}) + 12 = 6\sqrt{2} > 0,$$

והנקודת הקיצון היא מינימום.

8.3 חורף תשע"ח

$$\text{נתונה הפונקציה } f(x) = \frac{1}{x^3}.$$

העבירו ישר המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה שבה $x = t$.

נתון: $1 \leq t \leq 5$.

המשיק חותך את ציר ה- x בנקודה A ואת ציר ה- y בנקודה B. הנקודה O היא ראשית הצירים.

a. מצא את שיעור ה- x של נקודת ההשקה שעבורו סכום ניצבי המשולש AOB הוא מינימלי.


b. מצא את שיעור ה- x של נקודת ההשקה שעבורו סכום ניצבי המשולש AOB הוא מקסימלי.

אני מודה שהסתובבתי כאן בגלל שלא תירגali מזמן את המשוואת המשווה לקו ישר. נדמה לי שגם הפעם היחידה שהמשווה נדרשת בכל הבחינות הילאי.

סעיף א

ערך הפונקציה חיובית עבור ערכי x חיוביים, ולכן המשיק נמצא בربיע הראשון.

(הערכים בציר ה- y בתרשים הוכפלו פי שמונה כדי לאפשר הצגת הראשים ברור).



הנגזרת של הפונקציה היא $f'(x) = -\frac{3}{x^4}$ לכן הקו המשיק לגרף הפונקציה הוא:

$$y - \frac{1}{t^3} = -\frac{3}{t^4}(x - t).$$

נחשב את הנקודות על הצירים:

$$0 - \frac{1}{t^3} = -\frac{3}{t^4}(x_A - t)$$

$$x_A = \frac{t}{3} + t = \frac{4t}{3}$$

$$y_B - \frac{1}{t^3} = -\frac{3}{t^4}(0 - t)$$

$$y_B = \frac{1}{t^3} + \frac{3}{t^3} = \frac{4}{t^3}.$$

השאלה מבקשת את נקודת הקיצון של:

$$g(t) = x_A + x_B = \frac{4t}{3} + \frac{4}{t^3}.$$

הנגזרת הראשונה והנגזרת השנייה הן:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{4}{3} + \frac{-12}{t^4} \\ g''(x) &= \frac{48}{t^5}. \end{aligned}$$

הנחשב את t כאשר הנגזרת הראשונה מתאפסת:

$$\begin{aligned} g'(t) &= \frac{4}{3} + \frac{-12}{t^4} = 0 \\ t^4 &= \frac{3}{4} \cdot 12 = 9 \\ t &= \pm\sqrt{3}. \end{aligned}$$

נתנו ש- $t > 0$ ולכן נקודת הקיצון היא $t = \sqrt{3}$. הנגזרת השנייה חיובית עבור כל $t > 0$ ולכן נקודת הקיצון היא מינימום.

סעיף ב

אם יש רק נקודת קיצון פנימית אחת שהיא מינימום, אז המקסימום חייב להיות בקצה התוחום.

$$\begin{aligned} g(1) &= \frac{4 \cdot 1}{3} + \frac{4}{1^3} = \frac{16}{3} \\ g(5) &= \frac{4 \cdot 5}{3} + \frac{4}{5^3} = \frac{20}{3} + \frac{4}{125}. \end{aligned}$$

ברור ש- $g(1) < g(5)$ ולכן המקסימום הוא ב- $t = 5$.

8.4 קיז תשע"ז מועד ב


(x) היא פונקציה המוגדרת לכל x .

גרף הפונקציה (x) חותך את ציר ה- y בחלקו השילי.

נקודת החיתוך היחידה של גרף הפונקציה (x) f עם ציר ה- x היא $(\frac{\pi}{2}, 0)$ (ראה ציור).

נתון: השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה (x) f , על ידי הצירים ועל ידי הישר x = 2π

$$(השטח האפור בציור) שווה ל- 10\pi^2 + 16 .$$



$$\text{נתון גם: } \int_0^{2\pi} f(x) dx = 8\pi^2$$

א. מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה (x) f ועל ידי הצירים

(השטח S₁ המסומן בציור).

הfonקציה (x) F היא פונקציה קדומה לפונקציה f . נתון: 0 = F(0)

$$. \text{ ב. מצא את } F(\frac{\pi}{2}) .$$

$$\text{נתון: } f'(x) = 8 \sin x + 8$$

$$. \text{ ג. מצא את } f(x) .$$

בשאלה זו צריך לשים לב להבדל בין חישוב אינטגרל של פונקציה ובין השימוש באינטגרל לחישוב שטח. בתרשים בשאלה, אם מחשבים אינטגרל מ-0 ל-2π, הערכיכם השיליליים עד $\frac{\pi}{2}$ "מורידים" מערך האינטגרל. כאשר מחשבים את השטח $S_1 + S_2$ התרומה של S_1 חיובית ויש לחשב את האינטגרל של השילילה של הפונקציה.

סעיף א

הערך של f(x) שלילי בין 0 ל- $\frac{\pi}{2}$ ולכן:

$$S_1 + S_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} -f(x) dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{2\pi} f(x) dx = 10\pi^2 + 16 .$$

נתון ש:

$$-S_1 + S_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{2\pi} f(x) dx = \int_0^{2\pi} f(x) dx = 8\pi^2 .$$

נחסיר את המשווהה השנייה מהראשונה ונקבל:

$$S_1 = \pi^2 + 8 .$$

סעיף ב


$$-S_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = F|_0^{\frac{\pi}{2}} = F\left(\frac{\pi}{2}\right) - F(0) = F\left(\frac{\pi}{2}\right) = -(\pi^2 + 8).$$

סעיף ג

$$\text{נתון } f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \int f'(x) dx = \int (8 \sin x + 8) dx \\ &= -8 \cos x + 8x + c \\ f\left(\frac{\pi}{2}\right) &= -8 \cos \frac{\pi}{2} + 8 \cdot \frac{\pi}{2} + c = 0 \\ c &= -4\pi \\ f(x) &= -8 \cos x + 8x - 4\pi. \end{aligned}$$

8.5 קייז תשע"ז מועד א



בציר שלפניך מתואר גרף הפונקציה $f(x) = -x^2 + 2x + c$ בתחום האיד-שליליות שלה.

A ו B הן נקודות החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה- x .

נתון: $(t > 0) \quad x_B = 2t, x_A = -t$
א. מצא את t ואת c .

M היא נקודת החיתוך של ציר הסימטריה של הפרבולה עם ציר ה- x .

K היא נקודת כלשה עלי גרף הפונקציה $f(x)$ מעל לציר ה- x .

מנקודה K הורידו אנך לציר ה- x , החותך את הקטע AB בנקודה L .

ב. מצא עבור אילו שיעורי x של הנקודה K שטח המשולש KLM הוא מקסימלי.
מצא את שני הפתרונות האפשריים.

תוכל להשאיר שורש בתשובהך.

סעיף א

נציב את הביטויים הנתונים עבור A, B ונקבל שתי משוואת בשני נעלמים t, c שנוכל לפתור:

$$\begin{aligned} -(2t)^2 + 2(2t) + c &= 0 \\ -(-t)^2 + 2(-t) + c &= 0 \\ t(6t - 3) &= 0 \\ t &= 2. \end{aligned}$$

פסלנו את הפתרון $t = 0$ כי נתון $t > 0$. נחשב את c :

$$\begin{aligned} -(-2)^2 + 2(-2) + c &= 0 \\ c &= 8. \end{aligned}$$

הfonקציה היא $f(x) = -x^2 + 2x + 8$.

סעיף ב

נקודות החיתוך של ציר הסימטריה של הפרבולה עם הפונקציה היא נקודות המקסימום של $f(x) = -x^2 + 2x + 8$. מהנגזרת הראשונה $f'(x) = -2x + 2 = 0$ מתקבל $x = 1$.
הקודקודים של $\triangle KLM$ הם:

$$\begin{aligned} M &= (1, 0) \\ L &= (x, 0) \\ K &= (x, -x^2 + 2x + 8). \end{aligned}$$

השטח של $\triangle KLM$ הוא:

$$S(x) = \frac{1}{2}(x-1)(-x^2 + 2x + 8),$$

והגזרת הראשונה היא:

$$\begin{aligned} S'(x) &= \frac{1}{2} \cdot -3x^2 + 6x + 6 \\ &= -\frac{3}{2} \cdot (x^2 - 2x - 2). \end{aligned}$$

הנגזרת מתאפסת ב:

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 4 \cdot 2}}{2} = 1 \pm \sqrt{3}.$$

השטחים מקסימליים כי חישוב הנגזרות השניות נותנים:

$$\begin{aligned} S''(x) &= -3(x-1) \\ S''(1 + \sqrt{3}) &= -\sqrt{3} < 0. \end{aligned}$$


הפתרון $1 + \sqrt{3}$ ממתאים למשולש בתרשים.

הפתרון $1 - \sqrt{3}$ ממתאים למשולש הסימטרי משמאלו ל- M . אורך הבסיס יהיה $x - 1$, הסימנים יתהפכו ונקבל שטח חיובי ומקסימלי.

פתרונות אחרים משתמשים במונח "קודקוד הפרבולה". לא נתקלתי בו בספרי לימוד או בבחינות אחרות. עבור פרבולה $ax^2 + bx + c$ ערך ה- x של הקודקוד הוא $\frac{-b}{2a}$. אין צורך לזכור את הנוסחה כי ניתן לשחזר אותה על ידי חישוב הנגזרת:

$$\begin{aligned} f(x) &= ax^2 + bx + c \\ f'(x) &= 2ax + b = 0 \\ x &= \frac{-b}{2a}. \end{aligned}$$

8.6 חורף תשע"ז



נתונה גזרת עיגול BAC שהוא $\frac{1}{6}$ מעיגול שרדיוסו R ומרכזו A .
מנקודה כלשהי P , הנמצאת על הקשת BC ,

הורדיו אנך ל- AC החותך את הרדיוס AC בנקודה L (ראה ציר).

השטח האפור שבציוור הוא השטח הכלוא בין הקשת BC ובין הרדיוסים AB ו- AP , והקטעים LP ו- LC . נתון שהשטח האפור המינימלי הוא $36\pi - 24\pi$.

א. (1) מצא את הזווית PAC שעוברה

השטח האפור שמתקיים הוא מינימלי.

(2) מצא את R .

ב. מהו השטח המקסימלי של המשולש APL ? נמק.

סעיף א

(1) במקום לחשב את השטח האפור שצורה ישירה (משימה שנראית די קשה) נחשב את שטחו כהפרש בין השטח של גזרת המעגל BAC לבין שטח של המשולש $\triangle APL$.

שטח הגזרה הוא ששית משטח המעגל כולל $\frac{1}{6} \cdot \pi R^2$.

שטח המשולש הוא מחצי המכפלת הבסיס AL והגובה PL , אבל ניתן להביע אותם באמצעות הרדיוס R והזווית $AP = R$ $\alpha = \angle PAC$

$$\cos \alpha = \frac{AL}{R}$$

$$\sin \alpha = \frac{PL}{R}$$

$$S_{\triangle APL} = \frac{1}{2} \cdot R \cos \alpha \cdot R \sin \alpha .$$

השטח האפור הוא:

$$S_{\text{אפור}} = \text{אפור} = \frac{R^2}{2} \left(\frac{\pi}{3} - \cos \alpha \sin \alpha \right)$$

בלי הקבוע $\frac{R^2}{2}$ הנזרת הראשונה היא:

$$-((- \sin \alpha) \cdot \sin \alpha + \cos \alpha \cdot \cos \alpha) = \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha .$$

הנזרת מתאפשרת כאשר $0 < \alpha < \frac{1}{6} \cdot 2\pi$. בזרה $\cos \alpha = \sin \alpha$ הפתרון היחיד הוא $\alpha = \frac{\pi}{4}$.

(2) הנגזרת השנייה היא $4 \sin \alpha \cos \alpha$ שהיא חיובית בזירה, ולכן נקודות הקיצון היא מינימום.

נשווה את החישוב שקיבלנו עם השטח הנוכחי:

$$\begin{aligned} \frac{R^2}{2} \left(\frac{\pi}{3} - \cos \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{4} \right) &= 24\pi - 36 = 12(2\pi - 3) \\ R^2 \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \right) &= 24(2\pi - 3) \\ \frac{R^2}{6} (2\pi - 3) &= 24(2\pi - 3) \\ R &= 12. \end{aligned}$$

סעיף ב

השטח המקסימלי של $\triangle APL$ הוא שטח הגירה פחות השטח המינימלי של השטח האפור:


$$\begin{aligned} S_{\triangle APL} &= \frac{\pi R^2}{6} - (24\pi - 36) \\ &= 24\pi - (24\pi - 36) = 36. \end{aligned}$$

8.7 קיז תשע"ו מועד ב

במשולש ישר זווית $\angle ABC = 90^\circ$ אורך היתר הוא k ס"מ (k הוא פרמטר). הניצב AB הוא גם יתר במשולש ADB , שהוא שווה שוקיים וישר זווית ($\angle ADB = 90^\circ$).

- א. סמן $x = AB$ והבע את BC באמצעות x ו- k .
- ב. נתון כי הערך המקסימלי של המכפלה $BC \cdot AD^2$ הוא $3\sqrt{3}$. מצא את שטח המשולש ADB (ערך מסווני), כאשר המכפלה $BC \cdot AD^2$ היא מקסימלית.

בזבוזתי הרבה זמן על השאלה כי בהעדר תרשימים שמתי את הנקודה D על היתר AC !



סעיף א

הביטויים עבור BC, AD, BD נובעים ממשפט פתגורס ומהנתון $\angle ADB = 90^\circ$ ש- $\triangle ADB$ שווה-שוקיים.

סעיף ב

$$\begin{aligned}
 (BC \cdot AD^2)' &= \left(\sqrt{k^2 - x^2} \cdot \frac{x^2}{2} \right)' \\
 &= \frac{-2x}{2\sqrt{k^2 - x^2}} \cdot \frac{x^2}{2} + \sqrt{k^2 - x^2} \cdot x \\
 &= \frac{2k^2x - 3x^3}{2\sqrt{k^2 - x^2}}.
 \end{aligned}$$

נניח כモובן שהמשולש לא מנוקן כך ש- $x \neq 0$. הנגזרת מתאפסת כאשר:

$$k = \sqrt{\frac{3}{2}}x, \quad x = \sqrt{\frac{2}{3}}k.$$

סימן הנגזרת השנייה הוא סימן הנגזרת של המונה של הנגזרת הראשונה:

$$(2k^2 - 3x^2)' = -6x < 0,$$

נקודות הקיצון היא מקסימלית.

$x = \sqrt{\frac{2}{3}}k$ כדי לקבל ערך מסוימי עבור k . נציב $BC \cdot AD^2 = 3\sqrt{3}$

$$\begin{aligned} \sqrt{k^2 - x^2} \cdot \frac{x^2}{2} &= \sqrt{k^2 - \frac{2}{3}k^2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}k^2 \\ &= k^3 \sqrt{\frac{1}{3}} \cdot \frac{1}{3} = 3\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$k^3 = 27$$

$$k = 3.$$

מכאן ש:

$$x = \sqrt{\frac{2}{3}}k = \sqrt{6}.$$

השטח המקסימלי של $\triangle ADB$ הוא:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{x}{\sqrt{2}} \cdot \frac{x}{\sqrt{2}} = \frac{x^2}{4} = \frac{(\sqrt{6})^2}{4} = 1.5.$$


8.8 קיז תשע"ו מועד א

נתונה הפונקציה $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^n$ ו- $x \neq 0$.

א. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים.

ב. הראה כי עבור x אי-זוגי $f'(x) \leq 0$ לכל $x \neq 0$.

לפניך שני גרפים, I ו- II. (בגרפים מוצגות כל נקודות הקיצון).



אחד הגראפים מייצג סקיצה של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ עבור x זוגי,

והגרף האחר מייצג סקיצה של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ עבור x אי-זוגי.

היעזר בגרפים I ו- II, וענה על הסעיפים ג, ד, ו- ה.

ג. עבור x אי-זוגי:

(1) מצא כמה נקודות קיצון (אם יש כאלה) יש לפונקציה $f(x)$. נמק.

(2) מצא כמה נקודות פיתול יש לפונקציה $f(x)$. נמק.

ד. עבור x זוגי:

(1) מצא כמה נקודות קיצון (אם יש כאלה) יש לפונקציה $f(x)$. נמק.

(2) מצא כמה נקודות פיתול יש לפונקציה $f(x)$. נמק.

(3) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ה. נתונות הפונקציות: $h(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^4$, $g(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^3$.

מהו הסימן של המכפלה $g''(x) \cdot h''(x) > 0$? נמק.

השאלה ארוכה מאוד אבל התשובות קצרות!

אני הסתובכתי כי לא פעליippi הפיה: "היעזר בגרפים ...".

סעיף א

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = y$ ויש אסימפטוטה אופקית ב- y . עבור $x \rightarrow -\infty$, עדין יש אסימפטוטה אופקית ב- $y = 0$, רק $f(x)$ שואפת ל-0 מעל לציר ה- x עבור $x < 0$ זוגית, ומתחת לציר עבור $x < 0$ אי-זוגית. הפונקציה לא מוגדרת עבור $x = 0$ ולכן $x = 0$ היא אסימפטוטה אנכית.

סעיף ב

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left((1+x^{-1})^n \right)' \\ &= n(1+x^{-1})^{n-1} \cdot -x^{-2}. \end{aligned}$$


נתון $n > 0$ חיובית. אם n אי-זוגית, $1 - x^{-1} = n$ זוגית, ו- $(1 - x^{-1})^{n-1}$ חיובית או אפס. כמובן x^{-2} חיובית (ולא אפס כי נתון $x \neq 0$). לכן סימן המינוס לפני x^{-2} גורם לכל הביטוי להיות שלילי. מכאן שגרף I מתאים ל- n אי-זוגית וגרף II ל- n זוגית.

סעיף ג

- (1) בנקודת קיצון של $f(x)$ הנגזרת הראשונה $f'(x)$ חוצה את ציר ה- x , שכן אין נקודות קיצון.
- (2) בנקודת פיתול הנגזרת השנייה מתאפסת. זה קורה פעמיים אחד משמאלי למינימום של $f'(x)$ ופעמיים אחד כאשר $f'(x) < 0$ יש נקודות מקסימום ללא שינוי בסימן. לכן יש שתי נקודות פיתול.

סעיף ד


- (1) בנקודת קיצון של $f(x)$ הנגזרת הראשונה $f'(x)$ חוצה את ציר ה- x , שכן יש נקודות קיצון אחת.
- (2) נקודות פיתול הנגזרת השנייה מתאפסת, ככלומר, יש נקודה קיצון לנגזרת הראשונה, שכן יש נקודות פיתול אחת.
- (3) לפי גרף II, עבור $x < 0$, השיפוע קרוב לאפס באסימפטוטה האופקית. השיפוע יורדת משמאלי עד לנקודות פיתול שם השיפוע עולה עד לנקודות מינימום של $f(x)$, ואז השיפוע עולה. עבור $x > 0$ השיפוע תמיד עולה מערך שלילי נמוך מאד ועד קרוב לאפס בכיוון האסימפטוטה האופקית.



סעיף ה

רואים בשני הגרפים שעבור $x > 0$, השיפוע, הנגזרת הראשונה, עולה, כך שהנגזרת השנייה חיובית. מכפלה של שני ערכיים חיוביים היא חיובית.

8.9 חורף תשע"ו



$$f(x) = \frac{x-1}{x+1}$$

נתונה הפונקציה
(ראה ציור).

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה,

ואת האסימפטוטות של הפונקציה
המקבילות לצירים.

ב. העבירו ישר המקביל לציר ה- x .

הישר חותם את גרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה C
ואת הישר $y = 2x$ בנקודה D .

נסמן את שיעור ה- x של הנקודה C ב- t .

מצא מה צריך להיות הערך של t , כדי שהאורך של הקטע CD יהיה מינימלי:

(1) עברו $-1 > t$.

(2) עברו $t < -1$.

ג. מצא את האורך המינימלי של הקטע CD עבור כל $t \neq -1$.

סעיף א

הפונקציה לא מוגדרת כאשר המכנה מתאפס: $x = -1$.


$x = -1$ יש אסימפטוטה אנכית כי המכנה מתאפס והמונה לא מתאפס.

$y = 1$ היא אסימפטוטה אופקית כי:

$$\frac{1 - \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}} \xrightarrow{x \pm \infty} 1.$$

סעיף ב

בתרשים סימנו את ערכי ה- x ליש שמות הנקודות:



יש כאן מלכודת שנייה להימנע ממנה רק אם מציריים תרשימים מדוייק. אמן t מוגדר כערך ה- x של $f(x)$ אבל האורך בין הפונקציה והקו $y = 2x = t - x - (-t) = t - x - a$ תלוי במקום היחסי בין הקו וגרף הפונקציה. ניתן גם לראות את החלוקה לשני הת-סעיפים רמז שיש לטפל בשני המקרים בנפרד.

(1) כאשר $-1 < t <$ אורך הקטע DC (נסמן a) הוא $a = -x - (-t) = t - x - a$. (מדובר במקרה ש- x, t , שליליים, אבל הנוסחה מתאימה גם אם קו במקומות אחרים). ערכי ה- y של שתי הנקודות שוויים, ולכן ניתן להציב בנוסחה עבור a : $x = \frac{y}{2} = \frac{f(t)}{2}$

$$\begin{aligned} a &= t - x = t - \frac{t - 1}{2(t + 1)} \\ &= \frac{2t^2 + t + 1}{2(t + 1)} \\ a' &= \frac{(4t + 1) \cdot 2(t + 1) - (2t^2 + t + 1)(2)}{4(t + 1)^2} \\ &= \frac{4t^2 + 8t}{4(t + 1)^2} = \frac{t(t + 2)}{(t + 1)^2} = 0. \end{aligned}$$

ערכים t של נקודות הקיצון נמצאות במקומות שהנגזרת הראשונה מתאפסת: $t = 0, t = -2$. את סוג נקודות הקיצון נקבל מהנגזרת השנייה: $t = 2t + 2$. כאשר $0 < t < -2$, הנגזרת חיובית והנקודה היא מינימום. כאשר $-2 < t < 0$ הנגזרת שלילית והנקודה היא מקסימום. לכן האורך המינימלי הוא:

$$t - x = 0 - \frac{0 - 1}{2(0 + 1)} = \frac{1}{2}.$$

(2) כאשר $-1 < t < 0$ אורך הקטע a הוא $a = x + (-t) = x - t - a$.

$$\begin{aligned} a &= x - t = \frac{t - 1}{2(t + 1)} - t \\ &= \frac{-(2t^2 + t + 1)}{2(t + 1)} \\ a' &= \frac{-(4t + 1) \cdot 2(t + 1) + (2t^2 + t + 1)(2)}{4(t + 1)^2} \\ &= \frac{-4t^2 - 8t}{4(t + 1)^2} = \frac{-t(t + 2)}{(t + 1)^2} = 0. \end{aligned}$$

ערכים t של נקודות הקיצון נמצאות במקומות שהנגזרת הראשונה מתאפסת, שוב ב- $-2 < t < 0$. הנגזרת השנייה היא $-(2t + 2)$. כאשר $0 < t < -2$, הנגזרת שלילית והנקודה היא מקסימום. כאשר $-2 < t < 0$ הנגזרת חיובית והנקודה היא מינימום. לכן, האורך המינימלי הוא:

$$x - t = -\frac{-2 - 1}{2(-2 + 1)} - (-2) = \frac{7}{2}.$$

סעיף 6

לכן האורך המינימלי עבר $-1 \neq t = \frac{1}{2}$ כאשר $0 < \frac{1}{2} < \frac{7}{2}$

8.10 קיז תשע"ה מועד ב

נתונה הפונקציה $f(x)$, ונตอน כי כל אחת מהפונקציות $f(x)$, $f'(x)$ ו- $f''(x)$ מוגדרת בתחום $x > 0$.

נתון גם: הגרף של $f'(x)$ חותך את ציר ה- x בנקודה שבין $x = 1$ ו- $x > 3$, $0 < x < 3$, ו יורדת בתחום $x > 3$.
האסימפטוטות של $f'(x)$ הן $y = 0$ ו- $x = 0$.

א. סרטט סקיצה של פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

נתון גם כי לפונקציה $f(x)$ יש אסימפטוטה אחת שמשוואתה $x = 0$.

ב. מצא את שיעורי ה- x של נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$ (אם יש כאלה), וקבע את סוגן.

ג. מצא את תחומי הקוירוט כלפי מעלה ו כלפימטה של הפונקציה $f(x)$. נמק.

ד. הפונקציה $f(x)$ מקבלת את כל הערכים בטוחה $y \geq 4$ ו רק אותם.
סרטט סקיצה של גраф הפונקציה $f(x)$.


צין על ציר ה- x ועל ציר ה- y את הערכים שמצאת.

ה. נתונה הפונקציה $g(x) = -[f(x)]^3$.

מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $g(x)$.

סעיף א

(בשאלה אין נוסחה לפונקציה, גם לא לאחר פתרון השאלה, ולכן התרשימים הוא ממש "סקיצה".)



סעיף ב


קיימת נקודת קיצון ב- $x = -1$ כי הנגזרת הראשונה מתאפסת ומחליפה סימן. הנקודה היא מינימום כי הנגזרת עולה.

סעיף ג

הנגזרת השנייה היא השיפוע של הנגזרת הראשונה, שהוא חיובי עבור $3 < x < 0$ ושלילי עבור $x < -3$. לכן הפונקציה קעורה כלפי מעלה ב- $x < 0$ וקעורה כלפי מטה ב- $x > 3$.

סעיף ד

אם הפונקציה מקבלת ערכים $y \geq 4$ אז נקודות המינימום שמתקבלת ב- $x = -1$ צריכים לקבל את הערך $y = 4$. נשתמש בתוון של פונקציה יש אסימפטוטה ב- $x = 0$, וכיוניה הקעירות מסעיף ג כדי להשלים את צורת הגרף:



סעיף ה

$f(x)$ חיובית בכל תחום ההגדרה, לכן גם $f^3(x)$ חיובית. סימן המינוס הופך את הסימן של ערך הפונקציה. $f(x)$ יורדת ב- $x < 0$ ולכן $g(x) = f(x)$ עולה בתחום זה. $f(x)$ עולה ב- $x < 1$ ולכן $g(x)$ יורדת בתחום זה.

אפשר להשתמש בנגזרת של $g(x)$:

$$g'(x) = -3f^2(x)f'(x).$$

$f^2(x)$ תמיד חיובי, ולכן לאור המינוס בתחילת הביטוי, תחומי העלייה והירדה הם התוחמים שערבי $f'(x)$ שליליים או חיוביים בהתאם. $f'(x)$ חותך את ציר ה- x משליליים לחוביים ב- $x = 1$, ולכן $g(x)$ עולה ב- $-1 < x < 0$ ויורד ב- $x < -1$.

8.11 **קייז תשע"ה מועד א**

- נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - a^2x + a^2$, a הוא פרמטר גדול מ-0.
- הראה כי המקסימום של הפונקציה מתקיים בנקודת שבה $y > 0$.
 - מצא עבור איזה ערך/אייזה תחום ערכיהם של a נקודת המינימום של הפונקציה:
 - נמצאת על ציר ה- x .
 - נמצאת מעל ציר ה- x .
 - נמצאת מתחת לציר ה- x . - סרטט סקיצה של גרף הפונקציה עבור כל אחד משלשות המקרים שבסעיף ב.
 - כמה פתרונות יש למשוואה $\frac{1}{3}x^3 - x + 1 = 0$? נמק.

סעיף א

נגזרת ראשונה:

$$\begin{aligned} f'(x) &= x^2 - a^2 = 0 \\ x &= \pm a \\ f''(x) &= 2x \\ f''(+a) &= 2a > 0 \\ f''(-a) &= -2a < 0. \end{aligned}$$

בשתי השורות האחרונות השתמשנו בנתון $a > 0$.
 $x = a$ והמינימום הוא ב- $x = -a$.

סעיף ב

המינימום הוא ב- $x = a$.

$$f(a) = -\frac{2}{3}a^3 + a^2 = a^2 \left(-\frac{2}{3}a + 1 \right).$$


a^2 חיובי ולא משנה על סימן של נקודות המינימום. הפתרון מתקיים על ידי השוואת $-\frac{2}{3}a + 1 = 0$ לאפס:

$$\begin{aligned} a &= \frac{3}{2} && \text{על ציר ה-}x \\ a &< \frac{3}{2} && \text{מעל ציר ה-}x \\ a &> \frac{3}{2} && \text{ מתחת לציר ה-}x. \end{aligned}$$

סעיף ג

נקודות המינימום מסומנות.

קו רציף: על הציר. קו מקווקו: מעל לציר. קו מנוקד: מתחת לציר.



סעיף ד

משווהה זו היא המשווהה הנתונה בשאלת כאשר $1 = a$. אבל $\frac{3}{2} < 1$, ולכן לפי סעיף ב המינימום נמצא מעל לציר ה- x . מכאן שאין פתרון אחר פרט לנקודות החיתוך של הגרף לפני המקסימום.

8.12 חורף תשע"ה

נתון כי הפונקציה $f(x)$ ופונקציית הנגזרת שלה $f'(x)$ מקיימות
נתון גם: $f(0) = 1$, $f'(x) = kx + 2$ הוא פרמטר.

א. מצא את הערך המספרי של $f(3)$, ומצא את הפונקציה $f(x)$ (בלי פרמטרים).

ב. הפונקציה $g(x)$ מקיימת $g(x) = \sqrt{f(x)}$.

$$\therefore g(x) = |x + 1| \quad (1)$$

סרטט במערכת צירים אחד סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$ (2)

וסקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

סעיף א

לפי הנוסחה לנגזרת של חזקה של פונקציה, $(f(x)^{\frac{1}{2}})' = \frac{1}{2}f(x)^{-\frac{1}{2}}f'(x)$ שהיא הפונקציה המופיעות באינטגרל. נחשב את ערך האינטגרל:

$$\begin{aligned} \int_0^3 \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}} dx &= \left. \sqrt{f(x)} \right|_0^3 \\ &= \sqrt{f(3)} - \sqrt{f(0)} = \sqrt{f(3)} - 1 = 3 \\ f(3) &= 4^2 = 16. \end{aligned}$$

הפונקציה $f(x)$ מתΚבלת מאינטגרציה של הנוסחה לנגזרת ומהישוב הקבוע והפרמטר מהערכים הידועים של $f(0), f(3)$

$$f(x) = \int (kx + 2) dx = \frac{1}{2}kx^2 + 2x + c$$

$$f(0) = c = 1$$

$$f(3) = \frac{9}{2}k + 7 = 16$$

$$k = 2$$

$$f(x) = x^2 + 2x + 1.$$


סעיף ב

$$g(x) = \sqrt{f(x)} = \sqrt{x^2 + 2x + 1} = \sqrt{(x+1)^2} = |x+1|.$$

אם $x+1 \geq 0$ אז $x+1$ חיובי ו-


אם $x+1 < 0$ אז $x+1$ שלילי ו-

ביחד יש לנו $|x+1|$.

סעיף ג

8.13 קיז' תשע"ז מועד ב

נתון מלבן $ABCD$.




הצלע DC מונחת על הקוטר של חצי מעגל שהרדיוס שלו R ומרכזו M כך ש- $DC \geq R$. הצלע AD משיקה לחצי המעגל בנקודה D והקדקוד B נמצא על המעגל (ראה ציור).

נסמן: $\angle BMC = x$

$ABCD$ – שטח המלבן $S(x)$

- ממצא מה צריך להיות x , כדי ששטח המלבן $S(x)$ יהיה מקסימלי.
- הבע באמצעות R את השטח המוגבל על ידי גוף הפונקציה $S(x)$ ועל ידי ציר ה- x

בתחום $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.



סעיף א

עם הסימונים בתרשימים:

$$S(x) = a(R + b) = R \sin x(R + R \cos x) = R^2 \sin x(1 + \cos x).$$

נחשב את הנגזרת:

$$\begin{aligned} S'(x) &= R^2(\cos x(1 + \cos x) + \sin x \cdot -\sin x) \\ &= R^2(\cos x + \cos^2 x - \sin^2 x) \\ &= R^2(\cos x + \cos^2 x - (1 - \cos^2 x)) \\ &= R^2(2\cos^2 x + \cos x - 1) = 0 \\ &= R^2(2\cos x - 1)(\cos x + 1) = 0. \end{aligned}$$

אנחנו פוסלים את הפתרון $x = 180^\circ$ כי $\cos x = -1$ לא יכול להיות זווית במשולש.

לכן, $x = 60^\circ$, $\cos x = \frac{1}{2}$

הנגזרת השנייה היא: $(1)(2\cos^2 x + \cos x - 1)' = -\sin x(4\cos x + 1)$

$$-\sin 60(4\cos 60 + 1) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot (4 \cdot \frac{1}{2} + 1) = -\frac{3\sqrt{3}}{2} < 0,$$


ולכן נקודת הקיצון היא מקסימום.

סעיף ב'

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} R^2 \sin x (1 + \cos x) dx = R^2 \cdot -\frac{1}{2} (1 + \cos x)^2 \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{R^2}{2} (1^2 - 2^2) = \frac{3R^2}{2}.$$

8.14 קיז תשע"ד מועד א

בציר שלפניך מוצג הגרף של פונקציית הנגזרת $(x^f)'$.



האסימפטוטה היחידה של הפונקציה (x^f) היא $x = 0$.

נתון כי יש פתרון אחד בלבד למשוואה $f(x) = 2$.

ופתרון אחד בלבד למשוואה $f(x) = -2$.

א. רק על פי נתוני השאלה,

סרטט סקיצה של הפונקציה (x^f) . נמק.

ב. נתון גם כי פונקציית הנגזרת $(x^f)'$ היא:

a ו- b הם פרמטרים שונים מד' 0.


מצא את הפונקציה (x^f) (בלי פרמטרים).

סעיף א

כאשר x עולה בערכים חיוביים, הנגזרת עולה בצורה תלולה מערכיים שליליים ובצורה מתונה לערכים חיוביים, ולכן הפונקציה יורדת בצורה תלולה ואח"כ עולה בצורה מתונה.

כאשר x עולה בערכים שליליים, הנגזרת יורדת בצורה מתונה מערכים חיוביים ובצורה תלולה לערכים שליליים, ולכן הפונקציה עולה בצורה מתונה ואח"כ יורדת בצורה תלולה.

לפי התרשימים הנתון בנקודה $-1 = x$ יש נקודת קיצון שהיא מינימום כי השיפוע יורד. בנקודת $1 = x$ יש נקודת קיצון שהיא מינימום כי השיפוע עולה. לפי המידע הנתון על הפתרונות של (x^f) , נקודת הקיצון שהיא המינימום היא $(-2, -1)$ ונקודת הקיצון שהיא מינימום היא $(2, 1)$, כי אם יש רק פתרון אחד, גרף הפונקציה לא יכול לחצות את הקווים $y = 2$ ו- $y = -2$.



סעיף ב

לפי הגרף 0, $a = b$, $\frac{a-b}{a} = 0$ ונתון $a \neq 0$, ולכן $f'(1) = f'(-1) = 0$.
שוב בגלל ש- $a \neq 0$ אפשר למצמצם את הפרמטרים:

$$f'(x) = \frac{a(x^2 - 1)}{ax^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}.$$

נחשב את האיטרגל של הנגזרת כדי למצוא את הפונקציה:

$$f(x) = \int f'(x) dx = \int \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) dx = x + \frac{1}{x} + c.$$

הנגזרת מתאפסת ב- $x = \pm 1$, ולכן נקודות המינימום והמקסימום גם הן ב- $x = \pm 1$:

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{1} + c &= 2 \\ -1 + \frac{1}{-1} + c &= -2, \end{aligned}$$

ולכן $c = 0$
 $f(x) = x + \frac{1}{x}$ הפונקציה היא

8.15 חורף תשע"ד

בטבלה שלפניך מוצגים ערכים מסוימים של הפונקציה $f(x)$ בקטע $1 < x < 2$.

x	1.1	1.2	1.3	1.4
$f(x)$	1.19	1.28	1.36	1.43

הfonקציה $f(x)$ חיובית בקטע הנתון, ואין לה נקודות קיצון פנימיות בקטע זה.

נתון כי פונקציית הנגזרת השנייה $(x)''f$ שלילית בקטע הנתון.

א. קבוע מהו הסימן של $(1.2)f'$. נמק.

ב. קבוע אם הטענה $(1.3) < f'(1.2) < f'(1.1)f'$ נכונה. נמק.

נתונה הפונקציה $(x)g = \sqrt{f(x)}$ בקטע $1 < x < 2$.

ג. בקטע הנתון מצא תחומי עלייה וירידה של הפונקציה $(x)g$ (אם יש כאלה). נמק.

ד. הראה כי בתחום $1.1 \leq x \leq 1.3$ אין פתרון למשוואת $g'(x) = f'(x)$.

בבחינה זו היו שלוש שאלות בפרק השני לבן מספר השאלה הוא 9 ולא 8.

סעיף א

לפי הطבלה הפונקציה עולה מ- $x = 1.1$ דרך $x = 1.2$ ל- $x = 1.3$. נתון שאין נקודות קיצון פנימיות ולכן הנגזרת הראשונה חיובית.

סעיף ב

הנגזרת השנייה שלילית כך שהנגזרת הראשונה יורדת בתחום ולכן הטענה נכונה.

סעיף ג

$$g'(x) = \frac{1}{2}f(x)^{-\frac{1}{2}}f'(x).$$

מסעיף א, גם $f(x)$ וגם $f'(x)$ חיוביים בתחום, ולכן $g'(x)$ חיובי, ו- $g(x)$ עולה בתחום.

סעיף ד

$$\begin{aligned} g'(x) &= f'(x) \\ \frac{1}{2\sqrt{f(x)}}f'(x) &= f'(x) \\ f(x) &= \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

מצאנו שהנגזרת הראשונה חיובית כך שאפשר לצמצם אותה. לפי הטבלה, $f(x)$ אינה פונקציה קבועה בכל התחום, لكن לא ניתן ש- $f'(x) = g'(x)$.

המלצות: פרקים 8, 7, 6

- אי-אפשר להכין טבלה של עליות וירידות עד שלא מחשבים את תחום ההגדרה וגם כל נקודות הקיצון של הפונקציה, כי רק בינהם אפשר לסמוך על זה שאין שינוי בכיוון הפונקציה.
- אני אוהב להשתמש בתנויות ידיהם כדי "לראות שיפועים" ולקבע אם פונקציה עולה או יורדת, וכן אם נקודות קיצון היא מקסימום או מינימום. אני מיזע כף יד שטוחה לאורך הפונקציה מערכיים לחובאים על ציר $\text{-}x$. אם כיוון היד למטה הפונקציה יורדת, ואם הכוון למעלה הפונקציה עולה. אם היד עוברת מכיוון למטה לכיוון למעלה, השיפוע (הנגזרת) עולה, וכך שהנגזרת השנייה היא חיובית ונקודת הקיצון היא מינימום. שינוי הפוּך בכיוון היד מראה שקיים מקסימום.
- אני מציע להתרחק מהמחשבון עד כמה שאפשר ולהשאיב עם סימנים אלגבריים. הסיבה היא שקשה למצוא שגיאות הנגרמות על ידי טעויות בຄלה על המחשבון, אבל אפשר לעבור שוב ושוב על חישוב אלגבראי כדי לוודא את נכונותו.
- אל תקצרו בחישובים. לעיתים קרובות שגתי כי השטתי סימן מינוס. לוקח מעט זמן לרשות שורה נוספת לעמוד הזמן הדרוש לחפש שגיאה בחישוב מקוצר.
- אני מעדיף לסוג נקודות קיצון על ידי בדיקת הסימן של הנגזרת השנייה ולא על ידי חישוב טבלת עליות וירידות.
- ככלים יודעים שאם המכנה של המנגזרת הראשונה חיובי, הסימן של המנגזרת השנייה זהה לסימן של המנגזרת של המונה של המנגזרת הראשונה. חשוב לא לטעון שהנגזרת התקפה שווה לנגזרת של המונה של המנגזרת הראשונה!¹ עם זאת, יש נוסחה לנגזרת השנייה התקפה רק עבור נקודות בהן המנגזרת האשונה מתאפשרת והן **נקודות בנקודת הקיצון**.² עברו:

$$f'(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$$

$$\text{ו-} a \text{ כך ש-} 0 : f'(a) =$$

$$f''(a) = \frac{g'(a)}{h(a)}.$$

ההוכחה פשוטה: חישבו את הנגזרת וצמצמו את השבר.

nbia דוגמה:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x^2 + x - 1}{x^2 - x + 1} \\ f'(x) &= \frac{-2x^2 + 4x}{(x^2 - x + 1)^2}. \end{aligned}$$

נקודות הקיצון הן:

$$a_1 = (0, -1), \quad a_2 = \left(2, \frac{5}{3}\right).$$

¹ראו: יונתן אחיטוב. 'גירה שנייה מוקוצרת' כדרך לאפיון נקודות קיצון. על"ה 20, 2002, עמ' 27–26.

²ראו במאמר של אחיטוב גם "לימוד ולמד אנליה", עמ' 323 – 322.

בגלו שהמכנה חיובי, הסימן של הנגזרת השנייה הוא הסימן של:

$$(-2x^2 + 4x)' = -4x + 4,$$

למרות שזו לא הנגזרת השנייה. עבור נקודות הקיצון, $0 < -4 \cdot 0 + 4 = 4 > 0$ ו- a_1 היא מינימום, ו- $0 < -4 \cdot 2 + 4 = -4 < 0$ ו- a_2 היא מקסימום.

עבור הנקודות $a = a_1, a = a_2$ אפשר לחשב את הנגזרת השנייה ולבודק ש:

$$f''(a) = \frac{-4a + 4}{a^2 - a + 1}.$$

- שימושו לב להגדירה של נקודת פיתול: נקודה בה משתנה הקעירות של הפונקציה. בנקודת פיתול, הנגזרת השנייה מתאפסת או לא מוגדרת, אבל יש פונקציות שמקיימות אחד מהתנאים האלה בנקודה מסוימת אבל אין שם נקודת פיתול. למשל, הנגזרת שנייה של $f(x) = x^4$ מתאפסת ב- $x = 0$ אבל יש שם מינימום ולא נקודת פיתול.³

בקודמת פיתול **הנגזרת הראשונה** לא חייב להתאפס. למשל, עבור x :

$$\begin{aligned} f'(0) &= \cos 0 = 1 \\ f''(0) &= -\sin 0 = 0. \end{aligned}$$

- כאשר מופיע שורש בפונקציה הכוונה היא לשורש החיובי. אבל, כאשר לוקחים שורש של x^2 , הכוונה היא לערך המוחלט של x . למשל, אם $\sqrt{3^2} = 3 = x$, אבל אם $\sqrt{(-3)^2} = 3 = -x$.

כאשר מחשבים אסימפטוטות של פונקציות עם שורשים, יש לקחת את זה בחשבון:

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{\frac{x}{\sqrt{x^2}}}{\sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}}} = \frac{\frac{x}{|x|}}{\sqrt{1 - \frac{a^2}{x^2}}} \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} \pm 1.$$

- אם השאלה מבקשת נקודות חיתוך עם הצירים או נקודות קיצון, יש נתיחה להסתפק בחישוב ערך ה- x , אבל התשובה חייבת להיות קוודינטota (x, y) .

- כאשר מבקשים לחשב אינטגרל "מפחיד" של פונקציה, תמיד הפונקציה תהיה נגזרת של פונקציה שאפשר לנחש בקלות. למשל:

$$\int \frac{2 \sin x}{\cos^3 x} dx$$


נראה "מפחיד" אבל אם נתבונן בו קצת נבין ש:

$$(\cos^{-2} x) = -2 \cdot (-\sin x) \cos^{-3} = \frac{2 \sin x}{\cos^3 x}.$$

לפעמים מבקשים $\int f'(x) dx$ כאשר $f(x)$ נתון, אז אין מה לחשב!

³"ללמד וללמוד אנגליזה", עמ' 227

- שימושו לב להבדל בין שטח לאינטגרל.




אם מבקשים את האינטגרל של סינוס מאפס עד 2π , התשובה היא אפס:

$$\int_0^{2\pi} \sin x \, dx = -\cos x|_0^{2\pi} = -(1 - 1) = 0.$$

אבל אם מבקשים את השטח התחום על ידי הפונקציה וציר x התשובה היא:

$$\int_0^\pi \sin x \, dx + \int_\pi^{2\pi} -\sin x \, dx = -\cos x|_0^\pi + \cos x|_\pi^{2\pi} = -(-1 - (1)) + (1 - (-1)) = 4.$$

- אינטגרל של פונקציה אי-זוגית בתחום סימטרי סביב ציר $\text{ה}-y$ הוא אפס, ואינטגרל של פונקציה זוגית בתחום סימטרי הוא פי שניים האינטגרל של התחום החזובי בלבד.
- בעיות עם פונקציות טריגונומטריות, ציירו תרשימים של מעגל היחידה וסמןו עליו את תחומי ההגדרה. התרשימים יעזר בקביעת סימני הפונקציות ובعرצי הפונקציות כאשר מוסיפים או מחסירים כפולות רצינליות של π .




נספח א' אין לสมוד על איורים


הנה הוכחה "נכונה" שבל משולש שווה שוקיים!

נתון משולש שרירוטי ABC , תהי P נקודת החיתוך בין חוצה הזווית של $\angle BAC$ לבין האמצעי של BC . סימנו ב- D, E, F - את נקודות החיתוך של האנכים מ- P לצלעות BC, AB, AC בהתאמה. כי הם משולשים ישר זווית עם זוויות שוות α וצלע AP משותף. $\triangle APE \cong \triangle APF$ לפי צ.צ. כי $PD = DC = a$. כי $BD = DC = a$ והוא האמצעי ל- BC . $\triangle DPB \cong \triangle DPC$ כי $EP = PF$ לפי החפיפה הראשונה, ו- $PB = PC$ לפי החפיפה השנייה. לחבר את השוויונות ונקבל ש- $\triangle ABC$ שווה שוקיים:









$$AB = AE + EB = AF + FC = AC.$$











הבעיה בהוכחה היא שהairo אינו נכוון כי הנקודה P נמצאות מוחוץ למשולש:



נספח ב' ייצוג גרפי של משפטים בגיאומטריה







נספח ג' מעגל היחידה

1.ג' רבעים של מעגל היחידה

מעגל שהרדיוס שלו 1 נקרא **מעגל היחידה**.



הצירים את מעגל היחידה באופן טבעי לארכעה **רבעים**. זוויות נמדדות **מעלות** בין 0° ל- 360° כאשר הכיוון החיבובי הוא נגד כיוון השעון. יחידה אחרת לזוויות היא **רדיאן**. רדיאן אחד הוא הזווית כוללת קשת על היקף המעגל שאורכו שווה לרדיאוס. במעגל היחידה הרדיוס הוא 1 ולכן אורך היקף הוא 2π . כאשר קרן מסתובבת לאורך כל היקף (נגד כיוון השעון) היא עוברת מזוויות 0 רדיאנים לזוויות 2π רדיאנים. רדיאן אחד שווה בערך 57.3 מעלות.




מהחיתוכים של הצירים עם מעגל היחידה קיבל את ערכי הסינוס והקוסינוס של הזוויות:


זווית (מעלות)	זווית (רדיאנים)	\sin	\cos
0	0	0	1
90	$\pi/2$	1	0
180	π	0	-1
270	$3\pi/2$	-1	0

2.ג' חלוקת מעגל היחידה ל-8 קטעים

נחלק כל רביע בחצי ונקבל 8 קטעים. הזווית של כל קטע הוא 45° או $\pi/4$ רדיאנטים:



במשולש $\triangle ABC$ אם הזווית $\angle BAC$ הוא 45° , הזווית הנגדית $\angle ABC$ חייבת להיות גם היא 45° כדי שסכום הזוויות במשולש יהיה 180° . המשולש שוו-שוקיים כך שערכי הסינוס והקוסינוס שוויים.



ממשפט פיתגורס:

$$\sin^2 45 + \cos^2 45 = 1$$

$$2 \sin^2 45 = 1$$


$$\sin 45 = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos 45 = \sin 45 = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

3.ג' סינוס וкосינוס של זוויתות גדולות מ- 90°

עכשו שאנו יודעים את ערכי הסינוס והקוסינוס של 45° , נוכל לשאול על הזוויתות הסימטריות $135^\circ, 225^\circ, 315^\circ$. בעזרת חבירינו מעגל היחידה, נמצא מיד את ערכי הסינוס והקוסינוס שלן.


תחילה נחשב את הערכים עבור זווית שירוטית θ בربיע הראשון. היטל הקרן θ על הצירים x, y שוים כך שיש רק לשנות את הסימנים. בربיע השני:



$$\cos 135 = \cos(180 - 45) = -\cos 45 = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin 135 = \sin(180 - 45) = \sin 45 = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

נסתכל על הרביע השלישי והרביע הרביעי:



עבור הרביע השלישי:

$$\cos 225 = \cos(180 + 45) = -\cos 45 = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin 225 = \sin(180 + 45) = -\sin 45 = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

עבור הרביע הרביעי, נוח להשתמש בזווית השלילית θ – במקומות הזוגיות החיובית $360 - \theta$

$$\cos 315 = \cos(-45) = \cos 45 = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin 315 = \sin(-45) = -\sin 45 = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

נסכם את הערכים בטבלה:



זווית (מעלות)	זווית (רדיאנים)	\sin	\cos
θ	θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$
$180 - \theta$	$\pi - \theta$	$\sin \theta$	$-\cos \theta$
$180 + \theta$	$\pi + \theta$	$-\sin \theta$	$-\cos \theta$
$-\theta$	θ	$-\sin \theta$	$\cos \theta$

עבור $:45^\circ$


זווית (מעלות)	זווית (רדיאנים)	\sin	\cos
45	$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$
135	$3\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$-\sqrt{2}/2$
225	$5\pi/4$	$-\sqrt{2}/2$	$-\sqrt{2}/2$
315	$7\pi/4$	$-\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$

4.ג' הסינוס והקוסינוס של 30° ו- 60°


את מעגל היחידה ניתן לחלק ל-6 קטעים של 60° או ל-12 קטעים של 30° :




ברדייאנים:



נחשב תחילה את הסינוס של 30° . במשולש ישר-זווית:



ציר קו מ- C אל היתר כך שהזווית עם הצלע AC היא 30° :



מעובדות על זוויות במשולש השלמינו לצורך את שאר הזוויות. המשולש $\triangle BCD$ שווי-צלעות ואורך כל צלע הוא a . בנוסף, $\triangle ACD$ שווי-שוקיים כך ש- $a = 1 - a$ (זכור שהמשולש נמצא במפגל היחידה ואורץ היתר הוא 1). מכאן:


$$\sin a = a = 1 - a = \frac{1}{2}.$$

מהנוסחה $1 = \sin^2 \theta + \cos^2 \theta$ מתקבל ערך הקוסינוס:

$$\cos 30 = \sqrt{1 - \sin^2 30} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

5.ג' סינוס וкосינוס של $(90 - \theta)$


נפנה עכשו לחישוב של סינוס וקוסינוס של 60° . מד $90 - 30 = 60$, את הקשר בין 60° ו- 30° ניתן לראות מהزاויות של $\theta - 90$ במעגל היחידה:



הزاויות בנקודת המשולש נושק למעגל היחידה היא θ , כך שהפונקציות הטריגונומטריות של $\theta - 90$ מתקבעות מלאו של θ על ידי החלפת הצלע הנגדי והצלע השכן בהגדירות:

$$\begin{aligned}\cos(90 - \theta) &= \sin \theta \\ \sin(90 - \theta) &= \cos \theta.\end{aligned}$$

דרך אחרת לראות את הקשר היא לשים לב שהמשולש חופף את המשולש לחשב $\sin \theta$ ו- $\cos \theta$:



מכאן:

$$\begin{aligned}\cos 60 &= \cos(90 - 30) = \sin 30 = \frac{1}{2} \\ \sin 60 &= \sin(90 - 30) = \cos 30 = \frac{\sqrt{3}}{2}.\end{aligned}$$

ערכים הפונקציות הטריגונומטריות של כפולות של 30° , 60° מתקיים ממעגל היחידה כפי שראינו:

זווית (מעלות)	זווית (רדייאנים)	\sin	\cos
0	0	0	1
30	$\pi/6$	$1/2$	$\sqrt{3}/2$
60	$\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	$1/2$
90	$\pi/2$	1	0
120	$2\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	$-1/2$
150	$5\pi/6$	$1/2$	$-\sqrt{3}/2$
180	π	0	-1
210	$7\pi/6$	$-1/2$	$-\sqrt{3}/2$
240	$4\pi/3$	$-\sqrt{3}/2$	$-1/2$
270	$3\pi/2$	-1	0
300	$5\pi/3$	$-\sqrt{3}/2$	$1/2$
330	$11\pi/6$	$-1/2$	$\sqrt{3}/2$

נספח ד' נוסחאות בחדו"א

סינוס וкосינוס של $2x$

לעתים קרובות מופיעים נוסחאות עם $\sin 2x$ ו- $\cos 2x$. אין צורך לזכור את הנוסחאות המאפשרות לבטא את הפונקציות הללו עם x במקום $2x$, כי ניתן לשזר אותן תוך מספר שניות מהנוסחאות הטריגונומטריות עבור חיבור של זוויות, נוסחאות הניצנות בנוסחאות:

$$\begin{aligned}\sin 2x &= \sin(x + x) \\&= \sin x \cos x + \sin x \cos x \\&= 2 \sin x \cos x \\ \cos 2x &= \cos(x + x) \\&= \cos x \cos x - \sin x \sin x \\&= \cos^2 x - \sin^2 x \\&= (1 - \sin^2 x) - \sin^2 x \\&= 1 - 2 \sin^2 x.\end{aligned}$$

x בתחום גם אם $2x$ לא בתחום

נניח שהתחום הנתון הוא $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, ונניח שמקבלים את התוצאה $\sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}$. ברור שתשובה אחת היא $2x = \frac{\pi}{3}$, לא לשכוח את התשובה השנייה: $\sin 2\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, ו- $x = \frac{\pi}{3}$ בתחום, למרות ש- $2x = \frac{2\pi}{3}$ אינו בתחום.

חיבור או חיסור של $\frac{\pi}{2}$

חיבור או חיסור של $\frac{\pi}{2}$ משנה סינוס לקוסינוס ולהיפך. כל להשתכנע כי במשולש ישר זוית, הזווית החודות הן $\theta, \theta - \frac{\pi}{2}$, והצלע הנגדי של הזווית המופיע בהגדרת הסינוס מתחלף עם הצלע השכן של הפונקציה המופיע בהגדרת הקוסינוס.

נגזרות של פונקציות עם גורמים בחזקות לא שלמות וחוביות

בנוסחאות נتون:

$$(x^t)' = tx^{t-1}, \quad (\text{ט' מימי}),$$

אולם משתמשים בנוסחה רק עבור t שלם וחובי. אני מעדיף להשתמש בנוסחה זו עבור כל t , כי קל לזכור את הנוסחה והчисובים פשוטים. למשל, מיותר לזכור את הנוסחה הנتونה:

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

כי:

$$(\sqrt{x})' = (x^{\frac{1}{2}})' = \frac{1}{2}(x^{-\frac{1}{2}}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

הчисכון בולט כאשר צריכים לחשב נגזרת רצינלית:

$$\left(\frac{1}{x^t}\right)'.$$

אני רואה שימושים בנוסחה המוסבכת עבור נגזרת של פונקציה שהיא חלוקה כאשר $\frac{f(x)}{g(x)}$ כאשר $f(x) = 1, g(x) = x^t$.

$$\left(\frac{1}{x^t}\right)' = (x^{-t})' = -t(x^{-t-1}) = \frac{-t}{x^{t+1}}.$$

כאשר במונה יש קבוע ובמכנה יש פונקציה מורכבת עדין החישוב לא מסובך במיוחד. למשל:

$$\begin{aligned} \left(\frac{14}{x^2 - 3x + 4}\right)' &= 14 \left((x^2 - 3x + 4)^{-1}\right)' \\ &= -14(x^2 - 3x + 4)^{-2}(2x - 3) \\ &= \frac{-14(2x - 3)}{(x^2 - 3x + 4)^2}. \end{aligned}$$

נקודות חיתוך של שליליה של פונקציה

אם $0 \neq f(x) = -g(x)$. אמם התוצאה פשוטה אבל היא שימושית כאשר חושבו נקודות איפוס של נגזרת, וצריך למצוא נקודות איפוס של השיליה של הנגזרת, למשל:

$$(g(x) - f(x))' = (-1 \cdot (f(x) - g(x)))' = -1(f(x) - g(x))',$$

ולכן אם $(f(x_1) - g(x_1))' = 0$, מתקבל מייד $(g(x_1) - f(x_1))' = 0$